



ORIGINAL ARTICLE

Received:2016/02/06

Accepted:2016/03/15

Prevalence of Listeria Monocytogenes in Traditional ice Cream, Yazd, IRAN (2015) and Compared to Other Studies in Different Parts of Iran

Negar Hamidiyan(MS.c)¹, Meysam Soleimani(MS.c)¹, Amin Salehi-Abargouei(Ph.D)², Hossein Fallahzadeh (Ph.D)³, Fateme Akrami-Mohajeri(Ph.D)⁴

1.MS.c student in Food Hygiene and Safety, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2.Assistant professor, Nutrition and Food Security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3.Professor Research center of prevention and epidemiology of non-communicable disease, School of health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4.Correcting Author :Assistant Professor Zoonotic Diseases Research Center, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran Email:fateme.akrami@gmail.com Tel:09136517764

Abstract

Introduction: The bacterium causes listeriosis with severe clinical consequences such as meningitis, septicemia and abortion. There are a minimum data on dairy products contamination of Listeria in Iran. Thus, the objective of this study was to assess the prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream in Yazd, Iran and to summarize the studies that reported Listeria monocytogenes contamination in traditional dairy and if possible conduct meta-analyses to report single estimates for raw milk and ice cream for the whole country.

Methods: A total of 85 samples of traditional ice cream were examined for the presence of Listeria monocytogenes using a two-step selective enrichment. All isolates were subjected to standard biochemical test. We searched PubMed, science direct, Scopus, Google Scholar and Iranian local databases including Iranian Scientific Information database (www.sid.ir), Magiran (www.magiran.com) using the following keywords: prevalence, Listeria monocytogenes, raw milk, ice cream and Iran. Twenty-six items of related articles on raw milk and ice cream were conducted of different cities. Studies were included in the meta-analysis. Statistical heterogeneity between studies was evaluated using Cochran's Q test and I-squared. All Statistical analyses were conducted using STATA version 11.2.

Results: On the basis of biological tests, none of the samples were contaminated with Listeria monocytogenes. The results of the meta-analysis showed that the prevalence of *L. monocytogenes* in raw milk 4% and 7.1% traditional ice cream. P values less than 0.05 were considered statistically significant.

Conclusion: Consumption of raw milk with mild heat treatment or its usage in traditional dairy a common practice in Iran. Therefore, the lack of appropriate control measures could pose serious health problems.

Keywords: Listeria monocytogenes, traditional ice cream, Yazd, IRAN

Conflict of interest: The authors declared that there is no Conflict interests.

**This Paper Should be Cited as:**

Prevalence of Listeria Monocytogenes in Traditional ice Cream, Yazd, IRAN (2015) and Compared ... J Tolooebehdasht Sci 2017; 16(2):31-45. [Persian]



بررسی میزان شیوع لیستریا مونوستیوژنر در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال ۱۳۹۴ و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران

**نویسنده‌گان: نگار حمیدیان^۱، میثم سلیمانی^۱، امین صالحی ابرقوئی^۲،
حسین فلاح زاده^۳، فاطمه اکرمی مهاجری^۴**

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و اینمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی شهید صدوقی یزد

۲. استادیار مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید

صدوقی یزد

۳. استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

۴. نویسنده مسئول: استادیار مرکز تحقیقات بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و

طلوع بهداشت

دو ماهنامه علمی پژوهشی

دانشکده بهداشت یزد

سال شانزدهم

شماره: دوم

خرداد و تیر

شماره مسلسل: ۶۲

تاریخ وصول: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

مقدمه: لیستریا مونوستیوژنر عامل بیماری لیستریوزیس می‌باشد که علاطم شدیدی مانند متزیت، سپتی سمی و سقط جنین ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه اطلاعات انکدکی از آلودگی بستنی سنتی در ایران وجود دارد، هدف از این پژوهش تعیین میزان شیوع لیستریا مونوستیوژنر در نمونه‌های بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد و بررسی خلاصه مطالعات گزارش آلودگی لیستریا مونوستیوژنر در غذاهای ایرانی و انجام متأنیز برای شیر خام و بستنی سنتی برای کل کشور بود.

روش بررسی: در این مطالعه ۸۵ نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی جمع آوری شد و برای تعیین حضور لیستریا مونوستیوژنر از محیط‌های کشت غنی کننده و انتخابی و آزمون‌های بیوشیمیابی استفاده شد. با استفاده از کلید واژه‌های از جمله شیوع، لیستریا مونوستیوژنر، شیر خام، بستنی و ایران از بانک‌های اطلاعاتی SID و Science Direct، PubMed، Scopus، Google Scholar، Magiran از مقالات مرتبط با شیر خام و بستنی سنتی جمع آوری شدکه وارد متأنیز شدند.. ناهمگونی آماری بین مطالعات با استفاده از آزمون کوکران Q و I-squared محاسبه شد و داده‌ها با روش متأنیز مدل اثرات تصادفی و با نرم افزار STATA نسخه ۱۱/۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بر پایه‌ی آزمون‌های میکروبی هیچ‌گدام از نمونه‌ها به لیستریا مونوستیوژنر آلوده نبودند. نتایج متأنیز نشان داد که شیوع لیستریا مونوستیوژنر در شیر خام ۴ درصد و بستنی سنتی ۱/۷ درصد بود. مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

نتیجه گیری: با توجه به مصرف شیر خام و یا استفاده از آن در فرآورده‌های لبنی سنتی در ایران، نبود کنترل مناسب، می‌تواند سبب بروز خطرات جدی در سلامت جامعه شود.

واژه‌های کلیدی: لیستریا مونوستیوژنر، بستنی سنتی، یزد، ایران



ناقص پاستوریزاسیون زنده باقی بماند(۷-۱۰). این باکتری شامل ۶ گونه: لیستریا مونوستیوژن، لیستریا ایوانووی، لیستریا سیلجری، لیستریا اینوکووا، لیستریا ولشیمری و لیستریا گرایی است. لیستریا مونوستیوژن باکتری بیماری‌زای مهم در انسان و حیوانات است(۱۱).

این باکتری به طور وسیعی در محیط پراکنده هستند و در خاک، آب، سبزیجات، حیوانات اهلی و وحشی، مدفوع انسان و دام، گوشت خام سفید و قرمز، فرآوردهای گوشتی، شیر و غذاهای دریابی و فرآوردهای حاصل از آنها یافت می‌شود. همچنین ۵ درصد از انسان‌ها بدون نشان دادن هر گونه علامتی می‌توانند این باکتری را سال‌ها در روده خود حمل نمایند.

مقاومت در برابر سرما، خشکی و پایداری در برابر استرس‌های اسمزی باعث بقا و پراکنده‌گی آنها شده است، لذا به راحتی می‌تواند در مواد غذایی موجود در یخچال رشد نمایند و حتی در عملیات ناقص پاستوریزاسیون باقی مانده و از بین نرونده(۱۵-۱۲). لیستریوز یک عفونت است که هنگامی که یک شخص غذایی مانند شیر و محصولات لبنی، گوشت، تخم مرغ، میوه‌ها و سبزیجات آلوده با لیستریا مونوستیوژن را می‌خورد، می‌تواند رخ دهد(۱۶).

زنان باردار، نوزادان، افراد دارای بیماری‌هایی مانند سرطان، ایدز، دیابت، اختلالات مزمن کبدی و گیرندهای عضو، افراد مسن و افراد دارای نقص سیستم ایمنی گروههای در معرض خطر لیستریوزیس هستند(۱۴).

لیستریا معمولاً با علائم اسهال و استفراغ ناشی از تب و یا شیشه به آنفلوآنزا ظاهر می‌شود، اما لیستریوز جدی تهاجمی دارای علائم شدیدتر است، که ممکن است به سپتی سمی، منتگوآنسفالیت و

مقدمه

شیر و فرآوردهای آن به لحاظ دارا بودن ارزش غذایی بالا، در تغذیه انسان دارای نقش بسزایی هستند. این مواد به علت دارا بودن انواع مواد مغذی محیط بسیار خوبی جهت رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌های بیماری زا می‌باشند. بنابراین عدم رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری این ماده غذایی، خطرات و عوارض بهداشتی را در مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. در بین فرآوردهای شیر می‌توان از بستنی نام برد(۱). بستنی سنتی محصول لبنی و منجمد شده است که مواد اولیه آن شیر، شکر، خامه و تخم مرغ بوده و به آن انواع چاشنی‌ها، مواد رنگی، میوه و مغزهای خوراکی افزوده می‌شود(۲). چربی آن ۲-۳ برابر شیر و پروتئین آن نیز کمی بیشتر است از نظر میزان انرژی یکی از عالی ترین منابع است(۳). بستنی یکی از محظوظ ترین و پرطرفدار ترین دسر مورد علاقه کودکان و بزرگسالان است(۴). در کشور ما تولید بستنی‌های غیر پاستوریزه تحت عنوان بستنی سنتی بسیار رایج بوده و این فرآورده در فضول گرم ۶-۷ سال مصرف زیادی دارد(۵). بستنی به دلیل محیط مغذی و pH = ۶-۷ دوره طولانی نگهداری، می‌تواند محیط مناسبی برای رشد انواع میکروارگانیسم‌هایی مانند لیستریا باشد(۶). جنس لیستریا باکتری گرم مثبت، بدون اسپور و هوایی-بی هوایی اختیاری است که به صورت داخل سلولی و خارج سلولی قادر به رشد می‌باشد. این باکتری در آب، خاک، مدفوع انسان و دام، سبزیجات، گوشت خام سفید و قرمز، ماهی و شیر یافت می‌شود. توانایی رشد لیستریا در شرایط خشکی و سرما باعث افزایش بقا و پراکنده‌گی آن شده، لذا به راحتی قادر به رشد در مواد غذایی موجود در یخچال می‌باشد و می‌تواند در عملیات دو ماهنامه علمی پژوهشی طبقه بهداشت بزد



بنابراین، مطالعه حاضر با هدف خلاصه مطالعات گزارش آلدگی لیستریا مونوسیتوژن در غذاهای ایرانی و انجام متانالیز برای شیر خام و بستنی سنتی برای کل کشور بود.

روش بررسی

۸۵ نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی از مراکز توزیع مواد لبنی با توجه به میزان استفاده و تراکم از سراسر شهریزد بر حسب موقعیت جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق، غرب) جمع آوری شد نمونه‌ها در ظروفی که قبل استریل شده بودند جمع آوری شد و تحت شرایط استریل و طی زنجیره‌ی سرما شد و آزمایشگاه منتقل شد.

مقدار ۲۵ گرم بستنی سنتی تحت شرایط استریل برداشته و به مدت ۲ دقیقه در ۲۲۵ میلی لیتر از محیط غنی کننده لیستریا (University of Vermont media)(UVMI) و در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه-گذاری شد ۱ میلی لیتر از محیط غنی کننده اولیه را به ۹ میلی لیتر از (Fraser Broth) (UVMII) منتقل کرده و در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه-گذاری شد در مرحله دوم غنی کننده در پالکام آگار کشت داده شد و در ۳۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت گرمخانه-گذاری شد پلیت-ها برای کلنی‌های لیستریا مورد بررسی قرار گرفتند ۳ کلنی مشکوک (کلنی‌های سیاه فرو رفته) بر روی تریتون سوی آگار حاوی ۰/۰۶٪ مخمر (TSAYE) کشت داده و در ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه-گذاری شد جهت

سقط جنین منجر شود(۱۷). اولین مورد گزارش شده از لیستریوز در سال ۱۹۵۳ بعد از زایمان یک نوزاد مرده در اثر مصرف شیر خام دام مبتلا به ورم پستان توسط مادر، گزارش شده است(۱۸). علی‌رغم اینکه استاندارد جستجوی لیستریا در مواد غذایی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شده است اما هنوز رعایت استاندارد وجود لیستریا در مواد غذایی اجباری نشده است ضرورت اجباری شدن استاندارد جستجوی لیستریا در مواد غذایی حساس، لازم به نظر می‌رسد.

پتانسیل بالای شیر خام و فرآورده‌های لبنی به آلدگی با لیستریا در مطالعات بسیاری از کشورهای مختلف نشان داده شده است اما وضعیت واقعی لیستریا مونوسیتوژن در محصولات لبنی ارائه شده در ایران و همچنین شهریزد ناشناخته است و اطلاعات کمی از حضور لیستریا مونوسیتوژن در محصولات غذایی که در ایران مصرف می‌شود در دسترس است.

در حال حاضر روش استاندارد برای تشخیص لیستریا مونوسیتوژن، کشت می‌باشد. با در نظر گرفتن این نکات، لزوم مراقبت و نظارت پیوسته بر وضعیت آلدگی مواد غذایی به گونه‌های لیستریا به ویژه لیستریا مونوسیتوژن لازم به نظر می‌رسد.

این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژن در نمونه‌های بستنی سنتی عرضه شده در شهریزد انجام گردید. در حالیکه مطالعات زیادی از آلدگی لیستریا مونوسیتوژن در غذاهای مختلف در قسمت‌هایی از ایران انجام گرفته، ما از خلاصه اطلاعات منتشر شده در این زمینه آگاه نیستیم.



از آزمون کوکران Q و I-squared محاسبه شد (Higgins, 2002 .and Thompson, 2002

برای کشف آنکه تا چه حد استنتاج ممکن است وابسته به یک مطالعه خاص و یا تعدادی از مطالعات باشد از آنالیز حساسیت استفاده گردید.

برای ارزیابی سوگراپی چاپ مقالات از نمودار قیفی به Egger همراه تست های آماری Egger و Begg استفاده شد (et al, 1997

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از STATA نسخه ۱۱/۲ انجام شد (STATA Corp, College Station, TX) مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در مطالعه‌ی حاضر در مجموع ۸۵ نمونه بستنی سنتی در سطح شهرستان یزد جمع آوری و با هدف جداسازی لیستریا مونوسیتوژن مورد آزمایش قرار گرفتند. بر پایه‌ی آزمون‌های میکروبی هیچکدام از نمونه‌ها با لیستریامونوسیتوژن آلدود نبودند.

۲۶ مورد از مقالات مرتبط با شیر خام و بستنی سنتی از شهرهای مختلف کشور جمع آوری شد. لیستریا مونوسیتوژن در طیف وسیعی از محصولات یافت شد. نتایج آنالیز در جدول ۱ و ۲ آورده شده است. بنابراین، شیر خام باید توسط تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی به عنوان یک منبع آلدودگی کارخانه در نظر گرفته شود.

شناسایی لیستریا کلنی‌های جدا شده تحت آزمایش‌های بیوشیمیایی شامل رنگ آمیزی گرم، تست کاتالاز، تست تحرک در دمای ۲۵ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد، تخمیر قندهای گلوکز، مالتوز، رامنوز، مانیتول و زایلوز، احیا اسکولین، احیا نیترات، تست همولیز بتا، آزمون متیل رد و گز پروسکوئر Cyclic adenosine) CAMP و آزمایش MR/VP Science (PubMed (monophosphate در قرار گرفتند. در Google Scholar Scopus Direct ایرانی از جمله بانک اطلاعاتی علمی ایران (www.sid.ir)، Magiran (www.magiran.com) کلمات کلیدی "شیوع"، "لیستریا مونوسیتوژن"، "ایران"، "شیر خام"، "بستنی سنتی" و "ایران" جستجو شد.

داده‌ها براساس انتشار (به نام نویسنده و سال انتشار)، نوع ماده غذایی، حجم نمونه، تعداد نمونه مثبت آلدود به لیستریا مونوسیتوژن و روش ارزیابی آلدودگی لیستریامونوسیتوژن جمع آوری شد و داده‌ها استخراج و متآنالیز شد.

تعداد کل اندازه نمونه برای هر ماده غذایی و تعداد نمونه‌هایی که توسط لیستریامونوسیتوژن آلدود بودند برای محاسبه فراوانی نسبی (RF) که پس از آن به لگاریتم RF تبدیل شد استفاده گردید و به همراه خطای استاندارد آن (SE) به عنوان اندازه اثر برای متآنالیز استفاده شد (Egger and Hemkaran, ۲۰۰۱).

برای انجام متآنالیز از مدل اثرات متغیر (random effects) استفاده شد. ناهمگونی آماری بین مطالعات با استفاده (model



جدول ۱: ویژگی های مطالعات ارزیابی شیوع آلدگی لیستریا مونوستیوژندر شیرخام و بستنی سنتی

نام نویسنده/سال	نوع ماده غذایی	تعداد نمونه ها	شیوع گونه های	تعداد نمونه های مثبت	شیوع لیستریا	روش ارزیابی
رحیمی/۲۰۱۴	شیر گاو	۸۵	گونه های لیستریا	۹	لیستریا مونوستیوژن	PCR و روشن کشت
واحدی/۲۰۱۳	شیر خام شیر پاستوریزه	۱۰۰ ۱۰۰	شیر خام؛ پاستوریزه	۰	پاستوریزه؛ شیر خام	آزمایشهای بیوشیمیایی، و کشت
شهرآزادی/۲۰۱۳	شیر خام	۲۱۰	شیر خام	۴۲	٪۲۰	آزمایشهای بیوشیمیایی، و کشت
صالحیان/۲۰۱۳	بستنی سنتی	۵۰	۱	٪۲	٪۹	آزمایشهای بیوشیمیایی و کشت
صفارپور/۲۰۱۳	شیر	۵۹۶	۵۸	۶۹ :Real-Time PCR ۶۱ :conventional PCR	٪۹/۷۳ ٪۱۱/۵۷ ٪۱۰/۲۳	,Conventional PCR و Real-Time PCR و کشت
جمالی/۲۰۱۳	شیر ورم پستان گاو	۲۰۷	۲۱	٪۱۰/۱۴	٪۸/۲۱	آزمایشهای بیوشیمیایی، کشت و PCR

سال شانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر ۱۳۹۶

دو ماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد



بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژن در بستنی سنتی عرضه و

آزمایش‌های بیوشیمیابی و کشت	روش ارزیابی	شیوع لیستریا مونوسیتوژن	تعداد نمونه‌های مثبت لیستریا مونوسیتوژن	شیوع گونه‌های لیستریا	تعداد نمونه‌های مثبت گونه‌های لیستریا	تعداد نمونه‌ها	نوع ماده غذایی	نام نویسنده/سال
آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت و PCR	%۴/۳۹	۴	%۵/۴۹	۵	۹۱	شیر خام	آفاخانی/۲۰۱۲	
آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت و PCR	%۳۷	۳۷	روش کشت: ۴:PCR	۱۰۰	شیر خام	جامی/۲۰۱۰		
آزمایش‌های بیوشیمیابی و کشت	%۶	۶	شیر خام: ۱	۱۰۰	شیر خام و شیر پاستوریزه: ۱۰۰	رحیمی/۲۰۱۰		
آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت و PCR	%۱۱	۱	%۱۱/۱	۱۰	شیر خام گاؤ	رحیمی/۲۰۱۰		
آزمایش‌های بیوشیمیابی و کشت	%۲۵	۲		۱۲۰	شیر خام	محمودی/۲۰۱۰		

سال شانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر ۱۳۹۶

دو ماهنامه علمی پژوهشی طب عمومی بهداشت یزد



آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت و PCR	۸	شیر خام	جلالی/۲۰۰۸
Micro-ID Listeria Kit (Remel, Lenexa, KS)	%۱/۶	۸	%۲/۲	۱۱	۵۰۰	شیر خام	مشتاقی/۲۰۰۷
آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت و PCR	%۲/۵	۱			۴۰	شیر	نوروزی/۲۰۰۵
آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت	%۵/۱	۳	شیر خام: شیر پاستوریزه:	۲۰۰	شیر خام: شیر پاستوریزه:	۲۰۰۴/زاده	
آزمایش‌های بیوشیمیابی و کشت	.	۰	%۲۵/۲۷	۱۱۵	شیر: بستنی:	۴۵۵	مجتهدی/۲۰۰۴
آزمایش‌های بیوشیمیابی، کشت و تسهیه‌ای سرو‌لوژیک، روش ارزیابی	%۲	۴			۱۹۰	شیر خام	رضوی روحانی/۱۹۹۰
آزمایش‌های بیوشیمیابی و کشت	۰	۰	%۴	۴	۱۰۰	بستنی سنتی	بنیادیان/۲۰۰۷

سال شانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر ۱۳۹۶

دو ماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد



بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژن در بستنی سنتی عرضه و

آزمایش‌های بیوشیمیابی و
کشت

۱۳۰ هویدا/۲۰۰۷

آزمایش‌های بیوشیمیابی و
کشت

۲۰۰ شاکریان/۲۰۰۷

آزمایش‌های
بیوشیمیابی، کشت و
PCR

رجیمی/۲۰۱۰

آزمایش‌های
بیوشیمیابی، کشت و
PCR

نوروزی/۲۰۱۳

آزمایش‌های بیوشیمیابی و
کشت

سهرابی/۲۰۱۳

آزمایش‌های
بیوشیمیابی، کشت و
PCR

شاملو/۲۰۱۵



لیستریا مونوستیوژنر مشاهده نشد. که این نتایج با نتایج گزارش شده توسط شاملو و همکاران در سال ۲۰۱۵ در اصفهان(۲۱)، رحیمی و همکاران در سال ۲۰۱۲ در چهارمحال بختیاری(۲۲)، شاکریان و همکاران در سال ۲۰۰۶(۲۳)، کریم و همکاران در سال ۱۳۷۳ در تهران(۲۴)، پاسینی و همکاران در سال ۱۹۹۶ در ایتالیا(۲۵)، رولا و همکاران در سال ۱۹۹۴ در لهستان(۲۶) و وارکه و همکاران در سال ۲۰۰۰ در هند(۲۷) مطابقت دارد و هیچ گونه موارد مثبت آلدگی به این باکتری را گزارش نمودند البته جدا نشدن لیستریا مونوستیوژنر از نمونه‌ها دلیل بر عدم وجود آلدگی به این باکتری نمی‌باشد، زیرا شاید تراکم سایر میکروارگانیسم‌ها و وجود باکتری‌های مختلف در بستنی و اثر نامطلوب و ممانعت کننده رشد آنها بر روی این باکتری باشد. بررسی انجام شده در اتیوپی، آلدگی ۱۹/۶ درصد بستنی به لیستریا مونوستیوژنر را نشان داده است(۲۸). و در یک بررسی دیگر در اصفهان لیستریا مونوستیوژنر در ۱۵ درصد (۹ نمونه) بستنی ستی تشخیص داده شد(۲۰). که بالاتر از نتایج ما بود. شیوع بالای لیستریا مونوستیوژنر در بستنی ستی می‌تواند به دلیل آلدگی محیطی یا تولید غیر بهداشتی مواد غذایی و روش‌های ذخیره باشد. فاکتورهای دیگری مانند افزودنی‌ها ممکن است در آلدگی نقش داشته باشد.

صالحیان و همکاران در سال ۲۰۱۳ در ساری مطالعه‌ای انجام داد که نشان داد یک نمونه بستنی (۲ درصد) به لیستریا مونوستیوژنر آلدود بوده است(۲۹).

در یک بررسی انجام شده توسط اکیا و همکاران در سال ۲۰۱۳ در کرمانشاه، از لحاظ آلدگی به لیستریا مونوستیوژنر منفی

بحث و نتیجه گیری

وضعیت واقعی لیستریوزیس در ایران ناشناخته است و اطلاعات کمی در مورد شیوع لیستریا مونوستیوژنر در غذاهای مصرف شده در کشور موجود است. همچنین مهم است توجه شود که لیستریوزیس بیماری قابل گزارش در برنامه بهداشت ایران نیست. علاوه بر این، معیار و یا پیشنهاد برای لیستریا مونوستیوژنر در مواد غذایی در کشور وجود ندارد.

عادات غذا خوردن جمعیت ایرانی از دیگر کشورهای غربی متفاوت است. گذشته از برخی از مواد غذایی غربی، انواع قابل توجهی از مواد غذایی به صورت محلی تولید و سنتی مصرف می‌شود.

اولین مرحله برای متقاعد کردن مقامات نظارتی و صنایع خصوصی در مورد اهمیت لیستریا در مواد غذایی، ارائه داده‌ها درباره شیوع باکتری در غذاهای مختلف است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع لیستریا مونوستیوژنر در نمونه‌های بستنی ستی عرضه شده در شهر یزد انجام گردید.

نتایج نشان داد که لیستریا مونوستیوژنر در ۸۵ نمونه بستنی ستی جمع آوری شده از سوپرمارکت‌های شهر یزد وجود ندارد.

در بستنی میزان خیلی پایین آلدگی لیستریا مونوستیوژنر، توسط رحیمی و همکاران در سال ۲۰۱۰ در شهر کرد و شیراز گزارش شد که میزان آلدگی بستنی ستی $\frac{3}{3}$ درصد بوده است(۱۹). اگرچه در بررسی دیگر رحیمی و همکاران در سال ۲۰۱۰ آلدگی بستنی ستی عرضه شده در اصفهان به لیستریا مونوستیوژنر را ۵ درصد گزارش نمودند(۲۰).

در تحقیق حاضر هیچگونه موارد مثبتی از لحاظ آلدگی به



بنابراین با توجه به مطالب مذکور و اهمیت بستنی‌های سنتی در انتقال باکتری‌های مهم عامل عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی به انسان، جهت بالا بردن کیفیت بهداشتی بستنی‌های سنتی در مناطق مختلف موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- ۱- پاستوریزاسیون شیر و مخلوط بستنی
- ۲- ارائه آموزش بهداشت در سطح آگاه کردن افراد جامعه بخصوص کسانی که مستقیماً با مواد غذایی در ارتباط هستند.
- ۳- نظارت بهداشتی دقیق از طریق مراجع ذی‌صلاح بر کار تولید کنندگان و فروشنده‌گان بستنی‌های سنتی.
- ۴- رعایت بهداشت محیط و بهداشت فردی.

تقدیر و تشکر

این مقاله بخشی از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد گروه بهداشت و اینمنی مواد غذایی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد است. از همه کارکنان دانشکده که در انجام این پایان نامه مساعدت نمودند، سپاسگزارم.

تضاد منافع

نویسنده‌گان این مقاله اعلام می‌دارند هیچ گونه تضاد منافع وجود ندارد.

مشارکت نویسنده‌گان

نگار حمیدیان و میثم سلیمانی در تحصیل داده‌ها، امین صالحی ابرقوئی در نگارش مقاله و تایید نسخه نهایی آن، حسین فلاح زاده در تحلیل و تفسیر داده‌ها و فاطمه اکرمی مهاجری در طراحی مطالعه و عهده گرفتن مسئولیت عمومی در مورد مقاله مشارکت داشتند.

بودند(۳۰). که این مشابه نتایج ما بود.

در سال ۲۰۱۵ کنوک و گوکنور با بررسی شیوع لیستریا مونوسیتوژن در فرآورده‌های لبنی در ترکیه دریافتند که از ۲۰ نمونه بستنی، این باکتری یافت نشد(۳۱).

یافته‌های ما برای سطح آلودگی بستنی سنتی با نتایج گزارش شده در اصفهان مطابق است در هردو مطالعه ای نشان داد که هیچکدام از نمونه‌ها با لیستریا مونوسیتوژن آلوده نبودند(۳۲).

در سال ۲۰۰۷، نتایج آزمون‌های صورت گرفته برای جداسازی لیستریا مونوسیتوژن، وجود این باکتری را در بستنی‌های سنتی تایید نکرد(۳۳، ۳۴).

میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژن در شیر خام در مطالعات ایرانی (۴ درصد) با مطالعات انجام گرفته توسط Kozak و همکاران (۱۹۹۶) مطابقت دارد(۳۵)، در نتیجه وجود لیستریا مونوسیتوژن در فرآورده‌های لبنی سنتی نشان‌دهنده‌ی پتانسیل خطر عفونت با لیستریا در افراد مصرف کننده، در ایران است. حضور این میکروارگانیسم بیماری‌زا در محصولات لبنی سنتی دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا می‌تواند یک خطر بهداشتی بخصوص برای زنان باردار، افراد مسن، نوزادان و افراد دارای نقص سیتم ایمنی باشد. این گروههای در معرض خطر باید از مصرف فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه اجتناب کنند.

بر طبق یافته‌ها فراوانی شیوع لیستریا مونوسیتوژن در فرآورده‌های لبنی سنتی ممکن است پتانسیل خطر برای مصرف کنندگان مطرح شود. بنابراین آن باید توسط وزارت سازمان بهداشت یا سایر سازمان‌های مرتبط کنترل گردد.



References

- 1-Mortazavi S, Gods rohani M, Juyande H. milk and dairy products technology. The University Ferdowsi Mashhad; 1996. p. 266.
- 2-Azadnia P, Ghasemi M, Abbasi M, Taarof N, Jashni M. Microbial Quality of Traditional Ice Cream Produced by Small-Scale Manufacturers in Khormoj and Its Comparison with the Iranian National Standard. Journal of Animal and Veterinary Advances 2011;10(6):742-4.
- 3- Ziabari Mirnezami H. What do you know about milk (Milk chemical technology): Tehran University; 1996.
- 4-Movassagh MH ,Movassagh A, Mahmoodi H, Servatkah F, Sourorbakhsh MR. Microbiological contamination of the traditional chocolate Ice cream sold in the Northwest Region of Iran. Global Veterinaria 2011;6(3):269-71.
- 5-Karim G, Razavilar V, Akhonndzade A. survey contamination of traditional ice cream to bacteria causing the infection and food poisoning[persian]. Tehran University Faculty of Veterinary 1374;50:71-8.
- 6-Kanbakan U, Con A, Ayar A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. Food Control 2004;15(6):463-70.
- 7- Fallah AA, Saei-Dehkordi SS, Rahnama M, Tahmasby H, Mahzounieh M. Prevalence and antimicrobial resistance patterns of Listeria species isolated from poultry products marketed in Iran. Food Control 2012;28(2):327-32.
- 8-Farber J, Peterkin P. Listeria monocytogenes, a food-borne pathogen. Microbiological reviews 1991;55(3):476.
- 9-Navratilova P, Schlegelova J, Sustackova A, Napravnikova E, Lukasova J, Klimova E. Prevalence of Listeria monocytogenes in milk, meat and foodstuff of animal origin and the phenotype of antibiotic resistance of isolated strains. Veterinarni Medicina-UZPI 2004;49.
- 10-Williams SK, Roof S, Boyle EA, Burson D, Thippareddi H, Geornaras I, et al. Molecular ecology of Listeria monocytogenes and other Listeria species in small and very small ready-to-eat meat processing plants. J Food Prot 2011;74(1):63-77.
- 11-Halter E, Neuhaus K, Scherer S. Listeria weihenstephanensis sp. nov., isolated from the water plant Lemma trisulca of a German fresh water pond. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2012;63:641-7.



- 12-Barros MA, Nero LA, Silva LC, d'Ovidio L, Monteiro FA, Tamanini R, et al. Listeria monocytogenes: Occurrence in beef and identification of the main contamination points in processing plants. *Meat science* 2007;76(4):591-6.
- 13-Lyytikäinen O, Autio T, Maijala R, Ruutu P, Honkanen-Buzalski T, Miettinen M, et al. An outbreak of Listeria monocytogenes serotype 3a infections from butter in Finland. *Journal of Infectious Diseases* 2000;181(5):1838-41.
- 14-McLauchlin J, Mitchell R, Smerdon W, Jewell K. Listeria monocytogenes and listeriosis: a review of hazard characterisation for use in microbiological risk assessment of foods. *International journal of food microbiology* 2004;92(1):15-33.
- 15-Tirziu E, Nichita I, Cumpanasoiu C, Gros RV, Seres M. Listeria monocytogenes Monographic Study. *Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies* 2010;43(1):441-6.
- 16-Adzitey F, Huda N. Listeria monocytogenes in foods: incidences and possible control measures. *Afr J Microbiol Res* 2010;4(25):2848-55.
- 17-Amaglian G, Brandi G, Omiccioli E, Casiere A, Bruce I, Magnani M. Direct detection of Listeria monocytogenes from milk by magnetic based DNA isolation and PCR. *Food microbiology* 2004;21(5):597-603.
- 18-Administration UsFaD. Draft assessment of the relative risk to public health from foodborne Listeria monocytogenes among selected categories of ready to eat foods 2001.
- 19-Rahimi E, Behzadnia A, Shakerian A, Momtaz H. Frequency of Listeria species from raw milk, traditional cheese and ice- cream in Shahrekord and Shiraz[persian]. *Journal of Microbial World* 2010;2(4):243-8.
- 20-Rahimi E, Ameri M, Momtaz H. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from milk and dairy products in Iran. *Food Control* 2010;21(11):1448-52.
- 21-Shamloo E, Jalali M, Mirlohi M, Madani G, Metcalf D, Merasi M. Prevalence of Listeria species in raw milk and traditional dairy products in Isfahan, Iran[persian]. *International Journal of Environmental Health Engineering* 2015;4(1):1-5.
- 22-Rahimi E, Momtaz H, Sharifzadeh A, Behzadnia A, Ashtari MS, Zandi Esfahani S, et al. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from traditional dairy products in chahar Mahal & Bakhtiyari, Iran. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine* 2012;15(2):115-22.



- 23-Shakrian A, Karim G, Tajbakhsh E, Shfei M. Investigating the microbial contamination of traditional ice creams in Shahrekord[persian]. Journal of Food Science and Technology 2007;2(4):21-7.
- 24-Karim G, Razavilar V, Akhonndzade A. Investigating the contamination of Iranian traditional ice cream to important bacterial infections and food poisoning[persian]. Tehran University Faculty of Veterinary Medicine 1374;50:71-8.
- 25-Pacini R, Galleschi G, Tozzi E, Malloggi L, Galassi R, Quagli E. Biological hazards connected with consumption of animal origin foods. 1. Pathogenic bacteria. Industrie Alimentari 1996;35(344):27-32.
- 26-Rola J, Kwiatek K, Wojton B, Michalski M. Incidence of *Listeria monocytogenes* in raw milk and dairy products. Medycyna Weterynaryjna (Poland) 1994;50(7):323-5.
- 27-Warke R, Kamat A, Kamat M, Thomas P. Incidence of pathogenic psychrotrophs in ice creams sold in some retail outlets in Mumbai, India. Food Control 2000;11(2):77-83.
- 28-Molla B, Yilma R, Alemayehu D. *Listeria monocytogenes* and other *Listeria* species in retail meat and milk products in Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Development 2004;18(3):208-12.
- 29-Salehian M, Salehifar E, Esfahanizadeh M, Karimzadeh L, Rezaei R, Molanejad M. Microbial contamination in traditional ice cream and effective factors, Sari 2012[persian]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2013;23(99):28-33.
- 30-Akyu A, Najafi F, Moradi J, Mohebi Z, Adabagher S. Prevalence of food contamination with *Listeria* spp. in Kermanshah, Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal 2013;19(5):474-7.
- 31-Kevenk TO, Terzi Gulel G. Prevalence, Antimicrobial Resistance and Serotype Distribution of *Listeria monocytogenes* Isolated from Raw Milk and Dairy Products. Journal of Food Safety 2015.
- 32-Jalali M, Abedi D. Prevalence of *Listeria* species in food products in Isfahan, Iran. International journal of food microbiology 2008;122(3):336-40.
- 33-Bonyadian M, Moshtagi H, Darabeigi SH. Study on microbial quality and *Listeria* contamination of traditional ice- cream in Shahrekord[persian]. journal of Shahrekord university of veterinary medicine 2007;1(2):65-70.



- 34-Hoveida L, Amir Mozafari N, Furuhash tehrani H. Bacterial contamination of the various types of ice cream in Tehran, 1382[persian]. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2004;23(4):383-90.
- 35-Kozak J, Balmer T, Byrne R, Fisher K. Prevalence of Listeria monocytogenes in foods: incidence in dairy products. Food Control 1996;7(4):215-21.