

Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources

Determination of new soil hydromorphic index (SHI) using micromorphological data for aquic soils in the north of Iran

Alireza Raheb^{*1}, Ahmad Heidari²

1. Corresponding Author, Dept. of Soil Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: araheb@ut.ac.ir
2. Dept. of Soil Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: aheidari@ut.ac.ir

Article Info	ABSTRACT
Article type: Full Length Research Paper	Background and Objectives: Microscopic techniques provide invaluable information about soil genesis and also physicochemical and morphological properties of undisturbed natural soil structure. Determination of micromorphological indices is an advanced method of quantifying soil properties and increasing the accuracy of morphological and micromorphological studies. At present, there are no quantitative criteria in the American soil classification system to determine the classification of soils with an aquic moisture regime or with aquic conditions; so that there is no distinction between saturated soils and their reduction due to high groundwater and soils which saturation and reduction due to water infiltration from the soil surface is temporarily saturated only in the upper horizons. To prevent this problem, the general purpose of this research is to use micromorphology and image analysis in order to manage soil resources through the correct identification of soils with aquic conditions. In addition to the specific purpose, a new hydromorphic index (SHI) for soil evolution in aquic conditions based on micromorphological features was proposed.
Article history: Received: 11.13.2021 Revised: 05.15.2022 Accepted: 05.22.2022	
Keywords: Aquic condition, Hydromorphic index, Image analysis, Micromorphological properties	
	Materials and Methods: To do this research and determine the micromorphological index of soil hydromorphic properties, after preparing intact samples from different horizons of the studied profiles (six control pedons with aquic conditions from northern Iran), their thin sections were prepared. In the following, thin sections were prepared and analyzed using a polarizing microscope. To determine the soil hydromorphic index (SHI) for aquic soils the following steps were then performed in the following order: 1-Preparation of thin sections, 2-Study of the micromorphological properties, 3-Preparation of necessary images, 4- Image analysis and quantification of micromorphological parameters, 5- Score attributes between 0 and 100 points and 6-Calculation of soil hydromorphic index (SHI).
	Results: The obtained hydromorphic index was correlated with microstructure, fine soil materials, birefringence fabric, organic materials, hydromorphic features and mineral alteration. This index can be useful for correlation of soils with aquic horizons formed on different landscape units. The results showed that the hydromorphic index varied from very high values in paddy soils under aquic moisture regime to very low values in non-paddy soils under kiwifruit cultivation. In paddy soils under aquic moisture regime, SHI values increased with soil depth and its maximum was seen in deeper horizons, whereas in non-paddy soils, the relationship between SHI and soil depth was unclear.

Conclusion: The defined hydromorphic index in soils under aquic moisture regime was more than 0.35 and in the soil taxonomy keys were in the aquic soils class. In contrast, soils with a hydromorphic index of less than 0.35 are found in soils that have only aquic conditions. Finally, many of the problems that exist in the American Soil Classification System in distinguishing soils with aquic moisture regime from soils with aquic conditions can be solved by determining the hydromorphic index.

Cite this article: Raheb, Alireza, Heidari, Ahmad. 2022. Determination of new soil hydromorphic index (SHI) using micromorphological data for aquic soils in the north of Iran. *Journal of Soil Management and Sustainable Production*, 12 (3), 49-70.



© The Author(s).

DOI: 10.22069/EJSMS.2022.19680.2046

Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار



شما پا چاپی: ۱۳۶۷-۲۳۲۲

شما آنلاین: ۱۳۷۵-۲۳۲۲

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک (SHI) با استفاده از داده‌های میکرومورفولوژیکی برای خاک‌های اکوئیک در شمال ایران

علیرضا راهب^{*}، احمد حیدری^۲

۱. نویسنده مسئول، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: araheb@ut.ac.ir
 ۲. گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: ahaidari@ut.ac.ir

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله:	مقاله کامل علمی - پژوهشی
تاریخ دریافت:	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
تاریخ ویرایش:	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تاریخ پذیرش:	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
واژه‌های کلیدی:	ساختار دست‌نخورده خاک با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپی اطلاعات ارزشمندی را در مورد خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی خاک و نحوه تشکیل خاک در اختیار می‌گذارد. تعیین شاخص‌های میکرومورفولوژیکی روشی پیشرفت‌های برای کمی کردن خصوصیات خاک و افزایش دقت و درستی نتایج مطالعات مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی است. در حال حاضر برای تعیین طبقه‌بندی خاک‌های دارای رژیم رطوبتی اکوئیک یا دارای شرایط اکوئیک در سامانه آمریکایی طبقه‌بندی خاک معیارهای کمی ارائه نشده است؛ به طوری که تفاوتی بین خاک‌های اشباع که احیا آن‌ها ناشی از آب زیرزمینی بالا می‌باشد و خاک‌هایی که اشباع و احیا آن‌ها در اثر نفوذ آب از سطح خاک به طور موقت بوده و اشباع تها در افق‌های فوقانی دیده می‌شود، وجود ندارد. برای رفع این مشکل، هدف کلی از این پژوهش استفاده از علم میکرومورفولوژی و نرم‌افزارهای تخصصی آنالیز تصویر در راستای مدیریت پایدار منابع خاک از طریق شناسایی صحیح خاک‌های دارای شرایط اکوئیک می‌باشد. علاوه بر این هدف اختصاصی نیز تعریف یک شاخص هیدرومورفیک جدید (SHI) برای ارزیابی وضعیت تحول خاک در شرایط اکوئیک بر اساس ویژگی‌های میکرومورفولوژیکی خاک است.

مواد و روش‌ها: برای انجام پژوهش و تعیین شاخص میکرومورفولوژیکی خصوصیات هیدرومورفیک خاک، پس از تهیه نمونه‌های دست‌نخورده (شش خاکرخ شاهد دارای شرایط اکوئیک از شمال ایران)، مقاطع نازک آن‌ها تهیه شد. مطالعه و تجزیه و تحلیل مقاطع نازک با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان صورت پذیرفت. در مرحله بعد برای تعیین شاخص هیدرومورفیک برای خاک‌های دارای شرایط اکوئیک به ترتیب مراحل زیر صورت پذیرفت:
 ۱- تهیه مقاطع نازک، ۲- مطالعه خصوصیات میکروسکوپی، ۳- تصویربرداری از مقاطع نازک،

-
- ۴- آنالیز تصویر و کمی کردن پارامترهای میکرومورفولوژی، ۵- نمره‌دهی به خصوصیات بین ۰ تا ۱۰۰ امتیاز و ۶- محاسبه شاخص هیدرومورفیک خاک.

یافته‌ها: شاخص هیدرومورفیک به دست آمده با ساختمان میکروسکوپی، مواد نرم خاک، b-فابریک، مواد آلی، عوارض هیدرومورفیک و تغییرشکل کانی‌ها ارتباط داشت. این شاخص می‌تواند برای طبقه‌بندی خاک‌های دارای رژیم رطوبتی اکوئیک یا شرایط اکوئیک در واحدهای مختلف زمین‌نما مفید باشد. نتایج نشان داد که شاخص هیدرومورفیک از مقادیر بسیار زیاد در خاک‌های شالیزاری با رژیم رطوبتی اکوئیک تا مقادیر بسیار کم در خاک‌های غیرشالیزاری تحت کشت کیوی متغیر بود. در خاک‌های شالیزاری دارای رژیم رطوبتی اکوئیک مقادیر SHI با عمق خاک افزایش نشان داد و حداقل آن در افق‌های عمیق‌تر دیده شد، در حالی‌که در خاک‌های غیرشالیزاری رابطه بین SHI با عمق خاک نامشخص بود.

نتیجه‌گیری: شاخص هیدرومورفیک تعریف شده در خاک‌های دارای رژیم رطوبتی اکوئیک بیش‌تر از ۰/۳۵ بود و در کلید رده‌بندی در کلاس خاک‌های اکوئیک قرار گرفتند. در مقابل خاک‌های دارای شاخص هیدرومورفیک کم‌تر از ۰/۳۵ در خاک‌هایی دیده شدند که تنها دارای شرایط اکوئیک بودند. بسیاری از مشکلاتی که در سامانه طبقه‌بندی آمریکایی خاک در تفکیک خاک‌های دارای رژیم رطوبتی اکوئیک از خاک‌های دارای شرایط اکوئیک وجود دارد، با تعیین شاخص هیدرومورفیک قابل حل خواهد بود.

استناد: راهب، علیرضا، حیدری، احمد (۱۴۰۱). تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک (SHI) با استفاده از داده‌های میکرومورفولوژیکی برای خاک‌های اکوئیک در شمال ایران. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، ۱۲ (۳)، ۴۹-۷۰.

DOI: 10.22069/EJSMS.2022.19680.2046



© نویسنده‌گان.

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

اكوئیک بر اساس سه معیار تعريف می شود که باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند: اشباع، احیا (کاهش) و ویژگی های اکسید و احیایی. در گذشته رژیم رطوبتی اکوئیک را برای همه رده های خاک قابل استفاده فرض می کردند و یکی از پرکاربرد ترین رژیم های رطوبتی در طبقه بندی خاک بود. با گذشت زمان مشخص شد که این رژیم رطوبتی به طور دقیق تعريف نشده و شناسایی صریح آن در مزرعه دشوار بوده است (۹).

لیندبو (۱۹۹۷) نمونه های متعددی از خاک هایی را مورد بررسی قرار داد که ممکن است هیدریک باشند اما با هیچ یک از شاخص های خاک های هیدریک موجود در کلید رده بندی خاک مطابقت ندارند (۱۰). به عنوان مثال بل و ریچاردسون (۱۹۹۷) مشکلات مربوط به تعريف مورفولوژی خاک مربوط به شرایط اکسید و احیای فصلی در مالی سول ها را مورد مطالعه و گزارش نمودند که در ۳۰ سانتی متر رویین، وجود مناطق احیا شده معمولاً به دلیل محتوای بالای مواد آلی و تجمع آن است (۱۱). علاوه بر این کوهل و همکاران (۱۹۹۷) در موارد مختلف در مورد شناسایی و تعريف خاک هیدریک در خاک های شنی بحث کردند. آن ها احتمالاً به این دلیل که این خاک ها حاوی مقدار کمی آهن هستند، ویژگی های اکسید و احیا بسیار کمی را در خاک های شنی مشاهده نمودند (۱۲). این شرایط و مثال ها نمونه ای از نیاز به تغییر مداوم در تعريف شاخص های خاک های مختلف را نشان می دهد (۱۳). به همین دلیل و با توجه به این مشکلات لزوم انجام پژوهش های بیشتر در زمینه تدوین و فرموله کردن شاخص های ویژه برای این خاک ها اجتناب ناپذیر است.

دانش میکرو مورفولوژی با استفاده از تکنیک های مختلف می تواند اطلاعات بسیار زیادی را در ارتباط با شرایط محیطی مؤثر بر فرآیندهای خاک سازی، مواد

مقدمه

خاک های اراضی خیس از جنبه های مختلفی دارای اهمیت هستند که از آن جمله می توان قابلیت ذخیره بالای آب در خاک و جلوگیری از هدر رفت آن، کاهش خطرات فرسایش و حاصلخیزی ذاتی نسبتاً خوب آن ها اشاره نمود (۱ و ۲). خاک های اراضی خیس یا هیدریک^۱، خاک هایی هستند که در شرایط غرقاب زمین های باتلاقی تشکیل می شوند. خاک های هیدریک معمولاً تحت عنوان خاک هایی شناخته می شوند که تحت شرایط اشباع، در مناطق سیل گیر و غرقاب در طی زمان ایجاد می شوند (۳ و ۴).

خاک های موجود در اراضی خیس حدود ده درصد (۷۲۰ میلیون هکتار) از خاک های سطح زمین را تشکیل می دهند. به طور کلی خاک های اراضی خیس را از نظر گسترش جغرافیایی به دو دسته نواحی حاره ای و غیر حاره تقسیم می کنند. مناطق وسیعی از کانادا، آلسکا، روسیه، آمریکا و آرژانتین جزء خاک های هیدرومورفیک غیر حاره ای هستند و عمدتاً زیر کشت برنج و پنبه قرار دارند. اراضی خیس نواحی حاره ای عمدتاً در جنوب و جنوب شرقی آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی مثل ونزوئلا، برزیل، سریلانکا، چین، مالزی، و اندونزی واقع شده اند و محصول عمده و اصلی این اراضی برنج می باشد (۵ و ۶). خاک های هیدرومورفیک در ایران نیز بیشتر در نواحی مرتضوب و نیمه مرتضوب سواحل دریای خزر یافت شده و به ترتیب استان های گیلان، مازندران و آذربایجان غربی بیشترین وسعت این خاک ها را دارا می باشند (۷).

رژیم رطوبتی اکوئیک که در طبقه بندی خاک استفاده می شود، مربوط به خاک هایی است که با آب اشباع شده و از نظر شیمیایی احیا شده اند، به طوری که آب خاک فاقد اکسیژن محلول است (۸). شرایط

ایجاد شده است، مورد استفاده قرار داد (۲۴). مگالدی و تالینی (۲۰۰۰) شاخص میکرومورفولوژیکی (شاخص توسعه میکرومورفولوژیکی خاک-^۳) MISODI را برای پالتوسول‌ها پیشنهاد کردند. در این شاخص برخی خصوصیات میکرومورفولوژی مثل ساختمان میکروسکوپی، b- فابریک، پوشش‌ها، گرهک‌ها و درجه هوازدگی و تغییرشکل ذرات معدنی جهت بیان نمودن درجه توسعه خاک و مدت زمان فرآیندهای پیدایشی مورد استفاده قرار گرفت. هر خصوصیت به‌وسیله یک نمره‌دهی ساده که بیانگر درجه توسعه آن‌ها بود، به صورت کمی درآمد. حاصل جمع نمرات در این شاخص در محدوده بین ۰ تا ۲۸ بوده که با افزایش درجه هوازدگی خاک افزایش می‌یابد (۲۶).

خرمالی و همکاران (۲۰۰۳) شاخص میکرومورفولوژی را برای تکامل خاک‌های آهکی در شرایط خشک و نیمه‌خشک ایران پیشنهاد دادند. این شاخص به پارامترهایی مثل اکسیدهای آهن آزاد، شاخص رنگ، شاخص تجمع رس و نسبت اسمکتایت به مجموع کلرایت و ایلایت بستگی داشته و براساس آن‌ها تعیین گردید. این شاخص برای ارتباط بین خاک‌های دارای افق آرجیلیک تشکیل شده بر روی مواد مادری آهکی در واحدهای زمین‌نمای مختلف بسیار مفید می‌باشد. همبستگی ضعیف بین MISODI محاسبه شده برای خاک‌های آهکی جنوب ایران و سایر پارامترهای مدنظر نشان می‌دهد که باید این شاخص برای خاک‌های آهکی دارای افق آرجیلیک در شرایط خشک و نیمه‌خشک اصلاح گردد. به همین دلیل شاخص میکرومورفولوژیکی MISECA^۴ را برای ارزیابی افق‌های آرجیلیک در یک محیط به شدت آهکی استفاده نمودند و بیان نمودند که شاخص MISECA می‌تواند به روش مشابه با مگالدی و

3- Micromorphological Soil Development Index
4- Micromorphological Index of Soil Evolution in highly Calcareous arid to semiarid Conditions

مادری و فعالیت‌های تحقیقاتی در اختیار پژوهش‌گران قرار دهد (۱۴). این دانش در کنار مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بسیاری از مشکلات پیچیده تشکیل و طبقه‌بندی خاک را پاسخ‌گو بوده و روشی مطمئن برای شناسایی فرآیندهای خاک‌سازی می‌باشد (۱۵). آنالیزهای کمی فابریک خاک محور اساسی پژوهش‌های تشکیل و طبقه‌بندی خاک است و کلیدی را برای تفسیر خصوصیات خاک برای مدیریت آن فراهم می‌کند (۱۶). استفاده از تصویر و تکنیک‌های پردازش تصویر فرصت‌های جدیدی را برای آنالیزهای کمی در میکرومورفولوژی خاک فراهم می‌کند (۱۷ و ۱۸).

حال غرقاب و ایجاد شرایط اکوئیک از طریق تغییر در مقدار مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی می‌تواند بر مشخصه‌های میکرومورفولوژیک هم‌چون نوع حفرات، ساختمان میکروسکوپی، b- فابریک و فرم‌های پوشش رسی و آهن اثر بگذارد (۱۹). وجود سخت‌دانه‌های دارای مرزهای مشخص و پوشش‌ها^۱ یا پوشش‌های زیرسطحی^۲ با مرزهای پخشیده آهن و منگنز به عنوان مهم‌ترین عارضه میکروسکوپی مشاهده شده در اراضی شالیزاری گزارش شده است (۱۹، ۲۰، ۲۱).

در حال حاضر مطالعات اندکی بر روی شاخص‌های میکرومورفولوژیکی و هیدرومورفیک خاک‌های سراسر جهان انجام شده است که نمونه‌ای از آن‌ها می‌توان به مطالعات دورونسورو (۱۹۹۴)، مگالدی و تالینی (۲۰۰۰)، خرمالی و همکاران (۲۰۰۵)، چپلوت و همکاران (۲۰۰۰) و (۲۰۰۴) و دیدانیتسکی (۲۰۰۷) اشاره نمود (۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷). دورونسورو (۱۹۹۴) شاخص‌های میکرومورفولوژیکی را برای ارزیابی میزان تکامل خاک که بر اساس ویژگی‌های میکرومورفولوژیکی

1- Coating
2- Hypo-coating

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

کاربری کشت برنج و باغ کیوی) با متوسط بارندگی سالیانه منطقه حدود ۱۰۰۰ میلی متر و متوسط سالیانه دمای هوا ۱۵/۸ درجه سانتی گراد و با مواد مادری مشابه از نوع رسوبات دریایی و آبرفتی انجام پذیرفت. باغ کیوی فروت احدهای قدمتی حدود ۳۰ سال داشت که در مجاورت اراضی شالیزاری واقع می باشند و طبق مصاحبه به عمل آمده از کشاورزان منطقه، قبل از احداث این باغ، کل منطقه زیر کشت برنج قرار داشته است. ولی با کشت اصولی نهال کیوی که با احداث زهکش های عمیق و لایروبی سالانه آنها همراه بوده، به تدریج خاک تحت کشت از شرایط غرقاب خارج شده و شرایط اکسید و احیایی بسیار متفاوتی نسبت به خاکرخ های زیر کشت برنج و تحت شرایط غرقاب ناشی از لایه گلخراپ بروز داد. براین اساس رژیم حرارتی خاک در منطقه مورد مطالعه ترمیک و رژیم رطوبتی یودیک تعیین گردید هرچند در بخش عمدۀ منطقه مورد مطالعه به واسطه بالا بودن سطح آب زیرزمینی و ایجاد شرایط احیا، رژیم رطوبتی خاک اکوییک می باشد (۲۹).

آنالیز خصوصیات میکرومورفولوژیکی: به منظور مطالعه عوارض اکسید احیایی و تخلخل در خاک های مورد مطالعه با استفاده از جعبه کوبینا تعداد ۱۵ نمونه دست نخورده از دیواره پروفیل ها تهیه گردید. نمونه ها هوا خشک و با مخلوط مناسبی از رزین پلی استر، استون و سخت کننده و کاتالیست، تحت شرایط خلا نسبی تلقیح شدند (۳۰). پس از سخت شدن و برش بر روی اسلامیدهای شیشه ای چسبانیده شده و با کمک دستگاه برش و سنباده با درجات مختلف تا حد ۳۰ میکرون نازک گردیدند. مقاطع نازک تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان (BX51) (Olympus) در دو حالت نور پلاریزان صفحه ای (PPL^۱) و مقاطع (XPL^۲) مورد بررسی قرار گرفتند و براساس

1- Plane polarized light
2- Cross polarized light

تالینی (۲۰۰۰) برای برقراری ارتباط بین سن افق های آرجیلیک تشکیل یافته در اقلیم ها، توپوگرافی و سایر فاکتور های خاکسازی و درجه تکامل خاک استفاده گردد. مقدار شاخص با افزایش درجه توسعه خاک بین ۰ الی ۲۴ متغیر بود و هرچه این شاخص بزرگ تر باشد درجه توسعه یافتگی و تکامل خاک بیشتر خواهد بود (۲۸).

چاپلوت و همکاران (۲۰۰۰) حساسیت روش های پیش بینی شرایط هیدرومورفی خاک را با توجه به وضوح اطلاعات توپوگرافی (DEM) و داده های اضافی خاک مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند (۲۲). علاوه بر این چاپلوت و همکاران (۲۰۰۴) شاخص هیدرومورفیک (HI) را با استفاده از توپوگرافی سطح با مدلی که از توپوگرافی زیر سطح استفاده می کند، پیشنهاد نمودند (۲۳). و دیانیتسکی (۲۰۰۷) نیز یک شاخص جدید هیدرومورفیسم خاک را بر اساس روش استخراج پی در پی آهن پیشنهاد کرد. اما در تمام مطالعات صورت گرفته شاخص هیدرومورفیک خاک براساس خصوصیات میکرومورفولوژیکی در جهان پیشنهاد نشده است (۲۷).

این شرایط و مثال ها نمونه ای از نیاز به تغییر مداوم در تعاریف شاخص های خاک های مذکور را نشان می دهد (۱۳). بنابراین با توجه به این مشکلات لزوم انجام پژوهش های بیشتر در زمینه تدوین و فرموله کردن شاخص های ویژه برای این خاک ها اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر تشریح ویژگی های هیدرومورفیک خاک و ارائه شاخص جدید هیدرومورفیک خاک (Soil Hydromorphic Index=SHI) براساس ویژگی های میکرومورفولوژیکی در خاک های اکوئیک است.

مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه: این مطالعه در اراضی ایستگاه تحقیقات برنج کشور واقع در استان مازندران (با دو

۲- نرمال‌سازی نمرات هر ویژگی بین ۰ تا ۱. این مراحل برای محاسبه شاخص میکرومورفولوژیک افق‌ها و خصوصیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این منظور شاخص مربوط به هر بخش از ویژگی بر ارزش کل شاخص‌های خصوصیات شش‌گانه تقسیم می‌گردد.

۳- تعیین شاخص میکرومورفولوژیک برای هر پارامتر. شاخص میکرومورفولوژیک برای هر پارامتر برابر با نمرات نرمال شده خواهد بود.

۴- تعیین شاخص میکرومورفولوژیک برای هر خصوصیت. شاخص میکرومورفولوژیک برای هر خصوصیت برابر با نمرات نرمال شده خواهد بود که از جمع کردن شاخص‌های میکرومورفولوژی هر پارامتر حاصل می‌شود.

۵- تعیین شاخص میکرومورفولوژیک برای هر افق. شاخص میکرومورفولوژی برای هر افق برابر با جمع نمرات نرمال شده هر خصوصیت تقسیم بر تعداد خصوصیات خواهد بود.

۶- تعیین شاخص میکرومورفولوژیک برای هر پروفیل. شاخص میکرومورفولوژیک برای هر خاک برابر با جمع حاصل ضرب شاخص میکرومورفولوژیک هر افق در ضخامت همان افق تقسیم بر مجموع ضخامت افق‌های مورد بررسی (ضخامت مؤثر) خواهد بود.

در پایان شاخص هیدرومorfیک میکرومورفولوژیکی برای خاک‌های دارای شرایط اکوئیک (SHI) با استفاده از رابطه‌های زیر تعیین گردید.

وازگان حیدری و صاحب جلال (۲۰۱۱) تشریح و برای تفسیر نتایج از استوپس و همکاران (۲۰۱۰) استفاده شد (۱۴، ۱۵، ۳۱).

روش تعیین شاخص هیدرومorfیک خاک (SHI): برای انجام پژوهش و تعیین شاخص هیدرومorfیک، با استفاده از خصوصیات میکرومورفولوژیکی شاخص هیدرومorfیک برای خاک‌های دارای شرایط اکوئیک مراحل زیر به ترتیب صورت پذیرفت (شکل ۱):

- ۱- تهیه مقاطع نازک، ۲- مطالعه خصوصیات میکرومورفولوژی، ۳- تهیه عکس‌های مورد نیاز، ۴- آنالیز تصویر و کمی کردن پارامترهای میکرومورفولوژی، ۵- نمره‌دهی به خصوصیات بین ۰ تا ۱۰۰ امتیاز و ۶- محاسبه و تعیین شاخص میکرومورفولوژی. در مرحله بعد ۶ پارامتر میکرومورفولوژی که هر کدام شامل چند بخش بود (۱۷ خصوصیت مختلف)، برای محاسبه شاخص هیدرومorfیک خاک مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

- ۱- ساختمان میکروسکوپی (نوع، درجه تکامل، نوع و سهم حفرات غالب)، ۲- مواد نرم خاک (رنگ و فراوانی ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون متر)، ۳- b- فابریک (نوع b- فابریک)، ۴- مواد آلی (درجه تغییرشکل و فراوانی)، ۵- عوارض هیدرومorfیک (نوع و ویژگی‌های مختلف رنگ و فراوانی) و ۶- تغییرشکل کانی‌ها (فراوانی کوارتز و فلدسپار).

بعد از بررسی خصوصیات شش‌گانه میکرومورفولوژی برای محاسبه شاخص میکرومورفولوژیکی هیدرومorfیک

مراحل زیر صورت پذیرفت:

- ۱- نمره‌دهی برای پارامترهای مختلف هر خصوصیت (توصیف و کمی کردن خصوصیات منتخب میکرومورفولوژیک در خاک)


$$HHI = \frac{\sum(\Sigma A / \Sigma B)}{N} \quad (1)$$

$$SHI = \frac{(HHI_1 \times T_1) + (HHI_2 \times T_2) + \dots + (HHI_n \times T_n)}{D} \quad (2)$$

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

۱- ساختمان میکروسکوپی در خاک‌های دارای شرایط اکوئیک اغلب به صورت توده‌ای می‌باشد و براساس آن حداقل ارزش به این نوع ساختمان اختصاص داده شد، ۲- بخش نرم خاک نیز شامل ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرون‌متر می‌باشد و ۳- پوشش‌ها نیز شامل پوشش، پوشش زیر سطحی و پوشش در امتداد سطح آهن با صخامت‌ها و فراوانی‌های مختلف بوده که در نتیجه تغییرات شرایط محیطی و اقلیمی حاصل می‌گردد. در نهایت با مجموع این ارزش‌ها شاخصی بدست می‌آید که به آن شاخص SHI گویند. جدول ۱ خصوصیات شش گانه محاسبه شاخص هیدرومورفیک و نمرات اختصاص داده شده به آن‌ها برای خاک نشان می‌دهد.

که در آن‌ها به ترتیب، HHI₁, HHI₂, HHIn شاخص هیدرومورفیک هر افق، A مجموع شاخص‌های پارامترهای هر خصوصیت، B مجموع حداقل استانداردهای شاخص‌های پارامترهای هر خصوصیت، N تعداد پارامترهای میکرومورفولوژی بررسی شده، T₁, T₂, T_n ضخامت هر افق و D عمق مؤثر بررسی شده هر پروفیل می‌باشد. چگونگی نمره‌دهی درجه هیدرومورفیک بر پایه نظریات دورونسورو (۱۹۹۴)، مکالدی و تالینی (۲۰۰۰) و خرمالی و همکاران (۲۰۰۳) با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام گردید (۲۶، ۲۷ و ۲۸):



شکل ۱- مراحل تعیین شاخص هیدرومورفیک (SHI) در نمونه‌های مورد مطالعه.

Figure 1. Steps of determining soil hydromorphic index in the studied samples.

جدول ۱- نمره‌دهی پارامترهای مختلف میکرومورفولوژی برای تعیین شاخص هیدرومorfیک.

Table 1. Micromorphological characteristics and their ratings to calculate SHI.

ارزش (Rate)	پارامترهای میکرومورفولوژی (Micromorphological characteristics)
(1. Microstructure)	
۱. ساختمان میکروسکوپی (A: Types)	
دارای ساختمان: مکعبی، منشوری (Pedal: blocky, prismatic) دارای ساختمان: دانه‌ای، کرامبی (Pedal: granular, crumb) دارای ساختمان: صفحه‌ای (Pedal: platy) فاقد ساختمان: ساختمان ذرات در اندازه شن، ذرات متصل، ذرات پوسته‌ای، به همراه ریزخاکدانه‌ها، به همراه کاتال‌ها Apedral. Sand size grain structures: bridge grains, pellicular grains, with microaggregates, with channels فاقد ساختمان: وگی، اسفنجی، کاتالی، حجره‌ای، وزیکولی، درزها، ترک، توده‌ای Apedral: vughy, spongy, channel, chamber, vesicular, fissure, crack, massive	
10	دارای ساختمان: مکعبی، منشوری (Pedal: blocky, prismatic)
20	دارای ساختمان: دانه‌ای، کرامبی (Pedal: granular, crumb)
30	دارای ساختمان: صفحه‌ای (Pedal: platy)
40	فاقد ساختمان: ساختمان ذرات در اندازه شن، ذرات متصل، ذرات پوسته‌ای، به همراه ریزخاکدانه‌ها، به همراه کاتال‌ها Apedral. Sand size grain structures: bridge grains, pellicular grains, with microaggregates, with channels
50	فاقد ساختمان: وگی، اسفنجی، کاتالی، حجره‌ای، وزیکولی، درزها، ترک، توده‌ای Apedral: vughy, spongy, channel, chamber, vesicular, fissure, crack, massive
ب- درجه تکامل (B:Grade of pedality)	
0	شدیدآ تکامل یافته (Strongly developed)
10	تکامل متوسط (Moderately developed)
30	تکامل ضعیف (Weakly developed)
50	فاقد تکامل (Apedral)
ج- نوع حفرات (C: Void types)	
0	حفرات آرایشی ساده (Simple packing)
5	حفرات آرایشی مرکب (Compound packing)
10	کاتالی، حجره‌ای، وزیکولی (Channels, chambers, vesicles)
20	وگی، صفحه‌ای (Vughs, planes)
د- سهم حفرات غالب (D: Void proportions)	
5	1-5%
10	5-15%
20	15-30%
30	> 30%
۲. مواد نرم (کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر) (2. Fine material < 10µm)	
(A: Percent of fine materials)	
الف- درصد فراوانی مواد نرم	
10	1-5%
20	5-10%
30	10-20%
40	20-30%
50	30-40%
60	40-50%
70	50-60%
80	60-70%
90	70-80%
100	>80%
ب- رنگ زمینه خاک (هو) (B: Soil Matrix Colour -Hue)	
10	5YR
20	7.5YR
30	10YR
40	2.5 Y
50	5Y
50	10 R

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

ادامه جدول ۱

Continue Table 1.

(C: Birefringence fabric) ۳. بی فابریک

(A: Types) الف - نوع

0	تفکیک نشده (Undifferentiated)
10	لکه‌ای منقوشه‌ای، خرده بلوری (Stipple speckled, crystallitic)
20	لکه‌ای موزائیکی، تک محور (Mosaic speckled, monostriated)

(4. Organic materials) ۴. مواد آلی

(A: Degree of alteration) الف - درجه هوازدگی

10	متوسط (Moderate)
30	ضعیف (Weak)

(B: Percent of organic materials) ب - درصد فراوانی مواد آلی

10	1-5%
20	5-15%
30	15-30%
40	> 30%

(C: Excrements) ج - مواد دفعی جانوران

10	> 10%
20	1-10%
30	<1%

(5. Hydromorphic features) ۵. عوارض هیدرومorfیک

(A: Types of Redox Concentration) الف - انواع تجمعات اکسیدی

10	گرهک‌ها و پوشش‌های آهن و منگنز با پوضوح ضعیف (Nodules and coatings of Fe/Mn weakly impregnated)
30	گرهک‌ها و پوشش‌های آهن و منگنز با پوضوح قوی (Nodules and coatings of Fe/Mn strongly impregnated)

(B: Types of Redox Depletion) ب - انواع تجمعات احیایی

10	ماتل‌های احیایی (Depletion mottles)
30	زمینه‌های احیایی (Depletion matrices)

(C: Redoximorphic features colour) ج - رنگ عوارض اکسید و احیایی

10	5YR
20	7.5YR
30	10YR
40	2.5 Y
50	5Y
50	10 R

(D: Nodules and coatings Proportions) د - فراوانی گرهک‌ها و پوشش‌ها

5	< 1%
10	1-15%
20	15-30%
30	30-60%
40	> 60%

(E: Depletion domains Proportions) ه - فراوانی عوارض احیایی

10	1-15%
20	15-30%
30	30-50%
40	> 50%

ادامه جدول -۱

Continue Table 1.

(6. هوازدگی مواد معدنی)

(A: Proportions of quartz) الف - درصد فراوانی کوارتز



5	1-5%
10	5-10%
20	10-20%
30	20-30%
40	>30%

(B: Proportions of feldspars) ب - درصد فراوانی کوارتز

5	1-5%
10	5-10%
20	10-20%
30	20-30%
40	>30%

فراوانی مواد نرم خاک، ۱۵ تصویر رقومی از هر مقطع تهیه شده و با استفاده از نرمافزار AnalySIS حد ۱۰ میکرومتر به عنوان معیار برای نمونه‌های مورد مطالعه تعیین و براساس آن کمی‌سازی فراوانی مواد نرم انجام پذیرفت. برای کمی نمودن شاخص رنگ مواد نرم و عوارض هیدرومورفیک نیز مراحل زیر صورت پذیرفت:

استفاده از آنالیز تصویر برای ارزش‌گذاری پارامترها: همان‌طور که اشاره گردید برای تعیین شاخص SHI ارزش‌گذاری برای ۶ خصوصیت صورت پذیرفت. برای کمی نمودن برخی از این پارامترها از تکنیک‌ها و نرم‌افزارهای آنالیز تصویر بهره گرفتیم. از جمله این موارد می‌توان به رنگ و فراوانی مواد نرم خاک و رنگ عوارض هیدرومورفیک اشاره نمود. برای تعیین



شکل ۲- تعیین ارزش رنگ در متن خاک و عوارض میکرومورفولوژی براساس آنالیز تصویر.

Figure 2. Determination of color value in soil matrix and micromorphological features based on image analysis.

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

با افزایش عمق و ایجاد شرایط غرقاب کامل (ناشی از وجود آب زیرزمینی بالا) در نمونه‌های مورد مطالعه تحت کشت برنج، مقدار حفرات کانالی و انشعبات آن‌ها به دلیل عمق کم ریشه‌های شالی و عدم وجود فعالیت بیولوژیکی شدید در اثر غرقاب سطحی و سطح آب بالا کاهش می‌یابد، در حالی که فراوانی این نوع حفرات در نمونه‌های مورد مطالعه تحت کشت درخت کیوی با افزایش عمق تغییری نکرده و گویای نفوذ بیشتر ریشه کیوی در خاک و فعالیت بیولوژیکی و شرایط زهکشی مناسب‌تر می‌باشد. حفرات صفحه‌ای^۱ در خاکرهای شالیزاری قابل رویت هستند که ناشی از انقباض خاک و کاهش رطوبت پس از دوره خیسی طولانی است.

b- فاپریک غالب مشاهده شده در کاربری شالیزاری لکه‌ای^۲ و نواری^۳ بوده و در کاربری زیر کشت کیوی اکثراً لکه‌ای و نامتمایز^۴ می‌باشد. پوشش، پوشش‌های زیر سطحی و در امتداد سطح آهن در تمام خاکرهای مشاهده گردید ولی فراوانی آن در اطراف حفرات و در امتداد مسیر ریشه در باغهای کیوی بسیار بیشتر بوده در حالی که پوشش زیر سطحی آهن در اطراف گرهک‌های کربناته نیز در کاربری شالیزاری مشاهده گردید. از طرف دیگر مشاهده اندک پوشش‌های رسی نیز در افق‌های Bt و Btg خاک‌های مورد مطالعه اشاره به احتمال پوشیده شدن رس‌ها توسط ترکیبات آهن دارد. مناطق خاکستری حاصل از تخلیه آهن در کنار تجمعات مختلف ترکیبات آهن نیز از ویژگی‌های بارز کاربری شالیزاری در مقایسه با کاربری غیرشالیزاری است که اشاره به وضعیت زهکشی نامناسب در شالیزارها در نتیجه گل‌خرابی، اشباع از سطح و سطح آب زیرزمینی بالا دارد. برخی از خصوصیات میکرومورفولوژی خاک‌های مورد مطالعه به اختصار در جدول ۲ آمده است.

- 1- Planar voids
- 2- Speckled b-fabric
- 3- Strial b-fabric
- 4- Undifferentiated b-fabric

در مرحله اول هیوهای مربوط به دفترچه رنگ (Hue= 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y, 5Y, 10R) که برای کمی نمودن استفاده شد، با استفاده از نرم‌افزار AnalySIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و محدوده‌های رنگ آن‌ها براساس هیو (بین صفر تا ۳۶۰) برای سه حالت حداکثر والیو دفترچه رنگ مانسل، حداقل والیو دفترچه رنگ مانسل و حداقل کرومای دفترچه رنگ مانسل تعیین شد. چگونگی تعیین رنگ در آنالیز تصویر در شکل ۲ آمده است. در مرحله دوم بین اعداد بدست آمده در مرحله قبل با هیوهای دفترچه رنگ ارتباط برقرار شد. به عبارت دیگر نتایج کمی نمودن رنگ حاصل از آنالیز تصویر معادل نتایج تشخیص رنگ حاصل از مطالعات میکرومورفولوژی و صحرایی گردید.

نتایج و بحث

نمونه خاک‌های مورد مطالعه طبق طبقه‌بندی آمریکایی در کلاس‌های Endoaquepts و Udipsamments و Eutrudepts قرار گرفتند. ویژگی‌های مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی در خاک‌های شالیزاری و غیرشالیزاری مورد مطالعه به‌طور قابل توجهی متفاوت بود. شرایط آنتراکوئیک و گل‌خرابی سطح زیر کشت برنج از یک طرف و سطح بالای آب زیرزمینی باعث ایجاد ویژگی‌های خاصی در این خاک‌ها شده است.

خصوصیات میکرومورفولوژیکی: رژیم‌های رطوبتی یودیک و اکوئیک و/یا وجود شرایط اکوئیک در اعماق کمتر از ۵۰ سانتی‌متر، منجر به تشکیل ویژگی‌های اکسید و احیایی و اشکال مختلف شیمیایی و مورفولوژیکی آهن و منگنز شده است. خاک‌های شالیزاری اکثرآً فاقد ساختمان (تودهای) بوده و ساختمان میکروسکوپی مشاهده شده در آن‌ها مکعبی زاویه‌دار و نیمه‌زاویه‌دار با درجه تفکیک متوسط تا ضعیف می‌باشد ولی در کاربری زیرکشت کیوی ساختمان میکروسکوپی مکعبی با تفکیک متوسط تا خوب و ساختمان میکروسکوپی کانالی تشخیص داده شد (جدول ۲).

جدول ۲- برخی خصوصیات میکروموفولژیک مقاطع نازک مورد مطالعه.

Table 2. Some micromorphological properties of studied thin sections.

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

نمونه‌های دارای شرایط اکوئیک نشان می‌دهد. طبق نتایج به دست آمده در نمونه‌های شالیزاری با افزایش عمق در افق‌های پایین‌تر مقدار این شاخص افزایش می‌یابد. در حالی که در نمونه‌های تحت کشت کیوی می‌یابد. به علت وجود شرایط زهکشی مناسب‌تر و عدم گلخراپی و اشباع سطحی مقدار شاخص SHI با افزایش عمق تغییر چندانی نکرده و کم‌تر از نمونه‌های SHI شالیزاری می‌باشد. بیشترین مقدار شاخص SHI مربوط به افق 3Bg₂ پروفیل شماره ۵ با مقدار ۰/۶۴ و کم‌ترین مقدار این شاخص نیز مربوط به افق Bg₂ پروفیل ۸ با مقدار ۰/۳۴ می‌باشد (جدول ۴). نتایج مشاهدات صحرایی نیز بیانگر نتایج فوق است، به گونه‌ای که در پروفیل شماره ۵ زیر کشت برنج رنگ خاکستری که نشان‌دهنده حالت احیایی در خاک است، غالیت دارد. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده با بهبود شرایط زهکشی در خاک‌ها مقدار شاخص میکرومورفولوژیکی هیدرومورفیک کاهش یافته و با نامساعد شدن شرایط زهکشی، این شاخص افزایش می‌یابد.

شاخص هیدرومورفیک خاک برای خاک‌های مورد مطالعه: مطالعات و گزارش‌های مختلف نشان داد که خاک‌های هیدریک شرح داده شده بر اساس شاخص‌های موجود در خاک‌های هیدریک قابل شناسایی نیست و نمونه‌های متعددی از خاک مورد بحث قرار گرفته است که ممکن است هیدریک بوده ولی هیچ‌یک از شاخص‌های خاک هیدریک که در حال حاضر موجود است را نداشته باشد. درجه کیفی رطوبت خاک می‌تواند به وسیله کلاس‌های زهکشی خاک و با کلاس‌های طبقه‌بندی خاک توصیف گردد که بر روی رطوبت خاک مؤثر است (۸). در برخی از این کلاس‌ها، رطوبت به صورت قابل ملاحظه‌ای متفاوت است و یک شاخص عددی می‌تواند اطلاعات بیش‌تر در مورد رطوبت خاک ارائه دهد. به علت ارتباط بسیار نزدیک توپوگرافی و حالت اشباع خاک، برخی از خصوصیات مورفولوژیکی برای برآورد تغییرات مکانی خاک‌های متأثر از رطوبت مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲۳).

جدول ۳ چگونگی محاسبه و تعیین شاخص میکرومورفولوژیکی هیدرومورفی را برای برخی

جدول ۳- محاسبه شاخص های میکر و مرغولوژیکی خاک در مراحل مختلف.

Table 3. Calculation of soil micromorphological indices in different stages.

خواص کمی (Quantified properties)											نمودار (Profile)												
P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1																
Bgl	Bg2	Bgl	Bg1	Ap	Bg2	Bgl	Apg	Bg	Apg	3Bg2	Bgl	Apg	Bgl	Bgl	Bgl	Bg	(Horizon thickness)(cm)	ضخامت سطح (Horizon depth)(cm)	عمق سطح (Basal depth)(cm)	آفراز (Horizon)	ساخته میکروسکوپی (Microstructure)	-۱- ساخته میکروسکوپی	
45	45	27	12	100	40	16	38	17	110	35	14	75	20	100	60	12	105						
12	18	15	12	60	24	16	21	17	35	21	14	35	20	40	35	12	35						

ادامه جدول -۳

Continue Table 3.

P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	خاکخ (Profile)
(Mineral alteration) (Proportions of quartz) (Proportions of feldspars)								
5	5	5	10	5	30	40	20	30-۱-هوازگی مواد معدنی
10	5	5	5	30	5	20	20	10-۲-درصد فرارانی کوارتز
								-۳-درصد فرارانی کالفسپار
(Hydromorphic indices) (Microstructure) (Fine material < 10µm)								
0.4	0.33	0.4	0.87	0.67	0.6	0.47	0.4	0.53-۴-ساخته‌مان میکروسکوپی
0.62	0.56	0.56	0.5	0.5	0.56	0.62	0.62	0.62-۵-ماد نرم
0.2	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2-۶-بی فابریک
0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.35	0.5	0.55	0.5-۷-مواد آلی
0.26	0.47	0.53	0.52	0.74	0.74	0.53	0.48	0.79-۵-عارض هیدرومorfیک
0.19	0.12	0.12	0.19	0.44	0.12	0.62	0.75	0.37-۶-هوازگی مواد معدنی
								-۷-هوازگی مواد معدنی

ارزش اختصاص یافته به آن طبق جدول ۱، عدد ۵۰ خواهد بود. به همین ترتیب برای سایر خصوصیات ۱۷ گانه ارزش‌گذاری انجام شد.

مرحله دوم: در این مرحله شاخص هیدرومورفیک هر افق براساس رابطه ۱ تعیین گردید. علاوه‌بر این نرمال‌سازی ارزش‌های اختصاص یافته بین صفر و یک نیز با استفاده از این معادله صورت پذیرفت (به‌طور مثال در مورد پارامتر ساختمان میکروسکوپی بر طبق جدول ۱، مجموع حداکثر ارزش برای ۴ خصوصیت آن برابر با ۱۵۰ است (نوع ساختمان=۵۰، درجه تکامل ساختمان=۵۰، نوع حفرات=۲۰ و سهم حفرات غالب=۳۰). به طور مثال مجموع ارزش‌گذاری اختصاص یافته به پارامتر ساختمان میکروسکوپی برای افق₂ Btg₂ خاکرخ شماره ۲ برابر با ۱۳۰ بود که اگر بر مبنای حداکثر ارزش ۱۵۰ بیان گردد، ارزش‌گذاری‌ها بین صفر و یک نرمال خواهد شد (۰/۸۷). شاخص هیدرومورفیک افق₂ Btg₂ خاکرخ شماره ۲ به صورت زیر محاسبه شد.

$$HHI (Btg_2, P2) = [(130/150)+(130/160)+(10/50)+(50/100)+(150/190)+(25/80)] / 6 = 0.58$$

از خاکرخ، شاخص هیدرومورفیک خاک محاسبه شد. به‌طور مثال در مورد خاکرخ شماره ۲ مراحل به‌صورت زیر انجام گردید.

در برخی از این کلاس‌ها، رطوبت به صورت قابل ملاحظه‌ای متفاوت است و یک شاخص عددی می‌تواند اطلاعات بیش‌تر در مورد رطوبت خاک ارائه دهد. به‌علت ارتباط بسیار نزدیک توپوگرافی و حالت اشباع خاک، برخی از خصوصیات مورفو‌لوزیکی برای برآورد تغییرات مکانی خاک‌های متأثر از رطوبت مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲۳).

جدول ۳ چگونگی محاسبه و تعیین شاخص میکروسکوپی هیدرومورفی را برای برخی نمونه‌های دارای شرایط اکوئیک نشان می‌دهد. با توجه به حجم زیاد محاسبات برای درک بهتر مطلب، مقدار شاخص هیدرومورفیک برای خاکرخ شماره ۲ به طور کامل و مرحله به مرحله صورت پذیرفت:

مرحله اول: با توجه به نتایج مطالعات و آنالیز میکروسکوپی جدول ۲ و با در نظر گرفتن نمره‌دهی‌های جدول ۱، خصوصیات مختلف مربوط به پارامترهای ۶ گانه ارزش‌گذاری شدند. به طور مثال در افق₂ Btg₂ خاکرخ شماره ۲ با توجه به این که نوع ساختمان میکروسکوپی غالب از نوع توده‌ای بود،

برای سایر افق‌ها نیز بر همین اساس شاخص هیدرومورفیک تعیین گردید.

مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از رابطه ۲ و با در نظر گرفتن عمق هر افق و عمق مؤثر مطالعه شده

$$SHI (P2) = [(0.42*12)+(0.51*35)+(0.58*40)] / 88 = 0.52$$

افزایش می‌یابد. در حالی که در نمونه‌های تحت کشت کیوی به علت وجود شرایط زهکشی مناسب‌تر و عدم گل خرابی و اشباع سطحی مقدار شاخص SHI با افزایش عمق تغییر چندانی نکرده و کم‌تر از نمونه‌های

برای سایر خاکرخ‌ها نیز بر همین اساس شاخص هیدرومورفیک تعیین گردید.

طبق نتایج به‌دست آمده در نمونه‌های شالیزاری با افزایش عمق در افق‌های پایین‌تر مقدار این شاخص

تعیین شاخص جدید هیدرومورفیک خاک ... / علیرضا راهب و احمد حیدری

خاکستری که نشان‌دهنده حالت احیایی در خاک است، غالباً دارد. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده با بهبود شرایط زهکشی در خاک‌ها مقدار شاخص میکرومورفولوژیکی هیدرومورفیک کاهش یافته و با نامساعد شدن شرایط زهکشی این شاخص افزایش می‌یابد.

شالیزاری می‌باشد. بیشترین مقدار شاخص SHI مربوط به افق 3Bg2 پروفیل شماره ۵ با مقدار ۰/۶۴ و کمترین مقدار این شاخص نیز مربوط به افق Bg2 پروفیل ۸ با مقدار ۰/۳۴ می‌باشد (جدول ۴). نتایج مشاهدات صحراوی نیز بیانگر نتایج فوق است، به گونه‌ای که در پروفیل شماره ۵ زیر کشت برنج رنگ

جدول ۴- شاخص هیدرومورفیک خاک (SHI) برای افق‌ها و خاکرخ‌های مطالعه شده.

Table 4. Soil Hydromorphic Index (SHI) for the studied horizons and profiles.

شاخص هیدرومورفیک خاک Soil Hydromorphic Index-SHI	شاخص هیدرومورفیک افق Horizon Hydromorphic Index-HHI	افق horizon	خاکرخ pedon
-	0.56	Bg	1
0.52	0.42	Apg	
	0.51	Btg1	2
	0.58	Btg2	
0.53	0.45	Apg	3
	0.58	2Bg2	
0.55	0.52	Apg	
	0.42	Btg1	4
	0.64	3Bg2	
0.48	0.48	Apg	5
	0.49	Bg	
0.47	0.39	Apg	
	0.49	Bg1	6
	0.48	Bg2	
0.35	0.36	Ap	
	0.37	Bg1	7
	0.34	Bg2	
-	0.36	Btg1	8

آب زیرزمینی بالا) و خاک‌هایی که در آن تنها افق‌های فوقانی به طور موقت اشباع از آب شده وجود ندارد و خاک‌های هیدریک شرح داده شده بر اساس شاخص‌های موجود در خاک‌های هیدریک قابل‌شناسایی نیست. به همین دلیل برای تجدیدنظر در تعریف رژیم

نتیجه‌گیری کلی

طبقه‌بندی خاک در حال حاضر با استفاده از رژیم رطوبتی اکوئیک در روش‌های طبقه‌بندی مختلف، گاهی مبهم است. به طوری که هیچ تفاوتی بین خاک‌های اشباع و کاهش یافته (خاک‌های لجنی دارای

به احتمال زیاد جز خاک‌های دارای شرایط اکوئیک بوده و در کلید رده‌بندی می‌توان در قسمت مربوط به خاک‌های اکوئیک در جستجوی طبقه‌بندی مناسب برای آن بود. در مقابل در صورتی که شاخص هیدرومorfیک تعریف شده کمتر از $0/35$ باشد، بسیاری از مشکلاتی که در طبقه‌بندی و تشخیص خاک‌های اکوئیک و شرایط اکوئیک وجود داشت، قابل حل خواهد بود و در طبقه‌بندی آن‌ها رفع ابهام خواهد شد. در پایان می‌توان بیان نمود که شاخص SHI ، یک شاخص بسیار ساده و کاربردی برای ارزیابی میزان تکامل حاصل از خاک‌های مورد مطالعه و تشخیص صحیح شرایط اکوئیک بود. به اعتقاد نویسنده‌گان این شاخص هیدرومorfیک می‌تواند به همان اندازه برای خاک‌های توسعه یافته تحت عوامل مختلف تشکیل نیز مفید باشد. کمی کردن خواص میکرومorfولوژیکی مورد استفاده برای محاسبه شاخص میکرومorfولوژیکی ممکن است برای شرایط خاص به تغییرات خاصی نیاز داشته باشد. لازم به ذکر است که برای افزایش دقت این شاخص (SHI) نیاز به مطالعات گسترده‌تری با نمونه‌های بیشتر و در شرایط مختلف است و این مطالعه نقطه شروع استفاده از شاخص می‌باشد.

روطبی اکوئیک، شاخص هیدرومorfیک جدید خاک پیشنهاد شده است. میکرومorfولوژی سهم به سزاپی در توسعه تعریف شرایط اکوئیک داشته است. بسیاری از ویژگی‌های اکسید و احیایی جدید که تعریف شده است، توسط میکرومorfولوژیست‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. شواهد گویای آن است که این ویژگی‌ها به سرعت توسط خاکشناسان برای استفاده فوری پذیرفته خواهد شد. شاخص جدید هیدرومorfیک خاک (SHI) برای ارزیابی افق‌های اکوئیک و شرایط اکوئیک بر اساس ویژگی‌های میکرومorfولوژیکی شامل ساختمان میکروسکوپی، مواد نرم، بی‌فابریک، مواد آلی، ویژگی‌های هیدرومorfیک و هوازدگی مواد معدنی است. با استفاده از این شاخص، می‌توان افق‌های دارای شرایط اکوئیک منطقه را از ضعیف تا خوب طبقه‌بندی کرد و مشکلات مربوط به تعریف این اصطلاح در طبقه‌بندی خاک برطرف نمود. براساس شاخص هیدرومorfیک معرفی شده در این پژوهش و تعداد نمونه‌ها و پروفیل‌های مطالعه شده، می‌توان نتیجه کار را به صورت زیر بیان نمود:

$SHI > 0.35$

Aquic soils
Aquitic soils

به عبارت دیگر در صورتی که شاخص هیدرومorfیک تعریف شده بیشتر از $0/35$ باشد خاک مورد مطالعه

منابع

- Dorney, J., Savage, R., Tiner, R.W., and Adamus, P. (Eds.). 2018. Wetland and stream rapid assessments: Development, validation, and application. Academic Press. 564p.
- Keddy, P.A. 2010. Wetland ecology: principles and conservation. Cambridge university press. 614p.
- Hong, H., Fang, Q., Cheng, L., Wang, C. and Churchman, G.J. 2016. Microorganism-induced weathering of clay minerals in a hydromorphic soil. *Geochimica et Cosmochimica Acta*. 184: 272-288.
- Hurt, G.W. 2005. Hydric Soils, P 212-217, In: D., Hillel (ed), Encyclopedia of soils in the environment. Vol. 2. Academic Press; Columbia University New York.
- Davidson, N.C., Fluet-Chouinard, E., and Finlayson, C.M. 2018. Global extent and distribution of wetlands: trends and issues. *Marine and Freshwater Research*. 69: 4. 620-627.

- 6.Guthrie, R.L. 1985. Characterization and classification wetland soils in relation to food production. P 11-22, In: United States. Soil Management Support Services, and Philippines. Bureau of Soils (ed) wetland soils-Characterization, classification and utilization. Manil, Philippines, IRRI.
- 7.Torabi Golsefidi, H. 2001. Genesis, classification and land suitability evaluation of wetland soils for irrigated rice in Eastern Guilan province. Ph.D. Thesis, College of Agriculture, Isfahan University of Technology. 460p. (In Persian)
- 8.Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil Taxonomy. United States Department of Agriculture. 12nd Ed. NRCS. 372p.
- 9.Bouma, J. 1983. Hydrology and soil genesis of soils with aquic moisture regimes. En: Pedogenesis and Soil Taxonomy I. Concepts and Interactions. P 253-281, In: L.P. Wilding; N.E. Smeck, and G.F. Hall. (eds.) Elsevier. Amsterdam.
- 10.Lindbo, D. 1997. Entisols: Fluvents and fluvaquents: Problems recognizing aquic and hydric conditions in young, flood plain soils. P 133-152, In: M.J. Vepraskas and S.W. Sprecher (eds.) Aquic conditions and hydric soils: The problem soils. SSSA Spec. Publ. 50. SSSA, Madison, WI.
- 11.Bell, J.C., and Richardson, J.L. 1997. Aquic conditions and hydric soil indicators for Aquolls and Albolls. P 23-40, In: M.J. Vepraskas and S.W. Sprecher (eds.) Aquic conditions and hydric soils: The problem soils. SSSA Spec. Publ. 50. SSSA, Madison, WI.
- 12.Kuehl, R.J., Comerford, N.B., and Brown, R.B. 1997. Aquods and Psammaquents: Problems in hydric soil identification. P 41-59, In: M.J. Vepraskas and S.W. Sprecher (eds.) Aquic conditions and hydric soils: The problem soils. SSSA Spec. Publ. 50. SSSA, Madison, WI.
- 13.Clausnitzer, D., Huddleston, J.H., Horn, E., Keller, M., and Leet, C. 2003. Hydric soils in a southeastern Oregon vernal pool. Soil Science Society of America Journal. 67: 3. 951-960.
- 14.Stoops, G., Marcelino, V., and Mees, F. 2010. Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths, SSSA. Madison, WI, 752p.
- 15.Heidari, A., and Sahebjalal, E. 2011. Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith thin Section, (by Stoops, G), University of Tehran Press. 278p. (Translated in Persian)
- 16.Aydemir, S., Keskin, S., and Drees, L. R. 2004. Quantification of soil features using digital image processing (DIP) techniques. Geoderma. 119: 1-2. 1-8.
- 17.O'Donnell, T., Goyne, K.W., Miles, R.J., Baffaut, C., Anderson, S.H., and Sudduth, K.A. 2010. Identification and quantification of soil redoximorphic features by digital image processing. Geoderma. 157: 86-96.
- 18.O'Donnell, T., Goyne, K.W., Miles, R.J., Baffaut, C., Anderson, S.H., and Sudduth, K.A. 2011. Determination of representative elementary areas for soil redoximorphic features identified by digital image processing. Geoderma. 161: 138-146.
- 19.Yurong, H., Chengmin, H., Xiangming, X., Yanqiang, W., and Xiubin, H. 2008. Micromorphological Features of Paleo-Stagnic-Anthrosols at Archaeological Site of Sanxingdui, China. Journal of Mountain Science. 5: 358-366.
- 20.Raheb, A.R., and Heidari, A. 2012. Investigating the soil properties affected by land use change of paddy rice to kiwi plantation in some soils of Tonekabon County, Northern Iran. Journal of Soil Management and Sustainable. 2: 2. 1-26. (In Persian)
- 21.Raheb, A.R. 2012. Image Analysis and investigation of micromorphological and mineralogical properties of paddy and non-paddy soils. M.Sc. Thesis, College of Agriculture, University of Tehran, Iran. 184p. (In Persian)
- 22.Chaplot, V., Walter, C., and Curmi, P. 2000. Improving soil hydromorphy prediction according to DEM resolution and available pedological data. Geoderma. 97: 405-422.

23. Chaplot, V., Walter, C., Curmi, P., Lagacherie, P., and Kinge, D. 2004. Using the topography of the saprolite upper boundary to improve the spatial prediction of the soil hydromorphic index. *Geoderma*. 123: 343-354.
24. Dorronsoro, C. 1994. Micromorphological index for the evaluation of soil evolution in central Spain. *Geoderma*. 61: 237-250.
25. Khormali, F. 2005. Application of image analysis and microscopic methods for estimation of porosity and gypsum in Gypsiferous soils. 9th Iranian Soil Science congress, Karaj. (In Persian)
26. Magaldi, D., and Tallini, M. 2000. A micromorphological index of soil development for Quaternary geology research. *Catena*. 41: 261-276.
27. Vodyanitskii, Y.N. 2007. New Soil Hydromorphism Index Based on State of Iron. *Russian Agricultural Sciences*. 33: 4. 250-253.
28. Khormali, F., Abtahi, A., Mahmoodi, S. and Stoops, G. 2003. Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semiarid regions of southern Iran. *Catena*. 53: 273-301.
29. Newhall, F., and Berdanier, C.R. 1996. Calculation of soil moisture regimes from the climatic record. Natural Resources Conservation Service, Soil Survey Investigation Report, No. 46. 13p.
30. Murphy, C.P. 1986. Thin Section Preparation of Soils and Sediments. A B Academic Publ., Berkhamsted. 149p.
31. Stoops, G. 2003. Guideline for analysis and description of soil and regolith thin sections, SSSA. Madison, WI, 184p.