

گزارش کوتاه علمی

چهار گونه عمدۀ سن *Miridae* روی درختان پسته در ایران. دکتر محمد رضا مهرنژاد^{*} و دکتر راونو لیناوری^۱، موسسه تحقیقات پسته کشور، صندوق پستی: ۷۷۱۷۵/۴۳۵، رفسنجدان، ایران؛ ساکوکوجا، فین ۲۱۲۲۰-۰ رازیسو، فنلاند.

*reza_mehrnejad@hotmail.com

در مناطق پسته کاری و رویش‌گاه‌های پسته وحشی استان کرمان چندین گونه سن از خانواده *Miridae* روی درختان پسته اهلی (*Pistacia vera* L.) و درختان پسته وحشی (*P. khinjuk* Stocks و *Pistacia atlantica* sub sp. *P. mutica* (Fischer & C.A. Meyer)) می‌کنند. بر اساس مطالعات صحراوی از بین آن‌ها چهار گونه دارای فراوانی بیشتر و پراکنده وسیع‌تر می‌باشند. معمولاً میوه‌های جوان پسته بالافاصله پس از مرحله گرده افسانی تا قبل از تشکیل پوست استخوانی مورد حمله سن‌های متعلق به خانواده *Miridae* قرار می‌گیرند. دو گونه سن *Campylomma verbasci* و *Campylomma diversicornis* Reuter, 1878 (Meyer-Dür, 1843) به میوه‌های تازه تشکیل شده و جوان پسته در اوایل بهار حمله می‌کنند و خسارت آن‌ها به صورت لکه تیره در پوست رویی میوه پسته بروز می‌کند، این عارضه نام دارد این صدمه که به دلیل فرو بردن خرطوم سن در میوه جوان پسته ایجاد می‌گردد بتدریج در تمام بافت آن گسترش می‌یابد و میوه صدمه دیده خشک می‌شود و سپس ریزش می‌نماید. این نوع خسارت در بین پسته کاران استان کرمان با نام محلی "داغو" معروف است و معمولاً از عوامل عمدۀ کاهش محصول می‌باشد (۱). بر اساس اطلاعات موجود، سن *C. verbasci* به عنوان یک حشره گیاه خوار و شکارگر محسوب می‌شود (۴). در رفتار گیاه خواری، پوره‌های جوان از شیره گیاهی، گرده و شهد تغذیه می‌کنند. در رفتار شکارگری، پوره‌ها و حشرات کامل از شته، کنه، تریپس و پسیل گلابی تغذیه می‌کنند (۶؛ ۳). سن *C. verbasci* به عنوان آفت میوه سیب در آذربایجان غربی نیز گزارش شده است (۵).

بررسی‌های صحرایی نشان داد دو گونه سن 1998 و *Farsiana pistaciae* Linnauvori, 1998 در سطح وسیعی از باغ‌های پسته و رویشگاه‌های پسته وحشی در استان کرمان پراکنده هستند پوره‌های هر دو گونه از پوره‌های سنین مختلط فضیل معمولی پسته، *Agonoscena pistaciae* Burckhardt and Lauterer، تغذیه می‌کنند و با این رژیم غذایی با موفقیت به حشره کامل تبدیل می‌شوند. سن‌های *P. pistaciae* و *P. sangrudanus* در بهار روی درختان پسته آلوه به آفت پسیل معمولی پسته حضور دارند (2)، در عین حال سایر شکارها و رفتار تغذیه‌ای آن‌ها ناشناخته می‌باشد این اولین گزارش از حضور و زندگی سن‌های *P. sangrudanus* و *C. verbasci* و *C. diversicornis* روی درختان پسته اهلی و وحشی می‌باشد.

Four major mirid bugs of pistachio trees in Iran. Dr. M. R. Mehrnejad^{1*} and Dr. R. E. Linnauvori². 1- Pistachio Research Institute, P. O. Box 77175/435, Rafsanjan, Iran; 2- Saukkokuja 10, FIN-21220 Raisio, Finland. Reza_mehrnejad@hotmail.com*.

There are several mirid bug species associated with cultivated- and wild- pistachio trees in Kerman province, southern of Iran. Among them, four species were found dominant. The very young and immature pistachio nuts may be attacked by either adult or nymph of some hemipteran bugs particularly those belonging family "Miridae" in spring. *Campylomma diversicornis* Reuter, 1878 and *Campylomma verbasci* (Meyer-Dür, 1843) both attack the newly formed and very young pistachio nuts at early spring causing epicarp lesion. This injury leads to desiccation and dropping of the damaged nuts from the trees. Epicarp lesion is considered as one of the important problems in pistachio orchards in Iran (1), which mainly causes by the mirid bugs. *Campylomma verbasci* may be considered as phytozoophagous insect (4). As a phytophagous, young nymphs feed on plant sap, pollen and nectar, injury being important on apples. As a predator, nymphs and adults feed on aphids, mites, thrips and pear psylla (3; 6). *Campylomma verbasci* was also reported as the pest of apple trees in west Azerbaijan, Iran (5).

Farsiana pistaciae Linnauvori, 1998 and *Pseudoloxops sangrudanus* Linnauvori, 2006 were found as the active predatory bugs in colonies of the common pistachio psyllid, *Agonoscena pistaciae* Burckhardt and Lauterer on both cultivated- and wild- pistachio trees

either in plane or mountainous areas in Kerman province. The nymphs of both species attack different nymphal instars of the *A. pistaciae* and develop successfully on this prey. These bugs active through the spring on pistachio trees (2). However, the other preys, host plants and feeding behaviour of these predatory bugs in pistachio plantations remained unclear. This is the first record for presence and activity of *C. diversicornis*, *C. verbasci* and *P. sangrudanus* on pistachio trees in Iran.

References: (1) M. R. MEHRNEJAD, Cahiers Options Mediterraneenes, 56: 315–322, 2001; (2) M. R. MEHRNEJAD, Entomofauna, 31: 249-272, 2010; (3) NIEMCZYK, Polski Pismo Entomologiczne, 48: 221-235, 1978; (4) NIEMCZYK, IOBC/WPRS Bulletin, 22 (6): 21–29, 1999; (5) POURHADJI, Journal of Entomological Society of Iran, 20: 47-55, 2001; (6) THISTLEWOOD and SMITH, Implications for life history and Integrated Pest Management, 119-140, 1996.