

ارتباط التهاب و استرس اکسیداتیو با قند خون، چربی خون و BMI، توده ی چربی و وزن بدن در افراد مبتلا به دیابت نوع دو

ناصح پهلوانی^۱، امید صادقی^۱، حمید رسد^۱، فاطمه عزیزی سلیمان^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
۲- دانشجوی PhD تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

*نویسنده مسئول: فاطمه عزیزی سلیمان - پست الکترونیکی: fatemehazizi87@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف: ۲/۵٪ مردم دنیا از دیابت رنچ می بزنند و یکی از شدیدترین اختلالات ناشی از متابولیسم می باشد که در نتیجه ی آن بیومارکرهای التهابی مانند (اینترلوکین ۶، TNF α و CRP) افزایش می یابند هدف از این مطالعه بررسی ارتباط التهاب و استرس اکسیداتیو با قندخون، چربی و شاخص های تن سنجی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو است.

مواد و روش‌ها: مطالعه ی حاضر به صورت یک بررسی مقطعی برای مقایسه ی ارتباط فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بر روی ۴۵ مرد و زن ۳۵-۶۵ ساله مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفت، از آزمون‌های آماری linear regression و independent sample T-test برای تحلیل نتایج استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین قند خون ناشتا، MDA و TC در زنان بیشتر از مردان بودند، در سایر موارد تفاوتی بین دو جنس وجود نداشت، MDA نه به صورت مستقیم و نه پس از تعديل اثر جنس ارتباطی با FBS، TG، TC و شاخص های آنتروپومتری (وزن، BMI و توده چربی بدن) نداشت.

بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه ی حاضر نشان داد که میانگین توده بدنی، کلسترول تام و مالون دی آلدھید در زنان بیشتر از مردان دیابتی بود، این مطالعه نشان داد که باید توجه ویژه ای به کنترل فاکتورهای التهابی در افراد دیابتی به منظور تسهیل و تسريع در درمان بیماری و همچنین پیشگیری از عوارض ناشی از التهابات انجام شود.

واژه‌های کلیدی: دیابت نوع دو، فاکتورهای التهابی، قندخون ناشتا، توده بدنی، کلسترول تام.

مقدمه

ضروری می باشدند و به منظور جلوگیری از تجمع این رادیکال‌ها بدن مجهز به یک سری از سیستم‌های آنتی اکسیدانی (شامل: ویتامین C، آنزیم های سوپراکسید دیس موتاز و کاتالاز و مولکول‌هایی مانند گلوتاتیون) می باشد که این رادیکال‌های آزاد را خنثی می کند، اما در هنگام افزایش تولید رادیکال‌های آزاد، به دلیل کشمکش بین رادیکال‌های آزاد و آنتی اکسیدان‌ها، ممکن است سطح آنتی اکسیدان‌ها کاهش یابد و در این شرایط پاکسازی ناقص این رادیکال‌ها موجب اکسیداسیون لیپیدها، قندها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک می شود که در نهایت موجب پیامدهای گسترده‌ی پاتولوژیک در دیابت می شود.^(۷)، یکی از عواملی که دیابت از طریق آن باعث تسهیل روند تشکیل آترواسکلروز می شود استرس اکسیداتیو است.^(۸) اگرچه در حال حاضر در مورد نقش استرس اکسیداتیو و التهاب در پاتوژن و عوارض دیابت اطلاعات زیادی در دسترس است اما مطالعات اندکی در باره‌ی ارتباط آنها با قند خون، چربی خون و شاخص‌های آنتروپومتریک در کشورمان انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط التهاب و استرس اکسیداتیو با قندخون، چربی و شاخص‌های تن سنجی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو است.

مواد و روش‌ها

۴۵ مرد و زن ۳۵-۶۵ ساله مبتلا به دیابت نوع دو و غیر سیگاری از انجمن دیابت ایران و انستیتو غدد و متابولیسم بیمارستان فیروزگر پس از کسب رضایت نامه کتبی وارد این مطالعه مقطعی شدند. در صورت وجود بیماری قلبی عروقی طی دو سال گذشته، بیماری کبدی، کلیوی، تیروئید،

دیابت ملیتوس یکی از شدیدترین اختلالات ناشی از متابولیسم می باشد که با افزایش قند خون، اختلال در متابولیسم کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها و کمبود نسیی یا مطلق انسولین همراه است (۱). ۳٪-۲٪ مردم دنیا از دیابت رنج می برند^(۲) دیابت نوع دو که بیش از ۹۰ درصد موارد ابتلا به دیابت را تشکیل می دهد^(۳) بر اساس بررسی ملی بیماری‌های غیر واگیر در ایران که در سال ۲۰۰۵ انجام شد شیوع دیابت ملیتوس در شهروندان ایرانی ۶۴-۲۵ ساله ۷/۷ درصد میلیون نفر) بود^(۴). عوارض دیررس متعددی از قبیل عوارض قلبی- عروقی را در مبتلایان موجب می گردد که علاوه بر کاهش کیفیت زندگی و تحملی هزینه‌های درمانی، خطر مرگ و میر را نیز در این افراد ۴-۲ درصد افزایش می دهد^(۲). همچنین از عوارض دیگر دیابت می توان به بیماری‌های قلبی-عروقی و آترواسکلروز اشاره کرد^(۵). ارتباط مثبتی بین دیابت و التهابات سیستمیک در افراد سفید پوست غیر سیگاری دیده شده است^(۵). تحقیقات فراوانی در مورد ارتباط بین دیابت نوع دو و التهاب صورت گرفته و مشاهده شده که بیومارکرهای التهابی در دیابت افزایش می یابند، از بین این بیومارکرهای CRP، اینترلوکین ۶ و TNF α اشاره کرد، بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اکثرًا دچار اضافه وزن هستند و معمولاً محدود کردن ۳۰-۱۵ درصدی کالری دریافتی برای کاهش وزن ۱۵-۱۵ درصدی، کاهش قند خون و دیس لیپیدمی و فشار خون مورد نیاز است^(۶). استرس اکسیداتیو می تواند در روند سرعت بخشیدن به بروز عوارض بالینی در مبتلایان به دیابت نوع دو نقش داشته باشد چون رادیکال‌های آزاد به طور مداوم در طی متابولیسم هوایی تولید و برای عملکرد مکانیسم دفاعی میزبان

جنس وجود نداشت ($P\text{-value} > 0.05$). MDA نه به صورت مستقیم و نه پس از تعديل اثر جنس ارتباطی با FBS، TC، TG و شاخص‌های آنتروپومتری (وزن، BMI، و توده چربی بدن) نداشت ($P\text{-value} > 0.05$). اما قند خون، نمایه توده بدن و توده چربی بدن نقش معنی داری در پیش‌بینی میزان CRP داشتند ($P\text{-value}$ به ترتیب: 0.012 ، 0.000 ، 0.027).

بحث و نتیجه گیری:

در این مطالعه نشان داده شد که میانگین قند خون ناشتا در زنان دیابتی به طور معنی داری بیشتر از مردان است و همچنین سطح مالون دی آلدھید در زنان بالاتر از مردان بود، سطوح کلسترول تام و BMI در زنان به میزان معنی داری بیشتر از مردان بود، میزان مالون دی آلدھید حتی پس از تعديل اثر جنسیت ارتباط معنی داری با سطوح قندخون ناشتا، توتال کلسترول، تری گلیسرید و شاخص‌های آنتروپومتریک (وزن، توده چربی و BMI) نداشت، اما قندخون ناشتا، نمایه توده بدن و توده چربی بدن در پیش‌بینی میزان CRP نقش معنی داری داشتند. در مطالعه فرانزینی (Franzini) و همکاران در سال 2013 در ایتالیا که مقایسه‌ی میان زنان و مردان دیابتی با و بدون چاقی شکمی را انجام دادند که این مطالعه نشان داد که سطوح HDL به طور قابل توجهی در زنان بیشتر از مردان دیابتی بود، اما میزان تری گلیسرید در دو جنس تفاوت معنی داری را نشان نداد. سطح قند خون ناشتا نیز در زنان دیابتی بالاتر از مردان دیابتی بود اما شاخص توده بدن در مردان دیابتی بدون چاقی شکمی به طور قابل توجهی بیشتر از زنان بود که با نتیجه‌ی به دست آمده از مطالعه‌ی ما همخوانی ندارد. همچنین فشار خون سیستولیک در زنان و

ماکروپروتئین اوری، نوروپاتی، استعمال دخانیات طی دو سال گذشته، مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی طی 3 ماه قبل و تغییرات وزن بیشتر از 3 کیلوگرم طی 3 ماه گذشته افراد وارد مطالعه نمی‌شدند. قد با استفاده از قد سنج، وزن با استفاده از ترازو seca و توده چربی بدن با استفاده از دستگاه Bioelectric impedance(BIA) از ناشتا، نمونه خون وربدی برای اندازه‌گیری FBS، CRP و MDA، TC، TG colorimetric enzymatic (پارس آزمون، تهران، ایران) و TG با روش آنزیماتیک (پارس آزمون، تهران، ایران)، Cayman، MI با روش کالریمتریک شیمیایی (BiochemCanada Elisa) USA و CRP با روش Ontario، Canada اندازه‌گیری گردید. فشار خون در حالت نشسته، دو بار از دست راست با استفاده از فشارسنج جیوهای اندازه‌گیری شد و میانگین آنها مورد استفاده قرار گرفت. پروتکل مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران independent تأیید قرار گرفت. از آزمون‌های آماری linear regression و sample T-test استفاده شد.

یافته‌ها:

در این مطالعه که به صورت مقطعی انجام شد میانگین سن افراد مورد مطالعه $54/97 \pm 8/26$ سال و میانگین مدت ابتلا به دیابت 5 سال بود. میانگین قند خون ناشتا، MDA، TC و BMI در زنان بیشتر از مردان بودند ($P\text{-value}$ به ترتیب: 0.019 ، 0.005 ، 0.031). در سایر موارد تفاوتی بین دو

می شود(۱۳). فاکتورهای تغذیه‌ای نقش مؤثری در کاهش یا افزایش برخی فاکتورهای مورد بررسی دارند به طوری که در مطالعه‌ی Krojcovicova و همکاران بین میزان مصرف ویتامین ث و سطح پروتئین واکنش دهنده‌ی C ارتباط عکس مشاهده گردید(۱۴)، در مطالعه‌ی محمودی و همکاران که بر روی بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی انجام شد میزان دیابتی بودن زنان به طور معنی داری بالاتر از مردان بود، همچنین هیپرلیپیدمی، پرفشاری خون، کلسترول و قندخون ناشتا در زنان بیشتر از مردان بود(۱۵). همچنین در مطالعه‌ی Ajani و همکاران نشان دادند که بین مصرف فیبر و مقادیر پروتئین واکنش‌گر C ارتباط معکوس وجود دارد(۱۶). در مطالعه پورمند که در بیماران مبتلا به آثربین صدری انجام شد عروق کرونر به طور معنی داری بالاتر از مردان مبتلا به این بیماری بود اما میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در دو جنس تفاوت معنی داری نداشتند و این درحالی بود که اکثر بیماران مبتلا به دیابت نیز بودند و این نتیجه تا حدودی مؤید نتایج مطالعه‌ی ماست(۱۷). در مطالعه‌ی کافشانی و همکاران که بر روی بیماران همودیالیزی انجام گرفت نشان داده شد که میان سطوح CRP، ویتامین B₁ و سلنیوم دریافتی ارتباط معکوسی وجود دارد و در مورد سایر مواد مغذی مانند ویتامین C، E، A، منیزیم و فیبر مانند اکثر مطالعات دیگر ارتباط معکوس دیده شد اما این رابطه معنی دار نبود(۱۸). در مطالعه‌ی بهادران و همکاران که هدف آن‌ها بررسی اثر مصرف پودر جوانه‌ی بروکلی در کاهش قندخون ناشتا و التهاب در بیماران دیابتی بود با کاهش میزان میزان قند خون ناشتا مقادیر اینتلروکین ۶ و پروتئین واکنش‌گر C هم به عنوان

مردان دیابتی تفاوت معنی داری نداشتند و نیز فشارخون دیاستولیک در مردان و زنان دیابتی بدون چاقی شکمی اختلاف معنی داری نداشت که هم راستا با مطالعه‌ی مقطعی حاضر بودند ولی فشار دیاستولیک در مردان دیابتی با چاقی شکمی بطور قابل توجهی بالاتر از زنان با چاقی شکمی بود که مغایر نتیجه‌ی به دست آمده از مطالعه‌ی ماست(۹). در مطالعه‌ی Shivananda و همکاران در سال ۲۰۰۶ که بر روی افراد دیابتی در مقایسه با گروه کنترل انجام شد مشخص شد که میزان CRP و BMI در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند ولی میزان فشارخون در دیابتی‌ها به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. در این بررسی همچنین میزان اسید سیالیک سرم به عنوان مارکر التهابی در دیابتی‌ها بالاتر از گروه کنترل بود، میزان کلسترول در افراد دیابتی و غیر دیابتی تفاوت معنی داری نداشت اما مقادیر تری گلیسرید در دیابتی‌ها بالاتر از گروه کنترل بود(۵). در مطالعه‌ی تقدیر و همکاران که بر روی زنان یائسه‌ی مبتلا به دیابت صورت گرفت میزان گلوکز سرم در افراد دیابتی به طور معنی داری بالاتر از دیابتی‌ها بود ولی سطوح فاکتورهای التهابی IL-6 و مالون دی آلدئید در دیابتی‌ها و غیردیابتی‌ها اختلاف معنی داری نداشتند(۱۰). افزایش سیتوکین‌های پیش التهابی و فعل شدن آبشار التهابی عامل مهمی در گسترش مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو محسوب می‌شود، از این رو تعديل یا مهار التهاب رویکرد جدیدی در کنترل دیابت نوع دو به شمار می‌رود(۱۱). در بیماران دیابتی بالا بودن قندخون منجر به افزایش استرس اکسیداتیو می‌شود و در نتیجه منجر به تغییر در ساختار و عملکرد چربی‌ها و پروتئین‌ها می‌گردد(۱۲). و پراکسیداسیون لیپیدها منجر به ایجاد آلدئیدهای سمی مانند مالون دی آلدئید

مارکرهای التهابی، چربی های خون و قند خون ناشتا در زنان و مردان به نسبت های متفاوت متغیر و بالا می رود؛ بنابراین پیشگیری و کنترل عوامل مؤثر و خطرزا در دیابت با اصلاح شیوهی زندگی و همچنین رژیم غذایی و در صورت لزوم دارو درمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شاخص های التهابی کاهش نشان دادند که هم راستا با مطالعه ای ماست (۳). از جمله محدودیت های این مطالعه کم بودن حجم نمونه بود، توصیه می شود در مطالعات مقطعی آینده از حجم نمونه ای بالاتر برای پی بردن به ارتباط قطعی تر میان التهاب و استرس اکسیداتیو با شاخص های مورد بررسی استفاده شود. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در بیماری دیابت سطوح شاخص های مورد بررسی مانند

جدول ۱ - ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه

متغیر	Mean \pm SD
سن (years)	۵۴/۹۷ \pm ۸/۲۶
جنس زن تعداد (%)	۲۲ (٪ ۵۰)
جنس مرد تعداد (%)	۲۳ (٪ ۵۰)
قد (cm)	۱۶۳/۰۶ \pm ۹/۸۰
وزن (kg)	۷۳/۳۰ \pm ۱۱/۸۷
نمایه توده بدن (kg/m ²)	۲۷/۴۴ \pm ۴/۱۱
مدت ابتلا به دیابت (years)	۵/۴۰ \pm ۴/۰۵

جدول ۲- مقایسه میانگین شاخصهای خونی و آنتروپومتری در زنان و مردان

P-value	مردان	زنان	
. / . . .	۹۵/۸۵ ± ۱۶/۹۵	۹۶/۷۷ ± ۱۵/۷۶	* (mg/dL) قند خون ناشتا
NS	۱۲۱/۲۷ ± ۱۰/۸۸	۱۲۱/۰۰ ± ۱۱/۷۵	فشار خون سیستولیک §(mmHg)
NS	۷۹/۵۰ ± ۸/۵۰	۷۷/۶۰ ± ۹/۹۷	فشار خون دیاستولیک *(mmHg)
NS	۲۵/۷۰ ± ۴/۳۲	۴۰/۱۰ ± ۶/۱	* توده چربی بدن (percent)
. / . ۱۹	۳/۲۸ ± ۰/۳۶	۳/۷۸ ± ۰/۷۸	مالون دی آلدھید § (nM/µL)
NS	۲۱۱۰/۳۳ ± ۲۶۶۳/۳۶	۲۶۳۰/۵۴ ± ۲۹۵۱/۸۲	§(mg/L)CRP
NS	۷۵/۶۹ ± ۱۰/۴۸	۷۱/۰۲ ± ۱۲/۸۸	* وزن (kg)
. / . ۰۵	۱۵۳/۵۰ ± ۲۵/۸۸	۱۸۰/۴۷ ± ۳۴/۷۶	کلسترول تام § (mg/dL)
NS	۱۴۷/۴۵ ± ۵۵/۲۳	۱۵۹/۸۶ ± ۸۰/۱۴	تری گلیسرید § (mg/dL)
. / . ۳۱	۲۶/۰۴ ± ۲/۸۱	۲۸/۹۸ ± ۴/۶۷	نمایه توده بدن § (kg/m2)
NS	۵/۵۹ ± ۳/۲۳	۷/۱۷ ± ۴/۶۴	* مدت ابتلا به دیابت (years)
independent sample T-test * آزمون آزمون non-parametric 2 independent sample § آزمون آزمون			

جدول ۳- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی MDA و log CRP

متغیر مستقل	MDA						Log CRP		
	B		SE		P		B	SE	P
	Model 1§	Model 2¶	Model 1§	Model 2¶	Model 1§	Model 2¶			
FBS*	.152	.123	.004	.006	.355	.450	.381	.005	.012
TC*	.096	-.014	.002	.002	.560	.936	.281	.111	.68
TG*	.007	-.024	.001	.001	.968	.881	.231	.001	.136
weight*	.034	.108	.005	.008	.519	.342	.295	.006	.055
BMI*	.219	.148	.015	.016	.181	.387	.518	.017	.000
Fat mass*	.269	.170	.010	.017	.098	.529	.336	.008	.027

* آزمون linear regression

§ آزمون رگرسیون بدون تعدیل اثر جنس

¶ آزمون رگرسیون پس از تعدیل اثر جنس

The Relationship between Inflammation, Oxidative Stress, Blood Sugar, Blood Lipid, Body Mass Index, Fat Mass, and Body Weight in Patients with Type 2 Diabetes

Pahlavani N¹, Sadeghi O¹, Rasad H¹, Azizi soleiman F^{2*}

1. MSc Student in Nutrition, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2. PhD Student in Nutritional Sciences, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

*Corresponding author: azizi soleiman F, E -mail: fatemehazizi87@gmail.com

Abstract

Introduction: Approximately 2.5-3% of the world's population suffers from diabetes. This condition is one of the most serious metabolic disorders, resulting in an increase in inflammatory biomarkers (e.g., interleukin-6, TNF-alpha, and CRP). The aim of this study was to investigate the relationship between oxidative stress, inflammation, blood glucose, lipid level, and anthropometric parameters in patients with type 2 diabetes.

Methodology: This cross-sectional study was performed to compare the relationship between inflammatory factors and type 2 diabetes in 45 male and female subjects (age range=35-65 years). For data analysis, independent sample t-test and linear regression were applied.

Results: The mean values of fasting blood sugar (FBS), malondialdehyde (MDA), total cholesterol (TC), and body mass index (BMI) were higher in women, compared to men. However, no significant difference was observed between the two genders in terms of other factors. Also, MDA was not directly correlated with FBS, TC, triglyceride, or anthropometric indices (body weight, BMI, and body fat) after adjusting the sex factor.

Conclusion: This study showed that the mean values of BMI, TC, and MDA were higher in diabetic women, compared to their male counterparts. Therefore, diabetic patients should pay particular attention to the management of inflammatory factors to facilitate and accelerate the treatment and prevention of complications due to inflammation.

Key words: Body Mass Index, Fasting Blood Sugar, Inflammatory Factors, Total Cholesterol, Type 2 Diabetes.

References

1. Larijani B, Zahedi F, Ghakhani SH. Epidemiology of diabetes mellitus in Iran. SEMJ. 2003; 4:4.[Persian]
2. Malekshahi moghadam A, saedisomeolia A, jalali M, sejoodi F. The effects of dietary omega-3 fatty acid supplementation on inflammatory biomarkers in type-2 diabetic patients. Journal of school of public health and institute of public health research. 2011;9(3):73-81.[Persian]
3. Bahadoran Z, Mirmiram P, Hossein panah F, Sadeghi M, and Azizi F. Evaluation the effects of Broccoli sprout powder in insulin resistant and inflammatory indexes in patient with type2 diabetes. A double blind clinical trial. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2011;2(11):148-53.[Persian]
4. Amini M, Parvaresh E. Prevalence of macro- and microvascular complications among patients with type 2 diabetes in Iran: A systematic review. Diabetes research and clinical practice. 2009; 83: 18 – 25.
5. Shivananda N, Lesley R. Relationship between inflammatory markers, metabolic and anthropometric variables in the Caribbean type 2 diabetic patients with and without microvascular complications. Journal of Inflammation. 2006; 3:17.
6. Gauthier-Chelle K, Mennen L, Arnault N, Rigalleau V, Hercberg S, Gin H. Comparison of the diet of self-declared diabetics with nondiabetic patients in the SU.VI.MAX study: did the diabetics modify their nutritional behavior. Diabetes Metab. 2004; 30: 535-542.
7. Nourooz zadeh J, Hafizi GH, Khadem Ansari Mh, Keyvanpajhoh K. Oxidative stress indexes in noncomplication type 2 diabetes. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2006; 11: 22-28.[Persian]
8. Hemmatabadi M, Larijani B. review the role of oxidative stress and antioxidant treatment in diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2009; 9(1):1-6.[Persian]
9. Franzini L, Ardigo D, Cavalot F, Miccoli R et al. Women show worse control of type 2 diabetes and cardiovascular disease risk factors than men: Results from the MIND.IT Study Group of the Italian Society of Diabetology, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2013 ;(23):235-41.
10. Taghdir M, Djazayeri SA, Djalali M, Ashourpour M, Sepandi M, Rajab A. Relationship Between Serum Leptin Concentration and Inflammatory Factors and Oxidative stress in Postmenopausal Type II Diabetic Women. Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services Endocrine & Metabolism Research Center. 2009; 11(4):371-6.[Persian]
11. King GL. The role of inflammatory cytokines in diabetes and its complications. J Periodontol. 2008; 79(8):1527-34.
12. Maxwell SR, Thomason H, Sandler D, Le Guen C, Baxter MA, Thorpe G, et al. Poor glycemic control is associated with reduced serum free radical scavenging (antioxidant) activity in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem. 1997 ;(34):638-44.
13. Esterbauer H, Schau RJ, Zollner H. Chemistry and biochemistry of 4-hydroxynonenal malondialdehyde and related aldehydes. Free Radic Biol Med. 1991 ;(11):81-128.
14. Krajcovicova-Kudlackova M, Blazicek P. C-reactive protein and nutrition. Bratisl Lek Listy.2005; 106(11):345.
15. Mahmoodi MR, Kimiagar SM, Abadi A. Gender differences in the incidence of myocardial infarction with and without conventional risk (modarres hospital heart study). Iranian Journal of Food Science and Technology. 2007; 2(3):65-72.[Persian]

16. Ajani UA, Ford ES, Mokdad AH. Dietary fiber and C-reactive protein: findings from national health and nutrition examination survey data. *J Nutr.* 2004; 135(5):1181-5.
17. Pourmand K MD, Sadeghi MMD, Sanei H MD, Akrami F, Talaei M MD. Which Major Atherosclerosis' Risk Factors Represents the Extent of Coronary Artery Disease. *Journal of*
18. Kafeshani O, Entezari MH, Hoseini M, Mohebrasool M, Sohrabi F, Torabi A. Correlation of inflammatory and nutrients intake in Isfahan hemodialysis patients. *Journal of Health Systems Research.* 2010;6(2).

Archive of SID