

The Role of Emotion Dysregulation, Repetitive Negative Thoughts and Thought-Action Fusion, in Prediction of Worry

Goudarzi, Z¹, Akbari, M^{2*}

1- MA Student in clinical psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2- Assistant of Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education Kharazmi University, Tehran, Iran. (Correspondence E-mail: Akbari.psy@gmail.com)

Abstract

Introduction: Worry is a prevalent phenomenon and common feature in many psychological disorders, especially anxiety disorders.

Objective: The aim of this study was to investigate the role of thought-action fusion, emotion dysregulation and repetitive negative thoughts in the prediction of worry

Method: According to the research design (correlation), the Pearson correlation and the multiple regression methods was used. In the current study, 343 students from the Kharazmi University were selected by a convenience sampling method and then completed Thought Fusion Inventory (TFI), Difficulties in Emotion Regulation Strategies Scale (DERS), Repetitive Negative Thoughts Questionnaire and Penn State Worry Questionnaire (PSWQ).

Results: The results showed that thought-action fusion, repetitive negative thoughts and emotion dysregulation have a significant and positive correlation with worry ($p<0.01$). Moreover, the stepwise multiple regression analysis indicated that the variation of worry can be explained by difficulty in emotion regulation (25%) at the first step, as well as repetitive negative thoughts and difficulty in emotion regulation (31%) at the second step. Also, the thought-action fusion excluded from this model.

Conclusion: The results of this study provide evidence that emotion dysregulation and repetitive negative thoughts have been able to predict worry and this result can be considered a step towards a better understanding of the nature of the worry.

Keywords: Worry, Thought-action fusion, Repetitive negative thought, Emotion dysregulation

نقش بی نظمی هیجانی، افکار منفی تکرارشونده و آمیختگی فکر- عمل در پیش بینی نگرانی

ژهرا گودرزی^۱، مهدی اکبری^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

۲- استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول: Akbari.psy@gmail.com)

چکیده

مقدمه: نگرانی، پدیده‌ای رایج و ویژگی مشترک در بسیاری از اختلال‌های روانشناسی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بین بی نظمی هیجانی، افکار منفی تکرارشونده و آمیختگی فکر- عمل بر نگرانی انجام گرفت.

روش: با توجه به طرح پژوهش حاضر (همبستگی) از روش تحلیل همبستگی پرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش، ۳۴۳ نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس به پرسشنامه آمیختگی فکر (TFI)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی (DERS)، پرسشنامه افکار منفی تکرارشونده (RNTQ) و پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (PSWQ) پاسخ دادند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای دشواری در تنظیم هیجان، افکار منفی تکرارشونده و آمیختگی فکر، همبستگی معنادار و مثبتی با نگرانی داشتند ($p < 0.01$). همچنین، نتایج تحلیل گام به گام نشان داد که در گام اول، دشواری در تنظیم هیجانی به تنها ۲۵ درصد از واریانس نگرانی و در گام دوم افکار منفی و دشواری در تنظیم هیجانی ۳۱ درصد از واریانس نگرانی را تبیین می‌کنند و آمیختگی فکر- عمل از مدل حذف شد.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش شواهدی فراهم کرد که بی نظمی هیجانی و افکار منفی تکرارشونده قادر به پیش‌بینی نگرانی در دانشجویان بوده است و این یافته می‌تواند گامی در جهت شناخت بیشتر ماهیت نگرانی محسوب شود.

کلید واژه‌ها: نگرانی، بی نظمی هیجانی، آمیختگی فکر- عمل و افکار منفی تکرارشونده

مقدمه

افزایش استفاده از خدمات بهداشتی در جامعه و مشکلات جسمانی و آشفتگی های خواب همراه است (اسدی و همکاران، ۱۳۹۱؛ نیکخت نصرآبادی و همکاران، ۱۳۸۹؛ پورمحسنی کلوری، ۱۳۹۲). همچنان که از مطالعات بر می آید، نگرانی یکی از مؤلفه های مهم اضطراب می باشد، بنابراین تبیین و شناسایی دیگر متغیرهای روانشناسی دخیل در گسترش و تداوم نگرانی، می تواند در تشخیص بهتر و ارائه مداخله های روانشناسی برای سایر اختلال های اضطرابی نیز سودمند باشد. نگرانی در بین گروه های مختلف جامعه وجود دارد و نیز می تواند در طبقات خاصی از جامعه بیشتر باشد. دانشجویان احتمالاً یکی از این طبقه ها هستند که به خاطر نوع نقشی که در جامعه دارند و همچنین انتظاراتی که دیگران از آنها دارند، بیشتر تحت فشار و آسیب پذیری قرار دارند. با توجه به مبانی نظری و پژوهشی بالا، انجام پژوهش در زمینه نگرانی و متغیرهای مرتبط با آن و اتخاذ روش هایی برای کاهش نگرانی، ضروری است.

در پژوهش حاضر با توجه به اینکه ماهیت نگرانی، یک فعالیت شناختی است، ما به بررسی متغیرهای مرتبط با آسیب شناسی شناختی بیشتر می پردازیم. بر این اساس یکی از متغیرهای مرتبط با نگرانی که در یک دهه اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است، متغیر تنظیم هیجانی^۷ می باشد. تنظیم هیجان به عنوان تلاش هایی تعریف می شود که از سوی افراد برای حفظ، مهار و افزایش تجربه و ابراز هیجان به کار برده می شود (گلستانه و سروقد، ۱۳۹۲)، در واقع تنظیم هیجانی شامل هر راهبرد مقابله ای^۸ است که افراد، هنگام مواجهه با هیجانات شدید استفاده می کنند (لیهی، تیرچ و ناپولیتانو، ۲۰۱۱). روند نگرانی مانع

همه می درباره مسائل مختلفی نگران می شویم و بسیاری از افراد، فکر کردن در مورد رویدادهای چالش برانگیز آینده را سودمند می دانند، البته فکر کردن در مورد رویدادهای آینده، مستلزم نگران بودن در مورد آنها نیست و مهم است که بین نگرانی و انواع دیگر فکر کردن تمایز قائل شویم (دیوی و ولز^۱، ۲۰۰۶). بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانشناسی^۲ (۲۰۱۳)، نگرانی مشخصه اصلی اختلال های اضطرابی به ویژه اختلال اضطراب فراگیر^۳ (GAD) می باشد. همچنین بورکووک^۴ (۱۹۸۵)، نگرانی^۵ را به عنوان یک فرایند شناختی تعریف می کند که متمرکز بر افکار و تصاویر تکرار شونده، رویدادهای تنبیه گی زای احتمالی و پیامدهای بالقوه فاجعه انجیز آنهاست.

مطالعات دیوی و ولز (۲۰۰۶)، بر روی گروهی از دانشجویان دانشگاه نشان می دهد که ۳۸ درصد آنها حداقل یک بار در روز با یک نوع نگرانی رو به رو می شوند، بین ۱ تا ۱۰ دقیقه ذهن آنها را مشغول می کند و موضوع این نگرانی ها اغلب درباره روابط میان فردی، عملکرد تحصیلی، بهداشت و مسائل مالی است. همچنین تحقیقات نشان داده است که شیوع نگرانی با افزایش سن بیشتر می شود (کراتز و وودرف-باردن^۶، ۲۰۱۱).

دلایل واضح و مهمی وجود دارد که نگرانی بسیار گسترده، مزمن و آسیب رسان است. برای نمونه مطالعات نشان داده اند که نگرانی با افزایش خطر بروز اختلال های روانی، اختلال های اجتماعی، شغلی،

1. Davey & wells
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th end
3. Generalized anxiety disorder
4. Borkovec
5. Worry
6. Keratz & Woodruff-Borden

7. Emotion regulation

8. Coping strategy

9. Leahy, Tirch & Napolitano

تکراری هستند که فرد می ترسد این افکار، پیامدهایی داشته باشند که قادر به کنترل آنها نباشد، بنابراین امکان دارد نگرانی و افکار وسوسی در مدت، محتوا، شکل (تصویری یا غیر تصویری) و میزان قابل پذیرش بودن برای فرد تفاوت داشته باشد (برلی و استارسویک، ۲۰۰۵). همچنین هازلت - استیون و همکاران^{۱۲} (۲۰۰۲)، طی مطالعه‌ای یافته‌ند که آمیختگی فکر-عمل ممکن است در توسعه یا تداوم نگرانی آسیب‌زا به عنوان یک باور فراشناختی دخیل باشد. همچنین در مطالعه‌ای که موریس و همکاران^{۱۳} (۲۰۰۱)، جهت بررسی آمیختگی فکر-عمل و نشانه‌های اختلال‌های اضطرابی در بین نوجوانان بهنجار انجام دادند، نه تنها بین TAF و OCD رابطه وجود داشت، بلکه با سایر اختلال‌های اضطرابی خصوصاً اضطراب فراگیر نیز همبستگی یافتند.

یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با نگرانی، افکار منفی تکرارشونده است که بنابر مطالعات انجام شده نگرانی یک شکل از افکار منفی تکرارشونده (RNT)^{۱۴} معروفی شده است که معمولاً به همراه اختلال‌های اضطرابی و افسردگی مورد بررسی قرار می‌گیرد (مک اووی، مولدز و ماہونی^{۱۵}، ۲۰۱۳). تفکر منفی تکراری، فعالیت شناختی غیرقابل کنترل، تکراری، مداوم و دقیقی است که بر جنبه‌های منفی خود و دنیا تمرکز می‌کند (ماهونی، مک اووی و مولدز، ۲۰۱۲). افکار تکرارشونده شامل نگرانی، نشخوار فکری، پایش تهدید^{۱۶}، خودپایشی^{۱۷} و هر نوع فکر منفی تکرارشونده دیگری است که هسته اصلی اختلال‌های افسردگی و اضطرابی را تشکیل می‌دهد (اکبری، روشن، شعبانی و ضرغامی، ۱۳۹۳). افرادی که از اختلال‌های روانی

برانگیختگی جسمانی، در نتیجه سبب تسکین اولیه می‌شود، ولی از طرفی باعث تداخل در فرایند پردازش هیجانی^۱ و نگهداری معنای اضطراب می‌گردد (نیمن و لیرا، ۲۰۱۱). آنچه بسیار زیانبار است، عدم اطمینان فرد به توانایی خودش در کنترل کردن احساسات، واکنش-های اضطرابی و عدم اطمینان به توانایی اداره کردن تکالیف زندگی به نحو شایسته است (هالجین و ویبورن، ۲۰۰۳). نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر (GAD) به عنوان عاملی که در اجتناب از تجربه هیجانی نقش دارد، تایید شده است و همچنین کمبود مهارت‌های تنظیم هیجان در GAD توسط چندین پژوهش مورد حمایت قرار گرفته است (منین، مک لافلین و فلانانگان، ۲۰۰۹؛ استاپینسکی، ابوت و رپی، ۲۰۱۰؛ آلدائو، نولن-هوکسما و شوایزر، ۲۰۱۱).

یکی دیگر از سازه‌های مورد بررسی با نگرانی، آمیختگی فکر- عمل^۷ است. آمیختگی فکر- عمل (TAF)، به افکار و عقایدی اشاره دارد که در آن، افکار و اعمال به‌طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برلی و استارسویک، ۲۰۰۵). این مفهوم از دهه ۱۹۹۰ وارد عرصه آسیب‌شناصی شناختی اختلال‌های روانشناختی بهویژه اختلال وسوسی-اجباری (OCD)^۹ شده است (شفران، توردارسون و راچمن، ۱۹۹۶). اگرچه نتایج این پژوهش‌ها حاکی از اختصاصی بودن آمیختگی فکر- عمل با OCD است، اما فرق بین نگرانی آسیب‌زا^{۱۰} و افکار وسوسی همیشه روشن نیست، هر دو نشان دهنده درگیر شدن با افکار

1. Emotional process

2. Newman & Llera

3. Halgin & Whitbourne

4. Mennin, McLaughlin & Flanagan

5. Stapinski, Abbott & Rapee

6. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer

7. Thought action fusion

8. Berle & Starcevic

9. Obsessive Compulsive Disorder

10. Shafran, Thordarson & Rachman

11. Pathological worry

12. Hazlett-steven et al.

13. Muris et al.

14. Repetitive negative thinking

15. McEvoy, Moulds & Mahoney

16. Threat monitoring

17. Self-monitoring

ابزار

۱- پرسشنامه افکار منفی تکرارشونده (RNTQ): این پرسشنامه در سال ۲۰۱۰ توسط مک اوی و همکاران، جهت سنجش افکار تکرارشونده منفی طراحی شد و دارای ۳۱ گویه در یک مقیاس لیکرتی پنج درجه‌ای است. ضریب آلفای کرونباخ آن ۰/۷۲ تا ۰/۹۳ گزارش شده‌است برای محاسبه روایی پیش‌بین، از همبستگی این ابزار با پرسشنامه افسردگی بک (BAI) و پرسشنامه اضطراب بک (BDI) استفاده شده است و به ترتیب ضریب همبستگی ۰/۴۲ و ۰/۳۸ به دست آمده‌است (مک اوی و همکاران، ۲۰۱۰). پایایی نسخه فارسی این ابزار نیز توسط خالقی و همکاران (۲۰۱۱) به روش ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ گزارش شده‌است.

۲- پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS): توسط گراتز و رومر^۳ در سال ۲۰۰۰^۴ ساخته شده است. این پرسش نامه یک مقیاس ۳۶ سوالی است که الگوهای تنظیم هیجان را در قالب شش خرده مقیاس (عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در دست-یابی به رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، محدودیت در دستیابی به راهکارهای تنظیم هیجانی، و فقدان شفافیت هیجانی) می‌سنجد، و بیش از هر چیز بر مشکلات در تنظیم هیجان، تاکید دارد. گراتز و رومر پایایی این مقیاس را بر اساس بازآزمایی ۰/۸۸ و همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، ۰/۹۳ و برای خرده مقیاس‌ها بالای ۰/۸۰ گزارش کرده‌اند. اعتبار سازه و اعتبار پیش‌بین این مقیاس نیز طی مطالعه مذکور تایید شده است (مظلوم و یعقوبی، ۱۳۹۵). عسکری، پاشا و امینیان (۱۳۸۹)، پایایی نسخه فارسی مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ و روش تصنیف را به ترتیب ۰/۸۶ و ۰/۸۰

مخالفی رنج می‌برند گزارش می‌دهند که به طور تکراری درباره مشکلات و یا تجربیات منفی خود فکر می‌کنند و این افکار را به گونه‌ای تجربه می‌کنند که کنترل کردن آنها دشوار است (توپر، املکمپ و اهرینگ، ۲۰۱۰). افکار منفی تکرارشونده نه تنها در اختلال‌های افسردگی و اضطرابی حضور دارند، بلکه به عنوان نشانه‌ی راه انداز در این اختلال‌ها می‌باشد و همچنین تداوم و پیشرفت آنها را پیش‌بینی می‌کنند (توپر و همکاران، ۲۰۱۰).

بر این اساس در این پژوهش سعی بر آن شد تا برخی همبسته‌های نگرانی بر پایه پژوهش‌های پیشین در یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گیرد تا سهم هر یک در پیش‌بینی نگرانی مشخص شود.

روش

طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود و به روش تحلیل رگرسیون انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ بود. با توجه به حجم جامعه و نرخ ریزش، طبق جدول کرجسی و مورگان^۱ (۱۹۷۰)، نمونه ۳۵۰ نفر به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابتدا توضیحی مختصر جهت هدف پژوهش به دانشجویان داده شد و در صورت بروز مشکل در پاسخ دادن به پرسشنامه‌ها، توضیحات تکمیلی به شرکت کنندگان داده و پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، هر یک از آنها وارسی شدند و پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص، تعداد ۳۴۳ پرسشنامه وارد برنامه تحلیل آماری SPSS شد. همچنین تمام ملاحظات اخلاقی اعم از جلب رضایت شرکت کنندگان و محرمانه ماندن اطلاعات، توسط پژوهشگران رعایت شد.

1. Topper, Emmelkamp & Ehring
2. Krejcie & Morgan

و همکاران (۲۰۱۳)، توسط آلفای کرونباخ $\alpha=0.93$ و همبستگی درونی آیتم ها $r=0.42$ گزارش شده است.

۴- پرسشنامه آمیختگی فکر^۳ (TFI): این پرسشنامه یک آزمون خود سنجی 16 گویه ای است که باورهای رایج را در زمینه های معنی و توانمندی افکار می سنجد. TFI سه مقوله ای آمیختگی افکار را که در الگوی فراشناختی معرفی شده اند را می سنجد. این 3 عامل عبارتند از: ۱- آمیختگی فکر- عمل (TAF)، ۲- آمیختگی فکر- شئ (TOF) و ۳- آمیختگی فکر- رویداد (TEF). پاسخ ها بر یک پیوستار 100 درجه ای (از صفر، ابداً اعتقادی ندارم تا 100 ، کاملاً معتقدم) و به صورت ده تایی نمره گذاری می شوند. ولز، ویلیام و کاترایت- هاتون^۴ (۲۰۰۱) ضریب همسانی درونی مناسبی را برای این آزمون گزارش کرده است (آلفای کرونباخ، $\alpha=0.89$) و همبستگی کل ماده ها در دامنه ای از $0/35$ تا $0/78$ گزارش شده است. مایرز، فیشر^۵ و ولز ضریب پایایی این آزمون را به روش بازآزمایی، $0/69$ گزارش نموده اند (۲۰۰۷).

یافته ها

بر اساس یافته های جمعیت شناختی، تعداد مردان و زنان شرکت کننده در پژوهش حاضر به ترتیب 70 و 273 نفر و میانگین و انحراف سنی شرکت کننده ها به ترتیب، $20/25$ و $1/75$ می باشد. همچنین $92/7$ درصد از شرکت کننده ها، مجرد و $7/3$ درصد از آن ها متاهل بودند. همچنین آماره های توصیفی (حداقل و حداکثر نمرات، میانگین و انحراف معیار) مربوط به هر یک از متغیرهای نگرانی، افکار منفی تکرار شونده، آمیختگی فکر و دشواری در تنظیم هیجان به تفکیک خرده مقیاس در جدول 1 نشان داده شده است.

3. Thought fusion instrument

4. Wells, Gwilliam & Cartwright-Hatton

5. Myers & Fisher

گزارش کرده اند و داده های حاصل از همبستگی این مقیاس با مقیاس هیجان خواهی زاکرمن نیز اعتبار همگرای مقیاس را تایید کرده است ($r=0.26$ و $p<0.043$). در پژوهش مظلوم و یعقوبی (۱۳۹۵)، نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس $0/85$ و برای خرده مقیاس ها در دامنه $0/62$ تا $0/75$ به دست آمد.

۳- پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا^۶ (PSWQ): این پرسشنامه توسط مییر و همکاران^۷ در سال 1990 ساخته شده است و دارای 16 گویه می باشد. مقیاس پاسخگویی به سؤالات لیکرت پنج درجه ای است، به هر سؤال نمره 1 به گزینه (اصلاً صدق نمی کند) تا نمره 5 به گزینه (بسیار صدق می کند)، تعلق می گیرد. پنج سؤال آن دارای بار منفی است و معکوس نمره گذاری می شوند (ماده های 1 ، 3 ، 8 ، 10 و 11). خصوصیات روان سنجی پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا در 436 بیمار مضطرب و 32 فرد سالم به عنوان گروه کنترل بررسی شده است (سلطان محمدلو، غرابی و فتحعلی لواسانی، ۱۳۹۲). نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که PSWQ یک ساختار تک بعدی را می سنجد. روایی درونی این پرسشنامه بر اساس تحلیلی که طی آن افراد GAD از افراد با سایر اختلال های اضطرابی مجزا شد، مناسب تشخیص داده شد و به منظور بررسی روایی همگرایی PSWQ، همبستگی نمرات این پرسشنامه با نمرات اضطراب صفت پرسشنامه اضطراب اشپلبرگر و نمرات افسردگی بک محاسبه شد و همبستگی معناداری بین نمره کل پرسشنامه و نمره اضطراب صفت ($r=0.68$ ، $p<0.01$) و پرسشنامه افسردگی بک ($r=0.43$ ، $p<0.01$) به دست آمد. همچنین روایی و پایایی این مقیاس در نمونه های ایرانی در مطالعه های کمالی

1. Pennsylvania State Worry Questionnaire

2. Meyer, Miller & Metzger

هیجانی ($r=0.55$ و $p<0.01$) و عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی ($r=0.36$ و $p<0.01$) رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. با این وجود بین افکار منفی تکرارشونده و آمیختگی فکر و خرد مقياس‌هایش رابطه‌ای یافت نشد. همچنین بر اساس یافته‌های به دست آمده، بین نمره کل دشواری در تنظیم هیجان با آمیختگی فکر-عمل ($r=0.31$ و $p<0.01$)، آمیختگی فکر-رویداد ($r=0.19$ و $p<0.01$) و آمیختگی فکر-شیع ($r=0.13$ و $p<0.05$) رابطه معنادار یافت شد.

در راستای تعیین میزان قدرت پیش‌بینی کنندگی هر یک از متغیرهای دشواری در تنظیم هیجانی، آمیختگی فکر-عمل و افکار منفی تکرارشونده برای نگرانی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. در گام نخست متغیر دشواری در تنظیم هیجانی وارد مدل رگرسیون شد و نتایج نشان داد که اثر این متغیر بر نگرانی مثبت و معنادار است و به تنهایی ۲۵ درصد از واریانس نگرانی را پیش‌بینی می‌کند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی، $F=81/13$ می‌باشد که در سطح 0.001 معنادار است. در گام دوم افکار منفی و دشواری در تنظیم هیجانی وارد تحلیل شدند و نتایج نشان داد که متغیرهای مذکور قادر به پیش‌بینی متغیر نگرانی بوده و سهم آنها در تبیین این سازه، 31 درصد بود و آزمون معناداری F نیز برای آنها در سطح 0.001 ، ضریب همبستگی $F=11/77$ را نشان داد. متغیر آمیختگی فکر-عمل به دلیل آنکه سهم معناداری از متغیر ملاک را پیش‌بینی نمی‌کرد، از مدل رگرسیون حذف شد.

به منظور بررسی رابطه بین دشواری در تنظیم هیجانی، افکار منفی تکرارشونده و آمیختگی فکر-عمل با نگرانی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همانگونه که جدول ۳ نشان می‌دهد بین نگرانی و دشواری در تنظیم هیجانی در سطح 0.01 درصد رابطه معنادار وجود دارد ($r=0.50$). همچنین بین نگرانی و افکار منفی در سطح 0.01 درصد رابطه معنادار وجود دارد ($r=0.46$). رابطه بین نگرانی و آمیختگی فکر در سطح 0.01 درصد نیز معنادار است ($r=0.14$). از بین خرد مقياس‌های دشواری در تنظیم هیجانی مؤلفه‌های فقدان شفافیت هیجانی، دشواری در دست‌یابی به رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی و از بین خرد مقياس‌های آمیختگی فکر-عمل و فکر-رویداد با مؤلفه‌های آمیختگی فکر-عمل و فکر-رویداد با نگرانی رابطه مثبت و معنادار دارند ($r=0.01$ و $p<0.01$) که در بین این خرد مقياس‌ها کمترین همبستگی مربوط به آمیختگی فکر-رویداد ($r=0.14$ و $p<0.01$) و بالاترین میزان همبستگی مربوط به خرد مقياس $r=0.47$ دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی ($r=0.01$ و $p<0.01$) بود. همبستگی بین نمره کل دشواری در تنظیم هیجان، نمره کل آمیختگی فکر و افکار منفی تکرارشونده نیز مثبت و معنادار به دست آمد ($r=0.01$ و $p<0.01$). همچنین بین افکار منفی تکرارشونده با مؤلفه‌های فقدان شفافیت هیجانی ($r=0.24$ و $p<0.01$ و $r=0.24$ و $p<0.01$)، دشواری در دست‌یابی به رفتار هدفمند ($r=0.49$ و $p<0.01$ و $r=0.42$ و $p<0.01$)، دشواری در کنترل تکانه ($r=0.01$ و $p<0.01$)، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم

جدول ۱: آماره‌های توصیفی متغیرها به تفکیک خرد ۵ مقیاس

متغير	حدائق نمرات	حداکثر نمرات	ميانگين	انحراف معيار
فقدان آگاهی هیجانی	۶	۲۶	۱۵/۱۴	۳/۹۴
فقدان شفافیت هیجانی	۵	۲۴	۱۰/۲۴	۳/۵۱
دشواری در رفتار هدفمند	۴	۲۰	۱۱/۲۵	۳/۴۵
دشواری در کنترل تکانه	۶	۲۹	۱۴/۷۳	۵/۰۲
دسترسی محدود به راهبردها	۸	۳۹	۱۹/۳۷	۶/۰۵
عدم پذیرش هیجانی	۶	۳۰	۱۳/۴۴	۵/۳۱
دشواری در تنظیم هیجانی (کل)	۴۱	۱۴۰	۸۴/۴۱	۱۹/۲۲
آمیختگی فکر-عمل	۰	۵۳	۱۵/۶۱	۱۰/۹۷
آمیختگی فکر-رویداد	۰	۴۵	۲۱/۷۲	۱۰/۲۷
آمیختگی فکر-شیء	۰	۳۰	۱۳/۹۳	۷/۵۵
آمیختگی فکر (کل)	۰	۱۱۳	۵۱/۲۷	۲۴/۶۱
افکار منفی تکرار شونده	۴۰	۱۴۷	۸۴/۸۸	۲۲/۲۵
نگرانی	۲۱	۸۰	۴۵/۳۷	۹/۹۴

جدول ۲: نتایج ماتریس همسنگی، بین متغیرهای بیو-وهش، به تفکیک خرد ۵۵ مقیاس

متغیر	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱- نگرانی													۱
۲- فقدان آگاهی هیجانی												۰/۰۳	۱
۳- فقدان شفافیت هیجانی										۰/۲۷**	۰/۴۷**	۱	
۴- دشواری رفتار هدفمند									۰/۲۵**	-۰/۰۰۱	۰/۴۷**		۱
۵- دشواری کنترل تکانه								۰/۶۹**	۰/۳۳**	۰/۱۳*	۰/۴۱**		
۶- راهبردهای محدود							۰/۶۲**	۰/۶۶**	۰/۳۶**	۰/۰۳	۰/۴۷**		
۷- عدم پذیرش هیجانی						۰/۵۷**	۰/۴۹**	۰/۴۸**	۰/۳۲**	۰/۰۵	۰/۲۸**		
۸- دشواری در تنظیم هیجانی (کل)					۰/۷۴**	۰/۸۷**	۰/۸۱**	۰/۷۵**	۰/۶۱**	۰/۳۵**	۰/۵۰**		
۹- آمیختگی فکر عمل				۰/۳۱**	۰/۲۴**	۰/۲۴**	۰/۲۶**	۰/۲۰**	۰/۲۴**	۰/۱۳*	۰/۱۶**		
۱۰- آمیختگی فکر اردویاد			۰/۶۵**	۰/۱۹**	۰/۲۲**	۰/۱۷**	۰/۱۵**	۰/۱۵**	۰/۰۳	۰/۰۱	۰/۱۴**		
۱۱- آمیختگی فکر اشیاء		۰/۶۳**	۰/۴۶**	۰/۱۳*	۰/۱۹**	۰/۱۱*	۰/۱۷**	۰/۱۵**	-۰/۰۷	-۰/۰۸	۰/۰۴		
۱۲- آمیختگی فکر (کل)	۰/۷۸**	۰/۹۰**	۰/۸۶**	۰/۲۶**	۰/۲۶**	۰/۲۱**	۰/۲۳**	۰/۲۰**	۰/۱۰*	۰/۰۳	۰/۱۴**		

* : همسنگ معنادار در سطح ۰/۰۵ درصد

حدوا، ۳: نتایج، گرسیون گام به گام داد، پیش بینی نگرانی

t	β	B	F	R ²	R	مدل
10/668***	0/500	0/259	113/81***	0/250	0/500	(دشواری در تنظیم هیجانی)
6/846***	0/356	0/184	77/11***	0/312	0/559	(دشواری در تنظیم هیجانی)
5/525***	0/287	0/128				(افکار منفی تکرار شونده)

***: همستانگ، معنادار در سطح ۱۰۰/۰ درصد

اتخاذ نمی‌کنند و این موضوع به ادامه یافتن روند نگرانی آنها کمک می‌کند.

یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین نگرانی و افکار منفی تکرارشونده رابطه معناداری وجود دارد. همانطور که در کتب گوناگون و ادبیات پژوهشی مشاهده می‌شود، نگرانی خود از انواع افکار منفی تکرارشونده می‌باشد (توپر و همکاران، ۲۰۱۰؛ ۲۰۱۴؛ دروست و همکاران^{۳۸}، ۲۰۱۴). بنابراین معناداری بین این دو متغیر همسو با ادبیات پژوهشی پیشین است.

آمیختگی فکر- عمل نیز که یک خطای شناختی است، اغلب همراه اختلال وسوس اجباری (OCD) بررسی شده است. به هر حال شواهدی وجود دارد که نشان دهنده این است که این خطا در سایر اختلال‌ها نیز حضور دارد، برای نمونه تامپسون-هولنلز^{۳۹} و همکاران (۲۰۱۳)، در پژوهش خود نشان دادند برخلاف انتظار، تمامی تشخیص‌های اختلال اضطراب فراگیر یک پیش‌بین قوی برای آمیختگی فکر- عمل بود. همچنین در پژوهشی دیگر نتایج نشان داده شد که بیماران GAD و OCD از نظر باور آمیختگی فکر- عمل و نگرانی متفاوت از گروه کنترل بودند. همچنین با مطالعه خان خانی زاده و همکاران (۲۰۱۴)، بر روی گروه‌های GAD و OCD، مشخص شد که این گروه‌ها در مقیاس آمیختگی فکر، فقط در زیر مقیاس فکر- شیء (TOF) متفاوت بودند. با این وجود همانطور که بیان گردید آمیختگی فکر در این پژوهش نتوانست سهم قابل توجهی در پیش‌بینی نگرانی داشته باشد. این نتیجه برخلاف نتایج پژوهش‌های پیشین بود (برای نمونه: غفاری و رضایی، ۱۳۹۲). از علل این تناقض می‌توان به این موضوع اشاره کرد که رابطه‌ی آمیختگی

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی نگرانی از طریق متغیرهای آمیختگی فکر-عمل، افکار منفی تکرارشونده و بی‌نظمی هیجانی بود. از آنجایی که در کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانشناختی (DSM)، نگرانی به عنوان نشانه‌ی اصلی اختلال اضطراب فراگیر معروف شده است لذا بیشتر در بطن این اختلال مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین بیشتر مدل‌ها و ادبیات پژوهشی در برگیرنده‌ی اختلال اضطراب فراگیر می‌باشند. البته این پژوهش سعی بر آن داشت که پژوهش‌ها و مدل‌هایی که اخیراً و منحصراً در ارتباط با نگرانی مطرح شده‌اند را مورد توجه قرار دهد و این متغیر مهم روانشناختی را که امروزه در اکثر اختلال‌های اضطرابی حضور دارد را مورد پیش-بینی قرار دهد. هم‌اکنون نتایج این پژوهش همسو با پژوهش‌های پیشین، بین نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان رابطه معنادار یافت شد (مک لافلین، منین و فاراج، ۲۰۰۷؛ تورتلا-فلیو، بل و سیس^{۳۶}؛ ۲۰۱۰، سالترز، رومرو تل^{۳۷}، ۲۰۰۶؛ منین و همکاران ۲۰۰۹)، نیز در پژوهش خود علاوه بر تایید وجود رابطه بین این دو متغیر، دریافتند که از بین زیرمقیاس‌های تنظیم هیجانی، عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی بهترین پیش-بین برای اختلال اضطراب فراگیر بود که در این پژوهش نیز ضریب همبستگی خوبی با نگرانی داشت ($r=0.38$)، البته همانطور که ذکر گردید خرده مقیاس دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی همبستگی بالاتری را با نگرانی کسب کرد که نشان دهنده این موضوع می‌باشد که افراد نگران برای مدیریت هیجان-های خود از جمله نگران بودن، راهبردهای مناسبی را

1. Drost
2. Thompson-Holands et al.

1 Farach
2 Tortella-Feliu, Balle & Sese
3 Salters, Roemer & Tull

در پایان، همانطور که نتایج نشان داد، بی‌نظمی هیجانی و افکار منفی تکرارشونده توانستند نگرانی را پیش‌بینی کنند، لذا این پژوهش می‌تواند گامی در جهت شناسایی هرچه بیشتر ماهیت نگرانی بر دارد.

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‌ها علاوه بر داشتن نتایج سودبخشی که می‌تواند در جهت تایید مفروضه‌های روانشناسی باشد، در نوع خود نیز دارای محدودیت‌هایی می‌باشد؛ از جمله محدود بودن نمونه مورد پژوهش که تنها در جمعیت دانشجویی یک دانشگاه اجرا شد و روش نمونه برداری که به روش در دسترس انجام گرفت. همچنین یافته‌های پژوهش به صورت طرح توصیفی و همبستگی بررسی شده است که استنباط علی از آنها امکان پذیر نیست و پیش‌بینی-کننده‌ها در بهترین حالت همبسته‌های نگرانی هستند.

تشکر و قدردانی

از تمامی دانشجویان که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، سپاسگزاری می‌کنیم.

References

- Association of Psychiatry , DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [5th end]. (2013). Washington, DC.
- Akbari, M., Roshan, R., Shabani, A. & Zarghami F. (2014). The Role of Cognitive, Behavioral, Emotional and Metacognitive Factors in Predicting Repetitive Negative Thinking: A Transdiagnostic Approach. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, (20), 3: 233-242.
- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S. & Schweizer, S. (2011). Emotion-regulation strategies across Psycho pathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, No 30: 217–237.
- Asadi, S., Abedini, M., Poursharifi, H. & Nikokar, M. (2013). The Relationship between Intolerance of Uncertainty and
- فکر با نگرانی می‌تواند تحت تأثیر ارتباطِ سایر متغیرهای پیش‌بین با آمیختگی فکر باشد که بر واریانس این متغیر نیز اثر گذاشته است، چرا که در این پژوهش، متغیرها همزمان وارد تحلیل شدند و این همزمانی می-تواند واریانس مشترک عوامل پیش‌بین را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که برای بررسی‌های بیشتر، پژوهش‌هایی در آینده به این مورد اختصاص داده شود.
- به طور کلی افراد مضطرب و نگران به صورت مداوم و در زندگی روزمره خود افکار منفی در مورد آینده دارند که به صورت خارج از اراده فرد تجربه می‌شوند و این افکار به توبه خود پیامدهای رفتاری و هیجانی نامطلوبی ایجاد می‌کنند که این افراد در مواجه با هیجان‌های خود واکنش‌های نامناسب داشته و قادر به مدیریت آنها نمی‌باشند و پیامدهای رفتاری آن نیز متناسب با میزان آمیختگی فکر و عمل فرد، برای وی مشکلات متعدد به وجود می‌آورد و این چرخه معیوب در فرد ادامه پیدا می‌کند.
- Rumination with Worry on Student Population. Journal of Clinical Psychology, 4 (16):83-91.
- Askari, P., Pasha, G.H. & Aminian M. (2010). Relationship between emotion regulation, mental stresses and body image with eating disorders of women. Journal of Clinical Psychology, Andishe Va Raftar, 13:65-78.
- Berle, D. & Starcevic, V. (2005). Thought-action fusion: review of the literature and future directions. Clin Psychol Rev; 25(3): 263-84
- Borkovec, T. D. (1985). Worry: A potentially content. Behavior Research and Therapy, 481-482.
- Davey, G. C. L. & Wells, A. (2006). Worry and its Psychological Disorders: Theory, Assessment and Treatment, Michigan: John Wiley & Sons, 3-80.

- Drost, J., Does, W. & Hemert, A. M. (2014). Repetitive negative thinking as a transdiagnostic factor in depression and anxiety: A conceptual replication. *Behav Res Ther.* 177-183.
- Ghaffari, M. & Rezaei, A. (2014). Investigating the relation of cognitive emotion regulation strategies and thought-action fusion with the rate of worry in students. *J Rafsanjan Univ Med Sci.* 12(12): 975-990.
- Gratz, K.L. & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *J Psychopathol Behav.* 26:41-54.
- Golestaneh, A. & Sarvghad, S. (2013). The Mediating Role of Worry on the Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Depression and Anxiety. *Developmental Psychology: Iranian Psychologists.* No 35:259-269.
- Hazlett-steven, H., Zucker, B. G. & Craske, M. G. (2002). The relationship of thought- action fusion to pathological worry and generalized anxiety disorder. *Behave Res Ther.* 40(10): 1199-204.
- Halgin, P. R. & Whitbourne, S. K. (2003). *Abnormal Psychology: clinical perspectives on psychological disorders* (4th). McGraw-Hill College.
- Kamali, S., Gharraee, B. & Birashk B. (2013). The role of emotional schema in prediction of pathological worry in Iranian students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* 84(0): 994-998.
- Khaleghi, S., Liaghat, R. & Ganjdanesh Y. (2011). The Repetitive Thinking Questionnaire: Psychometric properties in Iranian Students and Relationship with depression, Anxiety and Social Anxiety. 2nd International Conference on Psychiatry and Psychotherapy-PSYCHO. University of Cambridge, Cambridge, UK.
- Khankhani Zadeh, H., Bahari, H. & Rezaei, E. (2014). Comparing of Thought-Action Fusion (TAF) and Worry between Patients with GAD, OCD diagnosis and Normal group. *Journal of Applied Science and Agriculture,* 9(6), Pages: 2649-2653.
- Keratz, S. J. & Woodruff- Borden, J. (2011).The Developmental Psychopathology of Worry. *Clinical Child and Family Psychological Review.* 14, (2), 174-197.
- Leahy, R.L., Tirch, D. & Napolitano, L.A. *Emotion regulation in psychotherapy.* (2011). New York: The Guilford Press.
- Mahoney, A.E.J., McEvoy, P.M. & Moulds, M.L. (2012). Psychometric properties of the Repetitive Thinking Questionnaire in a clinical sample. *Journal of Anxiety Disorders.* (26): 359– 367.
- Mazloom, M. & Yaghubi H. (2017). Role of emotion regulation and thought control in prediction of post-traumatic stress disorder. *Journal of Clinical Psychology.* 4 (32).
- Meyer, T.J., Miller, M.L., Metzger, R.L. & Borkovec TD. (1990). Development and validation of the penn state worry questionnaire. *Behaviour Research and Therapy.* 28:487-945.
- Mennin, D. S., McLaughlin, K. A. & Flanagan, T. J. (2009). Emotion regulation deficits in generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, and their co-occurrence. *Journal of Anxiety Disorders.* 23; 866– 871.
- McLaughlin, K. A., Mennin, D. S. & Farach, F. J. (2007). The contributory role of worry in emotion generation and dysregulation in generalized anxiety disorder. *Behaviour Research and Therapy.* 45; 1735–1752
- McEvoy, P. M., Moulds, M. L. & Mahoney, A. E. J. (2013). Mechanisms driving pre- and post-stressor repetitive negative thinking: Metacognitions, cognitive avoidance, and thought

- control. Behav. Ther. & Exp. Psychiat. (44), 84-93.
- McEvoy, P.M., Mahoney, A.E.J. & Moulds, M.L. (2010). Are worry, rumination, and post-event processing one and the same? Development of the repetitive thinking questionnaire. Journal of Anxiety Disorders. 24 (5):509-19.
- Muris, P., Meesters, C., Rassin, E., Merckelbach, H. & Campbell, J. (2001). Thought-action fusion and anxiety disorders symptoms in normal adolescents. Behav Res Ther; 39: 843-52.
- Myers, S., Fisher, P.L. & Wells A. (2007). The meta-cognitive model of obsessional-compulsive symptoms: an empirical model. Barcelona: World Congress of Cognitive and Behavior Therapy.
- Newman, M.G. & Llera, S.J. (2011). A novel theory of experiential avoidance in generalized anxiety disorder: A review and synthesis of research supporting a contrast avoidance model of worry. Clinical Psychology Review. 371–382.
- Nikbakht Nasrabadi, A., Mazloom, R., Nesari, M. & Goodarzi, F. (2009). Relation between worry domains and health related quality of life in students. Payesh. 1(29):85-92.
- Pourmohseni, F. (2009). The impact of rumination and worry on sleep disturbance. Scientific-Research Journal of Shahed University. No 108:1-12.
- Shafran, R., Thordarson, D.S., & Rachman, S. (1996). Thought action fusion in obsessive compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders, 10, 379-391.
- Salter-Pedneault, K., Roemer, L., Tull, MT., Mennin, D. S., & Rucker, L. (2006). Evidence of broad deficits in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy Research, 30 (4), 469-480.
- Soltan Mohammadlou, S., Gharraee, B., Fathali lavasani, F. & Gohari, MR. (2014). The relationship of behavioral activation and inhibition systems (BAS/BIS), difficulty of emotional regulation, metacognition with worry. Researches of Cognitive and Behavioral Science. 2(5):85-100.
- Stapinski, L.A., Abbott, M.J. & Rapee, R.M. (2010). Fear and perceived uncontrollability of emotion: Evaluating the unique contribution of emotion appraisal variables to prediction of worry and generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy. No 48:1097-1104.
- Thompson-Hollands, J., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2013). Thought-action fusion across anxiety disorder diagnoses: Specificity and treatment effects. J Nerv Ment Dis. (5): 407–413.
- Tortella-Feliu, M., Balle, M., & Sesé, A. (2010). Relationships between negative affectivity, emotion regulation, anxiety, and depressive symptoms in adolescents as examined through structural equation modeling. Journal of Anxiety Disorders. (24) 686–693.
- Topper, M., Emmelkamp, P. M. G., & Ehring, T. (2012). Improving Prevention of Depression and Anxiety Disorders: Repetitive Negative Thinking as a Promising Target. Applied and Preventive Psychology.
- Topper, M., Molenaar, D., Emmelkamp, P. M. G., & Ehring, T. (2014). Are Rumination and Worry Two Sides of the Same Coin? A Structural Equation Modelling Approach. Journal of Experimental Psychopathology. 3: 363-381.
- Wells, A., Gwilliam, P. & Cartwright-Hatton S. (2001). The thought fusion instrument. Manchester: University of Manchester.