

اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در برابر استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا

مرتضی ترخان^{*}، مجید صفاری‌نیا^{**}، پروانه خوش‌سیما^{***}

^{*} استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول^۱)

^{*} استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

^{**} کارشناس ارشد روان‌شناسی

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی مصون‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا انجام شد.

فصلنامه علمی تیزوهشی / شماره ۱ - بهار ۱۳۹۱
Health Psychology/Voll. No1 / Spring 2012

۴۶

مشخصات مقاله:

تاریخچه:

دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵

تجدیدنظر: ۱۳۹۱/۳/۱۰

پذیرش: ۱۳۹۱/۳/۲۸

کلیدواژه‌ها:

کیفیت زندگی، مصون‌سازی در مقابل استرس، فشار خون سیستولیک، دیاستولیک.

روش: نخست ۳۰ نفر از زنانی که کیفیت زندگی پایین و فشار خون سیستولیک بالای ۱۳۰ و دیاستولیک بالای ۹۰ داشتند، به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین گردیدند (هر گروه ۱۵ نفر). گروه آزمایشی ۱۰ جلسه فنون SIT را آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. پس از آموزش، مجدداً کیفیت زندگی و فشار خون هر دو گروه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

یافته‌ها: F بدست آمده در فشار خون سیستولیک (۳/۰۹) و در فشار خون دیاستولیک (۳/۱۷) و

t بدست آمده در کیفیت زندگی (۳/۳۰) در سطح $P \leq 0.05$ معنادار می‌باشد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که با آموزش SIT می‌توان موجبات کاهش فشار خون بالا و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به فشار خون را فراهم ساخت.

Mttmaster20@yahoo.com

۱. نشانی نویسنده مسئول.

Effectiveness of Group Stress Inoculation Training on the Systolic and Diastolic Blood Pressure and Life Quality of Hypertension in women

M. Tarkhan*, M. Safarinia**, P. Khosh Sima***

* Assistant professor of psychology, Payam Noor University, Iran.

** Assistant professor of psychology, Payam Noor University, Iran.

*** M. A. psychology.

Abstract:

Aim. The purpose of the present research was to study effectiveness of group stress inoculation training (SIT) on the systolic and diastolic blood pressure and life quality in the women involved blood pressure.

Method: The method of research was semi experimental and with design is pretest- post test by control group. For sampling, by using of life quality questionnaire and manometer, 30 women that had low life quality and 130 above systolic and 90 above diastolic blood pressure were chosen on simple random basic and were divided on voluntarily experimental and control groups. Experiment group received 10 sessions of SIT techniques and control group did not receive any training. After receiving of training, life quality and blood pressure were measured for next time.

Results: Results showed systolic blood pressure (3.09) diastolic blood pressure (3.17) life quality (3.30) $P \leq 0.05$ revealed significant effect. Present investigation clarified importance SIT method on the decreasing systolic, diastolic blood pressure and increasing life quality of women.

Conclusion: This investigation showed with SIT training can cause decreasing of above blood pressure and increasing life quality of women

Article Information:

History:

Receipt: 2012/3/5

Revise: 2012/5/30

Acceptance: 2012/6/17

Key words:

Stress Inoculation Training,
Systolic, Diastolic Blood
Pressure, Life Quality

مقدمه

جیوه و سیستولی برابر یا بالاتر از ۱۳۰ میلی‌متر جیوه باشد به عنوان فشار خون سیستمیک شناخته می‌شود (آندرسون^۷، لن^۸، مورنیکا^۹، ۲۰۰۷). فشار خون را معمولاً به دو نوع تقسیم می‌کنند، فشار خون اساسی یا اولیه^{۱۰} و فشار خون ثانویه^{۱۱}. فشار خون اولیه به فشار خونی گفته می‌شود که علت عضوی قابل تشخیصی ندارد و معمولاً از ترکیب عوامل فیزیولوژیکی و روانی به وجود می‌آید. اما فشار خون ثانویه نسبت به فشار خون اولیه کمتر شایع است و عموماً ریشه در برخی از اختلالات سیستم درون‌ریز بدن دارد. در ایجاد فشار خون بالا، عوامل ژنتیکی، محیطی، روانی و اجتماعی نقش بسزایی دارند. عوامل ژنتیکی مانند سابقه خانوادگی و عوامل محیطی مانند مصرف نمک، چاقی، مصرف الکل (ال^{۱۱}، موستاردی^{۱۲}، ۲۰۰۵). عوامل روانی مانند شخصیت، سبک مقابله با استرس، اعتماد به نفس، خشم فروبرده شده، تیپ شخصیتی و عوامل اجتماعی مانند شغل، میزان درآمد، وضعیت تأهل، تنها بی و انزوای اجتماعی مؤثر هستند (دریسلر^{۱۴}، استنتوس^{۱۵}، ویتری^{۱۶}، ۲۰۰۷). اما یکی از عواملی که به تنها بی و یا در ترکیبی با عوامل دیگر نقش اساسی در فشار خون بالا دارد، استرس است. در هنگام استرس و موقعیت‌های تهدیدکننده، رگ‌های اندام‌های احساسی منقبض می‌شوند. وقتی این رگ‌ها منقبض می‌شوند، فشار به قدری زیاد است که اجازه

یکی از جدی‌ترین اختلالات روانی فیزیولوژیکی^۱ و مهم‌ترین عوامل خطرزا برای بیماری قلبی-عروقی فشار خون بالا^۲ است (بریزنیتز^۳، ۲۰۰۵). فشار خون بالا افراد را به تصلب شرائین، حملات قلبی و سکته مستعد می‌سازد و به سبب نارسایی کلیوی که ایجاد می‌کند، باعث مرگ انسان‌ها می‌شود (گایتون، ۱۹۹۸). به همین خاطر در ادبیات پژوهشی به آن قاتل خاموش گفته می‌شود (هاریسون، ۲۰۰۸ به نقل از خدایی، زین‌ساز بروجردی، ۱۳۸۸). فشارخون از نظر همودینامیک عبارت است از نیرویی که خون بر دیواره رگ‌هایی که در آن جریان دارد، وارد می‌کند (دیمیتو، ۲۰۰۴) و براساس دو شاخص مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. یکی از این شاخص‌ها، نشان‌دهنده فشار خون ابساطی (دیاستولیک)^۴ است و دیگری نشان‌دهنده فشارخون انقباضی (سیستولیک)^۵ می‌باشد. شاخص سیستولیک عبارت است مقدار فشار وریدی در هنگامی که بطن‌ها منقبض می‌شوند و قلب مشغول پمپاژ است. شاخص دیاستولیک نشان‌دهنده درجه فشار وریدی در زمانی است که بطن‌ها در حالت آرمیدگی قرار دارند و قلب در حالت استراحت می‌باشد (دیوسیون و گرینگ، ۲۰۰۴، به نقل از دهستانی، ۱۳۸۳). فشار خون طبیعی برای فشارخون سیستولیک، پایین‌تر از ۱۲۰ میلی‌متر جیوه است و برای فشارخون دیاستولیک پایین‌تر از ۸۰ میلی‌متر جیوه است. اما چنانچه فشارخون دیاستولیک بالاتر از ۹۰ میلی‌متر

7. Aderson

8. Lan

9. Muranaka

10. Primary or essential blood pressure

11. Secondary blood pressure

12. Ely

13. Mostardi

14. Dresseler

15. Stantos

16. Viteri

1. Psycho physiological disorders

2. High Blood Pressure

3. Breznitz

4. Dimattew

5. Systolic

6. Diastolic

۲۰۰۷) وقتی افراد دچار بیماری مزمن می‌شوند، علائم بیماری، پیش‌آگهی و درمان آن می‌توانند کیفیت زندگی را شدیداً تحت تأثیر قرار دهنند. متخصصان بر این باورند که کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون، پایین است، به همین جهت این محققان بر نقش مداخله‌های روان‌شناسی به منظور کاهش علائم بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران تأکید دارند (هیلز، ۲۰۰۳، نقل از تیلور، ۲۰۰۵).

در درمان فشار خون بالا از روش‌های دارویی و غیردارویی استفاده می‌شود. در درمان دارویی از دو دسته داروها به نام دیورتیکها و بتابلوکرها استفاده می‌شود. از آنجا که این داروها، دارای عوارض جانبی مانند کاهش پتاسیم، افزایش گلوكز سدیم و افزایش اوره می‌باشند (ثمنی، ۱۳۸۱) از درمان غیردارویی و یا مداخله‌های روان‌شناسی مانند اصلاح سبک زندگی، رژیم غذایی، درمان شناختی - رفتاری، بازخورد زیستی، یوگا، مدیتیشن و آموزش مصونسازی در مقابل استرس^{۲۴} استفاده می‌شود. روش آموزش مصونسازی در مقابل استرس (SIT) توسط مایکن^{۲۵} در سال ۱۹۷۷ جهت تجهیز افراد به مهارت‌های مقابله با استرس ابداع گردید و به روش خود-آموزی^{۲۶} معروف شده است (کلمن، ۲۰۰۵) در این روش، هم بر مؤلفه‌های شناختی و هم بر مؤلفه‌های رفتاری تأکید می‌شود و هدف از آموزش این روش، آموزش مهارت‌ها به بیماران برای رویارویی با مشکلات خود می‌باشد. به دیگر سخن در این روش از

عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهند، در این حالت نمض سریع می‌زند و فشار خون بالا می‌رود. وقتی استرس خاتمه می‌یابد، قلب دوباره عملکرد طبیعی خود را به دست می‌آورد و فشار خون به حالت طبیعی بر می‌گردد (لازاروس^{۱۷} و فلکمن^{۱۸}، ۱۹۹۹). اما وقتی که موقعیت‌های تهدیدکننده پایدار می‌ماند و فرد تحت استرس‌های مداوم قرار می‌گیرد و از سبک دفاعی نامناسب مثل خشم فرو برده استفاده می‌کند، فشار خون بالا ممکن است حالت مزمنی پیدا کند و به شکل بیماری متجلى گردد (فلکمن، لازاروس، ۲۰۰۱). به عبارت دیگر افرادی که از سنتیز درونی و بن‌بست روانشناسی برخوردارند و قدرت ابراز وجود و تخلیه هیجان‌های منفی خود را ندارند، و در برابر موقعیت‌های تهدیدکننده زندگی از مکانیزم‌های اجتناب و تسليم برخوردارند، بیشتر در معرض فشار خون بالا قرار دارند (فیشر، ۲۰۱۰). از جمله متغیرهای دیگری که رابطه مقابله با فشار خون دارد، کیفیت زندگی^{۱۹} است. کیفیت زندگی به عنوان قضایت شناختی آگاهانه راجع به رضایت فرد از زندگی تعریف می‌شود (وینبورن، ۲۰۰۰). به دیگر سخن سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را به تصورات افراد از موقعیت خود با توجه به شرایط فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، تعریف کرده است. هرچه این تصورات مثبت‌تر و بهتر باشد، افراد از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند و بر عکس. محققان سطوح شادی و رضایت در ابعاد زندگی را مشخص کننده سطح کیفیت زندگی افراد می‌دانند (کافمن، ۲۱، استرنبرگ، ۲۲،

22. Sternberg

23. Taylor

24. Stress Inoculation Training

25. Meichen Baum

26. Self-instruction training

27. Coleman

17. Lazaruss

18. Folkman

19. Life quality

20. Veenboren

21. Kaufman

راش، ۲۰۰۱ نقل از سو^{۳۴}، سو^{۳۵}، سو^{۳۶}، سو^{۳۷}). در مطالعه دیگری در دانشگاه بربزیل ۱۴۵ بیمار با فشار خون بالا (۱۰۵ زن و ۴۰ مرد در دامنه سنی ۷۰-۴۰) به مدت ۶ ماه با روش SIT مورد درمان قرار گرفتند. فشار خون سیستولیک در هنگام اجرای روش SIT به طور متوسط ۱۷۰ میلی‌متر جیوه بود که در پایان مداخله به ۱۴۲ میلی‌متر جیوه کاهش یافت و فشار خون دیاستولیک از ۹۸/۵ میلی‌متر جیوه به ۸۱/۵ میلی‌متر جیوه کاهش یافت (مایر^{۳۷} و لودنسلگر^{۳۸}، ۲۰۰۸). در تحقیق دیگری اثربخشی درمان‌های غیردارویی از جمله روش SIT در یک دوره ۱۲ هفته‌ای بر روی ۵۳ مرد با فشار خون بالا انجام گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد نه تنها فشار خون افراد به طور معناداری کاهش یافت، بلکه تنفس و بدینه افراد به فشار خون نیز کاهش یافت. به عبارت دیگر این افراد دریافتند که می‌توانند بدون دارو و با روش‌های دیگر، فشار خون خود را کاهش دهند، این باور موجبات کاهش انزواطی، گوشه‌گیری و افزایش اعتماد به نفس و کیفیت زندگی بالای آنها شده است کیمپوس، (۲۰۰۰) نقل از پیکرینگ^{۳۹}، هارش‌فیلد^{۴۰}، ۲۰۰۶). در همگرایی با تحقیق فوق گرین (۲۰۰۹) طی مطالعه‌ای نشان داد، که روش SIT، روش مؤثری در کاهش استرس، افزایش سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان است. همین‌طور در تحقیق دیگری نشان داده شد با روش‌های غیردارویی از جمله اصلاح سبک زندگی، کاهش مصرف نمک، آموزش

فنونی مانند آموزش ابراز وجود، تنفس‌زدایی عضلانی، مهارت حل مسئله، خودگویی‌های مثبت، آرام‌سازی عمیق عضلانی، مهارت‌های خودکنترلی و خود تقویتی و تصویرسازی خوشایند استفاده می‌شود (بویلن^{۲۸}، اسکات^{۲۹}، ۲۰۰۸) روش SIT تاکنون در کنترل، درمان و پیشگیری از انواع مشکلات از جمله خشم، اضطراب، ترس، درد، رفتار نوع A، هراس، فشارهای شغلی، مشکلات جسمانی مانند سرطان، فشار خون بالا و افسردگی در گروه‌های سنی متفاوت و با رسته‌های شغلی متفاوت مانند پرستاران، معلمان، نیروهای نظامی، سربازان، ورزشکاران و بیماران مورد استفاده قرار گرفته است (مایرز و نور، ۲۰۰۱ نقل از یکر^{۳۰} و اسکارتس^{۳۱}، ۲۰۰۵).

از جمله متغیرهایی که اثربخشی SIT در مورد آن مورد بررسی قرار گرفت، فشار خون بالا و کیفیت زندگی در گروه‌های مختلف شغلی است. مثلاً در تحقیقی، اثربخشی تنفس‌زدایی عضلانی که از مهارت‌های SIT می‌باشد، موجبات کاهش فشار خون و اضطراب دانشجویان را فراهم ساخته است (براون^{۳۲} و لوکاس^{۳۳}، ۲۰۰۸). در همین راستا اثربخشی SIT و درمان دارویی بر روی کاهش فشار خون ۵۱ نفر از افراد ۲۰ تا ۵۵ ساله به مدت ۱۰ هفته مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشخص گردید که هر دو روش موجب کاهش فشار خون افراد می‌شود. اما درمان دارویی در مقایسه با روش SIT سریع‌تر موجب کاهش فشار خون افراد شده است (ساندمون و

-
- 34. Sue
 - 35. Sue
 - 36. Sue
 - 37. Maier
 - 38. Laudenslager
 - 39. Pickering
 - 40. Harshfield

- 28. Boylan
- 29. Scott
- 30. Baker
- 31. Scarth
- 32. Brwon
- 33. Lucas

و کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۵ نفر). قبل از اجرای روش SIT در مورد چگونگی شرکت در پژوهش، کسب رضایت آگاهانه و محترمانه بودن اطلاعات مربوط به پرسشنامه به شرکت‌کنندگان توضیحاتی داده شد و سپس گروه آزمایشی به میزان ۱۰ جلسه ۷۵ دقیقه‌ای روش SIT را به صورت گروهی (هفتاهی یک جلسه) توسط روان‌شناسی که در زمینه SIT مهارت کافی داشت، آموزش دیدند و گروه کنترل تنها مراقبت‌های معمول پزشکی را دریافت کردند و روش SIT را آموزش ندیدند. پس از آموزش به کلیه اعضای کنترل و آزمایش پرسشنامه کیفیت زندگی مجددًا داده شد و در ۴ روز متوالی ۴ بار فشار خون هر دو گروه مجددًا مورد اندازه‌گیری قرار گرفت که میانگین این ۴ بار به عنوان فشار خون پس‌آزمون در نظر گرفته شد. ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از: ۱-پرسشنامه کیفیت زندگی؛ ۲- دستگاه فشارسنج؛ ۳- بسته آموزشی روش SIT.

۱- پرسشنامه کیفیت زندگی: توسط سازمان بهداشت جهانی با همکاری ۱۵ مرکز بین‌المللی در سال ۱۹۸۹ ساخته شد. این پرسشنامه ۲۶ سؤال دارد و هر سؤال بر اساس وزن ۰، ۱، ۲، ۳، ۴ نمره‌گذاری می‌شود. این پرسشنامه ۴ خرده مقیاس سلامت روانی، سلامت جسمانی، روابط اجتماعی، محیط زندگی اجتماعی را مورد سنجش قرار می‌دهد. ضریب همبستگی سؤالات و خرده مقیاس‌های این پرسشنامه نشان داد، مقیاس سلامت جسمانی و محیط زندگی اجتماعی بالاترین همبستگی را با نمره کل نشان دادند. حداقل نمره‌ای که افراد از این پرسشنامه می‌گیرند ۱۰۴ نمره می‌باشد. هر چه نمره فرد بالاتر باشد، کیفیت

مهارت حل مسئله و تنش‌زدایی عضلانی می‌توان فشار خون و قند خون را کنترل نمود (Diner^۱، Harshfield، ۲۰۰۲). با توجه به تحقیقات فوق و با توجه به این که هدف اصلی این پژوهش کاهش فشار خون و افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا از طریق روش SIT می‌باشد، لذا این پژوهش درصد آزمون به فرضیه‌های ذیل بوده است:

۱- روش SIT موجب کاهش فشار خون سیستولیک زنان مبتلا به فشار خون بالا می‌شود.

۲- روش SIT موجب کاهش فشار خون دیاستولیک زنان مبتلا به فشار خون بالا می‌شود.

۳- روش SIT موجب افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا می‌شود.

روش

این مطالعه مداخله‌ای به روش نیمه‌آزمایشی و با طرح دو‌گروهی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در بخش قلب بیمارستان دکتر صولتی شهرستان ارومیه انجام شد. از بین زنان بستری در بخش قلب که دارای فشارخون بالا بودند و از داروهای کنترل‌کننده فشار خون استفاده می‌کردند، به ۵۵ نفر پرسشنامه کیفیت زندگی داده شد و در ۴ روز متوالی هر روز یک بار فشار خون آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. تحلیل پرسشنامه‌ها نشان داد که ۳۹ نفر از کیفیت زندگی پایین‌تر از متوسط و از فشارخون سیستولیک حداقل ۱۳۰ و دیاستولیک حداقل ۹۰ برخوردارند (براساس میانگین ۴ بار اندازه‌گیری فشار خون در ۴ روز متوالی) که در وهله نهایی از بین آنها، ۳۰ نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و به طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی

کوواریانس یک راهه یعنی همگنی رگرسیون یا رابطه خطی بین متغیرهای مورد مطالعه رعایت شود. در غیر این صورت از آزمون t مقایسه میانگین‌های مستقل با نمرات افتراقی استفاده شود (بریس، کمپ، رزمری، ۲۰۰۴ به نقل از علی‌آبادی و صمدی، ۱۳۸۴). از آنجا که در فرضیه اول و دوم، رابطه خطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود داشت اما در فرضیه سوم چنین رابطه وجود نداشت، در فرضیه اول و دوم از تحلیل کوواریانس یک راهه و برای فرضیه سوم از آزمون t مقایسه میانگین‌های مستقل با نمرات افتراقی استفاده شده است.

یافته‌ها

فرضیه اول: روش SIT موجب کاهش فشار خون سیستولیک زنان مبتلا به فشار خون بالا می‌شود.

جدول ۱. شاخص‌های توصیفی فرضیه اول

گروه‌ها	تعداد	میانگین			انحراف استاندارد		
		پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	آزمون آزمون	آزمون آزمون
آزمایشی	۱۵	۱۵	۱۵	۱۱/۸۰	۱۱/۸/۱۱	۱۳۶/۲۵	۱۰/۰۷
کنترل	۱۵	۱۵	۱۵	۱۱/۹۰	۱۲۲/۷۰	۱۳۵/۱۲	۱۱/۹۰

همان‌طور که از جدول ۱ می‌توان فهمید، تفاصل میانگین فشارخون سیستولیک بیماران بستری در بیمارستان قبل و بعد از آموزش در گروه آزمایشی ۱۸/۱۴ نمره می‌باشد ($18/14 = 118/11 - 118/25$). در حالی که همین تفاصل در گروه کنترل $2/42$ نمره می‌باشد ($2/42 = 132/70 - 135/12$). برای اینکه مشاهده شود این تفاوت معنادار است، به علت خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و همگنی کوواریانس‌ها وجود دارد، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

زندگی او نیز بهتر است و بر عکس نمره بالای ۴۳ نشان‌گر کیفیت زندگی متوسط افراد می‌باشد و نمره پایین‌تر از ۴۳ نشان می‌دهد که فرد از کیفیت زندگی پایینی برخوردار است. ضریب پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۹۰ با استفاده از روش کودر ریچاردسون ۰/۷۹ و به روش بازآزمایی ۰/۸۷ گزارش شده است (غلامی، ۱۳۷۸).

۲- دستگاه فشار خون: نخست در نوع ابتدایی خود توسط یک فیزیولوژیستی در دهه‌های ۱۷۰۰ میلادی اختراع شده و به تدریج در طی سال‌های ۱۸۶۳، ۱۸۹۸، ۱۹۰۱، ۱۹۱۵ میلادی کامل تر گردید. در سال ۱۹۰۵ میلادی جراح روسی به نام کروتكوف این دستگاه را که از گوشی پزشکی و صفحه عقربه‌دار تشکیل می‌شد به نام خود ثبت نمود. فشارسنج انواع متفاوت عقربه‌ای، جیوه‌ای، دیجیتال داشته که به صورت شایع از نوع عقربه‌ای برای سنجش فشارخون افراد استفاده می‌شود (دیویسون، ۲۰۰۰، جان، ۳۳).

۳- بسته آموزشی روش SIT: این بسته براساس نظریه مایکن بام با فنون مهارت حل مسئله، تنش زدایی عضلانی، خود- تقویتی، خود- کنترلی، خودگویی‌های مثبت، ارتباط مؤثر و ابراز وجود منطقی تهیه گردید و در جمعیت ایرانی به کار گرفته شده است (مهرآبادی، ۱۳۸۹).

در رابطه با روش آماری این پژوهش، متخصصان آماری بر این باورند که در پژوهش‌هایی که با عامل پیش‌آزمون سروکار داریم، برای آزمون فرضیه بهتر است از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شود، به شرط آن که مفروضه زیربنایی تحلیل

42. Davison

43. John

اثر بخشی آموزش گروهی مصونسازی در برابر استرس بر...

جدول ۲. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکوا) فرضیه اول

منبع تغییرات	SS	d.F	MS	F	سطح معناداری	مجذور اتا	توان آماری
پیش آزمون	۲۵/۱۸	۱	۲۵/۱۸	۰/۱۰۷	۰/۵۶۱	۰/۰۲۲	۰/۰۶۳
گروه	۷۲۵/۲۷	۱	۷۲۵/۲۷	۳/۰۹	۰/۰۰۰۱	۰/۷۳۰	۰/۹۶
خطا	۶۳۲۲/۱۸	۲۷	۲۳۴/۱۵				

زنان مبتلا به فشار خون گروه آزمایشی شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با $0/73 = 0/001$ میباشد. یعنی $73 = 0/001$ درصد تفاوت در نمرات پس آزمون فشار خون سیستولیک مربوط به تأثیر روش SIT میباشد. فرضیه دوم: روش SIT موجب کاهش فشار خون دیاستولیک زنان مبتلا به فشار خون بالا میشود.

همان طور که در جدول شماره ۲ مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون بین زنان مبتلا به فشار خون بالا در گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ فشار خون سیستولیک تفاوت معناداری وجود دارد. $P \leq 0/001$. بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد. به بیان F بهتر روش SIT موجب کاهش فشار خون سیستولیک

جدول ۳. شاخص های توصیفی فرضیه دوم

گروه ها	تعداد	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	میانگین	انحراف استاندارد
آزمایشی	۱۵	۹۶/۷۸	۷۳/۲۵	۹/۷۸	۸/۱۰		
کنترل	۱۵	۹۴/۱۲	۸۶/۴۰	۱۲/۱۴	۱۰/۱۱		

جدول ۳ نشان می دهد که تفاضل میانگین فشار خون دیاستولیک بیماران بستری در بیمارستان قبل و بعد از آزمون در گروه آزمایشی $23/53 - 23/53 = 0$ نمره میباشد آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

جدول ۳ نشان می دهد که تفاضل میانگین فشار خون دیاستولیک بیماران بستری در بیمارستان قبل و بعد از آزمون در گروه آزمایشی $23/53 - 23/53 = 0$ نمره میباشد آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

جدول ۴. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکوا) فرضیه دوم

منبع تغییرات	SS	d.F	MS	F	سطح معناداری	مجذور دتا	توان آماری
پیش آزمون	۱۳/۲۰	۱	۱۲/۲۰	۰/۰۵۹	۰/۰۳۱	۰/۰۷۸	۰/۰۳۷
گروه	۷۰۱/۱۷	۱	۷۰۱/۱۷	۲/۱۷	۰/۰۰۲	۰/۷۵	۰/۹۷

شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با $0/75 = 0/002$ میباشد یعنی $75 = 0/002$ درصد تفاوت در نمرات پس فشار خون دیاستولیک مربوط به تأثیر روش SIT میباشد. فرضیه سوم: روش SIT موجب افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا میشود.

جدول ۴ نشان می دهد با کنترل پیش آزمون، بین زنان مبتلا به فشار خون بالا در گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ فشار خون دیاستولیک تفاوت معناداری وجود دارد ($F = ۳/۷$ و $P \leq 0/002$). بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میگردد. به دیگر سخن روش SIT موجب کاهش فشار خون دیاستولیک گروه آزمایشی

جدول ۵. شاخص های توصیفی و آزمون t مقایسه میانگین های مستقل با نمرات افتراقی

گروه ها	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	درجه آزادی	t آزمون	سطح معناداری	انحراف استاندارد (S)	میانگین
آزمایشی	۴۶/۲	۴/۲۲	۴/۰۱	۴/۰۱	۲۸	۳/۳۰	۰/۰۰۳		
کنترل	۴۴/۹۳	۴/۷۸	۴/۵۶	۴/۵۶					

بحث و نتیجه‌گیری

فرضیه اول و دوم این پژوهش مبنی بر اینکه SIT در کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان مبتلا به فشار خون بالا مؤثر است، مورد تأیید قرار گرفته است. نتیجه این فرضیه با کاوش‌ها و وارسی‌های بسیاری از محققان همچون براون و لوکاس (۲۰۰۸)، ساندمون، راش (۲۰۰۱)، نقل از سو، سو، سو، (۲۰۰۴)، مایر و لودنسگلر (۲۰۰۸)، کوهن (۲۰۰۳)، الیوت، ایزدورفر (۱۹۸۲، نقل از آزاد، ۱۳۷۲) همخوانی دارد. به دیگر سخن این پژوهش و پژوهش‌های همگرا در این زمینه نشان می‌دهند که فنون SIT مانند ابزار وجود، مهارت حل مسئله، تنش‌زدایی عضلانی، ایفای نقش، خودکترلی، خودتقویتی و خودگویی‌های مثبت به کار گرفته شد موجب کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان مبتلا به فشار خون بالا شده است. محققان بر این باورند در افرادی که به خاطر فشار روانی ناشی از موقعیت بین فردی و یا موقعیت‌های تهدیدکننده، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک آنها افزایش می‌یابد، روش SIT روش مناسبی در کمک به

آنها در جهت کنترل فشار خون می‌باشد. چرا که روش SIT از یک طرف به بیماران کمک می‌کند تا هیجان‌ها و باورهای نادرست و غیرمنطقی خود را شناسایی کنند و آگاهی یابند که فشار خون بالای آنها ناشی از نگرش، گمان‌ها، عملکرد ضعیف رفتاری در موقعیت‌های استرس‌آفرین می‌باشد و از طرف دیگر به درمان‌جویان کمک می‌کند مشکلات خود را به چالش بکشند و از راهبردهای سازگارانه، خلاقانه و مسئله‌مدارانه برای حل آنها استفاده کنند. وقتی که اینگونه افراد با شیوه‌های سازگارانه، مسائل خود را حل می‌کنند، خود-کارآمدی و خودباوری و اعتماد به نفس آنها بالا رفته و این مهم به نوبه خود، ترس از مواجهه با مشکلات را کاهش داد، سطح آرزوهای را بالا برده و توانایی حل مسئله و تفکر تحلیلی را بهبود می‌بخشد. در چنین شرایطی سامانه واقعیت‌سننجی درمان‌جویان جان تازه‌ای به خود گرفته و در موقعیت‌های استرس‌انگیز برخورد منطقی تری خواهند داشت. (گلدبرگر و بریزنیتز، ۲۰۰۵، کلمن، ۲۰۰۵، کوهن، ۲۰۰۳). نانسی (۲۰۰۸) در تحقیق خود نشان داد که افراد مبتلا به فشار خون بالا وقتی در جلسات روان‌درمانی از فشارهای درونی رهایی می‌یابند و در مناسبات اجتماعی خود ابراز وجود پیدا می‌کنند، دارو درمانی در کاهش فشار خون مؤثر واقع می‌شود. تحقیقات همسو با این پژوهش نشان می‌دهد، بیمارانی که در شرایط استرس‌انگیز و تنش‌های هیجانی مانند خشم، دچار فشار خون اساسی می‌شوند، افرادی هستند که فاقد مهارت‌های لازم در برخورد با این موقعیت می‌باشند. اینگونه افراد در ظاهر بسیار آرام و از شدت خشم در درون خود می‌جوشند، این حالت در آنها یک بن‌بست روان‌شناسختی و یک انسداد دوچانبه خاص ایجاد می‌کند. چراکه اینگونه افراد نه می‌توانند خشم خود را آشکارا ابراز نمایند و نه می‌توانند به طور کامل آن را سرکوب نمایند. این

اثر بخشی آموزش گروهی مصونسازی در برابر استرس بر...

۲۰۰۰). افرادی که از فشار خون اساسی یا فشار خون ناشی از موقعیت‌های استرس‌آفرین زندگی رنج می‌برند، از آنجا که فاقد مهارت‌های شناختی و رفتاری در کنترل رویدادهای فشارزای محیطی می‌باشند، معمولاً به دیده تردید به توانایی خود می‌نگرند و همواره نگران ارزیابی‌های منفی دیگران در مورد خود و رفتارهای خویش می‌باشند. به همین جهت از کیفیت زندگی مطلوب و رضایتمندی درونی برخوردار نیستند. لذا بهبود کیفیت زندگی این بیماران در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی، به عنوان یک مفهوم اساسی یکی از مهم‌ترین اهداف درمانی درمانگران SIT می‌باشد (دیمیتو، ۲۰۰۴، دینر، شفیلد، ۲۰۰۲). لذا درمانگران SIT به منظور کنترل فشار روانی و نتیجتاً افزایش کیفیت زندگی در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی درمان‌جویان، در جلسات درمانی نخست، موقعیت‌های اضطراب‌زای زندگی، شیوه برخورد درمان‌جویان با این موقعیت‌ها را مورد ارزیابی و عواملی که در تداوم و استحکام حالات هیجانی منفی نقش دارند، شناسایی کرده و سپس با استفاده از فنون درمانی همچون ابراز وجود منطقی، خودگویی‌های مثبت، مهارت حل مسئله، تنفس زدایی عضلانی و دیگر مهارت‌های SIT، درمان‌جویان را به مهارت‌های رفتاری و شناختی جهت کنترل فشار روانی مسلح می‌کنند. وقتی درمان‌جویان فنون آموزش داده شده در جلسات درمانی را فرا می‌گیرند و در موقعیت‌های استرس‌آفرین زندگی برای مدتی به کار می‌گیرند و درمی‌یابند که قادر به تصمیم‌گیری و کنترل رویدادهای زندگی خود و اقدام مؤثر جهت دستیابی به نتیجه مطلوب و بهینه می‌باشند، احساس رضایت درونی کرده و این مهم به نوبه خود موجب افزایش شادکامی، بهزیستی روانی و خودکارآمدی که از مؤلفه‌های کیفیت زندگی می‌باشد، می‌گردد. در چنین شرایطی اینگونه افراد وقتی که در موقعیت‌های استرس‌انگیز زندگی قرار می‌گیرند، چون مجهز به مهارت‌های شناختی و رفتاری می‌باشند، شرایط موجود را به چالش می‌کشند

تعارض و فشار تکانه‌های خصمانه، خصیصه مرکزی افراد مبتلا به فشار خون اساسی می‌باشد. حال وقتی این افراد در جلسات SIT مهارت حل مسئله، ابراز وجود منطقی، ایفای نقش، جرأت‌آموزی، مهارت‌های بین فردی خودگویی‌های مثبت و دیگر مهارت‌های خودکنترلی را می‌آموزند و در موقعیت‌های طبیعی زندگی خود به کار می‌گیرند، خوداتکایی و تاب‌آوری آنها افزایش می‌یابد. در چنین وضعی افراد به شایستگی شناختی و کفایت رفتاری دست می‌یابند و بهتر می‌توانند متناسب با شرایط محیطی، رفتارهای منطقی‌تر از خود نشان دهند. این مهم به نوبه خود موجب کاهش تنش‌های هیجانی ناشی از موقعیت استرس‌انگیز و نتیجتاً کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک آنها می‌شود (کافمن، استرنبرگ، ۲۰۰۷، بولین و اسکات، ۲۰۰۸، آزاد، ۱۳۷۲).

فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه SIT موجب افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا می‌شود، در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. نتیجه این فرضیه با مطالعات و تحقیقاتی که در این راستا انجام گرفته همانند کیمپوس (۲۰۰۰، نقل از پیکرینگ، هارشفیلد، ۲۰۰۶)، هیلز (۲۰۰۳، نقل از تیلور، ۲۰۰۵)، کلمن (۲۰۰۵)، مایرز و نور (۲۰۰۱)، نقل از بیکر و اسکارتس، ۲۰۰۵)، همسوی دارد. به بیان بهتر، تحقیقات متعدد نشان داده است، مهارت‌هایی که در جلسات درمانی SIT به درمان‌جویان آموزش داده می‌شود، موجبات کیفیت زندگی مطلوب آنها را فراهم می‌سازد. درمانگران SIT بر این باورند که کیفیت زندگی افراد بر حسب کارکرد انطباقی و یا از طریق تسلط و کنترلی که آنها بر محیط دارند، تعریف می‌شود. هرچه افراد کنترل و تسلط‌شان بر محیط زندگی و به خصوص شرایط استرس‌آفرین زندگی بیشتر باشد، احساس رضایت درونی، خودکارآمدی و خودباری آنها بیشتر و از کیفیت زندگی مطلوب‌تری برخوردار می‌شوند و بر عکس (کلمن، ۲۰۰۵، دیوسون،

خون متوسط رنج می‌برند و یا در کنار سایر روش‌های درمانی از جمله دارودرمانی در افرادی که مبتلا به فشار خون اساسی یا شدید می‌باشند، می‌توان استفاده نمود.

سپاسگزاری

در اینجا جا دارد از شرکت‌کنندگان در امر این پژوهش که با وجود مشکلات موجود با علاقه نسبت به انجام پژوهش و تکمیل پرسشنامه‌ها اقدام نمودند تشکر و سپاسگزاری شود.

منابع

- الیوت، جی، آر؛ ایزدورفر، سی (۱۹۸۲)، استرس و سلامت روانی، آزاد، حسین. (آسیب‌شناسی روانی، فصل هشتم، ص ۲۴۰-۲۴۴)، انتشارات بعثت، تهران.
- بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد؛ سنکلار، رزمیری (۱۳۸۴)، تحلیل داده‌های روان‌شناسی با برنامه اس، پی، اس اس، ترجمه خدیجه علی‌آبادی؛ علی صمدی، ویرایش شانزده، نشر دوران، تهران.
- ثمنی، مرتضی (۱۳۸۱)، فشار خون، افزایش فشار خون و داروهای پایین‌آورنده فشار خون، انتشارات ذوقی، تهران.
- دیوسیون، نیل. گرنیگ (۱۳۸۳)، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه مهدی دهستانی، نشر ویرایش، تهران.
- غلامی، احمد (۱۳۸۷)، کیفیت زندگی زنان نابارور و عوامل مرتبط با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
- گایتون، آرتور (۱۳۷۹)، فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجمه احمد رضا نیاورانی، چاپ دهم، انتشارات سماط، تهران.
- مهرآبادی، فاطمه (۱۳۷۹)، اثربخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان پیام نور مرکز تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران.
- هاریسون. (۱۳۸۸)، اصول طب داخلی هاریسون، بیماری قلب و عروق، ترجمه مسعود خدابی، حامد زرین‌ساز بروجردی، چاپ سوم، انتشارات ارجمند.

و به‌طور خلافانه و مستلزم‌دارانه با مشکلات برخورد می‌کنند. نتیجتاً این گونه برخوردها موجب می‌گردد آنها کمتر تحت تأثیر فشار روانی و عوارض آن قرار گیرند. (لازاروس، فلکمن، ۱۹۹۹، کوهن، ۲۰۰۳، همچنین ریوا و سیلی (۲۰۰۹) در تحقیق خود نشان دادند، روش SIT با ایجاد حس رضایتمندی، خودباوری و مناسبات گرم اجتماعی که در افراد ایجاد می‌کند، موجبات کیفیت زندگی بالا را در افراد فراهم می‌سازد. به‌طور کلی طرفداران SIT بر این باورند، SIT شیوه مؤثری در کمک به افرادی می‌باشد که از فشار خون اساسی ناشی از سیز درونی رنج می‌برند. چرا که در این روش با فتونی که این‌گونه افراد در جلسات درمانی فرا می‌گیرند، از حس درماندگی رهایی یافته و به یک حس امیدواری و کنترل دست می‌یابند. هنگامی که افراد احساس می‌کنند بر روی محیط زندگی خود کنترل دارند و می‌توانند موجب تغییرات محیطی شوند، از آنجا که احساس درونی قشنگی نسبت به خود پیدا می‌کنند، فشار خون آنها در سطح طبیعی قرار می‌گیرد. چرا اینکه، رهاسدگی از حس درماندگی و عدم کنترل محیطی، موجب بازبینی افراد از تجربه‌های موفقیت‌آمیز، افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی آنها در کنترل موقعیت‌های استرس‌آفرین زندگی و تعییم آن به موقعیت‌های دیگر زندگی خواهد شد و این درک مثبت درونی افراد از خودشان، باعث کنترل فشار روانی و نتیجتاً کاهش فشار خون و افزایش کیفیت زندگی می‌شود.

از محدودیت‌های پژوهش می‌توان به مشکلات هماهنگی اداری با مسئولان بیمارستان، کارکنان بخش قلب و همکاری بیماران مورد مطالعه اشاره کرد. چرا که بیماران مورد مطالعه دارای فشارخون بالا بودند و شرکت آنها در کلاس‌های آموزشی قدری مشکل بود که این مهم با پذیرایی و طرح سوالات از پیش تعیین شده همراه با اهدای جوايز حل گردید. به‌طور کلی با توجه به این پژوهش و تحقیقات مشابه می‌توان از SIT به عنوان یک روش درمانی در افرادی که از فشار

- Anderson, N. B.; Lan, J. D.; Muranka, M. (2007), *Racial differences in blood pressure and forearm vascular responses to the cold face stimulus*, Psychosomatic medicine, 57, 121-130.
- Boylan, L. E. & Scott, J. (2008), *Practicum interpership: Textbook and resource Guide for counseling and psychotherapy*, By taylor & francis group. LLC.
- Brown, R. & Lucas, R. (2008), *Progressive relaxation for blood pressure reduction*, Journal of consulting an clinical psychology, 17(4), 418-430.
- Cohen, M. (2003), *Evaluation of an stress inoculation training in the self-efficacy of Anxiety disorders and phobias*, Journal of Applied psychology, 70(1) 101-111.
- Coldberger, L.; Breznitz, S. (2005), *Hand book of stress, theoretical and clinical aspects*, Free press, Adivision of Macmillan, inc.
- Coleman, J. C. (2005), *Abnormal psychology and Modern*, Sixth Edition, Scott foreman company.
- Compos, J. B. (2000), *Relationship between hope ,quality of life ,Blood pressure in the patients*, Pickering, P;
- Harshfield, G. A. (2006), *Blood pressure during normal daily activities, sleep and exercise: Comparison of values in normal and hypertensive subjects*, Journal of the American medical association, 159, 571-584.
- Davison, G. G. & John, N. M. (2000), *Abnormal psychology*, Third Edition, U.S.A.
- Diener, J. G. & Harshfield, A. (2002), *The influence of happiness, anger and anxiety on the blood pressure of border line hypertensives*, Psychosomatic medicine, 15, 502.
- Dimattw, M. R. (2004), *The psychology of health illness and Medical care*, Individual perspective, Callifornia: Brooks / cole publishing company.
- Dressler, W.W.; Stantos, J. E. & Viteri, F. E. (2003), *Blood pressure, ethnicity, and psycho social resources*, Psychosomatic medicine, 15, 315-323.
- Ely, D., L. & Mostardi, R. (2005), *The effects of recent life events stress, Life assets and tempermant pattern on cardiovascular risk factors for Akorn city police officers*, Journal of human stress, 17, 155-162.
- Fisher, G. P. (2010), *Stress, coping and life good*, Journal of personality and social psychology, 15, 325-335.
- Folkman, S. & Lazarus, R. S. (2001), *Coping and emotion in stress and coping*, Newyork, Columbia, university press.
- Green, P. D. (2009), *Stress inoculation Draing and aspects of life good in the concer peoples*, Journal of human stress 25, 211-223.
- Hills, J. C. (2003), *Anger and quality of life among blood pressure patient*, Taylor, S. E. (2005), *Health psychology*, Sixth Edition. New York;

- McGrow- Hill.
- Kaufman, J. G. & Sternberg, R. J. (2007), *Human ability*, Annual review of psychology, 49: 479-490.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1999), *Stress appraisal and coping*, New York, Forth Edition.
- Maier, S. F. & Laudenslager, M. (2008), *Stress and health. Exploring the link*, Journal of research in personality, 15, 221- 231.
- Meicham, Baum, D. (1996), *Stress inoculation training for coping with stressors*, Journal of clinical psychology, 46, 4-12.
- Myers, D. & Noor, J. (2001), *Stress and psychophysiological disorders*, Baker, L.;
- Scarth, B. (2005), *Abnormal psychology*, Fourth Edition, U.S.A.
- Nancy, G. (2008), *Psychotherapy and blood pressure*, Journal of clinical psychology, 15, 115-128.
- Riva, S. & Seeley, J. (2009), *Evaluation of an stress inoculation training in the Human living*, Journal of consulting and clinical psychology, 23, 25-268.
- Sandman, C. B. & Rush, J. (2001), *Stress and essential blood pressure*,
- Sue, David; Sue, Devald; Sue, Stanley (2004), *Understanding Abnormal behavior*, Fourth Edition, U.S.A.
- Veenboren, R. (2000), *The four qualities of life*, Journal of Happiness studies, 1: 1-39.