

اثربخشی آموزش تابآوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

طاهره حسینی قمی^{*}(نویسنده مسئول) / حسین سلیمانی^{**} بجستانی^{***}

دربافت مقاله:

خرداد ۱۳۹۱

پذیرش:

بهمن ۱۳۹۱

چکیده

هدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیش از اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربوط به تشخیص سرطان در فرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تابآوری است. تابآوری به توانایی انسان برای سازگاری در برابر بیماری‌ها، درد و رنج ناشی از گرفتاری‌ها و عوامل تنفس‌زای با اهمیت در جریان زندگی اشاره دارد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش تابآوری بر استرس مادرانی که فرزندان آنها دچار سرطان شده‌اند، انجام شده است.

روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران فرزندان سرطانی بین ۱۰ - ۱۳ بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده طرح نیمه آزمایشی که شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. با روش نمونه‌گیری تصادفی یک گروه ۳۰ نفری از مادران انتخاب شدند. آنها در دو گروه مساوی قرار داده شده‌اند که نیمی از آنها در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه کنترل بوده‌اند. پرسشنامه‌های تابآوری کانر- دیوید سون و استرس آبدین برای هر دو گروه به کار رفت.

یافته‌ها: نتایج ۹ جلسه آموزش تابآوری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مادرانی که تحت آموزش معین قرار گرفته‌اند در افزایش تابآوری و کاهش استرس به نسبت مادرانی که از این آموزش‌ها برخوردار نبوده‌اند پیشرفت بهتری داشته‌اند.

نتیجه‌گیری: آموزش تابآوری تاثیر معناداری بر روی کاهش استرس و افزایش تابآوری مادران به همراه داشته است.

کلیدواژه: تابآوری، استرس، سرطان

* کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

** استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

توسعه سرطان با ۹۵ درصد چهارمین علت مرگ و میر است. در کشورها نیز بنا بر آمار وزارت بهداشت سرطان پس از بیماری‌های قلبی عروقی و سوانح سومین علت مرگ و میر می‌باشد. میزان بروز کلی سرطان در ایران ۹۱/۵ در ۱۰۰۰۰۰ نفر گزارش شده است. سالانه حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده ۹۰ میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست بدهند. بیش از ۷۰ درصد سرطان‌ها در کشورهای در حال توسعه که منابع محدودی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مناسب سرطان در اختیار دارند، رخ می‌دهد (گویا و موسوی، ۱۳۸۷).

خانواده‌های بیماران سرطانی رویدادهای پراسترس و وضعیت‌های پیوسته و دنباله داری از اضطراب را تجربه می‌کنند (بست^۶، استریازند^۷، کاتانیا و کازاک^۸؛ ۲۰۰۱؛ کوهن^۹، ۱۹۹۳؛ کازاک، ۲۰۰۱؛ به نقل از لاوی و می‌دان^{۱۰}، ۲۰۰۳).

امروزه به علت پیشرفت در روش‌های درمانی میزان بقاء کودکان مبتلا به سرطان افزایش یافته است. اما همچنان پیش آگهی، امید به زندگی و کیفیت زندگی این کودکان نامشخص می‌باشد و می‌توان این عوامل را از عمدترین دلایل بروز

یکی از بیماری‌های مزمن سرطان است. علیرغم پیشرفت‌های پزشکی، توسعه درمان‌های سرطان و افزایش تعداد نجات یافتنگان از سرطان، این بیماری از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می‌کند بی‌همتا است. اضطراب یکی از مهم‌ترین اختلالات روانشناسی در نوجوانان مبتلا به سرطان است (لی-مین^۱ و همکاران، ۲۰۱۲). تردیدی نیست که تشخیص بیماری‌های تهدید کننده حیات همچون سرطان اثرات متعددی بر کیفیت زندگی فرد می‌گذارد (طاولی و همکاران، ۱۳۸۶). بیماران سرطانی اضطراب و تنش‌های زیادی را همراه با تشخیص این بیماری، تجربه می‌کنند (شارما^۲ و همکاران، ۲۰۱۲). سرطان یکی از بیماری‌های نادر در کودکان است و تشخیص سرطان در بین آنها استرس‌های قابل ملاحظه‌ای را برای خانواده‌های آنها به همراه دارد (ایزر، ۲۰۰۴). به رغم طبیعت پراسترس سرطان، تحقیق در این زمینه تغییرات قابل ملاحظه‌ای در عملکرد بیماران در بعد از تشخیص را، نشان داده است (تمسون و گوستاوسون^۳، ۱۹۹۶؛ والاندر و وارنی^۴، ۱۹۹۸؛ به نقل از کریستین^۵ و همکاران، ۲۰۰۷). در حال حاضر سرطان با اختصاص ۲۱ درصد مرگ‌ها به خود دومین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می‌شود. در کشورهای در حال

6 .Best

7 .Streisand

8 .Catania & Kazak

9 . Cohen

10 . Lavee& Mey-dan

1 .Li-Min

2 . Sharma

3 . Thompson &Gustafson

4 . Wallander & Varni

5 . Kristen

(دلکوئیست^۱، سیزیوسکی و جونز^۲، ۱۹۹۶
داکرتی^۳، ویلیامز^۴، مک گی^۵، اسکیگ^۶، ۲۰۰۰
هوکسترا^۷، ویبرز^۸، جاسپرس^۹، کامپس^{۱۰}، کلیپ^{۱۱}
۱۹۹۹؛ به نقل از کریستین و همکاران، ۲۰۰۷).

یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان در افراد تابآوری است. تابآوری به این مسئله می‌پردازد که فرد علیرغم قرار گرفتن در معرض فشارهای شدید و عوامل خطر می‌تواند عملکرد اجتماعی خود را بهبود داده و بر مشکلات غلبه کند (سلیمی، ۱۳۸۸). هر چند اندیشه تابآوری در مواجهه با شرایط ناگوار از سال‌ها قبل در افسانه‌ها، اسطوره‌ها و هنر و ادبیات وجود داشته است اما در اوآخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم که روان‌شناسی تحولی تکوین یافت، تمایل واضحی در زمینه سازگاری فرد با محیط به وجود آمد (ماستن، ۱۹۹۵). تابآوری یکی از موضوعات مطالعه شده به وسیله روان‌شناسی مثبت نگر است. روان‌شناسی مثبت‌نگر در اوآخر دهه ۱۹۹۰ بر پا شده است و تمرکز آن بیشتر بر قدرت‌ها و توانایی‌های فرد است تا جستجو در ضعف‌ها و نقص‌های فرد (نینان، ۲۰۰۹).

استرس در والدین ذکر نمود.

مسائلی نظیر مشکلات روانی – اجتماعی، تنش درروابط والدین، مشکلات مالی، انزوای اجتماعی، تغییر در وظایف شغلی و خانوادگی، الگوهای تفریحی و کمبود وقت خانواده جهت پرداختن به کودکان سالم به عنوان دیگر عوامل تنش‌زا در خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به سرطان معرفی شده‌اند. نگرش سیستمی در مورد خانواده چنین بیان می‌کند که تغییر در یک بخش از سیستم خانواده، کل سیستم را متاثر خواهد ساخت و ارتباط درونی سیستم خانواده طوری به هم گره خورده است که تغییر در یک قسمت باعث تغییر غیر قابل اجتناب در تمام سیستم می‌شود (مرندی و همکاران، ۱۳۸۷).

بنابراین تشخیص و درمان سرطان، تاثیرات منفی را در محیط خانواده به همراه دارد (کریستین و همکاران، ۲۰۰۷).

عكس العمل اولیه والدین در ارتباط با تشخیص سرطان در فرزندانشان، اغلب با ضریبه و شوک پیچیده‌ای همراه است. اعتقاد به اینکه فرزندانشان از بین خواهند رفت، برای آنها سخت خواهد بود. بدون تردید سرطان یکی از پر استرس‌ترین رویدادهایی است که شخص در زندگی اش می‌تواند با آن روبرو شود و تغییرات آن نه تنها بر خود فرد بلکه برخواهر و برادرها و والدین و به طور کلی بر خانواده تاثیر گذار خواهد بود (ایزر، ۲۰۰۶). والدین، به خصوص مادران بچه‌های مبتلا به سرطان بیشتر از والدین بچه‌های سالم در معرض مشکلات روان‌شناختی از قبیل، اضطراب، افسردگی، استرس و غیره می‌باشند

-
- 1 . Dahlquist
 - 2 . & Jones Czyzewski
 - 3 . Dockerty
 - 4 . Williams
 - 5 . Mcgee
 - 6 . Skegg
 - 7 . Hoekstra
 - 8 . Weebers
 - 9 . Jaspers
 - 10 . Kamps
 - 11 . Klip

یک ضربه مهم، اشاره دارد (اسچون و همکاران، ۲۰۰۶). افراد تابآور توانایی برگشتن و بهبود پیدا کردن، خوشبینی و مهارت‌های فکری انعطاف‌پذیر، جست‌وجو کردن مشکلات به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد، توانایی پشتکار و استقامت داشتن، عزت نفس^۳ سالم، توانایی تعیین اهداف قابل دسترس؛ آشکار^۴ و واقعی^۵، داشتن شبکه حمایتی سالم، توانایی رشد قابلیت‌های عاطفی و فرا طبیعی، توانایی استقلال رأی، حس شوخ طبیعی، توانایی درگیری و ارتباط معنادار با افراد، توانایی رفتار کردن با احترام با خودشان و دیگران، توانایی حل کردن مشکلات و مهارت‌های حل تعارض را دارند (حسینی قمی و سلیمانی، ۱۳۹۰).

پژوهش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که برنامه‌های مداخله‌ای بر روی خانواده از خدمات مشاوره‌ای فردی سودمندتر است (ارباج و همکاران، ۲۰۰۵).

در پژوهش کاوه (۱۳۸۸) که بر روی مادران دارای فرزندان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی انجام شده است نتایج نشان دادند که میزان تابآوری والدینی که تحت آموزش برنامه تابآوری قرار گرفته‌اند، از والدینی که تحت این آموزش قرار نگرفته‌اند بیشتر و میزان استرس والدینی آنها کمتر بوده است.

در پژوهشی که توسط کلاسن^۶ و همکاران (۲۰۰۸) انجام شده است نتایج نشان داده است

امی ورنر^۱ یکی از نخستین دانشمندانی بود که در دهه ۱۹۷۰ از اصطلاح تابآوری استفاده کرده است. او گروهی از بچه‌های منطقه کایوایی در هاوایی را مورد مطالعه قرار داد که در فقر به سر می‌بردند و یا با والدین بیمار روانی یا الکلیک و یا اخراج شده از کار زندگی می‌کردند. ورنر نشان داده که بچه‌هایی که در وضعیت‌های خیلی بد رشد کرده‌اند از این تعداد دو سوم در سنین بالاتر رفتارهای مخرب از خود نشان داده‌اند به عنوان نمونه، سوءاستفاده و تولد‌های رفتارهای مخربی اما یک سوم از این بچه‌ها رفتارهای مخربی نداشتند، ورنر گروه اخیر را تابآور نامید. بچه‌ها و خانواده‌های تابآور ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی دارند که آنها را متفاوت از بچه‌ها و خانواده‌های غیر تابآور می‌سازد (ورنر، ۱۹۸۲). راتر در سال ۱۹۸۵ تابآوری را به عنوان مقابله با استرس در یک زمان که خود باوری و قایلیت اجتماعی که مسئولیت پذیری مناسب و ماهرانه را افزایش می‌دهد، تعریف می‌کند. تابآوری توانایی رشد کردن، به بلوغ رسیدن و پخته شدن و افزایش قابلیت در مقابل شرایط ناگوار است این شرایط ممکن است شامل نابهنجاری‌های بیولوژیکی یا موانع محیطی باشد. علاوه بر این شرایط ناگوار ممکن است مزمن و دائمی یا شدید و غیرمعمول باشد (رومأن اور توییگ^۲، ۲۰۰۴).

به طور کلی مفهوم تابآوری به پیامدهای مثبت به رغم تجربه ناگواری‌ها و ناملایمات، عملکرد مثبت و موثر در شرایط ناگوار، بهبودی بعد از

3 .Self-esteem

4 . Clear

5 .Realistic

6 . Klassen

1 . Emmy werner

2 .Roman -Ortwig

برای کل خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیش از اندازه، اضطراب و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربوط به تشخیص سرطان در فرزندان است. لذا با توجه به اینکه در بین اعضاء خانواده مادران بیشتر با بیماری فرزندانشان درگیر هستند و آنها بیشتر مسئول نگهداری و مراقبت از فرزندان می‌باشند و حضور پیوسته آنها همراه با فرزندانشان در بیمارستان پیامدهای نامطلوبی برای آنها به همراه دارد و از طرفی نقش مادر در خانواده در حکم قلب زندگی است، لذا مطرح نمودن تابآوری به عنوان دیدگاهی نسبتاً نو که می‌تواند افقی جدید را در حوزه ارتقاء سلامت افراد پیش روی ما باز کند امری به جا و شایسته و در خور تامل است.

لذا با توجه به آنچه که ذکر گردید، هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش تابآوری بر سطح استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان است.

فرضیه‌های تحقیق را می‌توان به شرح زیر مطرح نمود:

آموزش تابآوری بر کاهش سطح استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان موثر است.

آموزش تابآوری بر افزایش سطح تابآوری مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان موثر است.

روش

روش پژوهشی حاضر از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی بوده است. در این پژوهش، از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده

که والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان، کیفیت زندگی ضعیفتری را در مقایسه با جمعیت عادی گزارش کرده‌اند و همچنین استرس بالاتری را گزارش کرده‌اند. پیشنهاد شده است که مداخلات مستقیم در رابطه با والدین باید به عنوان بخشی از برنامه درمانی برای بچه‌های مبتلا به سرطان در نظر گرفته شود.

همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد آموزش مدل تابآوری به خانواده‌های بیماران دیالیزی موجب شده است تا علاوه بر کاهش استرس، روابط بسیار بهتری با بیماران و نزدیکان خود برقرار کنند (نانسی، ۲۰۰۲).

در پژوهشی که توسط لی¹ و همکاران (۲۰۱۲) بر روی والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان خون انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که تشخیص سرطان، تاثیرات منفی را هم بر سلامت جسمانی و روانی والدین و هم فرزندان آنها به دنبال داشته است. همچنین مادران از سطوح پائین‌تری از سلامت روان برخوردار هستند و میزان افسردگی و اضطراب در مادران بیشتر از پدران بوده است.

در پژوهشی که توسط شارما و همکاران (۲۰۱۲) انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که میزان اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان بیشتر بوده و همچنین از سطح کیفیت زندگی پائینی برخوردار بوده‌اند و از سوی دیگر برنامه افزایش تابآوری موجب افزایش تابآوری و کاهش سطح استرس و اضطراب آنها شده است.

تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی

1. Le

است که ضریب پایایی حاصله را برابر با ۰/۸۹ گزارش کرده است. پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس استرس والدینی در پاسخ یه نیاز متخصصان بالینی و محققان برای تهیه یک مقیاس معتبر به منظور اندازه گیری استرس در روابط والد- فرزند که در یک زمان محدود قابل اجرا باشد، مستقیماً از فرم بلند این مقیاس که توسط آبدین (۱۹۸۳) تهیه شده بود، گرفته شد. مقیاس مذکور بر اساس این نظریه تهیه شده بود که استرس کلی که والدین تجربه می کنند تابعی است از خصیصه های رفتاری کودک، ویژگی های شخصیتی والدین و فشارهای روانی محیط خانوادگی که مستقیماً به نقش والدگری (والد بودن) مربوط است (کاووه، ۱۳۸۸). فرم کوتاه مقیاس استرس والدین ۳۶ سوالی است و شامل سوالاتی است با همان عبارت هایی که مستقیماً در فرم اصلی بلند ۱۰۱ سوالی وجود دارد. این مقیاس طراحی شده بود تا علاوه بر سه حوزه از استرس والدینی، استرس کلی را اندازه گیری کند. پایایی از طریق آزمون- باز ازمن ۵۳۰ نفر از مادران با فاصله زمانی ۶ ماه انجام شد و ضریب پایایی استرس کلی ۸۴٪ به دست آمده است (همان منبع). لازم به ذکر است که برنامه آموزشی تنظیم شده در رابطه با تابآوری در سه بعد: آشنایی با مفهوم تابآوری و ویژگی های افراد تابآور/ عوامل حمایتی داخلی و خارجی/ آشنایی با راههای ایجاد تابآوری خلاصه شده و در مدت ۹ جلسه، هر جلسه به مدت یک ساعت به گروه آزمایش، آموزش داده شد.

شد و مادران به شیوه تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شده اند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مادرانی بوده است که فرزندان آنها مبتلا به سرطان خون بوده و در بهمن ۱۳۸۸ در بیمارستان امام خمینی دارای پرونده پزشکی بودند. بدین ترتیب نمونه ای شامل ۳۰ نفر (۱۵ نفر، گروه آزمایش) و (۱۵ نفر، گروه کنترل) به صورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند.

نمونه مورد بررسی دارای ویژگی هایی به شرح زیر بوده است: حداقل سن مادران ۳۷ سال و حداکثر ۵۲ سال بوده است و حداقل میزان تحصیلات مادران سیکل و حداکثر لیسانس بوده است. سن فرزندان آنها بین ۱۰ تا ۱۳ سال بوده است. ملاک های ورود شرکت کنندگان نیز قطعی بودن تشخیص سرطان خون با تاکید پزشک متخصص، گذشت حداقل یک سال از تشخیص بیماری فرزندانشان و نوع درمان (دارو درمانی) بوده است.

در این پژوهش از دو پرسشنامه تابآوری کانر- دیویدسون و استرس والدین آبدین استفاده گردید. تهیه کنندگان مقیاس تابآوری بر این عقیده اند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تابآور از غیر در گروه های بالینی و غیر بالینی بوده و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد. این پرسشنامه ۲۵ گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین (۰= کاملاً نادرست) و (۵= همیشه درست) نمره گذاری می شود. سلیمانی (۱۳۸۸)، به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده

جدول ۱. طرح آموزش تاب آوری

شماره جلسه	محتوای هر جلسه
جلسه اول	پیش آزمون - ارائه رهنمودهایی برای مشارکت اعضاء و تشریح چگونگی انجام کار - معرفی پژوهشگر - معرفی اعضاء توضیح خطوط کلی جلسات برای اعضاء
جلسه دوم	آشنایی با چهارچوب کلی بحث: ❖ تعریف تاب آوری ❖ معرفی خصوصیات افراد تاب آور: 1- شادی ۲- خردمندی و بینش ۳- شوخ طبعی ۴- همدلی ۵- کفاایت های عقلانی ۶- هدفمندی در زندگی ۷- ثبات قدم
جلسه سوم	راهکار: شناخت موقعیت‌های ناخوشایند زندگی و افزایش سازگاری و تحمل در حیطه فردی هدف: آشنایی با عوامل حمایتی داخلی ❖ مفهوم خوش بینی ❖ عزت نفس ❖ منبع کنترل
جلسه چهارم	راهکار: شناخت استعدادها و علایق و تاکید بر آنها و تمایل به استفاده از آنها هدف: آشنایی با عوامل حمایتی خارجی 1- سیستم حمایتی اجتماعی 2- مسئولیت پذیری فردی و پذیرش نقش‌های معنی دار
جلسه پنجم	راهکار: احساس تعلق داشتن و با ارزش بودن و تمایل به مشارکت کردن هدف: آشنایی با راههای ایجاد تاب آوری: ❖ برقراری و حفظ ارتباط با دیگران ❖ چهارچوب دادن به استرس‌ها ❖ پذیرفتن تغییر
جلسه ششم	هدف: ادامه راههای ایجاد تاب آوری ❖ هدفمندی و امید داشتن نسبت به آینده ❖ عمل کردن
جلسه هفتم	هدف: ادامه راههای ایجاد تاب آوری ❖ خود آگاهی ❖ پرورش اعتماد به نفس
جلسه هشتم	هدف: ادامه راههای ایجاد تاب آوری ❖ خود مراقبتی
جلسه نهم	هدف: جمع بندی و نتیجه گیری و اجرای پس آزمون

یافته ها

جدول ۲. ویژگی آماری متغیرهای پژوهش در پیش آزمون به تفکیک گروه

متغیر	گروه	میانگین	انحراف استاندارد
تاب آوری	کنترل	۷۴/۲۰	۱۶/۸۵
آزمایش	آزمایش	۸۱/۷۳	۱۹/۰۷
استرس مادران	کنترل	۳۹/۸۷	۵/۰۴
آزمایش	آزمایش	۳۷/۵۳	۳/۹۱

جدول ۲ بیانگر ویژگی های توصیفی متغیر پژوهش در پیش آزمون به تفکیک گروه می باشد.

جدول ۳. ویژگی آماری متغیر پژوهش در پس آزمون به تفکیک گروه

متغیر	گروه	میانگین	انحراف استاندارد
تاب آوری	کنترل	۶۸/۸۰	۲۱/۳۳
آزمایش	آزمایش	۱۰۷/۲۰	۹/۹۷
استرس مادران	کنترل	۴۰/۷۳	۴/۱۳
آزمایش	آزمایش	۳۱/۸۷	۴/۲۲

جدول ۳ بیانگر ویژگی های توصیفی متغیر پژوهش در پس آزمون به تفکیک گروه می باشد.

جدول ۴. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس ها در آزمون تحلیل کوواریانس در فرضیه اول

متغیر وابسته	شاخص	F	ضریب	درجہ آزادی ۱	درجہ آزادی ۲	معناداری (p)
استرس		۰/۰۰۱	۱	۲۸	۰/۹۷	

آزمایش و کنترل از نظر واریانس تفاوت معنی داری ندارند، بنابراین این پیش فرض جهت انجام آزمون کوواریانس رعایت شده است.

بر اساس داده های جدول ۴، نتایج این آزمون نشان می دهد که چون سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از (۰/۰۵) می باشد، بنابراین دو گروه

جدول شماره ۵ نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل پس از

کنترل متغیرهای مداخله‌گر (پیش آزمون) در فرضیه اول

منبع تغییرات	شاخص آماری	ضریب F	درجه آزادی	درجه آزادی ۱	میانگین مجدورات	میانگین مجدورات	معناداری (p)	طح	توان آماری
پیش آزمون			۱	۱۳۳۲/۸۴۶	۲/۳۹۸	۰/۱۲۳	۰/۳۲۱		
واریانس بین گروهی			۱	۹۰۳۴/۰۵۳	۲۵/۹۱۶	۰/۰۰۰۱	۰/۹۹۸		
واریانس درون گروهی			۲۷	۴۴۹/۱۶۹	۲۳۸/۲۲۱				
مجموع			۳۰	۴۰۱۲۳					

فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش تابآوری بر کاهش استرس تایید می‌شود و این طور نتیجه‌گیری می‌گردد که بین میانگین نمرات استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

بر اساس داده‌های جدول ۵، مشخص است که به دلیل این که در متغیر بین گروهی سطح معناداری برابر ($0/0001$) می‌باشد و این مقدار کوچکتر از سطح معناداری ملاک یعنی $0/01$ است و نیز از آنجا که مقدار F به دست آمده ($25/916$) بیش از مقدار جدول می‌باشد. بنابراین

جدول ۶: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌ها در آزمون تحلیل کوواریانس در فرضیه دوم

تاب آوری	متغیر وابسته	شاخص	ضریب F	درجه آزادی ۱	درجه آزادی ۲	معناداری (p)
			۰/۳۹	۱	۲۸	۰/۵۳

آزمایش و کنترل از نظر واریانس تفاوت معنی‌داری ندارند، بنابراین این پیش‌فرض جهت انجام آزمون کوواریانس رعایت شده است.

بر اساس داده‌های جدول ۶، نتایج نشان می‌دهد که چون سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از ($0/05$) می‌باشد، بنابراین دو گروه

جدول ۷. نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل پس از
کنترل متغیرهای مداخله گر (پیش آزمون) در فرضیه دوم

عنوان آماری	منبع تغییرات	مجموع	درجه آزادی	میانگین	ضریب F	سطح	معناداری (p)
پیش آزمون	واریانس بین گروهی	۱۳۳۲/۸۴۶	۱	۰/۰۲۵	۵/۰۹۵	۰/۶۲۶	
واریانس درون گروهی	واریانس بین گروهی	۹۰۳۴/۰۵۳	۱	۰/۰۰۰۱	۳۷/۹۲۳	۱	
مجموع		۶۴۳۱/۹۵۴	۲۷	۲۲۸/۲۲۱			
		۲۵۱۱۴۴	۳۰				

معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهشی با ۹۹٪ اطمینان تایید گردید. نتایج به دست آمده در این فرضیه با نتایج پژوهش کاوه (۱۳۸۸)، استینهارد و دولبیر^۱ (۲۰۰۸)، نونه و هستینگر^۲ (۲۰۰۹)، شارما و همکاران^۳ (۲۰۱۲) همخوانی دارد. از دلایل اثربخشی آموزش تابآوری بر کاهش استرس، ممکن است ایجاد راهبردهای کنار آمدن و ساز و کارهای دفاعی بهتر در افراد باشد. اسکھیل^۴ (۲۰۰۱) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که تابآوری با استفاده از راهبردهای کنار آمدن کارآمد و مفید رابطه دارد. همچنین یکی از دلایل و تبیین های تاثیر مداخله های حیطه تابآوری این است که اغلب این مداخله ها در سبک اسناد افراد تغییراتی ایجاد می کنند. افراد با تابآوری بالا در مقابل رویدادهای استرس زا با خوش بینی، ابراز وجود و اعتماد به نفس برخورد می کنند. در نتیجه این

بر اساس داده های جدول ، مشخص است که به دلیل این که در متغیر بین گروهی سطح معناداری برابر (۰/۰۰۰۱) می باشد و این مقدار کوچکتر از سطح معناداری ملاک یعنی ۰/۰۱ است و نیز از آنجا که مقدار F به دست آمده (۳۷/۹۲) بیش از مقدار جدول می باشد، بنابراین فرضیه پژوهش مبتنی بر تاثیر آموزش تابآوری بر افزایش تایید می شود و این طور نتیجه گیری می گردد که بین میانگین نمرات تابآوری مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تابآوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیه پژوهش مبتنی بر تاثیر آموزش تابآوری بر کاهش استرس مادران تایید و این طور نتیجه گیری می گردد که بین میانگین نمرات استرس در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت

1 . Steinhard T.M. & Dolbier

2 . Noone , S.J.& Hastings

3 . Sharma

4 . Skehill

که افراد راهبردها و مهارت‌های رویارویی با رویدادهای ناخوشایند زندگی را فرآگیرند. بنابراین تابآوری به عنوان یک عامل محافظتی است که به مانند نوعی واکسیناسیون عمل می‌کند. افراد با تابآوری بالا از راهبردهای مقابله‌ای موثر در برخورد با مسائل زندگی استفاده می‌نمایند و نگاه آنها به مشکلات به گونه‌ای است که در نظر آنها مشکلات به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد می‌باشد (حسینی قمی و سلیمی، ۱۳۹۰).

در پایان پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی در زمینه ارتقاء بهداشت روان برای والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان، مانند برنامه افزایش تابآوری از طرف سازمان‌های ذیرریط و مسئولان در فهرست خدماتی ارائه شده به آنها قرار گیرد و مداخلات آموزشی برای والدین به عنوان قسمتی از برنامه درمانی برای کودکان مبتلا به سرطان در نظر گرفته شود.

تشکر و قدردانی

در پایان مراتب تشکر و قدردانی را از پرسنل پرتلاش و زحمتکش بیمارستان امام خمینی(ره) و به خصوص جناب آقای دکتر مهدی رئیس کرمی و پرستاران بخش کانسر درمانگاه، خانم‌ها ذاکری و خسروجردی اعلام می‌داریم.

منابع

حسینی قمی، ط. ابراهیمی قوام، ص. علومی یزدی، ز. (۱۳۸۹). «اثربخشی آموزش تابآوری بر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان ۱۰ تا ۱۳

رویدادها را قابل کنترل می‌بینند. نگرش‌های خوش بینانه پردازش اطلاعات را موثرتر می‌سازد و فرد راهبردهای مقابله فعال بیشتری را به کار می‌گیرد و توان کنار آمدن با شرایط دشوار افزایش می‌یابد. بنابراین تابآوری انعطاف‌پذیری فرد را افزایش می‌دهد و این ویژگی باعث افزایش سازگاری افراد با شرایط مختلف می‌گردد. همچنین تابآوری با کاهش هیجانات منفی، سلامت روان را افزایش داده و میزان رضایتمندی از زندگی نیز افزایش می‌یابد (حسینی قمی و همکاران، ۱۳۸۹).

فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش تابآوری بر افزایش تابآوری مادران نیز تایید واپس طور نتیجه گیری می‌گردد که بین میانگین نمرات افزایش تابآوری در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و با توجه به مقایسه میانگین‌ها در دو گروه، تاثیر آموزش تابآوری بر افزایش تابآوری در گروه آزمایش بیشتر بوده است. بنابراین فرضیه پژوهشی با ۹۹٪ اطمینان تایید گردید. نتایج به دست آمده در این فرضیه با نتایج پژوهش کردمیرزا (۱۳۸۸)، کاوه (۱۳۸۸)، نانسی^۱ (۲۰۰۲)، استینهارد و دولبیر (۲۰۰۸)، شارما و همکاران (۲۰۱۲) همخوانی دارد.

بر طبق نظر دنت (۲۰۰۹) توانایی حل کردن مشکلات و مهارت‌های حل تعارض به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز در افراد تابآور ذکر شده است. مک گرات (۲۰۰۰) به این نتیجه رسید که برنامه افزایش تابآوری باعث می‌شود

1 . Nancy

دستگاه گوارش»فصلنامه پایش. سال ششم. شماره سوم ص ۲۵۸.

کاوه، م. (۱۳۸۸) «تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف» پایان نامه دکتری در رشته روان‌شناسی استثنایی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبائی.

گویا، م. موسوی، م. (۱۳۸۷) «طب تسکینی» اولین کنگره مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در سرطان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

مرندی، ع. اکبری، م. (۱۳۸۷) «مالحظات اقتصادی و سرطان در جمهوری اسلامی ایران» اولین کنگره مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در سرطان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

Dent, M.,(2009) *Real kids in an unreal world: building resilience and self-esteem in today's children*, Murwillumbah , Pennington Publications, N.S.W, 2009.

Eiser,CH.(2004). Cancer: the quality of life. Journal of pediatric psychology .29(8):579-590.

Eiser,CH. Lawrence,E. (2006). children with cancer : the quality of life. Newjersey,USA.8,79-93

Klassen , robert klassen .annef(2008)Impact of caring for a child with cancer on parents, health – related reality of life. Journal of clinical oncology, vol 26 no 36 .pp:5884-5889 .

Kristen,E.Robinson,BS.Cynthia,A.Gerhardt(2007)Parent and family factors associated with child adjustment to pediatric cancer .journal of pediatric psychology.

Lavee.Y. mey-dan.M. (2003) patterns of change in marital relationships among parents of children with

ساله مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران»، مطالعات بالینی، شماره ۱. ۷۷-۱۰۰.

حسینی قمی، ط. سلیمانی بجستانی، ح. (۱۳۹۰) «رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری» مجله روان‌شناسی و دین . سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۶۹-۸۲.

سلیمانی بجستانی، ح. (۱۳۸۸). «مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنى بر تمثیل برسلامت روانی، تاب آوری و امیدواری دانشجویان دانشکده روان‌شناسی علامه طباطبائی» پایان نامه دکتری در رشته مشاوره دانشکده روان‌شناسی علامه طباطبائی.

طاولی، آ. منتظری، ع. محققی، م. روشن، ر. طاولی، ز. ملیانی، م. (۱۳۸۶) «نقش اطلاع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

cancer. Journal health and social work .vo1,28.

Le, Thien Thanh(2012) Resilience and mental health in parents of children surviving Acute Lymphoblastic Leukemia.Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science.Student thesis.

Li-Min. Wu. Jiunn-Ming,,SH. Hsiu-Lan ,SH. Shu-Chen, CH and Chih-Cheng ,H. (2012) Predictors of anxiety and resilience in adolescents undergoing cancer treatment. Journal of Advanced Nursing : 10.1111/j.1365-2648.2012.06003.

MacGrath , H .(2000) The bounce back ,resiliency program : a pilot study .paper presented at the American educational research association annual conference ,new Orleans.april 24 - 28.

Masten.A.S.(1995) .resilience in

- development . Hand book of positive psychology. New York .pp:3-25-hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Nancy,W.judy,R.jane,K.youngae ,l.kirsty,l.(2002)Across cultural family resiliency in hemodialysis patients, journal of trans cultural nersing.13,134-157.
- Neenan, M. (2009). Developing resilience:A cognitive – behavioural approach. Developmental psychopathology (vol.1,pp: 261-294).
- Noone , S.J.& Hastings,R.p(2009). Building psychological resilience in support staff caring for people with intellectual disabilities :pilot evaluation of an acceptance – based intervention . journal of intellectual disabilities, 13(1):43-51.
- Orbuch ,T . parry,C.(2005) Parent-Child Relationships and Quality of Life: Resilience Among Childhood Cancer Survivors. Journal Customer Services .
- Roman-oertwig ,S. (2004)Teacher resilience and job satisfaction.A dissertation propodal submitted to the faculty of the university of north Carolina at chapel hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of education in the school of education.
- Schoon , I. (2006).risk and resilience adaptation in changing times.Journal of marriage and family.68:1383-1384.
- Sharma.V, Sood.A ,loprinzi.C,Prasad,K (2012) Stress Management and Resilience Training (SMART) program to decrease stress and enhance resilience among breast cancer survivors: a randomized trial.BMC Complement Altern Med. 2012 June; 12(Suppl 1). P: 211.
- Skehill, C.M (2001) Resilience, coping with an extended stay outdoor education program, and adolescent mental health.canberra : university of Canberra: dissertation for the degree of honors.
- Steinhard T.M. & Dolbier, C.(2008).Evaluation of a resilience intervention to enhance coping strategies and protective factors and decrease symptomology. journal of American college health, 56(4),445 – 453.
- Werner, E. E. (1982). Vulnerable but invincible: a longitudinal study of resilient children and youth. New York: McGraw-HillNew York: McGraw-Hill.