

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه

پیشانی در افراد مصرف کننده متامفتامین

*لادن واقف^۱، مجتبی زاهدی^۲

۱. استادیار روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

(تاریخ وصول: ۹۸/۰۱/۱۲ - تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۴/۲۴)

The Effect of Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS) on Alpha wave Absolute power of the Frontal Region in Methamphetamine Users

*Ladan vaghef¹, Mojtaba Zahedi²

1. Assistant Professor, Department of Psychology, Azarbaijan shahid madani University, Tabriz, Iran.

2. MA in cognitive Psychology, Azarbaijan shahid madani University, Tabriz, Iran.

(Received: Apr. 01, 2019 - Accepted: Jul. 15, 2019)

Abstract

چکیده

Aim: The aim of the study is to investigate the effect of alpha Transcranial Alternating Current Stimulation on the brain wave pattern of the frontal lobe in methamphetamine users. **Methods:** This was a pre-test and post-test quasi-experimental study with control group. Twenty male methamphetamine users were selected through purposive sampling and randomly assigned into two experimental and control groups (10 in each). The QEEG was recorded in all participants to evaluate absolute power of alpha wave in the frontal lobe region. A single session transcranial alternating current stimulation (tACS), for 20 min at 10 Hz or sham, was applied to the right dorsolateral prefrontal cortex (F4). At the end, QEEG was recorded again. Collected data were analyzed by multivariate covariance method. **Findings:** Findings showed that Experimental group showed greater absolute alpha power at F4, F3, F7 and Fz compared to the control group ($p < 0.05$). **Discussion and Conclusion:** According to the results, 10 Hz tACS stimulation over F4 can increase alpha activity at dorsolateral, ventrolateral and central prefrontal cortex, a region of the frontal lobes that is associated with cognitive functions. Regarding to cognitive role of alpha oscillations, it can be concluded that tACS stimulation at alpha Frequency (α -tACS) can be used as a non-pharmacological method to improve cognitive function in methamphetamine users.

Keywords: methamphetamine users, Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS), Absolute Alpha Power

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر فعالیت موج آلفای ناحیه پیشانی افراد مصرف کننده متامفتامین بوده است. روش: در این مطالعه که از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و با گروه کنترل است، ۲۰ نفر از افراد مصرف کننده متامفتامین به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ۱۰ نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا به منظور بررسی توان مطلق موج آلفا در ناحیه لوب پیشانی از آزمودنی ها EEG گرفته شد. سپس تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با فرکانس ۱۰ هرتز (α -tACS) و یا تحریک شم روی ناحیه پیش پیشانی خلفی جانبی راست (F4) طی یک جلسه ۲۰ دقیقه ای اعمال شد. در پایان مجدداً امواج مغزی هر دو گروه ثبت و داده ها با استفاده از روش کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان دادند که در گروه آزمایش توان مطلق موج آلفای نواحی F4, F3, F7, Fz نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته بود ($p < 0.05$). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل، تحریک الکتریکی با موج آلفا در ناحیه F4 می تواند توان مطلق موج آلفا در قشر پیش پیشانی خلفی جانبی، تحتانی جانبی و مرکزی که در عملکردهای شناختی دخیل است را بهبود ببخشد. با توجه به نقش شناختی امواج مغزی آلفا، انتظار می رود تحریک tACS در فرکانس آلفا بتواند به عنوان روشی غیردارویی برای بهبود عملکرد شناختی در مصرف کنندگان متامفتامین استفاده شود.

واژگان کلیدی: متامفتامین، تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، توان مطلق موج آلفا

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (ACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف کننده متآمفتامین

مقدمه

برآوردها در آمریکا حاکی از شیوع ۰/۲

درصدی اختلال مصرف مواد محرک آمفتامینی در میان نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله و افراد ۱۸ ساله به بالا است. در همین حال، ۵ الی ۳۵ درصد از دانشجویان اعلام کردند که طی یک سال گذشته مواد محرک مصرف کرده اند (انجمن روانشناسی آمریکا، ۱۳۹۳). بررسی ها در زمینه شیوع مصرف متآمفتامین در ایران نشان می دهند که این ماده در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی وارد بازار ایران شد و تنها پس از گذشت یک دهه مصرف این ماده محرک به یکی از جدیدترین نگرانی های اجتماعی در ایران تبدیل شد. در ایران اگرچه آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان متآمفتامین در دست نیست اما براساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این ماده دومین ماده مخدر مصرفی در کشور است (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۳). در همین راستا گزارش شده است که ۱۴/۴ درصد از مراجعین بخش فوریت های روان پزشکی دارای نمونه ادراری مثبت از نظر متآمفتامین هستند (قهاری، ضرغامی، ۱۳۹۶).

متآمفتامین یک ماده محرک بسیار قوی و اعتیادآور است. مصرف کوتاه مدت آن موجب بالا رفتن ضربان قلب و فشارخون، افزایش هوشیاری و انرژی، احساس سرحالی و سرخوشی، افزایش قدرت تمرکز و یادگیری می گردد (دیوی^۱، ۲۰۰۸). علاوه بر آن، تحقیقات

اختلال مصرف مواد یکی از مسائل اجتماعی حاد در سراسر جهان محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت (WHO^۱) و انجمن روان پزشکی آمریکا (APA^۲) اعتیاد را به عنوان یک بیماری مزمن همراه با تمایل شدید به مصرف مواد و مشکلات وابسته به آن تعریف کرده اند (به نقل از نعمتی مقدم، ۲۰۰۸). در این میان، تولید انواع مواد مخدر صنعتی و پرخطر بر مشکلات جامعه در این حوزه افزوده است. یکی از رایج ترین و خطرناک ترین مواد مذکور، متآمفتامین (شیشه) است. این ماده که از دسته مواد محرک مشتق از آمفتامین است اولین بار در سال ۱۸۹۳ میلادی در کشور ژاپن از ادفرین گرفته شده از گیاه Ma Huang ساخته شد (راسنیاک^۳، ۲۰۱۱، به نقل از عصار، شریف آبادی، یادگاری، ۱۳۹۶). در زمان جنگ جهانی دوم توسط سربازان ژاپنی، آمریکایی و آلمانی برای برطرف کردن خستگی و افزایش انرژی استفاده می شد. در حال حاضر متآمفتامین جزو پرمصرف ترین مواد مخدر در بسیاری از کشورها ی جهان از جمله استرالیا، چین، ایران و امریکا است و روزبه روز نیز بر شیوع مصرف این ماده مخدر افزوده می شود (لیو^۴ و همکاران، ۲۰۱۳؛ رادفر^۵، ۲۰۱۴؛ پارتز^۶، ۲۰۱۵؛ عزیزی، صبوری، قادری و سیدحسین علاقبند، ۱۳۹۲).

1. World Health Organization
2. American Psychiatric Association
3. Rusyniak
4. Liu
5. Radfar

6. Paratz
7. Stimulant
8. Davey

پیش‌پیشانی موجب کاهش پردازش مربوط به پاداش در مناطق دخیل در آن می‌شود (ون هولشتاین^۴ و همکاران، ۲۰۱۸). به عبارت دیگر، هر چه فعالیت این نقاط کاهش پیدا کند توان غلبه به ولع مصرف مواد که از فعالیت مناطق پاداش ناشی می‌گردد کاهش می‌یابد. در همین راستا، مطالعات حاکی از آن است که در طول تکلیف سوگیری توجه در افراد دارای اختلال مصرف مواد، فعالیت مناطق پیش‌پیشانی کاهش م یابد (جونز^۵، ۲۰۱۰). در آزمون مذکور، وقتی به افرادی که مصرف شدید سیگار داشتند کلمات مرتبط با سیگار ارائه شد فعالیت نواحی اینسولای^۶ قدامی و پشتی سینگولیت قدامی در هر دو نیمکره افزایش یافت. شواهد حاکی است که افزایش فعالیت در ناحیه استریاتوم با افزایش فعالیت در ناحیه شکمی میانی پیش‌پیشانی^۷ (VMPFC) مرتبط است (چیب و همکاران، ۲۰۱۳). با این تفصیل به نظر می‌رسد که در افراد مصرف‌کننده مواد مخدر هنگام افزایش ولع مصرف، فعالیت ناحیه VMPFC بیشتر می‌شود و متقابلاً نواحی DLPFC و ACC با کاهش فعالیت همراه است.

همچنین تحقیقات در خصوص نقش موج آلفا در کارکردهای شناختی نشان می‌دهد که این موج در عملکردهای توجهی نظیر توجه انتخابی^۸، بازداری توجه^۱ نسبت به محرک‌های

نشان می‌دهند که مصرف متامفتامین باعث ایجاد تغییراتی بارز در امواج مغزی می‌گردد. به‌عنوان مثال: یون^۱ و همکاران (۲۰۱۲) با بررسی و تحلیل امواج مغزی (EEG) افراد مصرف‌کننده متامفتامین (۶ روز پس از ترک) گزارش دادند که فعالیت امواج مغزی بویژه موج آلفا در سطح قشر مغز این افراد نسبت به افراد عادی کاهش یافته است. این کاهش ممکن است نشان‌دهنده کاهش کلی متابولیسم قشر و اتصالات عملکردی مغز باشد. کاهش متابولیسم مغزی، می‌تواند به نقص در کارکردهای شناختی، نظیر توجه انتخابی (حداد، خسروی، نجفی و صباحی، ۱۳۹۳)، سوگیری توجه (قاسمی و همکاران، ۱۳۹۱)، قضاوت، تصمیم‌گیری، حافظه کاری و انعطاف‌پذیری شناختی (ترانل و بچارا^۲، ۲۰۰۹؛ به نقل از ماردردپور، ۱۳۹۶؛ کاظمی و میرمهدی، ۱۳۹۷) در مصرف‌کنندگان متامفتامین نسبت به افراد عادی منجر شود. علاوه بر آن، اختلال در این کارکردها (مانند عدم توانایی تصمیم‌گیری مناسب و غیره) می‌تواند سبب گرایش مجدد به مصرف مواد مخدر پس از گذراندن دوره ترک اعتیاد شود. مستندات پژوهشی بیانگر آن است که افزایش فعالیت در مناطق دخیل در احساسات/پاداش (آمیگدال^۳ و استریاتوم) با میل به مصرف مواد مخدر ارتباط دارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که تحریک ناحیه

4. Van Holstein

5. Janes

6. Insula

7. Ventromedial prefrontal cortex

8. Selective attention

1. Yun

2. Tranel & Bechara

3. Amygdala

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متآفتامین مزاحم (کلیمش^۲، ۲۰۱۲)، توجه فضایی^۳ (فاستر^۴ و همکاران، ۲۰۱۷)، سوگیری توجه (لی و همکاران، ۲۰۱۳؛ پریپفل و همکاران، ۲۰۱۴، پریکریل، ۲۰۱۴؛ میشر^۵ و همکاران، ۲۰۱۵)، حافظه کاری (کلارک^۶ و همکاران، ۲۰۰۴؛ به نقل از ولاهو^۷ و همکاران، ۲۰۱۴)، حافظه معنایی (اصغری و همکاران، ۱۳۹۵) و انعطاف‌پذیری (وولف^۷ و همکاران، ۲۰۱۷) نقش دارد و همان‌طور که ذکر شد افراد مصرف‌کننده متآفتامین در این کارکردها ضعیف عمل می‌کنند.

با توجه به مطالب بیان‌شده به نظر می‌رسد که با اصلاح الگوی امواج مغزی، بویژه در نواحی که کاهش عملکرد آنها باعث گرایش مجدد مصرف‌کنندگان به استفاده از مواد می‌گردد، می‌تواند در روند بهبود این افراد به طور چشمگیر موثر باشد. در این زمینه، بنظر می‌رسد به‌کارگیری تکنیک‌های نوین توان‌بخشی در کنار درمان‌های دارویی و روان‌شناختی ترک اعتیاد بتواند موجب افزایش کارایی درمان شود. یکی از روش‌های نوین تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با جریان متناوب (tACS) است. در روش مذکور با قرار دادن دو الکتروود بر روی سر جریان

8. Antal
9. Feurra
10. Helfrich
11. Marshall
12. Meiron, Lavidor
13. Sela
14. Voss
15. Vossn
16. Li
17. Pripfl
18. Amiaz
19. Mishra

1. Attention-suppression
2. Klimesch
3. Spatial attention
4. Foster
5. Clark
6. Vlahou
7. Wolff

فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، سال پنجم، شماره دوم (پیاپی ۱۷)، تابستان ۱۳۹۸

معتادان متآمفتامین در حال ترک ساکن کمپ نجات (ماده ۱۵) شهر تبریز در سال ۱۳۹۷ بود که از بین آن‌ها ۲۰ نفر به صورت روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۰ نفره آزمایشی و ۱۰ نفره کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود در این طرح عبارت بودند از: راست دست بودن، برخورداری از دید طبیعی یا اصلاح شده، داشتن هوش نرمال، عدم وجود سابقه مشکلات روان‌شناختی و مصرف حداقل ۱.۵ گرم متآمفتامین، ۲ بار در روز. معیارهای خروج عبارت بودند از: مصرف ماده مخدر دیگری بجز متآمفتامین در سه ماه اخیر، دارا بودن مشکلات روان‌پریشی مانند اسکیزوفرنی، عدم تمایل به ادامه همکاری در طول پژوهش، مرخص شدن از کمپ در طول پژوهش.

همچنین ابزارهای مورد استفاده و روند کار با آن‌ها به شرح ذیل است: برای ارائه تحریک الکتریکی (STIMULATIONPROCEDURE) از دستگاه نورواستریم (NEUROSTIM۲)، شرکت مدینا طب گستر، استفاده شد. پس از ارائه توضیحات کافی به شرکت کنندگان در مورد فرآیند اجرای طرح و اخذ رضایت‌نامه آگاهانه از آن‌ها، در جلسه اول امواج مغزی افراد هر دو گروه بروش الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) ثبت شد. در جلسه دوم، گروه آزمایشی تحریک الکتریکی متناوب فراجمجمه ای (tACS) را دریافت کردند. بر اساس سیستم بین المللی ۱۰-۲۰، الکتروود آند در

همکاران، ۲۰۰۷؛ منصوریه و همکاران، ۱۳۹۱)؛ که این مطالعات حاکی از نقش این موج در محدوده فرکانسی ۱۰ هرتز بر نشانه‌های مربوط به ولع مصرف در معتادان است. همچنین سایر بررسی‌ها نشان دادند که تحریک ناحیه DLPFC با فرکانس ۱۰ هرتز باعث افزایش توان مطلق موج آلفا در این ناحیه می‌گردد (وسن و همکاران، ۲۰۱۵؛ هلفیش و همکاران، ۲۰۱۴؛ نیولینگ^۲ و همکاران، ۲۰۱۳؛ زاهل^۳ و همکاران، ۲۰۱۰). با این تفصیل، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان متناوب ناحیه بین DLPFC راست و VMPFC بر الگوی موج آلفای مغزی لوب پیشانی افراد مصرف‌کننده متآمفتامین است. لازم به ذکر است که به دلیل عدم وجود تحقیق مشابه در این زمینه و بخاطر رعایت اخلاق حرفه‌ای، پژوهش حاضر به صورت مداخله (tACS) به صورت تک جلسه‌ای اجرا شد تا اثرات اولیه یا حاد (ناصری، نیچه و اختیاری،^۴ ۲۰۱۵) تحریک الکتریکی مورد بررسی قرار گیرد.


روش

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به صورت طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل (شم) است. جامعه این پژوهش کلیه

1. Comprodon
2. Neuling
3. Zahaehle
4. Nasser, Nitsche and Ekhtiari

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متآمتنامین ناحیه F4 و الکتروود کاتد در ناحیه FPz (که نزدیک‌ترین محل به VMPFC است) قرار گرفتند (شکل ۱). سپس اعضای گروه یک تحریک الکتریکی با فرکانس ۱۰ هرتز (موج آلفا) و شدت جریان ۱/۵ میلی‌آمپر به مدت ۲۰ دقیقه دریافت کردند. پروتکل مشابهی برای

گروه کنترل نیز استفاده شد، با این تفاوت که به جای جریان الکتریکی واقعی، یک تحریک شم (به مدت ۳۰ ثانیه) دریافت کردند. در پایان پروتکل امواج مغزی هر دو گروه مجدداً ثبت گردید.



شکل ۱. نحوه چینش الکترودهای آند و کاتد (چیپ و همکاران، ۲۰۱۳).

الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG):

قبل و بعد از تحریک الکتریکی، نوار مغزی شرکت‌کنندگان با استفاده از دستگاه ثبت نوار مغزی (EEG) ۱۹ کاناله شرکت شعله دانش ثبت گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار نوروگاید، توان مطلق موج آلفا در نقاط مختلف لوب پیشانی (FP1,FP2,F4,F3,F7,F8,FZ) استخراج شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 24 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) بررسی گردیدند.

یافته‌ها

میانگین سنی افراد شرکت‌کننده در این پژوهش ۳۲/۹ سال (میانگین گروه آزمایش=۳۲/۵، میانگین گروه کنترل=۳۳/۳) بود. متوسط دفعات حضور افراد در کمپ که بیانگر تعداد عود مصرف این افراد بود برای گروه آزمایش ۲/۷ بار و برای گروه کنترل ۳/۲ بار بود. میانگین و انحراف معیار توان مطلق موج آلفای منطقه پیشانی قبل و بعد از تحریک برای دو گروه آزمایش و کنترل در جدول (۱) نشان داده شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، سال پنجم، شماره دوم (پیاپی ۱۷)، تابستان ۱۳۹۸
 جدول ۱. میانگین و انحراف معیار توان مطلق موج آلفا پیشانی به تفکیک گروه‌ها

متغیر	گروه	تعداد	قبل از تحریک		بعد از تحریک	
			میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
FP1	گروه آزمایش	۱۰	۱۲/۶۵	۴/۷۰	۱۷/۳۳	۵/۵۸
	گروه کنترل	۱۰	۱۰/۷۱	۴/۵۳	۱۰/۵۲	۴/۶۰
FP2	گروه آزمایش	۱۰	۱۳/۵۵	۴/۸۶	۱۷/۰۶	۵/۸۱
	گروه کنترل	۱۰	۱۰/۱۹	۳/۷۱	۱۰/۱۵	۵/۲۲
F3	گروه آزمایش	۱۰	۱۰/۵۱	۳/۵۸	۱۳/۴۴	۵/۴۲
	گروه کنترل	۱۰	۷/۶۹	۳/۸۰	۷/۲۴	۳/۱۱
F4	گروه آزمایش	۱۰	۱۰/۳۹	۳/۶۱	۱۳/۲۴	۴/۷۷
	گروه کنترل	۱۰	۷/۹۹	۴/۲۶	۷/۷۳	۴/۲۰
F7	گروه آزمایش	۱۰	۱۱/۹۰	۳/۵۶	۱۵/۱۰	۴/۹۰
	گروه کنترل	۱۰	۹/۳۰	۳/۸۶	۸/۳۱	۲/۵۱
F8	گروه آزمایش	۱۰	۱۲/۱۵	۳/۶۸	۱۴/۷۰	۵/۰۵
	گروه کنترل	۱۰	۹/۳۷	۳/۴۲	۱۰/۱۱	۴/۱۴
Fz	گروه آزمایش	۱۰	۱۱/۶۸	۴/۱۹	۱۵/۱۰	۵/۸۰
	گروه کنترل	۱۰	۸/۳۳	۵/۱۷	۸/۴۲	۴/۷۳

همان‌طور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود میانگین توان مطلق موج آلفای در نقاط گروه آزمایش بعد از اعمال تحریک الکتریکی نسبت به گروه گواه بیشتر است. قبل از انجام تحلیل کوواریانس چند متغیره، ابتدا پیش‌فرض‌های آزمون شامل نرمال بودن داده‌ها،

همگنی شیب رگرسیون و همگنی واریانس‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از رعایت تمام پیش‌فرض‌ها، نتایج آزمون کوواریانس چند متغیره در جدول (۲) نشان داده شده است.

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متامفتامین

جدول ۲. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی تأثیر مداخله الکتریکی بر توان مطلق موج آلفای پیشانی

نام آزمون	مقدار	F	سطح معنی داری	ضریب اتا
لامبدای ویلکز	۰/۳۰۹	۱/۲۷۶	۰/۴۳۰	۰/۶۹۱


با توجه به نتایج حاصل از جدول (۲)، لامبدای ویلکز معنی دار نیست ($p > 0.05$). عدم معنی داری این آزمون نشان می‌دهد که به‌طور کلی تحریک الکتریکی بر تمامی مؤلفه‌های سوگیری توجه اثر نداشته است. در جدول (۳) نتایج مربوط به اثر گروه به تفکیک نقاط پیشانی ارائه شده است.

جدول ۳. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره به تفکیک نقاط پیشانی

متغیر	منابع	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	مقدار F	سطح معنی داری	اندازه اثر
نقطه FP1	گروه	۱۲۳/۸۱	۱	۱۲۳/۸۱	۳/۰۵۶	۰/۱۱۱	۰/۲۳۴
	خطا	۴۰۵/۱۵	۱۱	۴۰/۵۱			
نقطه FP2	گروه	۷۷/۲۶	۱	۷۷/۲۶	۱/۴۲۱	۰/۲۶۱	۰/۱۲۴
	خطا	۵۴۳/۹۱	۱۱	۵۴/۳۹			
نقطه F3	گروه	۸۳/۱۶	۱	۸۳/۱۶	۵/۹۳۳*	۰/۰۳۵*	۰/۳۷۲
	خطا	۱۴۰/۱۵	۱۱	۱۴/۰۱			
نقطه F4	گروه	۵۳/۲۲	۱	۵۳/۲۲	۵/۸۵۳	۰/۰۳۶*	۰/۳۶۹
	خطا	۹۰/۹۳	۱۱	۹/۰۹			
نقطه F7	گروه	۱۷۶/۴۱	۱	۱۷۶/۴۱	۵/۳۴۱	۰/۰۴۳*	۰/۳۴۸
	خطا	۳۳۰/۲۸	۱۱	۳۳/۰۲			
نقطه F8	گروه	۴۲/۰۴	۱	۴۲/۰۴	۱/۳۳۰	۰/۲۷۶	۰/۱۱۷
	خطا	۳۱۶/۱۱	۱۱	۳۱/۶۱			
نقطه Fz	گروه	۶۷/۳۴	۱	۶۷/۳۴	۵/۸۴۹	۰/۰۳۶*	۰/۳۶۹
	خطا	۱۱۵/۱۳	۱۱	۱۱/۵۱			

معنی داری دیده می شود ($p < 0.05$). این تفاوت در بقیه نقاط پیشانی معنی دار نیست.

همان طور که در جدول (۳) و شکل (۲) مشاهده می شود در نقاط Fz، F4، F3 و F7 بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت




شکل ۲. تغییرات توان مطلق موج آلفا در نواحی مختلف لوب پیشانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل. پیکان رو به بالا نشان دهنده افزایش معنی دار توان مطلق موج آلفا است.

آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان می دهد ($p < 0.05$). در گروه آزمایش، در سایر نقاط نیز افزایش توان مطلق آلفا ملاحظه شد اما تفاوت مشاهده شده معنی دار نبود.

میانگین توان مطلق آلفای دو گروه پس از اعمال تحریک tACS نیز در شکل (۳) نشان داده شده است. با توجه به این شکل، به دنبال تحریک الکتریکی، توان مطلق آلفای نقاط Fz و F7، F4، F3 در گروه

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متامفتامین



شکل ۳. توان مطلق موج آلفا در لوب پیشانی پس از مداخله. پس از اعمال تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، توان مطلق آلفای نواحی Fz و F7, F4, F3 در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان می‌دهد. * = تفاوت معنادار (p<0.05).

بحث و نتیجه‌گیری:

افزایش یافت. به عبارت دیگر، مداخله الکتریکی α-tACS توانست سبب افزایش توان مطلق موج آلفا در ناحیه پیش‌پیشانی شود. قابل ذکر است که افزایشی هرچند غیر معنادار در سایر نقاط لوب پیشانی (F8, FP2, FP1) نیز در گروه آزمایش ملاحظه گردید. بر اساس مستندات تجربی، ناحیه پیش‌پیشانی و به‌خصوص DLPFC و VLPFC از مهم‌ترین نواحی مغزی دخیل در عملکردهای شناختی هستند. در همین راستا، کاهش فعالیت این نواحی می‌تواند باعث نقص در تصمیم‌گیری ادراکی (فیلاستیدس، آکسبولویچ، هیگرن و بلنکنبرگ^۱، ۲۰۱۱)، حافظه کاری (باربی،

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر الگوی امواج مغزی ناحیه پیشانی افراد مصرف‌کننده متامفتامین صورت گرفت. بدین منظور، ناحیه بین DLPFC راست و VMPFC شرکت‌کنندگان با استفاده از جریان الکتریکی متناوب و با فرکانس موج آلفا تحریک شد. سپس توان مطلق این موج در نواحی پیشانی ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، بدنبال تحریک α-tACS، موج آلفا در نواحی DLPFC راست و چپ (F4, F3)، پیشانی مرکزی (Fz) و پیش‌پیشانی تحتانی جانبی چپ^۱ (VLPFC) (F7)

2. Philiastides, Auksztulewicz, Heekeren and Blankenburg

1. Ventrolateral prefrontal cortex

فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، سال پنجم، شماره دوم (پیاپی ۱۷)، تابستان ۱۳۹۸

۱۰ هرتز طی یک جلسه ۲۰ دقیقه‌ای تحریک شد و ۳۰ دقیقه بعد، از شرکت‌کنندگان ثبت EEG به عمل آمد. نتایج آنها حاکی از افزایش توان آلفا در ناحیه تحریکی (Cz-Oz) بود.

خاطر نشان می‌سازد پژوهش حاضر اولین مطالعه در زمینه بررسی اثر القای جریان الکتریکی متناوب با فرکانس موج آلفا (۱۰ هرتز) در ناحیه DLPFC بر توان مطلق موج آلفای لوب پیشانی در مصرف‌کنندگان متآمفتامین است. اغلب مطالعات موجود در زمینه اثر بخشی موج آلفا به بررسی تاثیر آن بر ولع مصرف و سوگیری توجه پرداخته‌اند و نه به تغییرات الگوی موج آلفا. بر اساس یافته‌های پژوهش‌های مذکور، القای موج آلفا در ناحیه DLPFC باعث کاهش ولع مصرف و توجه به نشانه‌های مرتبط با مواد مخدر می‌گردد (لی و همکاران، ۲۰۱۳؛ پریپفل و همکاران، ۲۰۱۴؛ آمیاز، ۲۰۰۹؛ میشر و همکاران، ۲۰۱۵). با این وجود، نتایج بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نقش نواحی DLPFC راست و چپ در ولع مصرف یا سوگیری توجه، بسیار متناقض هستند. به‌عنوان مثال در پژوهشی که کامپرادون و همکاران (۲۰۰۷)، به‌وسیله TMS و القای موج آلفا در ناحیه DLPFC راست و چپ افراد مصرف‌کننده کوکائین انجام دادند، نشان داده شد که تحریک ناحیه DLPFC راست بر کاهش ولع مصرف تأثیر معنی‌داری داشت اما این تحریک در ناحیه DLPFC چپ هیچ اثری

کونگس و گرافمن^۱، (۲۰۱۳)، بازداری پاسخ (وبلاسی، گلدبرگ و ویکرت و همکاران^۲، ۲۰۰۶)، توجه (پسونن، هاماینن، کروس^۳، ۲۰۰۷؛ به نقل از نجاتی، ۱۳۹۲)، کاهش سرعت پردازش توجهی (نرماشیری و همکاران، ۱۳۹۶) و سایر کارکردهای شناختی شود. بر اساس شواهد موجود، نقصان عملکردهای شناختی در افراد مصرف‌کننده مواد مخدر به‌خصوص متآمفتامین می‌تواند یکی از علل روی‌آوری به مصرف مواد باشد (نوزری، تامپسون شیل^۴، ۲۰۱۶؛ لوی، واگنر^۵، ۲۰۱۱). در تایید نتایج حاصل از پژوهش حاضر، برخی مطالعات نیز نشان دادند که تحریک با موج آلفا سبب افزایش توان مطلق این موج در ناحیه تحریکی می‌گردد (وسن و همکاران، ۲۰۱۵؛ هلفیش و همکاران، ۲۰۱۴). به‌عنوان مثال، در مطالعه‌ای که توسط زاهل (۲۰۱۰) که بر روی ۱۰ فرد سالم صورت گرفت، طی یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای ناحیه (PO9-PO10) به‌وسیله tACS و با فرکانس موج آلفا تحریک شد. یافته‌های وی نشان داد که پس از تحریک الکتریکی، توان آلفا در ناحیه تحریک‌شده افزایش می‌یابد. همچنین، در پژوهش صورت گرفته توسط نیولینگ و همکاران (۲۰۱۳)، ناحیه دیداری-مرکزی (Cz-Oz) با استفاده از tACS و با فرکانس

1. Barbey, Koenigs and Grafman
2. Blasi, Goldberg, and Weickert
3. Pesonen, Hamainen, Krause
4. Nozari, Thompson-Schill
5. Levy, Wagner

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متآمفتامین

در حوزه‌های مرتبط با این پژوهش، پیشنهادات زیر برای انجام مطالعات آتی ارائه می‌شود:

۱- پیشنهاد می‌گردد که پروتکل انجام شده در این پژوهش در تعداد دفعات بیشتری اجرا شود و میزان ماندگاری آن با پیگیری چندماهه بررسی گردد.

۲- در این پژوهش تغییرات الگوی موج آلفا مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می‌شود رابطه بین این تغییرات و عملکردهای شناختی نیز بررسی شود.

۳- پیشنهاد می‌شود رابطه بین توان مطلق موج آلفا و ولع مصرف در افراد دارای اختلال مصرف متآمفتامین نیز بررسی شود.

تشکر و قدردانی:

تحقیق حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد است که در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال ۱۳۹۷ به انجام رسید و تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی قرار گرفت. همچنین لازم به ذکر است که بین نویسندگان هیچ تضاد منافی وجود ندارد. در پایان از مساعدت تمامی همکاران گرامی، مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی، کمپ ترک اعتیاد نجات (ماده ۱۶) شهر تبریز و شرکت‌کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی می‌گردد.

نداشت. در مقابل برخی مطالعات (پریپفل، ۲۰۱۴؛ آمیاز، ۲۰۰۹) نشان دادند که تحریک ناحیه DLPFC چپ با موج آلفا باعث کاهش ولع مصرف مواد می‌گردد. از سوی دیگر، یافته‌های میشرای و همکاران (۲۰۱۵)، حاکی از آن بود که تحریک هر دو ناحیه DLPFC چپ و راست با موج ۱۰ هرتز می‌تواند در کاهش ولع مصرف مواد مؤثر واقع شود.

با این تفصیلات، می‌توان گفت که تحریک tACS با موج آلفا، در ناحیه بین DLPFC راست و VMPFC باعث افزایش توان مطلق در ناحیه بالای سطح پیش‌پیشانی یعنی نواحی پیش‌پیشانی خلفی جانبی راست و چپ، تحتانی جانبی چپ و مرکزی می‌شود. با توجه به نقش موج آلفا در بهبود عملکردهای شناختی و کاهش ولع مصرف و همچنین نقش مهم ناحیه پیش‌پیشانی در این عملکردها و نیز در ولع مصرف مواد از یک سو و ضعف افراد مصرف‌کننده متآمفتامین در فعالیت این ناحیه و عملکردهای شناختی، می‌توان انتظار داشت که به دنبال تحریک tACS و افزایش موج آلفا شاهد بهبود در کارکردهای شناختی این افراد بود.

با توجه به نتایج این پژوهش، جهت تکمیل این پژوهش و انجام مطالعات بیشتر

منابع:

- اصغری، الهام؛ نظری، محمدعلی؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ احمدی، اسماعیل (۱۳۹۵). تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی. فصلنامه علمی - پژوهشی عصب روانشناسی، ۲(۴)، ۹۱-۱۰۶.
- انجمن روانپزشکی آمریکا (۲۰۱۳). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM5)، ویرایش پنجم. ترجمه: رضاعی، ف.، فخرایی، ع.، فرمند، آ.، نیلوفری، ع.، هاشمی آذر، ژ. و شاملو، ف. (۱۳۹۳)، تهران: کتاب ارجمند.
- حداد، شیما؛ خسروی، معصومه؛ نجفی، محمود و صباحی، پرویز (۱۳۹۳). مقایسه عملکرد توجه در افراد وابسته و غیروابسته به متامفتامین. مجله روانشناسی بالینی، ۹(۳۴)، ۲۳-۳۶.
- عزیزی، حسن؛ صبوری، احسان؛ قادری، سلمان؛ سیدحسین علاقبند، آذر (۱۳۹۲). بررسی تأثیر متامفتامین بر خانواده ها و بیماران مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر تهران در سال ۱۳۹۱. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، ۱۱(۱۱)، ۹۲۵-۹۳۵.
- قاسمی، نظام الدین؛ کیانی، احمدرضا؛ زرهپوش، اصغر؛ ربیعی، مهدی و وکیلی، نجمه (۱۳۹۱). بررسی تفاوت های سوگیری توجه، عملکرد اجرایی و زمان واکنش در مصرف کنندگان آمفتامین در مقایسه با افراد غیرمصرف کننده مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، ۶(۲۳)، ۵۳-۶۴.
- قهراری، شهربانو؛ ضرغامی، مهران (۱۳۹۶). درمان اعتیاد. تهران: انتشارات رشد.
- مارد پور علیرضا (۱۳۹۶). اعتیاد و عملکردهای شناختی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، ۴(۱۵)، ۶۳-۹۲.
- منصوریه، نسترن؛ محمودعلیلو، مجید؛ رستمی، رضا؛ هاشمی، تورج (۱۳۹۱). اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش ولع مصرف افراد سوءمصرف کننده متامفتامین. روانشناسی کاربردی، ۴(۲۴)، ۴۳-۵۶.
- میرمهدی، سید رضا؛ کاظمی، الهام (۱۳۹۷). مقایسه فعالیت مکانیزم های مغزی فعال سازی-بازداری رفتاری (BAS/BIS) و کارکرد انعطاف پذیری شناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد و زنان سالم. فصلنامه علمی - پژوهشی عصب روانشناسی، ۴(۱۲)، ۱۰۱-۱۲۴.

- لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متامفتامین
نجاتی، وحید (۱۳۹۲). ارتباط بین کارکردهای
اجرائی مغز با تصمیم‌گیری پرخطر در
دانشجویان. مجله تحقیقات علوم
رفتاری. ۱۱(۴)، ۲۷۰-۲۷۸.
- نرماشیری، عبدالواحد؛ اشرفی، حمیدرضا؛
رستمی، زینب؛ باقری فر، علی؛ همتی راد،
گیتی (۱۳۹۶). اثربخشی تحریک
الکتریکی فراقشری مغز بر بهبود سرعت
working memory. *Cortex*, 49(5),
1195-1205.
- Blasi, G., Goldberg, T.E., Weickert, T.,
Das, S., Kohn, P., Zolnick, B., &
Mattay, V. S. (2006). Brain
regions underlying response
inhibition and interference
monitoring and suppression.
*European Journal of
Neuroscience*, 23(6), 1658-1664.
- Camprodon J.A., Martinez-Raga J.,
Alonso-Alonso M., Shih M.C., &
Pascual-Leone A. (2007). One
session of high frequency
repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) to the right
prefrontalcortex transiently
reduces cocaine craving. *Drug
Alcohol Depend*, 86: 91-94.
- Chib, V.S., Yun, K., Takahashi, H., &
Shimojo, S. (2013). Noninvasive
remote activation of the ventral
midbrain by transcranial direct
current stimulation of prefrontal
cortex. *Translational Psychiatry*,
3(6), e268.
- Davey, G.C. (2008). Psychopathology:
پردازش شناختی توجه در افراد مبتلا به
بیش‌فعالی و نقص توجه. فصلنامه علمی -
پژوهشی عصب روانشناسی، ۳(۱۱)، ۱۴۳-
۱۵۸.
- هادی‌زاده عصار، ساناز، حسینی شریف‌آباد، محمد،
یادگاری مریم (۱۳۹۷). اثرات سمیت
متامفتامین بر سیستم عصبی. مجله علوم
اعصاب شفای خاتم. ۶(۳)، ۹۱-۹۹.
- AlamMehrerjdy, Z., Noroozi, A., Barr,
A.M., & Ekhtiari, H. (2012).
Attention Deficits in chronic
Methamphetamine users as a
potential target for enhancing
treatment efficiency. *Basic and
Clinical Neuroscience*, 3(4), 5-14.
- Amiaz R., Levy D., Vainiger D.,
Grunhaus L., & Zangen A. (2009).
Repeated high-frequency
transcranial magnetic stimulation
over the dorsolateral prefrontal
cortex reduces cigarette craving
and consumption. *Addiction*, 104:
653-660.
- Antal, A., Boros, K., Poreisz, C.,
Chaieb, L., Terney, D., & Paulus,
W. (2008). Comparatively weak
after-effects of transcranial
alternating current stimulation
(tACS) on cortical excitability in
humans. *Brain stimulation*, 1(2),
97-105.
- Barbey, A. K., Koenigs, M., &
Grafman, J. (2013). Dorsolateral
prefrontal contributions to human

- research, assessment and treatment in clinical psychology, 259-308.
- Foster, J. J., Sutterer, D. W., Serences, J. T., Vogel, E. K., & Awh, E. (2017). Alpha-band oscillations enable spatially and temporally resolved tracking of covert spatial attention. *Psychological science*, 28(7), 929-941.
- Helfrich, R. F., Schneider, T. R., Rach, S., Trautmann-Lengsfeld, S. A., Engel, A. K., & Herrmann, C. S. (2014b). Entrainment of brain oscillations by transcranial alternating current stimulation. *Curr. Biol.* 24, 333-339.
- Janes, A.C., et al., (2010). Brain reactivity to smoking cues prior to smoking cessation predicts ability to maintain tobacco abstinence. *Biol. Psychiatry*, 67, 722-729.
- Klimesch, W. (2012). Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information. *Trends in Cognitive Sciences*, Vol. 16, No. 12, 607-617.
- Levy, B. J., & Wagner, A. D. (2011). Cognitive control and right ventrolateral prefrontal cortex: reflexive reorienting, motor inhibition, and action updating. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1224(1), 40-62.
- Li, X., Malcolm R.J., Huebner K, Hanlon C.A., Taylor J.J., Brady K.T. et al (2013). Low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex transiently increases cue-induced craving for methamphetamine: a preliminary study. *Drug Alcohol Depend*, 133: 641-646.
- Liu J., Liu L., Chen Y., Wen N., Kosten T.R., et al. (2013). Gender differences in sociodemographic and clinical characteristics of methamphetamine inpatients in a Chinese population. *Drug Alcohol Depend*, 130, 94-100.
- Mishra B.R., Praharaj S.K., Katshu M.Z., Sarkar S., & Nizamie S.H. (2015). Comparison of anticraving efficacy of right and left repetitive transcranial magnetic stimulation in alcohol dependence: a randomized double-blind study. *J Neuropsychiatry Clin. Neurosci.*, 27: e54-e59.
- Nasseri, P., Nitsche, M. A., & Ekhtiari, H. (2015). A framework for categorizing electrode montages in transcranial direct current stimulation. *Frontiers in human neuroscience*, 9, 54.
- Nemati Mogadam M.R. (2008). Managing addiction as a chronic condition. *J Add.* 4&5:64-7.
- Neuling, T., Rach, S., & Herrmann, C. S. (2013). Orchestrating neuronal networks: sustained after-effects of transcranial alternating current stimulation depend upon brain states. *Front. Hum. Neurosci.*, 7:161.
- Niedermeyer E., & Lopes da Silva, F. (2004). *Electroencephalography: Basic Principles, Clinical*

لادن واقف و مجتبی زاهدی: تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (tACS)، بر توان مطلق موج آلفای ناحیه پیشانی در افراد مصرف‌کننده متامفتامین

- Applications, and Related Fields. 641-55.
Lippincot Williams & Wilkins.
- Nozari, N., & Thompson-Schill, S. L. (2016). Left ventrolateral prefrontal cortex in processing of words and sentences. In *Neurobiology of language* (pp. 569-584). *Academic Press.*
- Paratz E.D., Cunningham N.J., MacIsaac A.I (2015). The cardiac complications of methamphetamines. *Heart Lung Circ.*, S1443950615014894.
- Philiastides, M. G., Auksztulewicz, R., Heekeren, H. R., & Blankenburg, F. (2011). Causal role of dorsolateral prefrontal cortex in human perceptual decision making. *Current biology*, 21(11), 980-983.
- Pripfl J., Tomova L., Riecanaky I., Lamm C. (2014). Transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex decreases cue-induced nicotine craving and EEG delta power. *Brain Stimul.*, 7: 226-233.
- Radfar SR, Rawson RA (2014). Current research on methamphetamine: Epidemiology, medical and psychiatric effects, treatment and harm reduction efforts. *Addict Health*, 6: 146-154.
- Rusyniak D.E. (2001). Neurologic manifestations of chronic methamphetamine abuse. *Psychiatr Clin. North Am.*, 29(3): 641-55.
- van Holstein, M., Froböse, M. I., O'Shea, J., Aarts, E., & Cools, R. (2018). Controlling striatal function via anterior frontal cortex stimulation. *Scientific reports*, 8(1), 3312.
- Vlahou, E. L., Thurm, F., Kolassa, I. T., & Schlee, W. (2014). Resting-state slow wave power, healthy aging and cognitive performance. *Scientific reports*, 4, 5101.
- Vossen, A., Gross, J., & Thut, G. (2015). Alpha power increase after transcranial alternating current stimulation at alpha frequency (alpha-tACS) reflects plastic changes rather than entrainment. *Brain Stimul.*, 8, 499-508.
- Wolff, N., Zink, N., Stock, A. K., & Beste, C. (2017). On the relevance of the alpha frequency oscillation's small-world network architecture for cognitive flexibility. *Scientific reports*, 7(1), 13910.
- Yun K., Park H.K., Kwon D.H., Kim Y.T., Cho S.N., et al. (2012) Decreased cortical complexity in methamphetamine abusers. *Psychiatry Res.*, 201:226-232.
- Zaehle, T., Rach, S., & Herrmann, C. S. (2010). Transcranial alternating current stimulation enhances individual alpha activity in human EEG. *PloS one*, 5(11), e13766.