

**Research Article****Effect of coating and modified atmosphere packaging on the characteristics of fresh-cut melon during storage****Parvin Sharaye^{1*}, Shohreh Nikkhah²**

1. Associate Professor, Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.

2. Researcher, Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.

(Received 21 May 2023, Received in revised form 24 June 2023, Accepted 19 July 2023)

Introduction: Melon (*Cucumis melo* L.) is one of the most important fruits that is consumed all over the world. The fresh cut fruit and vegetable industry is one of the relatively new and growing sectors of the fresh food products industry. Fresh-cut fruits, in addition to ease of consumption, bring benefits such as higher added value, reduction of waste and losses, increased product variety, improved security and quality, and less work in stores. Quality retention and shelf-life extension of fresh-cut fruits are crucial for industry because of their economic impact. Fresh-cut fruits and vegetables with high pH and water activity are considered to be highly perishable when they are not subjected to preservative processes and delay undesirable biological and biochemical changes. A recent approach to prolong the shelf life of fresh-cut fruit and vegetables is the use of edible coatings either alone or combined with modified atmosphere packaging. Numerous studies on improving the shelf life of fresh-cut fruits are extensive with the application of modified atmosphere packaging, and edible coatings and films. Chitosan, a polysaccharides-based edible coating, has been used individually or in combination with nanocomposite and other biological materials such as extracts or essential oils of various plants. On the other hand, edible films and coatings, due to their high ability to carry active compounds including antimicrobial compounds, can increase product shelf life and reduce the risk of pathogen growth on fresh-cut surfaces. Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) is a monoterpenoid phenol with the molecular formula C₁₀H₁₀O and isomer of carvacrol, which is slightly soluble in water with neutral pH, but is very soluble in alcohols and other organic solvents. MA packaging technology has been representatively used to maintain quality of fresh-cut products during preservation by carbon dioxide elevation and reduction in oxygen levels.

Materials and methods: Melon fruit was harvested with full maturity at the right time. The outer surface of the fruit was disinfected with sodium hypochlorite solution (200 ppm) and cube slices with dimensions of 4x4x4 cm³ and an approximate weight of 9 g were prepared from it. To prepare the coating solution, 1 or 2 g of chitosan with 0.5 g of tween 80 was dissolved in 100 g of 1% acetic acid solution and thymol was added to the solution at 3 concentrations (zero, 0.25 and 0.5%). The final pH of the product was adjusted to 5.6 using NaOH 0.1 M. Then the solution was homogenized with a magnetic stirrer (1500 rpm) for 2 min. Fruit slices were immersed in each of the solutions separately for 2 min. After coating and removing excess solutions, the fruit slices were dried at room temperature for 8 min. Then, 30±2 g of treated and the control samples (uncoated) were weighed inside a polyethylene container and covered with a double-layer film (with a total thickness of 85 µm with an outer layer of polyethylene and an inner layer of polyamide) were packed in a modified or natural atmosphere. Atmosphere change was done using a MAP device equipped with a gas injection system. The levels of CO₂, O₂ and N₂ inside the package immediately after sealing were 10, 5 and 85%, respectively. Fresh-cut packages were kept at 4±2°C for 8 days. All physicochemical (O₂ and CO₂ levels, weight loss, TSS, TA, ascorbic acid, color and firmness) characteristics were performed during storage time (immediately after harvesting, after 4 and 8 days). At the end of the storage time, microbial contamination (total count, mold and yeast count) and sensory characteristics were evaluated.

* Corresponding author: p.sharaye@areeo.ac.ir



Results and discussion: The results of analysis of variance showed a significant effect of the type of packaging atmosphere on the level of O₂ and CO₂ gases inside the packages ($p<0.05$). The results showed the CO₂ and O₂ levels, respectively increased and decreased inside the different fresh-cut melon packages during storage at 4°C under natural and modified atmospheres. However, in the samples coated with chitosan and thymol, the intensity of O₂ reduction and CO₂ increase was less than the uncoated samples (control). This phenomenon is probably due to the gas blocking properties of the chitosan coating and the antimicrobial properties of thymol, which reduce oxygen consumption and carbon dioxide production by reducing the respiration rate. At the end of 8 days of storage, the weight loss in the samples coated with chitosan and thymol and stored under modified atmosphere was much less than the control sample (0.34% compared to 13.60%). Chitosan coating and packaging under modified atmosphere provide relative semi-permeable barriers against oxygen, carbon dioxide and moisture, and as a result, weight loss is reduced by decreasing respiration rate and moisture loss. Increasing the concentration of chitosan and packaging under modified atmosphere caused an increase in the amount of soluble solids, titratable acid, ascorbic acid, and firmness of the melon slices, but increasing the concentration of thymol had no significant effect on these quality characteristics. The color indices of green-redness (a*), blue-yellowness (b*), brightness (L*) and browning index (BI) were also affected by the type of packaging and chitosan concentration. Evaluating the interaction effect of storage time with chitosan concentration showed that the amount of a* and b* indexes in the samples coated with 1% chitosan after 4 days of storage was not significantly different from the first sample. However, after 8 days of storage, these indexes decreased significantly. The interaction effect of chitosan and thymol concentration showed that melon slices treated with 1% chitosan with 0.25% or 0.5% thymol had the lowest microbial load. Coating with chitosan and thymol and the same type of packaging had a significant effect on all sensory attributes of melon slices (color, texture, smell, taste and overall acceptance) ($P<0.05$). Generally, the panelists preferred 1% chitosan over 2% in overall acceptanc.

Conclusion: The results showed that the physicochemical, sensory and microbial characteristics of fresh melon slices decrease during the storage period. Coating fresh-cut melons with chitosan and thymol due to its gas barrier and antimicrobial properties helped to preserve the quality and also prevent some undesirable changes. The integration of coating and packaging under modified atmosphere caused more maintaining the quality of fresh-cut melons. So that coating with chitosan 1% chitosan with thymol 0.5% and packed under modified atmosphere reduces microbial spoilage and preserves more qualitative features, color components and sensory attributes in fresh-cut melons.

Keywords: *Fresh-cut melon, Chitosan, Thymol, Storage time, Modified atmosphere.*

How to cite this article:

Sharayei, P., Nikkhah, S., (2023). Effect of coating and modified atmosphere packaging on the characteristics of fresh-cut melon during storage. *Innov. Food Technol.*, 10(4), 377-395.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22104/IFT.2023.6293.2143>



مقاله پژوهشی

اثر پوشش‌دهی و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییر یافته بر ویژگی‌های برش‌های تازه خربزه در طول انبارداری

پروین شرایعی^{۱*}، شهره نیکخواه^۲

۱. دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

۲. مریبی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

(تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر کیتوzan، تیمول و اتمسفر تغییر یافته بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی برش‌های تازه خربزه بود. بدین منظور، برش‌های خربزه (به ابعاد $4 \times 4 \times 4\text{ cm}^3$ و وزن تقریبی ۹ g) در محلول حاوی درصدهای مختلف کیتوzan (صفرا، ۱٪ و ۰.۲٪) و تیمول (صفرا، ۰.۰۵٪ و ۰.۰۱٪) به مدت ۲ دقیقه غوطه‌ور شدند. برش‌های تازه میوه پس از پوشش‌دهی و حذف محلول‌های اضافی و نمونه شاهد (پوشش‌داده نشده) در اتمسفر تغییریافته (۱۰٪ دی‌اکسیدکربن) و اتمسفر طبیعی بسته‌بندی و به مدت ۸ روز در دمای 4°C نگهداری شدند. نتایج بیانگر افزایش میزان دی‌اکسیدکربن و کاهش اکسیژن در بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح‌شده و اتمسفر طبیعی همگام با افزایش دوره ماندگاری بود. اما در نمونه‌های پوشش‌دهی شده با کیتوzan و تیمول شدت کاهش اکسیژن و افزایش دی‌اکسیدکربن کمتر از نمونه شاهد بود. در پایان ۸ روز نگهداری، افت وزنی در نمونه‌های پوشش‌دهی شده با کیتوzan و تیمول و نگهداری شده تحت اتمسفر تغییریافته بسیار کمتر از نمونه شاهد بود (۳۴٪ در مقایسه با ۶۰٪). افزایش غلظت کیتوzan و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته سبب افزایش حفظ میزان مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، اسید اسکوربیک و سفتی بافت برش‌های خربزه شد، اما افزایش غلظت تیمول تأثیر معنی‌داری بر این ویژگی‌های کیفی نداشت. شاخص‌های رنگی میزان سبزی- قرمزی (a^* ، b^* ، L^*)، میزان روشنایی (BI) و شاخص قهوه‌ای شدن (TGI) نیز تحت تأثیر نوع بسته‌بندی و غلظت کیتوzan قرار گرفتند. اما، تیمار با تیمول بر شاخص‌های رنگی برش خربزه تأثیر معنی‌داری نداشت. اثر متقابل غلظت کیتوzan و غلظت اسنس نشان داد که برش‌های خربزه تیمار شده با غلظت ۱٪ کیتوzan و غلظت‌های ۰.۲۵٪ و ۰.۰۵٪ تیمول دارای کمترین میزان بار میکروبی بودند. پوشش‌دهی با کیتوzan و تیمول و همچنین نوع بسته‌بندی بر همه صفات حسی برش‌های خربزه (رنگ، بافت، بو، طعم و پذیرش کلی) تأثیر معنی‌داری داشت ($P < 0.05$)؛ و ارزیابی در پذیرش کلی، غلظت ۱٪ کیتوzan را بر غلظت ۰.۲٪ ترجیح دادند. بنابراین، به نظر می‌رسد استفاده از پوشش‌دهنده‌های حاوی کیتوzan و تیمول و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته از توانایی مناسبی برای حفظ کیفیت برش‌های تازه خربزه برخوردار بوده و می‌تواند به عنوان یک تیمار سالم و مؤثر در نظر گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: اتمسفر تغییریافته، تیمول، برش تازه خربزه، زمان ماندگاری، کیتوzan

مورد توجه می‌باشد. کیتوزان نوعی پلی‌ساقارید چند قندی است که از استیل‌زادی کیتین (یکی از فراوان‌ترین پلیمرهای طبیعی) پوست سخت‌پوستان مثل خرچنگ و میگو به دست می‌آید و از واحدهای گلوکز آمین و ان‌استیل گلوکز آمین (با اتصالات بتا ۱ و ۴) تشکیل شده است این ماده به صورت منفرد و یا ترکیبی تحت عنوان نانوکامپوزیت و همراه با سایر مواد بیولوژیک نظری عصاره و یا اسانس گیاهان مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد [۶]. از اسانس دیگر، فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی با توجه به توانایی بالای خود برای حمل ترکیبات فعال از جمله ترکیبات ضدمیکروبی می‌توانند ماندگاری محصول را افزایش و خطر رشد پاتوژن‌ها در سطوح برش خورده را کاهش دهند [۷]. در میان مواد فعالی که به همراه پوشش‌ها به کار می‌روند، اسانس‌های گیاهی که موادی طبیعی و سازگار با طبیعت هستند، بسیار سودمند خواهند بود. منشأ طبیعی این ترکیب‌ها، نگرانی‌های مصرف‌کننده از اثرگذاری‌های سوء بقایای مواد شیمیایی در مواد غذایی را نیز برطرف می‌کند [۸]. تیمول (۲-ایزوپروپیل-۵-متیل فنل)، یک فنل مونوتربوتیئیدی با فرمول مولکولی $C_4H_{10}O$ و ایزومر کارواکرول^۳ است که در آب با pH خنثی به میزان کم حل می‌شود، اما در الکل‌ها و سایر حلال‌های آلی بسیار محلول است [۹].


Sun و همکاران (۲۰۲۲)، از فیلم‌های تهییه شده از کیتوزان حاوی عصاره پلی‌ساقاریدی جنسینینگ برای پوشش‌دهی برش‌های تازه خربزه استفاده کردند و بیان نمودند که کیتوزان به عنوان یک فیلم نیمه‌نفوذ‌پذیر با تغییر اتمسفر درونی (تفییر در نفوذ‌پذیری آب، اکسیژن و دی‌اکسید کربن) و با کم کردن سرعت تنفس پیری را به تأخیر می‌اندازد و فساد میوه طی ۴ روز نگهداری با افزودن عصاره پلی-ساقاریدی جنسینینگ نیز کاهش می‌یابد [۱۰]. Qiao و همکاران (۲۰۱۹)، برش‌های تازه خربزه را با محلول حاوی کیتوزان-دی‌اکسید نانوتیتانیوم-تیمول-تؤین پوشش‌دهی نمودند و گزارش کردند این پوشش از کاهش مالون‌دی‌آلدئید و میزان مواد جامد محلول در میوه جلوگیری نموده و میزان

۱. مقدمه خربزه (*Cucumis melo* L.)، یکی از مهم‌ترین محصولات جالیزی است که از زمان‌های قدیم در ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است و در حال حاضر بعد از هندوانه بیشترین سطح زیرکشت و تولید را در بین محصولات جالیزی کشور دارد می‌باشد. طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سطح زیرکشت خربزه در کشور ۴۴ هزار هکتار بوده که مقدار تولید سالیانه آن بالغ بر ۱۰۷۴ هزار تن می‌رسد [۱] که به صورت سنتی به بازار ارائه و مصرف می‌شود. با توجه به روند رو به رشد صنایع غذایی و ایجاد امکانات بهینه برای مصرف‌کنندگان، استفاده مناسب از فرآورده‌ها با کمترین ضایعات و ایجاد شرایطی که آنها بتوانند در هر زمان و هر موقعیت جغرافیایی از انواع فرآورده‌های زراعی و باگی استفاده کنند، توسعه یافته است [۲]. صنعت میوه و سبزی تازه برش خورده^۱ از بخش‌های نسبتاً جدید و در حال رشد صنعت تولید فرآورده‌های تازه غذایی است. فرآورده‌های آماده مصرف، علاوه بر آسانی مصرف، مزایایی مانند ارزش‌افزوده بالاتر، کاهش ضایعات و تلفات، افزایش تنوع محصول، امنیت و کیفیت بهبود یافته و همچنین کار کمتر در فروشگاه‌ها را به همراه دارند [۳].

کیفیت و عمر انبارمانی میوه‌ها و سبزی‌ها توسط عوامل گوناگونی مثل کاهش آب، قهوهای شدن آنزیمی، آسیب بافتی، فرآیند پیری و رشد میکروبی و غیره کاهش می‌یابد. در مورد میوه‌های برش خورده، این اتفاق به دلیل آسیب بافتی که به وسیله پوست کنند، قطعه قطعه کردن و بریدن به وجود آمده است، افزایش می‌باید [۴]. استفاده از پوشش بر سطح فرآورده‌های برش داده شده برای افزایش عمر ماندگاری با حفظ کیفیت و همچنین جلوگیری از ایجاد بعضی تغییرات نامطلوب پیشنهاد شده است [۵]. کیتوزان یکی از نگهدارنده‌های طبیعی و پوششی فعال است که به علت طبیعت غیررسمی، فعالیت ضد اکسایشی، ضد میکروبی، خاصیت تشکیل فیلم، زیست‌سازگاری و زیست‌تخربی‌پذیری به عنوان یکی از افزودنی‌های طبیعی

2. carvacrol

1. Fresh-cut



می شود که به افزایش ماندگاری محصول منتهی می شود [۱۸، ۱۷، ۱۹]. Kale و همکاران (۲۰۲۰) گزارش نمودند استفاده از اتمسفر تغییر یافته شامل ۱۰٪ دی اکسید کربن، ۳٪ اکسیژن و یا ۱۰۰٪ نیتروژن سبب افزایش زمان ماندگاری برش های تازه خربزه تا ۲۱ روز با حفظ خصوصیات فیزیکو شیمیایی، حسی و کاهش رشد میکروبی می شود [۲۰]. Minh و همکاران (۲۰۲۰)، اثرات غلظت های مختلف گازهای اکسیژن (۱/۵٪ تا ۱/۵٪)، دی اکسید کربن (صفر تا ۱/۱۵٪)، و نیتروژن (۰٪ تا ۱۰۰٪) را بر برش های خربزه کانتالوپ مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر آن بود که اتمسفر حاوی ۱۰٪ دی اکسید کربن، ۱۰٪ اکسیژن و ۸۰٪ نیتروژن سبب افزایش زمان ماندگاری برش های خربزه تا ۱۴ روز (دما نگهداری 12°C)، با حفظ خصوصیات کیفی می شود [۲۱].

با توجه به اهمیت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از یک سو و اهمیت اقتصادی محصولات آماده به مصرف و ماندگاری آن از سوی دیگر، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پوشش دهنده و نگهدارنده طبیعی و همچنین بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته در مقایسه با اتمسفر طبیعی بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و حسی برش های تازه خربزه (رقم تاشکنندی) و ماندگاری آن در دما 4°C بود.

۲. مواد و روش ها

۱.۲ مواد اولیه

مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل میوه خربزه رقم تاشکنندی بود. مواد بسته بندی شامل پلی اتیلن با دانسیته بالا (به عنوان سینی) و پلی آمید- پلی اتیلن با ضخامت $85\text{ }\mu\text{m}$ (به عنوان لفاف) از شرکت زرین آسیا و کیتوزان (وزن مولکولی متوسط 854 kDa ، درجه استیل زدایی ۸۸/۵٪ و درجه مصرف خوارکی)، کلور کلسیم، توتیین ۸۰، اسیداستیک، تیمول (خلوص ۹۸/۵٪ و درجه مصرف خوارکی) و سایر مواد شیمیایی مورد نیاز از شرکت های مرک و سیگما با درجه خلوص ۹۹/۵٪ تهیه شدند.

رشد کپک و مخمر را از ۲/۶ به ۱/۶ logcfu/g کاهش می دهد [۱۱]. Chen و همکاران (۲۰۲۱) نیز از پوشش دهی آلزینات حاوی اسانس تیمول برای برش های تازه سیب استفاده نمودند. نتایج بیانگر اثرات ضد میکروبی پوشش بر علیه میکرووارگانیسم های استافیلکوکس اورئوس و اشترشیا کولی بود و میوه های پوشش دهی شده با این ترکیبات کاهش افت وزنی کمتری با حفظ رنگ و مواد مغذی داشتند [۱۲]. Ortiz-Duarte و همکاران (۲۰۱۹)، از نانو کامپوزیت کیتوزان- نقره برای پوشش دهی برش های تازه خربزه استفاده نمودند. نتایج نشان داد پوشش دهی با کاهش شدت تنفس سبب حفظ رنگ، اسید قابل تیتراسیون، میزان مواد جامد محلول، قند های گلوکز و فروکتوز، اسید های آلی سیتریک و مالیک و خواص حسی در برش های خربزه نگهداری شده در 5°C و 12°C شد [۱۳]. Poverenov و همکاران (۲۰۱۴) از پوشش آلزینات- کیتوزان برای برش های خربزه استفاده نمودند و بیان نمودند که این پوشش علاوه بر دارا بودن خاصیت چسبندگی آلزینات، خاصیت ضد میکروبی کیتوزان را هم دارد لذا سبب کاهش رشد باکتری ها، کپک ها و قارچ ها به میزان ۱ تا ۲ سیکل لگاریتمی می شود [۱۴]. Almela و همکاران (۲۰۱۳) از غلظت های متفاوت انسانس های گیاهی آویشن و لیمو برای افزایش عمر انباری برش خرمالو استفاده نمودند. این محققان نتیجه گرفتند که روغن های اساسی در مدت انبارداری رنگ و کیفیت میکروبی میوه را حفظ نمودند اما بر بافت برش های میوه تأثیر معنی داری نداشتند [۱۵]. Zsivanovits و همکاران (۲۰۱۲)، افزایش عمر انباری برش های خربزه را به دلیل پوشش دهی میوه با محلول کیتوزان و محلول های اسید لاکتیک و لاکتان گزارش نمودند [۱۶]. استفاده از بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته نیز یک روش فراگیر و کارآمد دیگر برای کنترل تغییرات ناخواسته و افزایش زمان ماندگاری محصولات تازه برش خورده است. گزارش های متعددی وجود دارند که بیان می کنند بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته (افزایش غلظت دی اکسید کربن و کاهش غلظت اکسیژن) سبب کاهش میزان تنفس، تولید اتیلن، سرعت رسیدگی، فساد میکروبی، تجزیه ترکیبات مغذی و همچنین حفظ دیواره سلولی و ظاهر محصول

۳.۲ آزمون‌ها

۱۰.۳.۲ مواد جامد محلول در آب

درصد مواد جامد محلول، با استفاده از رفراکتومتر رومیزی (مدل Shouchit Tongliang) در دمای محیط اندازه‌گیری و گزارش شد [۲۲].

۲۰.۳.۲ مقدار اسید قابل تیتر

اسید قابل تیتر کردن، با تیتراسیون عصاره با سود ۱/۰ نرمال در مجاورت فنل فتالئین (تا رسیدن به رنگ صورتی ماندگار به مدت ۳۰s) و بر حسب درصد اسید مالیک محاسبه و گزارش شد [۲۲]. برای تهیه عصاره، ۱۰g میوه خردشده به ۱۰۰ml آب افزوده و سپس صاف شد.

۳.۳.۲ اسید اسکوربیک

به ۵ ml آب میوه، ۲۰ ml آب مقطر و ۲ ml معرف آمیدن ۱٪ اضافه شد و با محلول ید N ۰/۰۱ حاوی g ۱۶ یدورپتاسیم در لیتر، تیتر شد سپس میزان ویتامین ث موجود در آب میوه از رابطه (۱) محاسبه شد [۲۲].

$$AA = \left(\frac{0.88 \times V_t}{V_j} \right) \times 100 \quad (1)$$

که V_t حجم مصرفی محلول ید و V_j حجم آب میوه می‌باشد.


۴.۳.۲ رنگ

ابتدا تصویر نمونه برش خربزه به کمک اسکنر (مدل Hp Scan Jet 3010) ساخت کشور کانادا) گرفته شد. بهمنظور جلوگیری از ورود هرگونه نور جانبی، سطح اسکنر با پارچه کاملاً سیاه و ضخیم پوشانیده شد. تصاویر با وضوح ۳۰۰ dpi و فرمت JPEG ذخیره شدند. پس از انتقال تصاویر به رایانه، مختصات رنگی آنها در فضای رنگی Lab با نرم‌افزار j Image (version 1.40g) استخراج شد. فضای رنگی $L^* a^* b^*$ دارای سه شاخص است. شاخص L^* معرف میزان روشنی نمونه می‌باشد و دامنه آن از صفر (سیاه خالص) تا ۱۰۰ (سفید خالص) متغیر است. شاخص a^* میزان نزدیکی رنگ نمونه به رنگ‌های سبز و قرمز را نشان می‌دهد و دامنه آن از -۱۲۰ (سبز خالص) تا +۱۲۰ (قرمز خالص) متغیر است. شاخص b^*

۲۰.۲ آماده‌سازی و بسته‌بندی برش‌های خربزه

میوه خربزه با رسیدگی کامل در زمان مناسب با توجه به شاخص‌های رسیدگی (رنگ پوست، خشک شدن پیچک نزدیک به دم میوه، تراکم تور روی پوسته بیرونی میوه) برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی، در همان روز برش‌های میوه تهیه شدند. بدین منظور، سطح خارجی میوه با محلول سدیم هیپوکلریت (با غلظت ۲۰۰ ppm) ضدعفونی شد و برش‌های مکعبی به ابعاد $4 \times 4 \times 4$ cm³ و وزن تقریبی ۹g از آن تهیه گردید. برای تهیه محلول پوشش‌دهی، ۱ g یا ۲ g کیتوزان با ۰/۵٪ توبیین ۸۰ در ۱۰۰g محلول اسیداستیک ۱٪ حل و تیمول در ۳ سطح (صفر، ۰/۲۵ و ۰/۰۵٪ محلول اسیداستیک) به محلول اضافه شد. pH نهایی محصول بهوسیله سود ۱M ۰/۰۵ روی ۵/۶ تنظیم شد. سپس محلول به مدت ۲ min با همزن مغناطیسی (۱۵۰ rpm) به صورت همگن در آمد. برش‌های میوه در هریک از محلول‌ها به طور جداگانه به مدت ۲ min غوطه‌ور شدند. پس از پوشش‌دهی و حذف محلول‌های اضافی، برش‌های میوه به مدت ۸ min در دمای اتاق خشک شدند. مقدار ۳۰±۲ g نمونه‌های تیمار شده و نمونه شاهد (پوشش داده نشده، غلظت کیتوزان و اسانس صفر درصد، غوطه‌ور شده در آب مقطر با pH معادل ۵/۶) داخل ظرف پلی‌اتیلنی توزین شده و با فیلم دولایه (به ضخامت کلی ۸۵ μm با لایه خارجی پلی‌اتیلن و لایه داخلی پلی‌آمید) در اتمسفر تغییریافته و اتمسفر طبیعی بسته‌بندی شدند. تغییر اتمسفر با استفاده از دستگاه MAP (MAP Henkelman، ساخت هلند) مجهز به سیستم تزریق گاز A200Gerhardt انجام شد. سطوح گازهای دی‌اکسیدکربن، اکسیژن و نیتروژن در داخل بسته بلافاصله پس از درزبندی به ترتیب ۵، ۱۰ و ۰/۸۵٪ بود.

بسته‌های حاوی برش‌های تازه خربزه پس از آماده شدن به مدت ۸ روز در دمای C ۴±۲° (یخچال) قرار داده شدند. بهمنظور نمونه‌برداری سه بسته از هر تیمار و از هر اتمسفر به طور تصادفی انتخاب شد. همه آزمون‌های فیزیکی-شیمیایی در ۳ نقطه زمانی شامل بلافاصله پس از بسته‌بندی و پس از ۴ و ۸ روز انجام شدند.



گرفتند. بدین منظور پس از تهیه رقت سریالی در محلول سرم فیزیولوژی استریل، مقدار ۰/۱ ml به صورت پورپلیت (تعداد کل میکروارگانیسم‌ها) و کشت سطحی (تعداد کل کپک و مخمر) در پلیت‌های محتوی محیط کشت قرار گرفت. شمارش کلی میکروب‌ها و کپک و مخمر به ترتیب پس از مدت حداقل ۴۸ h نگهداری در دمای ۲۵°C و پس از حدود ۵ روز گرمخانه‌گذاری در دمای ۳۰°C انجام شد. در این آزمایش‌ها برای شمارش کلی میکروبی از محیط کشت استاندارد پلیت‌کانت‌آگار (PCA) و برای آزمایش‌های مربوط به کپک و مخمر از محیط کشت پوچیتو دکستروز‌آگار (PDA) استفاده شد. در نهایت تعداد میکروارگانیسم به صورت logcfu/g گزارش شد [۲۷].

۹.۳.۲ آزمون حسی

در پایان مدت نگهداری، صفات رنگ، بو، بافت و کیفیت کلی نمونه میوه توسط ۱۰ ارزیاب آموزش‌دهیه مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابان از آزمون هدونیک ۵ امتیازی (۱=بسیار بد و ۵=بسیار خوب) استفاده نموده و امتیاز بیشتر یا مساوی ۳ مورد قبول بود [۲۸].

۴.۲ تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های حاصل از آزمایش‌های مختلف با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار تجزیه و تحلیل آماری شدند. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف کیتوزان (۰،۰٪ و ۰،۲٪)، تیمول (۰،۰٪ و ۰،۲۵٪)، نوع بسته‌بندی (اتمسفر تغییریافته و طبیعی) و مدت نگهداری (بالاصله بعد از بسته‌بندی، پس از ۴ و ۸ روز نگهداری) بودند. میانگین‌ها با نرم‌افزار MStatC و بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵٪ مقایسه شدند ($p < 0.05$). برای رسم منحنی‌ها از نرم‌افزار Microsoft Excel 2013 استفاده شد.

۳. نتایج و بحث

۱.۳ تغییرات گاز داخل بسته‌ها

مقایسه میانگین اثر متقابل متغیرها (غلظت کیتوزان، غلظت تیمول، نوع اتمسفر بسته‌بندی (اتمسفر تغییریافته و طبیعی)

میزان نزدیکی رنگ نمونه به رنگ‌های آبی و زرد را نشان می‌دهد و دامنه آن از ۱۲۰- (آبی خالص) تا + (زرد خالص) متغیر می‌باشد. همچنین شاخص قهوه‌ای شدن^۱ با استفاده از رابطه‌های (۲ و ۳) محاسبه شد [۲۴]:

$$BI = \frac{100 \times (X - 0.31)}{0.172} \quad (2)$$

$$X = \frac{a^* + 0.175 \times L^*}{5.645 \times L^* + a - 0.12 \times b^*} \quad (3)$$

۵.۳.۲ بافت

سفتی بافت برش‌های میوه توسط دستگاه بافت‌سنجد (CNS Farnell, Hertfordshire, UK)، با آزمایش نفوذ با استفاده از پروب با قطر ۲ mm، سرعت ۱ mm/s، لود سل^۲ برابر با ۵ Kg و میزان نفوذ ۹۰٪ انجام شد. سفتی بافت بر حسب N با استفاده از شیب منحنی نیرو- تغییر شکل گزارش شد [۲۵].

۶.۳.۲ میزان کاهش وزن

درصد کاهش وزن، با استفاده از ترازو و محاسبه اختلاف وزن اولیه و ثانویه اندازه‌گیری، محاسبه و گزارش شد [۲۶].

$$W_L = \frac{W_i - W_f}{W_i} \times 100 \quad (4)$$

که W_L , W_i و W_f به ترتیب افت وزنی (٪)، وزن اولیه و وزن نهایی (g) می‌باشند.

۷.۳.۲ اندازه‌گیری غلظت گازهای موجود در بسته

غلظت گاز درون بسته با استفاده از دستگاه آنالایزر قابل حمل (OXYBABY VO₂/CO₂) ارزیابی شد. برای این کار سرنگ دستگاه را درون فضای بسته فرو کرده و سپس دستگاه ۵ ml از گاز داخل بسته را به داخل سیستم مکش کرده و به صورت اتوماتیک غلظت گاز اکسیژن و دی-اکسیدکربن داخل بسته گزارش می‌شود.


۸.۰.۲ آزمایش‌های میکروبی

در پایان مدت نگهداری، نمونه‌ها از نظر شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها و تعداد کپک و مخمر مورد ارزیابی قرار

1. Browning Index
2. Load Cell


همسو است [۳۰، ۲۹]. این محققین نشان دادند که غلظت گاز اکسیژن و دی‌اکسیدکربن طی ماندگاری در بسته‌های هلو (بسته‌بندی شده با فیلم پلی‌اتیلن با دانسیته پایین ۳۰، روز ماندگاری در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۰ و به دنبال آن ۳ روز در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۲۵) و میوه انار (بسته‌بندی شده در فیلم Xtend ۶ ماه نگهداری در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۶ و رطوبت نسبی ۹۰٪ و به دنبال آن ۷ روز نگهداری در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۲۰) تحت اتمسفر کنترل شده به ترتیب کاهش و افزایش یافت. به طوری که پس از پایان دوره نگهداری غلظت اکسیژن و دی‌اکسیدکربن در فیلم پلی‌اتیلن با دانسیته پایین به ضخامت $60\text{ }\mu\text{m}$ به ترتیب به ۵ و ۶٪ و در فیلم با ضخامت $80\text{ }\mu\text{m}$ به ترتیب ۱ و ۱۶٪ رسید. همچنان مقدار گاز اکسیژن در بسته‌های دارای فیلم Xtend تا ۲ ماه با شبیه تند کاهش و سپس تا ماه ۴، افزایش جزئی و پس از آن تا ماه ۶ دوباره کاهش (به ترتیب ۱۲/۹۰، ۱۳/۹۹ و ۱۳/۶۳ KPa) یافت و روند تغییرات دی‌اکسیدکربن معکوس بود.

و مدت زمان نگهداری) بر تغییرات سطح گازهای اکسیژن و دی‌اکسیدکربن در فضای داخل بسته‌ها به ترتیب در شکل‌های (۱ و ۲) آورده شده است. نتایج تجزیه واریانس بیانگر معنی‌دار بودن اثر مستقل نوع اتمسفر بسته‌بندی بر سطح گازهای اکسیژن و دی‌اکسیدکربن داخل بسته‌ها بود ($P<0.05$). بهطور کلی با افزایش زمان نگهداری سطح گاز اکسیژن در داخل بسته‌ها به دلیل مصرف آن در واکنش‌های بیوشیمیایی و میکروبی کاهش یافت. همچنین نتایج گویای افزایش معنی‌دار سطح دی‌اکسیدکربن در تمامی بسته‌ها در طول دوره نگهداری بود. این تغییرات در ۴ روز اول نگهداری با شدت بیشتری رخ داد. سطح نفوذپذیری بالاتر فیلم به گاز سبب تخلیه سریع‌تر اکسیژن و هم‌زمان تشكیل دی‌اکسیدکربن بیشتر می‌شود که متابولیسم تنفس را از حالت هوایی به بی‌هوایی تبدیل کرده و در تغییر اتمسفر داخل بسته تأثیرگذار است. نتایج این پژوهش با نتایج Mendes و همکاران (۲۰۱۸) و Candir (۲۰۱۸) همکاران



شکل (۱) مقایسه میانگین اثر متقابل متغیرها (غلظت کیتوزان، غلظت تمیول، نوع اتمسفر بسته‌بندی و زمان نگهداری) بر تغییرات گاز اکسیژن در بسته‌های مختلف برش‌های تازه خربزه (در تیمارها حروف C و T نشان‌دهنده به ترتیب پوشش دهنده با کیتوزان و تمیول است و اعداد نشان‌دهنده غلظت این ترکیبات است). میله‌های رسم شده نشانگر انحراف معیار داده‌هایست. حروف غیرمشابه بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می‌باشد ($P<0.05$).

Fig 1. Mean comparisons of interaction effect of variables (chitosan concentration, thymol concentration, type of packaging atmosphere and storage time) on the changes in O₂ level inside the different fresh-cut melon packages (in the treatments, the letters C and T indicate coating with chitosan and thymol, respectively, and the numbers indicate the concentration of these compounds). Error bars shows standard deviation (SD). Non-similar letters indicate a significant difference according to the Duncan test ($P<0.05$).



شکل (۲) مقایسه میانگین اثر متقابل متغیرها (غلظت کیتوzan، غلظت تمول، نوع اتمسفر بسته بندی و زمان نگهداری) بر تغییرات گاز دی اکسیدکربن در بسته های مختلف برش های تازه خربزه (در تیمارها حروف C و T نشان دهنده به ترتیب پوشش دهی با کیتوzan و تمول است و اعداد نشان دهنده غلظت این ترکیبات است). میله های رسم شده نشانگر انحراف معیار داده هاست. حروف غیر مشابه بیانگر وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می باشد (P<0.05).

Fig 2. Mean comparisons of interaction effect of variables (chitosan concentration, thymol concentration, type of packaging atmosphere and storage time) on the changes in CO₂ level inside the different fresh-cut melon packages (in the treatments, the letters C and T indicate coating with chitosan and thymol, respectively, and the numbers indicate the concentration of these compounds). Error bars shows standard deviation (SD). Non-similar letters indicate a significant difference according to the Duncan test (P<0.05).

همکاران (۲۰۱۶) نیز نشان دهنده کاهش شدت تنفسی در اثر تیمار ریشه های نیلوفر آبی تازه برش دهشده با تمول (۳ و ۵٪) تحت اتمسفر تغییر یافته در فیلم هایی از جنس پلی اتیلن سبک اصلاح شده بود؛ به طوری که غلظت گاز اکسیژن طی ۸ روز ماندگاری در دمای ۴°C و رطوبت نسبی ۹۶٪ در نمونه های حاوی ۳ و ۵٪ به ترتیب ۱۰ و ۱۵/۵٪ بود که اختلاف معنی داری با نمونه شاهد (فاقد تمول) داشت (۰/۴٪). این محققین همچنین بیان کردند روند تغییرات دی اکسیدکربن معکوس بود [۳۳].


۲۰.۳ افت وزن

تغییرات درصد کاهش وزن نمونه های مختلف برش خربزه در طول ۸ روز نگهداری در دمای ۴°C تحت اتمسفر طبیعی و تغییر یافته در شکل ۳ نشان داده شده است. حفظ وزن خالص میوه ها تا زمان تحویل برای بازاریابی ضروری است. افت وزنی

همان طور که از شکل های (۱) و (۲) مشاهده می شود، در بسته های حاوی برش های پوشش دهی شده با کیتوzan و تمول شدت کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسیدکربن کمتر از نمونه شاهد بود. این پدیده احتمالاً به دلیل خاصیت ممانعت کننده گازی پوشش کیتوzan و خاصیت ضد میکروبی تیمول می باشد که با کاهش شدت تنفسی سبب کاهش مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن می شوند. [۳۱، ۱۰]. نتایج Liguori و همکاران (۲۰۲۱) نشان داد غلظت گاز اکسیژن و دی اکسیدکربن طی ماندگاری میوه انگور تیمار شده با کیتوzan ۱٪ و بسته بندی شده تحت اتمسفر تغییر یافته

(۰/۱۰٪ دی اکسیدکربن و ۰/۲۱٪ اکسیژن) با فیلم پلی اتیلن با دانسیته بالا طی ۱۴ روز نگهداری در دمای ۵°C و رطوبت نسبی ۹۰٪ به ترتیب ۱۰ و ۱۵٪ بود، در حالی که در نمونه های پوشش دهی نشده غلظت گاز اکسیژن و دی اکسیدکربن بعد از ۱۴ روز به ترتیب ۸ و ۸٪ بود [۳۲]. نتایج Fu و

علاوه بر اثر مستقیم بر کمیت، بر ظاهر، بافت و کیفیت تغذیه‌ای نیز تأثیرگذار است. اثر مستقل متغیرها (غلظت کیتوزان، غلظت تیمول، نوع اتمسفر بسته‌بندی و طول مدت نگهداری) و اثرات متقابل آنها بر افت وزنی بسته‌ها معنی‌دار بود ($P < 0.05$). مقایسه میانگین‌ها نشان داد با افزایش زمان نگهداری افت وزنی به طور معنی‌داری افزایش بافت و بعد از ۸ روز نگهداری در نمونه‌های بدون پوشش و نگهداری شده در اتمسفر طبیعی به 13.6% رسید. افزایش افت وزنی در طول زمان نگهداری، به‌دلیل اثر تبخیر و تنفس (تولید آب، و گرما و مصرف قند) رخ می‌دهد. همچنین نتایج نشان داد وزن میوه‌ها در روزهای آخر نگهداری با شبیه بیشتری کاهش یافت. این پدیده، احتمالاً به‌علت افزایش فعالیت متابولیکی و همچنین رشد سریع میکروبی با تخریب بافت میوه می‌باشد. [۳۴]. اما در مطالعات قبلی نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه پوشش و اتمسفر تغییریافته در قطعات تازه برش خورده گلابی، هویج و انار دارد [۳۶]. انسان‌ها نیز به دلیل داشتن ویژگی‌های آبگریز به همراه پوشش کیتوزان سبب کاهش از دست دادن رطوبت در میوه‌ها می‌شوند [۱۲، ۳۸]. همچنین نتایج نشان داد ترکیب انسان با کیتوزان و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته با افزایش فعالیت‌های ضدمیکروبی و قابلیت تشکیل لایه‌ها و مواد بخار آب میزان افت وزنی را به میزان چشم‌گیری کاهش داد.



شکل (۳) مقایسه میانگین اثر مقابل متغیرها (غلظت کیتوزان، غلظت تیمول، نوع اتمسفر بسته‌بندی و زمان نگهداری) بر میزان افت وزنی (%) برش-های تازه خربزه (در تیمارها حروف C و T نشان دهنده به ترتیب پوشش دهی با کیتوزان و تیمول است و اعداد نشان دهنده غلظت این ترکیبات است). میله‌های رسم شده نشانگر انحراف معیار داده‌های است. حروف غیر مشابه بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می‌باشد.
 $P < 0.05$

Fig 3. Mean comparisons of interaction effect of variables (chitosan concentration, thymol concentration, type of packaging atmosphere and storage time) on the amount of **weight loss (%)** of fresh-cut melon (in the treatments, the letters C and T indicate coating with chitosan and thymol, respectively, and the numbers indicate the concentration of these compounds). Error bars shows standard deviation (SD). Non-similar letters indicate a significant difference according to the Duncan test ($P<0.05$).

کمتر مواد جامد محلول نسبت به نمونه شاهد شد. همچنین

با افزایش غلظت کیتوzan و تیمول حفظ این ویژگی کیفی افزایش یافت. کیتوzan به واسطه ایجاد یک مانع در مقابل عبور گازها و با کاهش تنفس، تلفات آبمیوه، تبادلات گازی و تولید اتیلن سبب ثبیت مواد جامد محلول می شود. در حالی که در تیمار شاهد به دلیل پیشرفت پدیده پیری، پلی ساکاریدهای دیواره سلولی هضم شده و مواد جامد محلول افزایش می یابد [۴۲]. همچنین کاهش سطح اکسیژن و بالا بردن سطح دی اکسید کربن با سرکوب کردن سنتز اتیلن سبب کاهش شدت تنفسی و فعالیت های متابولیکی می شود و در نتیجه پیشرفت پدیده پیری به تأخیر می افتد. Ortiz-Duarte و همکاران (۲۰۱۹) گزارش نمودند که میزان مواد جامد برش های خربزه محلول از ۱۰/۷ به ۹/۷ طی ۱۳ روز نگهداری در دمای C^۵ کاهش یافت؛ در حالی که در نمونه های تیمار شده با کیتوzan (استخراج شده از خرچنگ پنجه قرمز) میزان کاهش مواد جامد محلول بسیار کم و جزئی بود (میزان مواد جامد پس از ۱۳ روز نگهداری، ۱۰/۵٪ بود) [۴۳]. Liguori و همکاران (۲۰۲۱) نیز گزارش نمودند میزان مواد جامد محلول در برش خربزه قبل از هر تیماری بهتر مواد جامد محلول میوه انگور طی ۷ روز نگهداری در دمای C^۵ شد [۳۲].

۳.۰.۳ درصد مواد جامد محلول

تغییرات درصد مواد جامد محلول نمونه های مختلف برش خربزه در طول ۸ روز نگهداری در دمای C^۴ تحت اتمسفر طبیعی و تغییر یافته در جدول ۱ نشان داده شده است. میزان مواد جامد محلول در کنار سفتی بافت میوه، کاربرد گستره های برای تعیین کیفیت پس از برداشت میوه ها دارد و با دیگر صفات، ارتباط نزدیکی دارد [۳۹]. همان طور که مشهود است در همه بسته ها میزان مواد جامد محلول نمونه های برش خربزه پس از ۴ روز انبارداری کاهش یافت که این کاهش در تمامی نمونه ها معنی دار بود ($P < 0.05$). در روزهای بعد انبارداری تا روز هشتم، میزان مواد جامد محلول نمونه ها دستخوش نوسان بود که این نوسانات در نمونه های مختلف از روند خاصی تعییت نمی کرد. مصرف سوبسترا از طریق تنفس محصول یا فعالیت میکرو اگانیسم ها سبب تغییر میزان مواد جامد محلول می شود [۴۰]. افزایش مواد جامد محلول طی انبارداری و بلوغ فیزیولوژیک میوه به علت فعالیت آنزیم ساکارز فسفات سنتراز می باشد که نشاسته را به قندهای ساده مثل گلوگز فسفات تبدیل می کند [۴۱].

میزان مواد جامد محلول در برش خربزه بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته و کیتوzan سبب حفظ ۹/۷۵٪ بود و پوشش دهی با محلول کیتوzan و تیمول و همچنین بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده سبب کاهش

جدول (۱) مقایسه میانگین اثر متقابل متغیرها (غلظت کیتوzan، غلظت تیمول، نوع اتمسفر بسته بندی و زمان نگهداری) بر میزان مواد جامد محلول

(٪) برش های تازه خربزه

Table 1. Mean comparisons of interaction effect of variables (chitosan concentration, thymol concentration, type of packaging atmosphere and storage time) on the amount of TSS (%) of fresh-cut melon

Packaging type	Modified atmosphere			Natural atmosphere		
				Harvesting time= 9.75± 0.12		
Storage time (day)	0(after packaging)	4	8	0(after packaging)	4	8
C0T0	9.73±0.06 ^a	7.25 ±0.08 ^p	7.05 ± 0.12 ^p	9.81±0.06 ^a	7.87 ±0.03 ^{no}	8.12 ± 0.04 ^{lm}
C0T.25	9.72±0.06 ^a	7.82 ± 0.12 ^o	7.98 ± 0.05 ^{mo}	9.80±0.04 ^a	8.72 ± 0.09 ^{ef}	8.15 ± 0.01 ^l
C0T.5	9.75 ±0.04 ^a	8.35 ± 0.14 ^{lk}	8.15 ± 0.02 ^l	9.74±0.08 ^a	8.97 ± 0.09 ^{bc}	8.45 ± 0.04 ^{jl}
C1T0	9.74±0.06 ^a	8.37 ± 0.09 ^j	8.25 ± 0.04 ^k	9.75±0.06 ^a	8.67 ± 0.02 ^t	8.37 ± 0.13 ^{jk}
C1T.25	9.71±0.07 ^a	8.63 ± 0.11 ^{fg}	8.37 ± 0.05 ^l	9.73±0.07 ^a	8.95 ± 0.05 ^{bc}	8.62 ± 0.04 ^{fg}
C1T.5	9.78±0.05 ^a	8.87 ± 0.23 ^{bcd}	8.56 ± 0.01 ^{gh}	9.76±0.05 ^a	9.05 ± 0.05 ^b	8.57 ± 0.03 ^{gh}
C2T0	9.74±0.05 ^a	8.52 ± 0.03 ^{hi}	8.13 ± 0.04 ^{lm}	9.73±0.08 ^a	8.77 ± 0.01 ^e	8.48 ± 0.06 ^{hij}
C2T.25	9.80±0.04 ^a	8.87 ± 0.09 ^{cde}	8.88 ± 0.05 ^{ed}	9.74±0.07 ^a	9.01 ± 0.00 ^b	8.83 ± 0.04 ^{de}
C2T.5	9.76±0.04 ^a	9.01 ± 0.06 ^b	8.75 ± 0.06 ^{ef}	9.79±0.03 ^a	9.11 ± 0.10 ^b	9.03 ± 0.05 ^b

In the treatments, the letters C and T indicate coating with chitosan and thymol, respectively, and the numbers indicate the concentration of these compounds. Non-similar letters in total data (means± SD) indicate a significant difference according to the Duncan test ($P<0.05$).

در تیمارها حروف C و T نشان دهنده به ترتیب پوشش دهی با کیتوzan و تیمول است و اعداد نشان دهنده غلظت این ترکیبات است. حروف غیر مشابه در داده ها (میانگین ± انحراف معیار)، بیانگر وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می باشد ($P < 0.05$).

(۲۰۱۸) نیز بیان کردند که انارهای بسته‌بندی شده در اتمسفر تغییریافته در دمای 6°C اسیدیته بالاتری نسبت به شاهد داشتند در حالی که در ۷ روز بعدی نگهداری در دمای 20°C اسیدیته در هر دو مشابه بود [۲۹]. حضور دی-اکسیدکربن در فضای بسته‌بندی و حل شدن آن در پیکره محصول می‌تواند با تشکیل اسیدکربنیک، آمینواسیدها و اسیدهای چرب آزاد طی واکنش‌های پروتئولیز و لیپولیز همراه باشد که به افزایش اسید قابل تیتراسیون منجر می‌شود [۴۵]. گزارش شده است که تنفس مهم‌ترین فاکتور است که می‌تواند قندها را در حضور اکسیژن به انرژی تبدیل کند؛ بنابراین کاهش اسیدیته می‌تواند به افزایش غلظت اکسیژن نیز مربوط باشد [۴۶]. همچنین فعالیت میکروگانیسم‌ها می‌تواند باعث تخمیر و ترشیدگی و در نتیجه افزایش اسیدیته شود.

۴.۳ اسید قابل تیتر

نتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی‌دار بودن اثرات مستقل نوع بسته‌بندی، مدت زمان نگهداری و غلظت کیتوزان بر مقدار اسید قابل تیتراسیون برش‌های خربزه بود ($P<0.05$) که در جدول ۲ نشان داده شده است. بررسی اثر مستقل مدت زمان نگهداری نشان داد که اسیدیته در طول ۴ روز اول نگهداری به‌طور معنی‌دار کاهش یافت و سپس تا پایان مدت نگهداری ثابت باقی ماند. در نمونه‌های پوشش‌دهی شده با افزایش غلظت کیتوزان به 1% میزان اسیدیته افزایش یافت؛ اما افزایش بیشتر غلظت آن به 2% سبب کاهش میزان این ویژگی کیفی شد، به طوری که با نمونه پوشش‌دهی شده تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. اثر مستقل غلظت تیمول بر میزان اسید قابل تیتراسیون، معنی‌دار نبود ($P>0.05$). همچنین بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته سبب حفظ بهتر اسید قابل تیتراسیون میوه‌ها شد. Cendir و همکاران

جدول (۲) مقایسه میانگین اثر مستقل پوشش‌دهنده کیتوزان، غلظت تیمول، نوع بسته‌بندی و مدت انبارمانی بر میزان اسید قابل تیتر، اسید اسکوربیک و سفتی یافته برش‌های تازه خربزه

Table 2. Comparison of the average independent effect of chitosan coating, thymol concentration, packaging type and storage period on the amount of titratable acidity, Ascorbic acid and firmness of fresh - cut melon

Independent effect of variables	Variable levels	titratable acid (mg Malic acid / 100g)	Ascorbic acid (%)	Firmness (N)
Storage time (day)	0 (after packaging)	0.15 ± 0.008^a	10.56 ± 0.59^a	2.51 ± 0.09^a
	4	0.11 ± 0.002^b	6.55 ± 0.19^b	1.70 ± 0.13^b
	8	0.11 ± 0.003^b	6.05 ± 0.13^c	1.64 ± 0.09^b
Chitosan concentration (%)	0	0.12 ± 0.002^b	7.50 ± 0.13^b	1.89 ± 0.08^b
	1	0.13 ± 0.001^a	7.88 ± 0.16^a	1.99 ± 0.07^{ab}
	2	0.12 ± 0.003^b	7.77 ± 0.19^a	2.07 ± 0.07^a
Packaging type	natural atmosphere	0.12 ± 0.001^b	7.61 ± 0.05^b	1.99 ± 0.05^b
	Modified atmosphere	0.13 ± 0.004^a	7.97 ± 0.04^a	2.17 ± 0.01^a

Non-similar letters in each column indicate a significant difference according to the Duncan test ($P<0.05$).

حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار در سطح 5% بر اساس آزمون دانکن می‌باشد ($P<0.05$).

بر میزان اسید اسکوربیک معنی‌دار بود ($P<0.05$). میزان اسید اسکوربیک در برش‌های تازه خربزه قبل از پوشش‌دهی و بسته‌بندی $mg/100g$ $10/56$ نمونه بود. مقدار اسید اسکوربیک تحت تأثیر تفاوت‌های ژنتیکی، شرایط آب و هوایی قبل از برداشت و روش‌های مدیریت در زمان رسیدگی و پس از برداشت می‌باشد [۴۷]. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که با افزایش زمان نگهداری محتوای اسید اسکوربیک نمونه‌ها کاهش یافت (جدول ۲). کاهش میزان

۵.۳ اسید اسکوربیک

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر مستقل مدت زمان نگهداری و غلظت کیتوزان و اثرات متقابل دوتایی مدت زمان نگهداری با نوع بسته‌بندی و غلظت کیتوزان با نوع بسته‌بندی و اثرات متقابل سه تایی مدت زمان نگهداری با غلظت کیتوزان و تیمول و اثر متقابل همه متغیرها (مدت زمان نگهداری، غلظت کیتوزان، غلظت اسانس و نوع بسته‌بندی)

بیرونی یا حذف پریدرم برای انتقال بخار آب همراه باشد [۴۶]. همچنین، بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییر یافته (غلظت‌های پایین اکسیژن و بالای دی‌اکسیدکربن) با کاهش فعال‌سازی آنزیم‌های نرم‌کننده بافت امکان حفظ سفتی را طی انبارداری فراهم نمود. این پدیده می‌تواند به‌دلیل کاهش سرعت تنفس و تولید رادیکال کمتر باشد. رادیکال‌های تشکیل‌شده توسط تنفس هوایی (مانند سوپراکسید و اکسیدنیتریک) دیواره سلولی را ضعیف کرده و پکتین دیواره را برای پکتیناز قابل دسترس می‌کند و سبب افت سفتی طی دوره پس از برداشت می‌شود [۴۷]. نتایج Mendes و همکاران (۲۰۱۹) نشان داد که سفتی بافت در هلوهای بسته‌بندی شده تحت اتمسفر تغییر یافته کاهش یافت [۳۰]. پوشش کیتوزان نیز احتمالاً به‌دلیل کاهش شدت تنفسی، تغییر اتمسفر اطراف محصول و به دلیل داشتن خاصیت میکروبی از فساد میوه جلوگیری نموده و بدین طریق به حفظ سفتی بافت میوه کمک می‌کند [۱۶، ۱۰].

۷.۳ رنگ

تغییرات رنگ، مهم‌ترین عاملی است که طی انبارداری در برش میوه‌ها رخ می‌دهد و بر کیفیت محصول از دید مصرف-کننده تأثیر دارد. به‌منظور سنجش رنگ برش‌های خربزه پارامترهای L^* , a^* , b^* و BI مورد بررسی قرار گرفتند. این شاخص‌ها به ترتیب بیانگر روشی، سبزی-قرمزی، زردی-آبی و میزان قهوه‌ای شدن رنگ برش‌های خربزه می‌باشند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل مدت نگهداری، غلظت کیتوزان، نوع بسته‌بندی و اثر متقابل غلظت کیتوزان با مدت زمان نگهداری بر مؤلفه‌های رنگی و شاخص قهوه‌ای شدن برش‌های خربزه معنی‌دار بود ($P < 0.05$). بررسی اثر مستقل مدت زمان نگهداری نشان داد طی مدت نگهداری برش‌ها در انبار سرد، مؤلفه رنگی b^* کاهش و مؤلفه رنگی a^* افزایش یافت. مؤلفه رنگی L^* تا ۴ روز اول انبارداری کاهش یافت و سپس میزان آن تا روز هشتم انبارداری ثابت باقی ماند. میزان شاخص قهوه‌ای شدن تا روز ۴ انبارداری تغییری نداشت اما در روز هشتم انبارداری این شاخص در برش‌های خربزه افزایش نشان داد. اثر مستقل غلظت کیتوزان بر قرمز-زردی و روشی برش‌های خربزه

اسیداسکوربیک طی مدت زمان نگهداری قابل انتظار بود؛ زیرا اسید اسکوربیک به آنزیم فنلاز، دما، نور، اکسیژن و pH بسیار حساس است [۴۸]. میوه‌های پوشش‌دار دارای میزان اسید اسکوربیک بیشتری در مقایسه با شاهد بودند. به نظر می‌رسد پوشش کیتوزان با کاهش میزان اکسیژن در دسترس، اکسیداسیون اسیداسکوربیک را کاهش داده باشد نتایج کیائو و همکاران (۲۰۱۹) نیز نشان داد که مقدار اسید اسکوربیک در برش‌های تازه خربزه از حدود ۲۲ mg/100g به ۱۹ پس از ۸ روز نگهداری در دمای یخچال رسید؛ در حالی که پوشش‌دهی با محلول حاوی کیتوزان-دی اکسید نانو تیتانیوم - تیمول و توئین سبب حفظ اسیداسکوربیک شد. به طوری که پس از مقداری افزایش پس از ۲ روز نگهداری (حدود ۲۴ mg/100g) طی روزهای بعدی کاهش یافت و پس از ۸ روز نگهداری حدود ۲۲ mg/100g نمونه حفظ شد. به‌طور کلی نمونه‌های حاوی کیتوزان ۱٪ و تیمول ۵٪/۰ بالاترین میزان اسید اسکوربیک را پس از ۸ روز نگهداری تحت اتمسفر تغییر یافته داشتند. اتمسفر تغییر یافته می‌تواند از طریق کاهش اکسیژن اکسایش اسیداسکوربیک به دهیدرواسکوربیک را کاهش داده و درنتیجه به حفظ آن کمک می‌کند [۴۸].

۶.۳ میزان سفتی

نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر معنی‌دار مدت زمان نگهداری، غلظت کیتوزان و اتمسفر بسته‌بندی بر بافت برش خربزه بود ($P < 0.05$) که در جدول (۲) نشان داده شده است. به‌طور کلی نتایج بیانگر این مطلب بود که با افزایش زمان ماندگاری، بافت نمونه‌های مختلف نرم‌تر شد و میزان سفتی بافت کاهش یافت. کاهش سفتی میوه، به‌دلیل تجزیه پلی‌ساقاریدهای دیواره سلولی در اثر فعالیت آنزیم‌های هیدرولیزکننده (پکتین متیل استراز، پلی‌گالاکترونات و سلولاز) و تبدیل پروتوبکتین نامحلول به پکتین محلول و کاهش همی‌سلولز می‌باشد. تغییرات سفتی بافت طی دوره انبارداری به میزان آب کندانس شده روی سطح محصول یا از دست دادن آب آنها نیز بستگی دارد. تغییر در ویژگی‌های بافتی به دلیل از دست دادن آب به‌طور مستقیم به کاهش در فشار تورگور (اسمزی) مربوط است یا می‌تواند با مقاومت پریدرم

همراه با کیتوزان کمتر بود. تیمار با تیمول بر شاخص‌های رنگی در برش خربزه تأثیر معنی‌داری نداشت. نوع بسته‌بندی تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های میزان سبزی-قرمز-زردی-آبی و میزان روشنی نمونه‌های مختلف داشت. برش‌های خربزه که با اتمسفر تغییریافته بسته‌بندی شده بودند دارای a^* و b^* کمتر و L^* بیشتر بودند. طی رسیدن خربزه، میزان قرمز-سبزی و زرد-آبی کاهش می‌یابد، اما باید توجه داشت که برش خربزه دارای رنگ اولیه سبز بود و در اثر پوشش‌دهی نیز به رنگ سبز باقی ماند و به رنگ سبز کمرنگ یا زرد-narنجی تبدیل نشد. میزان اندیس قهوه‌ای شدن طی انبارداری کاهش یافت. کاهش میزان این اندیس به دلیل تیره شدن رنگ نمونه‌ها است در حالی که افزایش روشنی نشان‌دهنده از دست دادن رنگ سبز است. با افزایش میزان رسیدگی شاخص قهوه‌ای شدن، نیز افزایش می‌یابد [۲۵].

تأثیر معنی‌داری داشت ($P < 0.05$). نتایج نشان داد که میزان قرمز-زردی (a^*) در نمونه شاهد نسبت به میوه تیمارشده با هر دو غلظت کیتوزان بیشتر بود. بررسی نتایج اثر متقابل مدت زمان نگهداری با غلظت کیتوزان نشان داد، میزان مؤلفه‌های رنگی a^* و b^* در نمونه‌های پوشش‌دهی شده با کیتوزان ۱٪ بعد از ۴ روز نگهداری با نمونه اولیه اختلاف معنی‌داری نداشت؛ اما بعد از ۸ روز نگهداری میزان این مؤلفه‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت (جدول ۳). میوه پوشش‌دهی نشده دارای حداقل میزان روشنی بعد از ۸ روز نگهداری بود و پوشش‌دهی با کیتوزان سبب حفظ روشنی طی مدت زمان نگهداری شد. Chiabrandو Giacalone آژینات‌سدیم و کیتوزان نتیجه گرفتند که در همه تیمارها میزان روشنی در مدت نگهداری کاهش یافت؛ اما این روند کاهشی در میوه پوشش‌داده شده با آژینات و آژینات

جدول (۳) مقایسه میانگین اثر متقابل پوشش دهنده کیتوزان با مدت انبارمانی بر مؤلفه‌های رنگی و شاخص قهوه‌ای شدن برش‌های تازه خربزه

Table 3. Comparison of average interaction effect of chitosan coating with storage period on color components and browning index of fresh - cut melon


Storage time (day)	Chitosan concentration (%)		
	0	1	2
<i>b*</i> (harvesting time= 17.05 ± 0.12)			
0 (after packaging)	16.70 ± 0.38^a	16.96 ± 0.23^a	17.21 ± 0.47^a
4	13.79 ± 0.22^b	17.17 ± 0.58^a	13.79 ± 0.47^b
8	11.09 ± 0.45^d	9.52 ± 1.35^e	12.62 ± 0.36^c
<i>a*</i> (harvesting time= 10.83 ± 0.03)			
0 (after packaging)	10.82 ± 0.59^a	10.87 ± 0.61^a	10.84 ± 0.51^a
4	8.52 ± 0.95^b	10.30 ± 0.04^a	8.31 ± 0.69^b
8	6.97 ± 0.11^d	7.43 ± 0.23^e	8.58 ± 0.40^b
<i>L*</i> (harvesting time= 69.56 ± 0.15)			
0 (after packaging)	69.66 ± 0.39^a	69.97 ± 0.28^a	70.02 ± 0.51^a
4	67.41 ± 0.89^b	66.82 ± 1.11^{bc}	69.63 ± 0.59^a
8	62.01 ± 0.38^d	63.28 ± 0.90^d	65.11 ± 0.82^c
BI (harvesting time= 11.88 ± 0.06)			
0 (after packaging)	11.84 ± 0.64^a	11.85 ± 0.59^a	11.81 ± 0.49^a
4	9.71 ± 0.45^b	11.82 ± 1.02^a	9.16 ± 0.59^b
8	8.64 ± 0.14^c	8.87 ± 0.74^{bc}	9.93 ± 0.72^b

Non-similar letters in each color components and BI index indicate a significant difference according to the Duncan test ($P < 0.05$).

حروف غیر مشابه در هر مؤلفه رنگی و شاخص BI بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می‌باشد ($P < 0.05$).

ارگانیسم‌ها آماده می‌سازند؛ بنابراین، استفاده از تمهیداتی مانند پوشش‌دهنده‌ها و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته

۸.۳ بار میکروبی
میوه‌های تازه برش خورده، منبع غنی از رطوبت بالا و مواد مغذی هستند که محیط مناسبی را برای رشد میکرو



غلظت های ۰/۲۵ و ۰/۰٪ تیمول دارای کمترین میزان بار میکروبی بودند. نتایج پژوهش حاضر با یافته های Sun و همکاران (۲۰۲۲)، Qiao و همکاران (۲۰۱۹)، Chen و همکاران (۲۰۲۱)، Poverenov و همکاران (۲۰۱۴) و Almela و همکاران (۲۰۱۳) در تطابق بود [۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴].

نوع بسته بندی بر میزان شمارش کلی و کپک و مخمر تأثیر معنی داری داشت ($P<0.05$). برش های میوه بسته بندی شده در اتمسفر تغییر یافته دارای میزان شمارش کلی و کپک و مخمر کمتری از بسته بندی معمولی بودند. دی اکسید کربن در اتمسفر تغییر یافته، نقش توقف رشد باکتری ها و قارچ ها را دارد. همچنین دی اکسید کربن سبب افزایش فاز تأخیری در منحنی رشد میکروبی بسیاری از میکروا رگانیسم های مولد فساد می شود. کاهش اکسیژن در بسته بندی نیز سبب جلوگیری از رشد میکروا رگانیسم های هوایی می شود [۱۴-۲۰].

می تواند نقش عمدہ ای در عرضه فراورده تازه برش خورده سالم به بازار مصرف داشته باشد.

میکروا رگانیسم هایی که روی برش های تازه خربزه رشد می کنند شامل فلور طبیعی (باکتری های هوایی مزو فیل، کپک، مخمر و گونه های سودوموناس)، سالمونلا و لیستریا مونوسیتوئنز¹ هستند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که غلظت کیتوzan بر میزان شمارش کلی میکروبی و میزان کپک و مخمر در برش های خربزه تأثیر معنی داری داشت ($P<0.05$). با افزایش غلظت کیتوzan میزان شمارش کلی میکروبی و کپک و مخمر کاهش یافت، هر چند میزان کاهش بار میکروبی اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (جدول ۴). تیمار با تیمول نیز بر شمارش کلی میکروبی تأثیر معنی دار داشت و نمونه های شاهد نسبت به نمونه هایی که با تیمول تیمار شده بودند دارای بار میکروبی بیشتری بودند ($P<0.05$). اثر متقابل غلظت کیتوzan و تیمول نشان داد که برش های خربزه تیمار شده با غلظت ۱٪ کیتوzan و

جدول (۴) مقایسه میانگین اثر مستقل پوشش دهنده کیتوzan، غلظت تیمول و نوع بسته بندی برآ洛گی میکروبی برش های تازه خربزه

Table 4. Comparison of the average independent effect of chitosan coating, thymol concentration and packaging type on microbial contamination of fresh - cut melon

Independent effect of variables	Variable levels	Mold and Yeast (Log CFU/g)	Total count (log CFU/g)
Chitosan concentration (%)	0	4.15 ± 0.09^a	6.98 ± 0.04^a
	1	3.38 ± 0.11^b	6.77 ± 0.07^b
	2	3.33 ± 0.08^b	6.71 ± 0.08^b
Thymol Concentration (%)	0	3.89 ± 0.03^a	6.88 ± 0.04^a
	0.25	3.81 ± 0.02^b	6.79 ± 0.05^b
	0.5	3.80 ± 0.02^b	6.76 ± 0.03^b
Packaging type	natural atmosphere	3.91 ± 0.04^a	6.91 ± 0.06^a
	Modified atmosphere	3.78 ± 0.05^b	6.37 ± 0.04^b

Non-similar letters in each column indicate a significant difference according to the Duncan test ($P<0.05$).

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می باشد ($P<0.05$).


هر چند، افزایش غلظت کیتوzan از ۱ به ۲٪، اختلاف معنی داری را در صفات حسی ایجاد نکرد؛ اما ارزیابان در پذیرش کلی، غلظت ۱٪ کیتوzan را بر غلظت ۲٪ ترجیح داده بودند. Ortiz-Duarte و همکاران (۲۰۱۹)، نیز گزارش نمودن استفاده از کیتوzan سبب حفظ خصوصیات حسی برش خربزه می شود [۱۳]. استفاده از اسانس تیمول نیز تأثیر معنی داری بر همه صفات حسی برش های خربزه داشت ($P<0.05$) و برش های حاوی ۰/۲۵ و ۰/۰٪ تیمول نسبت به

۹.۳ صفات حسی


کیفیت برش های تازه خربزه، مجموعه ای از کیفیت ظاهری، آroma، بافت، اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول در آب و رنگ است. مقایسه میانگین اثر مستقل غلظت کیتوzan، غلظت تیمول و نوع بسته بندی بر صفات حسی برش های خربزه در شکل (۴ الف-ج) نشان داده شده است. پوشش دهی با کیتوzan بر همه صفات حسی برش های خربزه (رنگ، بافت، بو، طعم و پذیرش کلی) تأثیر معنی داری داشت ($P<0.05$).

1. *Listeria monocytogenes*


شاهد امتیاز بالاتری را کسب نمودند. بسته‌بندی برش‌ها با اتمسفر تغییر یافته نیز سبب حفظ صفات حسی شد و امتیازات بالاتری را نسبت به اتمسفر طبیعی به خود اختصاص داد ($P<0.05$). Kale و همکاران (۲۰۲۰) گزارش فیزیکوشیمیایی، حسی و کاهش رشد میکروبی می‌شود.



a



b



c

شکل (۴) مقایسه میانگین اثر مستقل پوشش دهنده کیتوزان (الف)، غلاظت تمول (ب) و نوع بسته‌بندی (ج) بر صفات حسی برش‌های تازه خربزه
Fig 4. Comparison of the average independent effect of chitosan coating (a), thymol concentration (b) and packaging type (c) on sensory attributes of fresh-cut melon

نسبت به بسته‌بندی تحت اتمسفر طبیعی داشتند. پوشش‌دهی برش‌های تازه میوه با کیتوزان و تیمول به‌دلیل خاصیت ممانعت‌کننده گازی و خاصیت ضدمیکروبی سبب حفظ کیفیت و همچنین جلوگیری از ایجاد بعضی تغییرات نامطلوب شد. ادغام پوشش‌دهی و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته، نتایج مطلوب‌تری را برای انبارداری و حفظ کیفیت برش‌های تازه میوه به همراه داشت. بنابراین، پوشش‌دهی برش‌های تازه خربزه با کیتوزان ۱٪ همراه با تیمول ۰/۵٪ و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته به‌دلیل کاهش فساد میکروبی و حفظ بیشتر ویژگی‌های کیفی، مؤلفه‌های رنگی و صفات حسی میوه، به عنوان تیمار بهینه و سالم معرفی می‌شود.

۴. نتیجه‌گیری

در این پژوهش اثر اتمسفر اصلاح شده و پوشش‌دهی با کیتوزان و اسانس تیمول بر ماندگاری برش‌های تازه خربزه در طول ۸ روز نگهداری در دمای ۴°C بررسی شد. نتایج بیانگر آن بود که خصوصیات فیزیکی شیمیابی، حسی و میکروبی برش‌های تازه خربزه طی دوره نگهداری کاهش می‌یابد. اما پوشش‌دهی با کیتوزان و تیمول و همچنین بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییریافته سبب حفظ بهتر این ویژگی‌ها شد. به‌طوری که، نمونه‌های بسته‌بندی شده در اتمسفر تغییریافته، میزان کاهش وزن، قرمز-سبزی، تعداد کل میکروب‌های زنده و کپک و مخمر کمتر و میزان اسید قابل تیتراسیون و روشی بیشتر و صفات حسی مطلوب‌تری

منابع

- [1] Anon. (2021). Agricultural statistics of the crop year 2020-2021. Volume One: Crop Products. Ministry of Jihad-e Agriculture, Deputy for Planning and Economy, Information and Communication Technology Center. [In Persian]
- [2] Bahramian, F., Javanmard, M. (2010). Shelf-life stability of fresh-cuts melon coated with whey protein stored at low temperatures. *Iranian J Nutr Sci Food Technol.*, 5 (2):53-62. [In Persian]
- [3] Ayala-Zavala, J. F., DelToroSánchez, L., AlvarezParrilla, E., & González Aguilar, G. A. (2008). High relative humidity in package of fresh-cut fruits and vegetables: advantage or disadvantage considering microbiological problems and antimicrobial delivering systems?. *J. Food Sci*, 73(4), R41-R47.
- [4] Amal, S. A., El-Mogy, M. M., Aboul-Anean, H. E., & Alsanius, B. W. (2010). Improving strawberry fruit storability by edible coating as a carrier of thymol or calcium chloride. *J. hortic. sci. ornam. plants*, 2(3), 88-97.
- [5] Artés-Hernández, F., Formica-Oliveira, A. C., Artés, F., & Martínez-Hernández, G. B. (2017). Improved quality of a vitamin B12-fortified 'ready to blend'fresh-cut mix salad with chitosan. *Food Sci. Technol. Int.*, 23(6), 513-528.
- [6] Bautista-Baños, S., Hernandez-Lauzardo, A. N., Velazquez-Del Valle, M. G., Hernández-López, M., Barka, E. A., Bosquez-Molina, E., & Wilson, C. L. (2006). Chitosan as a potential natural compound to control pre and postharvest diseases of horticultural commodities. *J. Crop Prot.*, 25(2), 108-118.
- [7] Rojas-Graü, M. A., Soliva-Fortuny, R., & Martín-Belloso, O. (2009). Edible coatings to incorporate active ingredients to fresh-cut fruits: a review. *Trends Food Sci. Technol.*, 20 (10), 438-447.
- [8] Alizadeh, A., Alizadeh, O., Amari, G., & Zare, M. (2013). Essential oil composition, total phenolic content, antioxidant activity and antifungal properties of Iranian *Thymus daenensis* subsp. *daenensis* Celak. as in influenced by ontogenetical variation. *J. Essent. Oil-Bear. Plants*, 16(1), 59-70.
- [9] Alagawany, M., Farag, M. R., Abdelnour, S. A., & Elnesr, S. S. (2021). A review on the beneficial effect of thymol on health and production of fish. *Rev. Aquac.*, 13(1), 632-641.
- [10] Sun, J., Li, Y., Cao, X., Yao, F., Shi, L., & Liu, Y. (2022). A Film of Chitosan Blended with Ginseng Residue Polysaccharides as an Antioxidant Packaging for Prolonging the Shelf Life of Fresh-Cut Melon. *Coatings*, 12(4), 468.
- [11] Qiao, G., Xiao, Z., Ding, W., & Rok, A. (2019). Effect of chitosan/nano-titanium dioxide/thymol and tween films on ready-to-eat cantaloupe fruit quality. *Coatings*, 9(12), 828.
- [12] Chen, J., Wu, A., Yang, M., Ge, Y., Pristijono, P., Li, J., ... & Mi, H. (2021). Characterization of sodium alginate-based films incorporated with thymol for fresh-cut apple packaging. *Food Control*, 126, 108063.
- [13] Ortiz-Duarte, G., Pérez-Cabrera, L. E., Artés-Hernández, F., & Martínez-Hernández, G. B. (2019). Ag-chitosan nanocomposites in edible coatings affect

- the quality of fresh-cut melon. *Postharvest Biol. Technol.*, 147, 174-184.
- [14] Poverenov, E., Cohen, R., Yefremov, T., Vinokur, Y. and Rodov, V. (2014). Effects of polysaccharide-based edible coatings on fresh-cut melon quality. *Acta Hortic.* 1015, 145-151.
- [15] Almela, C., Castelló, M. L., Tarrazó, J. and Ortolá, M. D. (2013). Washing of cut persimmon with thyme or lemon essential oils. *Food Sci. Technol. Int.*, 20(8), 557-565.
- [16] Zsivanovits, G., Zhelyazkov, S., Brashlyanova, B., Iserliyska, D., Yovkova, D., & Marudova, M. (2012). Effect of chitosan coating on quality of fresh-cut melon during the shelf-life. *Evol.*, 201, 2.
- [17] Wilson, M. D., Stanley, R. A., Eyles, A., & Ross, T. (2019). Innovative processes and technologies for modified atmosphere packaging of fresh and fresh-cut fruits and vegetables. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 59(3), 411-422.
- [18] Belay, Z. A., Caleb, O. J., & Opara, U. L. (2019). Influence of initial gas modification on physicochemical quality attributes and molecular changes in fresh and fresh-cut fruit during modified atmosphere packaging. *Food Packaging Shelf.*, 21, 100359.
- [19] Shah, M. A., Wani, S. M., Ganai, S. A., Mir, S. A., Ahmad, T., & Dar, B. N. (2020). Modified atmosphere packaging as a tool to improve the shelf life of fruits. In *Emerging Technologies for Shelf-Life Enhancement of Fruits* (pp. 109-128). Apple Academic Press.
- [20] Kale, P. M., Patil, S. S., & Palghadmal, U. B. (2020). Effect of different modified atmosphere packaging on physico-chemical, microbiological and sensorial attributes of fresh-cut muskmelon. *Int. j. environ. agric. biotech.*, 5(5).
- [21] Minh, N. P. (2020). Influence of modified atmospheric packaging and storage temperature on the physico-chemical, microbial and organoleptic properties of cantaloupe (*Cucumis melo*) fruit. *Res. Crops.*, 21(3), 506-511.
- [22] Gelly, M., Recasens, I., Girona, J., Mata, M., Arbones, A., Rufat, J., & Marsal, J. (2004). Effects of stage II and postharvest deficit irrigation on peach quality during maturation and after cold storage. *J. Sci. Food Agric.*, 84(6), 561-568.
- [23] Majdi, M. (1994). Chemical test methods of food. Academic Jihad Publications, University of Tehran.
- [24] Olivas, G. I., Mattinson, D. S., & Barbosa-Cánovas, G. V. (2007). Alginate coatings for preservation of minimally processed 'Gala' apples. *Postharvest Biol. Technol.*, 45(1), 89-96.
- [25] Oms-Oliu, G., Soliva-Fortuny, R., & Martín-Belloso, O. (2007). Effect of ripeness on the shelf-life of fresh-cut melon preserved by modified atmosphere packaging. *Eur. Food Res. Technol.*, 225, 301-311.
- [26] Chiabrando, V., & Giacalone, G. (2013). Effect of different coatings in preventing deterioration and preserving the quality of fresh-cut nectarines (cv *Big Top*). *CYTA - J. Food.* 11(3), 285-292.
- [27] Valverde, J. M., Valero, D., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Castillo, S., & Serrano, M. (2005). Novel edible coating based on Aloe vera gel to maintain table grape quality and safety. *J. Agric. Food Chem.*, 53(20), 7807-7813.
- [28] Amodio, M. L., Derossi, A., & Colelli, G. (2013). Modelling sensorial and nutritional changes to better define quality and shelf life of fresh-cut melons. *J. Agric. Eng.*, 44(1), e6-e6.
- [29] Candir, E., Ozdemir, A. E., & Aksoy, M. C. (2018). Effects of chitosan coating and modified atmosphere packaging on postharvest quality and bioactive compounds of pomegranate fruit cv. 'Hicaznar'. *Sci. Hortic.*, 235, 235-243.
- [30] Mendes, L. D. S., Aguayo, E., Pessoa, C. D. O., Nastaro, B. T., & Kluge, R. A. (2018). Enhancement of the antioxidant capacity and reduction of chilling injury in 'Douradão' peaches refrigerated under pre-storage and modified atmosphere. *Acta Sci. Agron.*, 41.
- [31] Tesfay, S. Z., & Magwaza, L. S. (2017). Evaluating the efficacy of moringa leaf extract, chitosan and carboxymethyl cellulose as edible coatings for enhancing quality and extending postharvest life of avocado (*Persea Americana* Mill.) fruit. *Food Packaging Shelf.*, 11, 40-48.
- [32] Liguori, G., Sortino, G., Gullo, G., & Inglese, P. (2021). Effects of modified atmosphere packaging and chitosan treatment on quality and sensorial parameters of minimally processed cv. 'Italia' table grapes. *J. Agron.*, 11(2), 328.
- [33] Fu, Y., Liu, H., Fu, L., Xu, W., & Li, D. (2016). Preservation effect of thymol active map packaging on fresh-cut lotus root. In *Advanced Graphic Communications, Packaging Technology and Materials* (pp. 523-530). Springer Singapore.
- [34] Gago, C. M., Miguel, M. G., Cavaco, A. M., Almeida, D. P., & Antunes, M. D. (2015). Combined effect of temperature and controlled atmosphere on storage and shelf-life of 'Rocha' pear treated with 1-methylcyclopropene. *Food Sci. Technol. Int.*, 21(2), 94-103.
- [35] Xu, Q., Xing, Y., Che, Z., Guan, T., Zhang, L., Bai, Y., & Gong, L. (2013). Effect of chitosan coating and oil fumigation on the microbiological and quality safety of fresh-cut pear. *J. Food Saf.*, 33(2), 179-189.

- [36] Leceta, I., Molinaro, S., Guerrero, P., Kerry, J. P., & De la Caba, K. (2015). Quality attributes of map packaged ready-to-eat baby carrots by using chitosan-based coatings. *Postharvest Biol. Technol.*, 100, 142-150.
- [37] Varasteh, F., Arzani, K., Barzegar, M., & Zamani, Z. (2018). Pomegranate (*Punica granatum* L.) fruit storability improvement using pre-storage chitosan coating technique.
- [38] Rahimi, R., ValizadehKaji, B., Khadivi, A., & Shahrjerdi, I. (2019). Effect of chitosan and thymol essential oil on quality maintenance and shelf life extension of peach fruits cv.'Zaferani'. *J. Hortic. Postharvest Res.* 2(2), 143-156.
- [39] Cicco, N., Dichio, B., Xiloyannis, C., Sofo, A., & Lattanzio, V. (2006, February). Influence of calcium on the activity of enzymes involved in kiwifruit ripening. In *VI International Symposium on Kiwifruit* 753 (pp. 433-438).
- [40] Jiang, Y. R., Fu, Y. B., Li, D. L., & Xu, W. C. (2013). Effects of 1-MCP and controllable-release SO₂ packaging on cold preservation of grapes (CV *Muscat Hamburg*). In *Adv. Mater. Res.* (Vol. 750, pp. 2335-2339). Trans Tech Publications Ltd.
- [41] Tavarini, S., Degl'Innocenti, E., Remorini, D., Massai, R., & Guidi, L. (2009). Polygalacturonase and β -galactosidase activities in Hayward kiwifruit as affected by light exposure, maturity stage and storage time. *Sci. Hortic.*, 120(3), 342-347.
- [42] Hong, K., Xie, J., Zhang, L., Sun, D., & Gong, D. (2012). Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of guava (*Psidium guajava* L.) fruit during cold storage. *Sci. Hortic.*, 144, 172-178.
- [43] Ortiz-Duarte, G., Pérez-Cabrera, L. E., Artés-Hernández, F., & Martínez-Hernández, G. B. (2019). Ag-chitosan nanocomposites in edible coatings affect the quality of fresh-cut melon. *Postharvest Biol. Technol.*, 147, 174-184.
- [45] Khoshgozaran, S., Azizi, M. H., & Bagheripoor-Fallah, N. (2012). Evaluating the effect of modified atmosphere packaging on cheese characteristics: a review. *Dairy Sci Technol.*, 92, 1-24.
- [46] Belay, Z. A., Caleb, O. J., Mahajan, P. V., & Opara, U. L. (2018). Design of active modified atmosphere and humidity packaging (MAHP) for 'wonderful' pomegranate arils. *Food Bioproc Tech.*, 11, 1478-1494.
- [47] Chitravathi, K., Chauhan, O. P., & Raju, P. S. (2015). Influence of modified atmosphere packaging on shelf-life of green chillies (*Capsicum annuum* L.). *Food Packaging Shelf.*, 4, 1-9.
- [48] Dhinesh Kumar, V., Ramasamy, D., & Jerish, J. J. (2018). Effect of active modified atmosphere packaging material on biochemical and microbial characteristics of pomegranate arils during storage. *Int J Chem Stud*, 6(2), 95-9.
- [49] Chiabrando, V., & Giacalone, G. (2013). Effect of different coatings in preventing deterioration and preserving the quality of fresh-cut nectarines (cv *Big Top*). *CYTA - J. Food.*, 11(3), 285-292.