

کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های هرز کلزا

پرویز شیمی^{۱*}، رضا پورآذر^۲، فرخ دین قزلی^۳ و حمیدرضا ساسان‌فر^۴

۱- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران-۲- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان^۴- گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۸

تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۱/۵

چکیده

به منظور مقایسه دو نوع کلوپیرالید (۳۰٪ اس ال) ساخت کارخانه‌های مختلف با نام‌های تجاری لونتل و واج و اثر مقادیر مختلف آنها بر روی کلزا و علف‌های هرز، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی، با ۴ تکرار و ۱۲ تیمار در استان‌های فارس و خوزستان انجام شد. تیمارها عبارت بودند از سه‌پاشی لونتل و واج در میزان‌های ۰/۶، ۰/۸، ۱/۲ و ۱/۴ لیتر ماده تجاری در هکتار در زمان ۵-۱۰ سانتی‌متری علف‌های هرز، علفکش بوتیزان استار (کوین مراك) + متازاکلر ۳۳/۳٪ به عنوان شاهد، بعد از کاشت و قبل از آبیاری اول و سبز شدن کلزا به میزان ۲/۵ لیتر ماده تجاری در هکتار و شاهد بدون علف‌هرز در طول فصل. کلیه کرت‌ها با ۷/۵ لیتر از ماده تجاری در هکتار از علف‌کش سوپر گالانت ۱۰/۸٪ امولسیون (هالوکسی فوب-آر-متیل استر) علیه علف‌های هرز باریک برگ سه‌پاشی گردیدند. نتایج نشان داد اثر کلوپیرالید روی گیاه کلزا برای هر دو نوع این علف‌کش مشابه و تا ۰/۸ لیتر در هکتار آن در مناطق آزمایش اثر سوء روی کلزا نداشت. مقدار یک لیتر در هکتار آن با خسارت جزئی منجر به افت عملکرد کلزا نگردید و کنترل مناسب تری روی علف‌های هرز داشت. علف‌های هرز غالب استان فارس تاتاری (*Carduus pycnocephalus* L.) و هفت بند (*Polygonum aviculare* L.) بودند که کنترل آن‌ها توسط یک لیتر کلوپیرالید بیشترین عملکرد کلزا (۲۸٪) را در بر داشت. در خوزستان، بیشترین مقدار کلوپیرالید که به کلزا خسارت وارد نیاورد یک لیتر در هکتار از هر دو نوع تجاری بود که توانست علف‌های هرز کنگر ابلق (*Silybum marianum* L.), وايه (*Ammi majus* L.)، شاه افسر (*Melilotus officinalis* L.) Pallas و پنیرک (*Malva* spp.) را مهار کرده و عملکرد کلزا را بیش از ۲۰۰ درصد افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی: علف‌های هرز پهن برگ، لونتل، میزان مصرف، واج

*Corresponding author. E-mail: parvizshimi@gmail.com

مقدمه

گزارش کرده اند که سمپاشی کلوپیرالید بهتر است در مراحل پیشرفته تر علف‌های هرز حساس، یعنی، ۱۰-۱۵ سانتی متری صورت پذیرد. بر اساس همین گزارش، این علف کش توانسته است سبب توقف رشد پیچک صحرائی گردد.

کترل مطلوب هفت بند (*Polygonum spp.*) توسط کلوپیرالید در مزارع کلزا گزارش شده است (Blackshaw, 1992). به گزارش زیمنسکا (Zimenska et al., 1997) از لهستان، این علفکش قادر است باونه گاوی (*Matricaria spp.*) و شقایق وحشی (*Papaver spp.*) را در مزارع کلزا کترول نماید. ضمن اینکه لورتی (Laureti, 1989) گزارش کرده که کلزا نسبت به علفکش کلوپیرالید متتحمل است، بوورمن (Bowerman, 1990) اشاره نموده است که این علف کش باید با دوزهای پائین در مزارع کلزا استفاده گردد. دوز توصیه شده این علف کش در کانادا ۰/۵ تا ۰/۶ لیتر در هکتار می‌باشد (Leoppy & Staff, 2007 ; Blackshaw, 1994). بر اساس همین گزارش، برخی از ارقام کلزا به این علف کش حساس می‌باشند. در کشورهای اروپائی چکوسلواکی، کرواسی و لهستان، میزان توصیه شده مصرف کلوپیرالید در مزارع کلزا ۰/۴-۰/۳ لیتر در هکتار می‌باشد (Anonymous, 1995).

نتایج یک بررسی در ایران نشان داد که ۰/۴ لیتر کلوپیرالید (SL) در هکتار توانست علف‌هرز تاتاری وحشی (Carduus pycnocephalus) و ۰/۶ لیتر در هکتار شبدر وحشی (Silybum marianum) را کترول نماید (Shimi et al., 2005). در آزمایش دیگر که در استان گلستان انجام شد، مصرف یک لیتر کلوپیرالید در هکتار سبب توقف رشد اندامها و کاهش ۱۰٪ ارتفاع کلزا را رقم هایولا ۴۰۱ گردید (Shimi et al., 2005).

هدف این آزمایش تعیین بالاترین و امن ترین مقدار مصرف علف کش کلوپیرالید در مزارع کلزا بوده و بعلت اینکه این

علف‌های هرز یکی از معضلات کشت کلزا محسوب می‌شوند. بر اساس تحقیقات انجام شده ۷۰ درصد علف‌های هرز مزارع کلزا ایران را پهن برگ‌ها تشکیل می‌دهند (Salimi, et al., 2004). علفکش کلوپیرالید یک پهن برگ‌کش مزارع کلزا می‌باشد که در ایران با دو نام تجاری لونتل (شرکت داو-آفریقای جنوبی) و واج (شرکت بیستر فیلد- آلمان) به ثبت رسیده است. میزان توصیه شده مصرف این علف کش ۰/۶ تا ۰/۸ لیتر در هکتار است (Noorbakhsh, et al., 2011). در برخی از مزارع کلزا تراکم علف‌های هرز پهن برگ بقدرتی بالا است که از مقادیر بالاتری از این علف کش نسبت به میزان توصیه شده استفاده می‌گردد.

کلوپیرالید علفکشی از خانواده Pyridinecarboxylic acid است که یک آکسین مصنوعی بوده، انتخابی و سیستمیک می‌باشد. این علفکش از طریق ریشه و شاخ و برگ وارد گیاه شده و در آوندها حرکت می‌نماید. زمان مصرف این علف کش پس رویشی بوده و علف‌های هرز تیره‌های آفتابگردان، نخود، چتریان، هفت بند، بادمجانو روناس را در مزارع کلزا به صورت انتخابی کترول می‌نماید (Anonymous, 1995; Tomlin, 2004).

بنا به گزارش شیمی (Shimi et al., 2003) ۰/۶ لیتر کلوپیرالید (از ماده تجاری ۳۰٪ اسال) قادر است علف‌های هرز ماشک (*Medicago spp.*)، یونجه وحشی (*Vicia spp.*)، شبدر (*Pimpinella spp.*)، جعفری وحشی (*Melilotus spp.*)، علف شیر (*Sonchus spp.*)، وايه (*Ammi majus L.*)، کاهو وحشی (*Lactuca spp.*) را تا بیش از ۹۰٪ کترول نماید، لیکن کنگر وحشی (*Circium arvense L.*) فقط توقف رشد داشت. در اظهارات کلی و دیکسون (Clay & Dixon, 1998) نیز نتایج مشابه مشاهده شد. این محققین همچنین اعتقاد دارند که سمپاشی باید در مرحله قبل از ۶ برگی علف‌های هرز حساس انجام شود. از سوی دیگر، Shimi et al., 2003

ارزیابی آزمایش بدین صورت انجام شد: تعیین خسارت احتمالی تیمارها به گیاه کلزا با استفاده از جدول EWRC (Camper, 1986) ۱۰ روز پس از سمپاشی کلوپیرالید (اوایل فصل رویش)، تعیین تراکم علفهای هرز غالب آزمایش از یک متر مربع هر کرت ۲۰ روز پس از سمپاشی کلوپیرالید، تعیین وزن خشک علفهای هرز غالب آزمایش از یک متر مربع هر کرت در زمان غنچه دهی کلزا با کف بر و خشک نمودن علفهای هرز در آون ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت و عملکرد کلزا از ۲ متر مربع وسط هر کرت انجام شد. صفات اندازه گیری شده نسبت به شاهدهای هر کرت درصد گیری شده و این درصدها مورد تجزیه آماری قرار گرفت و میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن و به کار گیری نرم افزار SAS مقایسه گردید.

نتایج و بحث

به سبب متفاوت بودن دو منطقه آزمایش از نظر اقلیمی و فلور علف‌هز، هر آزمایش به صورت جداگانه بررسی و در نهایت نتیجه گیری کلی شد. لازم به یادآوری است که کلیه درصدهای کنترل علفهای هرز و افزایش محصول نشان داده شده در جداول، نسبت به شاهد تیمار نشده هر کرت است.

استان فارس

علفهای هرز غالب آزمایش عبارت بودند از تاتاری (L. *Polygonum pycnocephalus*) و هفت بند (*Cardauus aviculare* L.). تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تفاوت معنی دار بین تیمارها در سطح یک درصد وجود دارد (جدول نشان داده نشده است).

بر اساس جدول (۱)، خسارت و یا عدم خسارت مقادیر مختلف هر دو نوع کلوپیرالید بر روی کلزا، بر اساس معیار EWRC یکسان بوده است. بدین ترتیب، مقادیر ۰/۶ و ۰/۸ لیتر علف کش لوتنرل و واچ هیچکدام اثر سوئی روی کلزا نداشتند. اما دوز ۱ لیتر هر دو نوع کلوپیرالید عالیم خفیف ناپایدار (امتیاز ۲)، دوز ۱/۲ لیتر کمی شدید تر ولی

علفکش با دو نام تجاری به ثبت رسیده است، مقایسه تاثیر این دو نوع کلوپیرالید نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۶-۸۷ در مزارع تحقیقاتی دو استان فارس (زرقان) و خوزستان (شاور) انجام شد. فاصله بین ردیف‌ها ۶۰ سانتی متر و روی هر پشته دو ردیف کلزا با فاصله ۳۰ سانتی متر کاشته شد. هر کرت آزمایش ۲۴ متر مربع (۳×۸) و میان دو کرت یک خط نکاشت برای جلوگیری از باد برده گی علفکش بر روی کرت‌های مجاور در نظر گرفته شد. ضمناً کرت‌ها به دو قسمت مساوی تقسیم شده نیمه بالائی شاهد بدون تیمار و نیمه پائینی تیمار گردید. در فارس کلزا رقم طلايه به صورت کرتی با استفاده از ۸ کیلوگرم بذر در هکتار در تاریخ ۷ مهر کاشته شد. خاک آزمایش از نوع لوم رسی بود. در خوزستان کلزا رقم هایولا ۴۰۱ به صورت ردیف‌های ۶۰ سانتیمتری و دو ردیف کلزا روی هر پشته در تاریخ ۱۵ آذر کاشته شد. خاک آزمایش از نوع سیلکی لوم بود. در هردو منطقه استفاده از کود شیمیائی بر اساس توصیه‌های محلی صورت گرفت.

آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۱۲ تیمار به شرح زیر اجراء گردید: مصرف علفکش کلوپیرالید (واچ و لوتنرل ۳۰٪ اس ال) در میزان‌های ۰/۶، ۰/۸، ۱، ۱/۲ و ۱/۴ لیتر در هکتار در مرحله ۵-۱۰ سانتی متری علفهای هرز، و کوین مراکل+متازاکل (بوتیزان استار ۱/۴٪) بعد از کاشت و آبیاری اول و قبل از سبز شدن کلزا، به میزان ۲/۵ لیتر در هکتار از ماده تجاری و شاهد بدون علف‌هز در طول فصل.

به منظور کنترل علفهای هرز باریک برگ آزمایش، کلیه کرت‌ها توسط باریک برگ کش هالوکسی فوب-آر-متیل استر (گالانت سوپر ۱۰/۸٪ امولسیون) به میزان ۰/۷۵ لیتر از ماده تجاری در هکتار در زمان قبل از ساقه رفتن علفهای هرز باریک برگ سمپاشی گردید.

۲۰۰۶، ۰/۴ لیتر لونترل توانسته است این علوفهرز را در مزرعه کلزای همین استان ۸۷٪ کنترل نماید.

بوتیزان استار، در اول فصل با ۴٪ کاهش تراکم تاتاری برابر ۰/۸ لیتر لونترل و در آخر فصل با ۴٪ کنترل برابر با ۰/۶ لیتر لونترل و واج عمل نمود.

به طور کلی، هر دو نوع تجاری کلوپیرالید (لونترل و واج) در مقادیر ۰/۶ تا ۰/۸ لیتر به کلزا صدمه ای وارد نکردند ولی در این مقادیر، واج بهتر از لونترل عمل نمود. در مقادیر بالاتر (۱، ۱/۲ و ۱/۴ لیتر ماده تجاری در هکتار، بخصوص دو مقدار ۱/۲ و ۱/۴ لیتر) کنترل تاتاری توسط لونترل از نظر آماری بهتر تر از واج بود (جدول ۱).

علوفهرز هفت بند

کمترین درصد کنترل علوفهرز هفت بند با مصرف ۰/۶ لیتر لونترل بود که سبب ۳۹٪ کاهش تراکم این علوفهرز در اوایل فصل (بیست روز پس از سمپاشی)، حال آنکه همین مقدار واج توانست هفت بند را تا ۴۹٪ کنترل نموده و اختلاف معنی داری با لونترل داشته باشد. میزان ۰/۸ لیتر لونترل، هفت بند را ۵۵٪ و واج ۵۹٪ کنترل نمود که با

ناپایدار (امتیاز ۳) و دوز ۱/۴ لیتر خسارت متوسط و نسبتاً طولانی (امتیاز ۴) روی کلزا ایجاد نمودند. بر اساس گزارش (1990) Bowerman کلزا فقط به مقادیر کم کلوپیرالید متحمل است..

علوفهرز تاتاری

کمترین درصد کنترل علوفهرز تاتاری با مصرف ۰/۶ لیتر لونترل بود که سبب ۴۲٪ کاهش تراکم این علوفهرز در اوایل فصل (بیست روز پس از سمپاشی)، و ۴۵٪ وزن خشک علوفهرز در اواخر فصل رویش (زمان غنچه دهی کلزا) بود. همچنین، ۰/۶ لیتر واج، تراکم و وزن خشک این علوفهرز را به ترتیب ۵۶٪ و ۵۰٪ کنترل نمود که از نظر آماری با مقدار مشابه لونترل تفاوت معنی دار داشت (جدول ۱). بیشترین کنترل تاتاری از نظر کاهش تراکم این علوفهرز با مصرف کلوپیرالید ۱ و ۱/۲ لیتر (لونترل و واج) الی ۷۰٪ بود که از نظر آماری با یکدیگر مشابه بودند. در آخر فصل رویش، لونترل ۱ و ۱/۲ لیتر با ۷۸٪ و ۸۲٪ بیشترین کنترل تاتاری را از نظر وزن خشک داشت. مقادیر ۱ و ۱/۲ لیتر واج تاتاری را بترتیب در حد ۵۹٪ و ۶۷٪ کنترل نمود که با لونترل تفاوت معنی دار داشت. به گزارش شیمی و همکاران (Shimi et al., 2006)

جدول ۱- مقایسه میانگین تاثیر مقادیر مختلف دو نوع تجاری کلوپیرالید (لونترل و واج) بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علوفهای هرز و افزایش عملکرد کلزا، نسبت به شاهد تیمار نشده هر کرت، در استان فارس

Table1- Mean comparison effect of different doses of two different commercial forms of clopyralid (Lontrel and Watch) on percent decrease of weed density and dry weight and yield increase in treated plots compared to untreated plots in Fars province.

Treatment	Canola damage by EWRC standards	Cardaus pycnocephalus % control		Polygonum aviculare % control		% canola yield increase
		Density	Dry weight	Density	Dry weight	
clopyralid (Lontrel) 0.6 L ^{-ha}	1	42 g	45 h	39 h	49 de	13 f
clopyralid (Lontrel) 0.8 L ^{-ha}	1	49 f	54 ef	55 fg	45 de	26 bc
clopyralid (Lontrel) 1 L ^{-ha}	2	75 bc	78 b	66 cd	41 e	28 b
clopyralid (Lontrel) 1.2 L ^{-ha}	3	77 b	82 b	61 de	48 de	21 de
clopyralid (Lontrel) 1.4 L ^{-ha}	4	68 d	63 cd	78 b	76 b	13 f
clopyralid (Watch) 0.6 L ^{-ha}	1	56 e	50 efg	49 g	44 de	12 f
clopyralid (Watch) 0.8 L ^{-ha}	1	58 e	62 cd	59 ef	45 de	24 cd
clopyralid (Watch) 1 L ^{-ha}	2	72 bcd	59 de	64 de	40 e	28 b
clopyralid (Watch) 1.2 L ^{-ha}	3	70 cd	67 c	63 de	57 c	18 e
clopyralid (Watch) 1. L ^{-ha}	4	61 e	52 fg	72 bc	57 c	10 f
quinmerac+metazachlore (Butisan Star) 2.5 L ^{-ha}	1	47 fg	47 gh	55 fg	55 c	18 e
Weed-free check	1	100 a	100a	100 a	100 a	60 a

In each column, values followed by the same letter are not significantly different at 5% probability.

۱/۲ لیتر کلوپیرالید (لونترل و واج) مشابهت داشت (جدول ۱).

نتیجه کلی استان فارس نشان می‌دهد که علفکش کلوپیرالید در میزان ۱ لیتر در هکتار ماده تجاری توانست علف‌هرز تاتاری را ۷۸٪ و هفت بند را ۴۵٪ در مزارع کلزا کنترل نماید بدون اینکه صدمه‌ای به محصول وارد و عملکرد را تا ۲۸٪ نسبت به شاهد آلووده به علف‌هرز افزایش می‌دهد. شیمی و همکاران (Shimi et al., 2006) گزارش کرده اند که ۰/۸ لیتر کلوپیرالید (واج) توانست علف‌هرز تاتاری را تا ۹۵٪ و هفت بند را تا ۹۴٪ در استان فارس کنترل نماید. کارایی بهتر کلوپیرالید در آزمایش شیمی و همکاران را می‌توان به تفاوت خاک، محل آزمایش مربوط دانست. علفکش بوتیزان استار در مقدار ۲/۵ لیتر در هکتار توانست تاتاری را ۴۷٪ و هفت بند را ۵۵٪ کنترل نماید. در مجموع، بین دونوع کلوپیرالید (لونترل و واج) اختلاف چندانی از نظر خسارت به کلزا و یا کنترل علف‌های هرز مورد نظر مشاهده نشد و مقدار تا یک لیتر در هکتار از دو نوع ماده تجاری لونترل و واج برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ توصیه می‌گردد. ولی نتایج قبلی شیمی و همکاران (Shimi, et al., 2005) نشان داد یک لیتر کلوپیرالید برای کلزا خسارت زا می‌باشد که نتایج این پژوهش در منطقه فارس این گونه نبود.

استان خوزستان

علف‌های هرز غالب استان خوزستان عبارت بودند از کنگر ابلق *Ammi majus* (L.) Gaertn (Silybum marianum (L.) (Ammi majus (L.) Gaertn)، واие (L.)، شاه افسر (L.) Pall. (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.) و پنیرک (*Malva* spp.). تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تفاوت معنی دار بین تیمارها در سطح یک درصد وجود داشت (جدول نشان داده نشده است).

بر اساس جدول ۲، هیچ یک از دو نوع ماده تجاری کلوپیرالید تا مقدار ۱ لیتر در هکتار خسارتی به کلزا وارد نیاورد. میزان ۱/۲ لیتر در هکتار لونترل خسارت شدید ولی ناپایدار بر روی کلزا داشت (امتیاز ۳)، لیکن با مصرف همین

یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. کلوپیرالید ۱/۲ لیتر (لونترل و واج) هفت بند را بین ۶۱ و ۶۶٪ کنترل نمودند و اختلاف معنی دار بین این اعداد مشاهده نگردید. بیشترین کنترل هفت بند بین ۷۲ و ۷۸٪ در تیمارهای ۱/۴ لیتر کلوپیرالید (لونترل و واج) بود که این دو تیمار با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند (جدول ۱). در اینجا بوتیزان استار با ۰/۵۵٪ کنترل هفت بند مشابه ۰/۸ لیتر لونترل و واج عمل نمود. در نمونه برداری پایان فصل برای وزن خشک علف‌هرز هفت بند، کمترین کنترل علف‌هرز بین ۴۰ و ۴۹٪ کنترل بود که در تیمارهای ۰/۶ تا ۱ لیتر هر دو نوع کلوپیرالید مشاهده گردید. میزان ۱/۲ لیتر واج هفت بند را ۵۷٪ ولی لونترل ۴۸٪ کنترل نمود که از نظر آماری با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. بیشترین کنترل علف‌هرز هفت بند ۷۶٪ در تیمار ۱/۴ لیتر لونترل مشاهده شد که نسبت به ۵۷٪ کنترل ۱/۴ لیتر واج اختلاف معنی دار داشت. در نهایت، بوتیزان استار توانست هفت بند را تا ۵۵٪ کنترل نماید که برابر ۱/۴ لیتر واج و بهتر از ۱/۲ لیتر لونترل بود.

به طور کلی، مقادیر تا ۰/۸ لیتر کلوپیرالید (لونترل و واج) به کلزا صدمه‌ای وارد نیاوردند و در پایان فصل از نظر کنترل هفت بند یکسان بودند.

عملکرد کلزا

کلیه تیمارهای اعمال شده در این آزمایش در استان فارس سبب افزایش عملکرد گردیدند. بیشترین افزایش عملکرد کلزا ۲۸ درصد نسبت به شاهد تیمار شده در تیمارهایی که ۱ لیتر ۰/۸ لونترل و واج مصرف شده بودند مشاهده شد. تیمارهای ۰/۸ لیتر ماده تجاری در هکتار لونترل و واج به ترتیب عملکرد کلزا را ۲۶٪ و ۲۴٪ افزایش دادند که از نظر آماری مشابه مصرف ۱ لیتردر هکتار دو ماده تجاری علفکش کلوپیرالید بود (جدول ۱). ضمناً هیچیکی از تیمارهای علفکش نتوانست با شاهد بدون علف‌هرز رقابت نماید. درصد افزایش عملکرد کلزا در شاهد ۶۰٪ بود که از نظر آماری با سایر تیمارها تفاوت معنی دار داشت. عملکرد بوتیزان استار با ۱۸٪ افزایش با تیمار

لیتر لونتل توانسته است کنگر ابلق را ۹۴٪ کنترل نماید (Shimi et al., 2005).

بوتیزان استار نیز توانست وزن خشک این علف‌هرز را تا ۸۴٪ کنترل نماید که از نظر آماری با ۱/۲ او ۱/۴ لیتر ماده تجاری در هکتار واج ویک لیتر لونتل برابر بود. در یک آزمایش که در استان خوزستان انجام شده بود، ۲/۵ لیتر ماده تجاری در هکتار بوتیزان استار توانسته بود این علف‌هرز را ۷۵٪ کنترل نماید (Shimi et al., 2008).

وایه

همانگونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، مقادیر ۰/۶ و ۰/۸ لیتر در هکتار لونتل، علف‌هرز وایه را به طور معنی داری بهتر از واج کنترل نمودند. اما، مقادیر بالاتر هر دو نوع ماده تجاری کلوپیرالید در مورد وایه مشابه عمل نمودند. در گزارش شیمی (Shimi et al., 2006) آمده است که ۰/۶ و ۰/۸ لیتر لونتل توانسته است وایه را ۹۰٪ کنترل نماید که نتایج فوق را تایید می‌نماید.

کارایی بوتیزان استار از نظر کاهش تراکم با ۸۳٪ کنترل مشابه ۱/۲ لیتر ماده تجاری در هکتار کلوپیرالید، و از نظر کاهش وزن خشک، با ۷۶٪ کنترل بهتر از ۰/۸ لیتر کلوپیرالید

جدول ۲ - مقایسه میانگین تاثیر مقادیر مختلف دو نوع تجاری کلوپیرالید (لونتل و واج) بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز و افزایش عملکرد کلزا، نسبت به شاهد تیمار نشده هر کرت، در استان خوزستان

Table 2- Mean comparison effect of different doses of two different commercial forms of clopyralid (Lontrel and Watch) on percent decrease of weed density and dry weight and yield increase in treated plots compared to untreated plots in Khuzestan province.

Treatment	EWRC Canola damage by EWRC standards	<i>Silybum marianum</i>		<i>Ammi majus</i>		<i>Melilotus Officinalis</i>		<i>Malva spp.</i>		% canola yield increase**
		Density	Dry weight	Density	Dry weight	Density	Dry weight.	Density	Dry weight	
clopyralid (Lontrel) 0.6 L ^{-ha}	1	53 e	50 g	44 f	19 i	47 e	39 f	18 fg	47 e	116 h
clopyralid (Lontrel) 0.8 L ^{-ha}	1	78 d	83 de	80 d	70 g	79 d	81 e	33 f	52 cde	233 g
clopyralid (Lontrel) 1 L ^{-ha}	1	89 bc	87 cd	85 cd	89 de	90 b	94 bc	54 cde	52 cde	283 d
clopyralid (Lontrel) 1.2 L ^{-ha}	3	78 d	90 bc	87 bcd	94 bcd	89 bc	96 abc	52 ed	57 c	261 c
clopyralid (Lontrel) 1.4 L ^{-ha}	5.5	94 ab	95 ab	95 ab	97 ab	94 ab	97 ab	60 bcd	57 c	267 c
clopyralid (Watch) 0.6 L ^{-ha}	1	22 f	19 h	15 g	19 i	16 g	11 g	14 g	27 f	30 j
clopyralid (Watch) 0.8 L ^{-ha}	1	47 e	23 h	52 e	51 h	39 f	40 f	26 f	32 f	85 i
clopyralid (Watch) 1 L ^{-ha}	1	83 cd	64 f	81 d	87 e	77 d	81 e	50 e	50 de	242 f
clopyralid (Watch) 1.2 L ^{-ha}	1.75	90 bc	79 e	80 d	91 cde	82 cd	86 d	66 b	52 cde	302 d
clopyralid (Watch) 1.4 L ^{-ha}	6	86 c	87 cd	91 bc	95 abc	88 bc	93 c	66 b	54 cd	320 b
quinmerac+metazachlore (Butisan Star) 2.5 L ^{-ha}	1	77 d	84 de	83 cd	76 f	78 d	80 e	61 bc	64 b	309 c
Weed-free check	1	100 a	100 a	100 a	100 a	100 a	100 a	100 a	100 a	342 a

In each column, values followed by the same letter are not significantly different at 5% probability.

مقدار از ماده تجاری واج، فقط خسارت خفیف و زود گذر به کلزا وارد گردید (امتیاز ۱/۷۵). مقدار ۱/۴ لیتر در هکتار لونتل و واج خسارت نسبتاً زیادی به کلزا وارد آورده (امتیاز ۵/۵ برای لونتل و ۶ برای واج). به گزارش شیمی و همکاران (Shimi et al., 2005) مصرف یک لیتر لونتل سبب کاهش ۱۰ درصدی ارتفاع کلزا شده است.

کنگر ابلق

برای کنترل کنگر ابلق، کارایی لونتل تا ۰/۸ لیتر در هکتار بهتر از واج بود. یک لیتر در هکتار هر دو نوع کلوپیرالید از نظر کاهش تراکم این علف‌هرز مشابه بودند، لیکن از نظر درصد کاهش وزن خشک، لونتل بهتر از واج بود (جدول ۲). در مقادیر ۱/۲ او ۱/۴ لیتر در هکتار، وزن خشک کنگر ابلق توسط لونتل بیش از ۹۰٪ و واج بین ۷۹٪ و ۸۷٪ کنترل گردید که با یکدیگر تفاوت معنی دار آماری داشتند. از نظر آماری میزان کنترل ۱/۴ لیتر در هکتار لونتل با شاهد بدون علف‌هرز برابر بود. لازم به ذکر است از آنجایی که که خسارت اولیه ۱/۴ لیتر ماده تجاری در هکتار لونتل به کلزا نسبتاً شدید بوده است، میزان کنترل کنگر ابلق را تحت الشاع قرار می‌دهد. در یک آزمایش که در خوزستان انجام شده بود ۰/۸

Shimi et al., 2008 بوتیزان استار توانست پنیرک را ۷۵٪ کترل نماید ().

نتیجه کلی استان خوزستان نشان می‌دهد که علفکش کلوپیرالید با مقدار یک لیتر در هکتار (لونترب واج) هیچ گونه اثر سوئی روی کلزا ندارد، در حالی که در اوایل رشد کلزا، مقادیر بالا تر از یک لیتر ماده تجاری در هکتار خسارت‌هایی به کلزا وارد نمودند. البته در این که در پایان فصل ظاهرا خسارت‌های ناشی از مقادیر بالای کلوپیرالید جبران شده و عملکرد کلزا نسبت به شاهد آلووده به علف‌هرز افزایش بیش از ۳۰۰ درصد را نشان داده است (جدول ۲).

از نظر کترل علف‌های هرز، نتیجه کلی نشان می‌دهد که کلوپیرالید با مقدار یک لیتر در هکتار از نوع تجاری لونترب و یا واج علف‌های هرز پهن برگ را بین ۸۵ و ۹۰ درصد کترل کرد (جز پنیرک که در حدود ۵۰ درصد کترول شد). ماده تجاری لونترب کمی بهتر از واج عمل نمود.

عملکرد

کلیه تیمارهای به کار رفته در خوزستان سبب افزایش عملکرد کلزا گردیدند. بیشترین عملکرد با ۳۴۲ درصد افزایش، نسبت به شاهد با علف‌هرز، در تیمار بدون علف‌هرز مشاهده شد که با سایر تیمارها تفاوت معنی دار داشت (جدول ۲). واج ۱/۴ لیتر در هکتار با ۳۲۰ درصد افزایش محصول در رده دوم قرار گرفت. اگر چه این مقدار واج سوختگی زیادی در کلزا پس از سمپاشی ایجاد نموده بود (جدول ۲)، لیکن ظاهرا خسارت وارد در طول فصل رشد جبران شده و، به علت کترول بهتر علف‌های هرز، باعث عملکرد نسبتاً بالای کلزا شده است. گرچه لونترب ۱/۴ لیتر در هکتار خسارت کمتری را به کلزا وارد آورده بود ولی عملکرد کلزا با ۲۶۷ درصد افزایش، کمتر از علفکش واج بود. در مجموع، عملکرد علفکش واج در مقادیر ۰/۸ و یک لیتر در هکتار کمتر از لونترب بود، لیکن در مقادیر بالاتر ۱/۲ و ۱/۴ لیتر بیشتر از

عمل نمود. در یک آزمایش شیمی و همکاران (Shimi et al., 2008) اظهار داشتند که ۲/۵ لیتر بوتیزان استار در خوزستان وايه را در حد ۴۹٪ کترول کرده در حالی که و این مقدار بسیار پائین تر از ۷۶٪ کترولی است که در آزمایش حاضر گزارش شده است.

شاه افسر

به طور کلی، کترول شاه افسر توسط علفکش لونترب بهتر از واج بود. مقدار یک لیتر از علفکش لونترب تراکم این علف‌هرز را تا ۹۰٪ کاهش داد، و همچنین وزن خشک آنرا نیز تا ۹۴٪ کترول نمود، در حالیکه واج به ترتیب با ۷۷٪ و ۸۱٪ کترول، تفاوت معنی داربا لونترب داشت (جدول ۲). کترول این علف‌هرز توسط بوتیزان استار به ترتیب از نظر درصد کاهش تراکم و وزن خشک ۷۸ و ۸۰٪ بود که برابر با لونترب ۰/۸ لیتر و واج یک لیتر ماده تجاری در هکتار بود. به گزارش شیمی و همکاران (Shimi et al., 2006) ۰/۸ لیتر لونترب توانست در خوزستان شاه افسر را ۸۶٪ کترول نماید. این درصد با نتیجه حاصل از کاربرد علفکش واج در آزمایش حاضر مطابقت دارد. نتایج مشابه نیز از استان گلستان گزارش شده است (Shimi et al., 2005).

پنیرک

لونترب ۰/۸ لیتر ماده تجاری در هکتار از علفکش لونترب بر روی درصد کاهش تراکم پنیرک تاثیر زیادی نداشت ولی در پایان فصل از نظر درصد کاهش وزن خشک، این علف‌هرز را ۵۲٪ کترول نمود. یک لیتر در هکتار لونترب و واج توانستند تراکم و وزن خشک پنیرک را ۵۰٪ کترول نمایند. مقادیر بالا تر این دو ماده تجاری کلوپیرالید نتوانستند تاثیر بیشتر روی کترول پنیرک بگذارند (جدول ۲). اما بوتیزان استار با ۶۴٪ کترول وزن خشک پنیرک، تفاوت معنی داری را با کلوپیرالید نشان داد. نتایج یک آزمایش در خوزستان نشان داد، لونترب توانست پنیرک از نظر وزن خشک ۷۶٪ کترول نماید (Shimi et al., 2006). در آزمایش دیگر در خوزستان، ۲/۵ لیتر

گاهی سبب خسارت جزئی و جبران پذیر به کلزا می‌شود. خطر استفاده از مقادیر بالاتر زیاد است ولی امکان جبران خسارت کلزا وجود دارد. در مرور مزارعی که از علفکش بوتیزان استوار استفاده شده است، به علت این که این علف کش می‌تواند علف‌های هرز حساس به کلوپیرالید، مانند تیره‌های *Polygonaceae* و *Asteraceae* را مهار نماید، دیگر نیازی به سمپاشی تکمیلی کلوپیرالید نمی‌باشد.

لونترل بود. می‌توان چنین استنباط نمود که کلوپیرالید از نوع تجاری و اچ خسارت کمتری به گیاه کلزا نسبت به لونترل وارد نمود.

در کل: نتیجه دو آزمایش فوق حاکی از آن است که دو نوع تجاری کلو پیرالید ۳۰٪ اس ال، که لونترل و واج می‌باشد، از نظر تاثیر روی علف‌های هرز حساس مشابه هم بوده و می‌شود مقدار اینم آن‌ها حد اکثر ۰/۸ لیتر در هکتار ذکر نمود. مقدار مصرف یک لیتر در هکتار دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید

منابع

- Anonymous. 1995. Lontrel 300, summary of data. Dow Elanco co. 10pp.
- Blackshaw, R.C. 1992. Combinde post emergence grass and broadleaf weed control in canola (*Brassica napus*). *Weed Tech.* 6:4, 892-897.
- Bowerman, P. 1990. Weed control in winter oilseed rape –Review of ADAS trials 1985-87. Aspect of applied biology. No. 23: 29-226.
- Camper, N.D. 1986. Research Methods in Weed Science. Southern Weed Science Society of America. Pp. 287.
- Clay, D.V. and Dixon, F. L. 1998. The susceptibility of Compositae weed species to clopyralid. Tests of Agrochemicals and Cultivars. No:19:32-33.
- Laureti, D. 1989. Results of two-years' experiments with herbicide products and timing of their use. *Informatore Agrario.* 45:32, 67-70.
- Loeppy H.A.,and R.E.Blackshaw.1994.Mustard tolerance to clopyralid applied alone or with ethametsulfuron.Can.J.PI.Sci.74(3):635-641.
- Noorbakhsh, S., Sahraian, H., Soroosh, M.J., Rezaei, V. and Fotoohi, A.R. 2011. Index of pests, diseases and weeds of main crops, pesticides and control recommendations. Plant Protection Organization. 100pp.
- Salimi, H., Ahmadi, M.A., Barjesteh, A., Hatami, S., Delghandi, M., Fereidoonpoor, M.R., Ghanbari-Birgani, D., Narimani.V., Yunesabadi, M., Nazer Kakhki, H. and Sajedi, S. 2004. Identification, density and phenology of dominant weeds of canola in ten provinces. Proceedings of the 16th Iranian Congress of Plant Protection.p. 538.
- Shimi, P., Amini-Khalaf, M.A., Faghah, H. and Azimi, A. 2003. Controlling Umbelliferae, Leguminae, Compositae and Polygonacae weeds in canola. Final on farm research report. Plant Pests and Diseases Research Institute. 24pp.
- Shimi, P., Bagherani-Torshiz, N., Maleki, I. and Mottaki, E. 2005. Testing some herbicides in canola fields. Final on farm research report. Plant Pests and Diseases Research Institute. 32pp.
- Shimi, P., Poorazar, R., Jamali, M. and Bagherani-Torshiz, N. 2006. Evaluating clopyralid as a broadleaf herbicide in canola. Pak. J. Weed Sci. Res. 12(4): 307-311.
- Shimi, P., Saeidi, H., Abtaly, Y. and Poorazar, R. 2008. Testing Butisan Star in canola. Final Research Report. Iranian Research Institute of Plant Protection. 27pp.
- Staff, O. 2007. Herbicide recommendations for canola (winter and spring planted): postemergence grass and broadleaf herbicides. Canada, Ontario Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs. 14pp.
- Tomlin, C.D.S. 2004. The Pesticide Manual. British Crop Protection Council. Pp.1344.
- Ziminska, Z., Bakuniaki, E. and Turos-Biernaka, M.1997. Greenhouse experiments to elaborate new herbicide composition against main weeds in winter oilseed rape. Progress in plant protection.37:2,241-243.

Efficiency of Two Commercial Forms of Clopyralid at Different Doses in Controlling Canola Weeds

Parviz Shimi¹, Reza Poorazar², Farokhdin Ghezeli³ and Hamidreza Sasanfar⁴

1- Department of Weed Research, Iranian Research Institute of Plant Protection 2- Agricultural Research Center, Khuzestan 3- Agricultural Research Center, Fars

4- Department of Agronomy, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract

In order to compare two commercial forms of clopyralid (30% SL) under the trade names of Lontrel and Watch and their high dose effects on canola, an experiment was conducted in randomized complete blocks design with 12 treatments and 4 replications in Fars and Khuzestan provinces during 2008-9. Treatments included post-emergence application of Lontrel and Watch at 0.6, 0.8, 1, 1.2 and 1.4 L.-ha., pre-emergence application of quinmerac+metazachlor (Butisan Star, 42.1% SC) at 2.5 L.-ha. and weed free check. All plots were sprayed with 0.75 L.-ha. of haloxyfop-R-methyl ester (Galant Super 10.8% EC) post emergence against grass weeds. Results indicated that both types of clopyralid were safe on canola up to 0.8 L.-ha. One L.-ha. of clopyralid caused slight damage to canola, but soon recovered and did not affect yield, while better control of weeds was observed. Control of dominant weeds (*Carduus pycnocephalus* L. and *Polygonum aviculare* L.) in Fars province, by one L.-ha. of both commercial forms of clopyralid resulted in highest canola yield increase (28%). Control of dominant weeds in Khuzestan, including *Silybum marianum* L., *Ammi majus* L., *Melilotus officinalis* (L.) Pallas and *Malva* spp., by one L.-ha of both commercial forms of clopyralid increased canola yield by over 200 per cent.

Key words: Broad leaf weeds, canola, dosage, Lontrel, Watch