

بررسی میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری در پایان نامه‌های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر احمد شیبانی نیا <sup>۳</sup>	دکتر افشین حراجی <sup>۲</sup>	ارمغان شهبازی <sup>۱</sup>
امیر ارسلان هوشیار فرد <sup>۶</sup>	مهندس ناصر ولایی <sup>#۵</sup>	دکتر محسن مهرشادیان <sup>۴</sup>
آزاده خواجه‌جی خان <sup>۹</sup>	دکتر بیتا توکلی <sup>۸</sup>	دکتر مهران نوربخش <sup>۷</sup>

## خلاصه:

**سابقه و هدف:** با توجه به اهمیت پایان نامه‌ها در آموزش عملی متداول‌ترین تحقیق به دانشجویان و عدم اطلاع از کیفیت محتوای پایان نامه‌ها در دانشگاه متبع وجود کاستی‌ها در مقالات منتشره از این نوع پایان نامه‌ها و به منظور تعیین میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و عوامل مرتبط با آن، این تحقیق روی پایان نامه‌های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۶-۸۷ انجام گرفت.

**مواد و روش‌ها:** تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت. کلیه پایان نامه‌های دفع شده واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۸۶/۷/۱ تا ۸۷/۶/۳۱ مورد بررسی قرار گرفت. در هر پایان نامه فصول مربوطه با ۱۳ شاخص در یک طیف سه‌گانه (صحيح، نسبتاً صحیح و ناصحیح) بررسی شد. عوامل مرتبط شامل: خصوصیات دانشجو، استاد راهنما، بخش مربوطه و ... بود که برای هر پایان نامه تعیین و ثبت گردید. در هر پایان نامه چنانچه بیش از ۷۵ درصد از شاخص‌ها درست تنظیم شده بودند، به عنوان گزینه صحیح، ۷۵-۵۰ درصد نسبتاً صحیح و کمتر از ۵۰ درصد ناصحیح تلقی شد. نقش عوامل مرتبط با آزمون (کای دو) مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

**یافته‌ها:** تحقیق روی ۱۳۷ پایان نامه انجام گرفت. فراوانی عدم صحت نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری در مورد کلیه شاخص‌ها، برابر ۴۰/۲ درصد بود و در بررسی شاخص‌ها فراوانی "توجیه نداشتن حجم نمونه" ۷۱ درصد، "تنظیم ناصحیح فرم اطلاعاتی" ۵۳ درصد و "عدم ذکر تمامی متغیرها" یا ذکر متغیر جدید یا مرکب در جدول ۳۷ درصد بود.

**نتیجه گیری:** کاستی‌های عمدۀ ای در پایان نامه‌های دندانپزشکی تدوین شده وجود دارد. انجام اقدامات لازم برای کاهش موارد اشتباه در متداول‌ترین نگارش پایان نامه‌ها سبب افزایش اعتبار آنها و به کارگیری نتایج صحیح پژوهش‌ها خواهد شد.

**کلیدوازه‌ها:** متداول‌وزیری تحقیق، متغیرهای تحقیق، پایان نامه‌های دندانپزشکی، حجم نمونه، فرم اطلاعاتی

وصول مقاله: ۸۸/۱۰/۱۲      اصلاح نهایی: ۸۸/۱۲/۲۲      پذیرش مقاله: ۸۹/۲/۳۰

مقدمه:

یکی از نگرانی‌های جامعه علمی کشور از جمله فعالان عرصه علوم دیندانی شکم مسئله کفت نیاز، متده له ڙی تحقیق، م باشد<sup>(۲۱)</sup>

اگر چه تحقیقات در زمینه بررسی صحت متدولوژی در ایران کم است، ولی بر اساس تحقیقات انجام شده، میزان عدم صحت کامل (۳)

مذکوری پایان نامه ها تا ۱۰ درصد ترارس سده است . در تحقیقی روی مجلات پزشکی دارای رتبه ISI در کشور پاکستان، میان نه اقص منبع نه سس به دوش و انکمو، ۷۵ درصد گزارش

۵- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات تالاسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۷- استادیار گروه آموزشی بروتایت دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

۸- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بیمارهای دهان و تشخیص دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

۱۰- عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

۷- استادیار کروه امورسی پرور بابت دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

۸- عضو هیئت علمی گروه اموزشی بیماریهای دهان و تشخیص دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

۹- دکتر حسن علی‌خانیان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

دارند اما در بعضی از تحقیقات نظری تحقیقات توصیفی و تحلیلی برخی از این شاخص‌ها مانند متغیر مداخله‌گر، موضوعیت ندارد، لذا این موارد به عنوان «مطرح نیست» تلقی شد و امتیاز بر مبنای شاخص‌های مطرح محاسبه گردید. کلیه نتایج در یک فرم اطلاعاتی ثبت گردید. پایانی اعضای تیم برای بررسی صحت متداول‌وزیری در یک مطالعه آزمایشی بر روی ۱۰ پایان نامه و با فاصله زمانی یک هفته به روش اسپرمن ارزیابی و ۹۶ درصد بدست آمد. عوامل مرتبط شامل جنس، معدل کل دانشجو، نمره پایان نامه، نمره درس تحقیقات، زمان دفاع، فاصله زمانی بین ثبت پروپوزال تا دفاع از پایان نامه، تعداد استاد مشاور و مرتبه علمی استاد راهنمای و استاد مشاور بود که برای هر پایان نامه تعیین گردید.

داده‌های فرم اطلاعاتی طبقه‌بندی، استخراج و آماره توصیفی- تحلیلی ارائه گردید. در هر پایان نامه چنانچه بیش از ۷۵ درصد از شاخص‌ها درست تنظیم شده بودند، آن پایان نامه به عنوان گزینه صحیح، ۵۰ - ۷۵ درصد نسبتاً صحیح و کمتر از ۵۰ درصد به عنوان گزینه ناصحیح تلقی شد. نقش عوامل مرتبط با آزمون (کای دو) مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

#### یافته‌ها:


تحقیق روی تعداد ۱۳۷ پایان نامه انجام گرفت. این پایان نامه‌ها مربوط به ۹۰ دختر (۶۵/۷ درصد) و ۴۷ پسر (۳۴/۳ درصد) بود. معدل کل آنها  $1/1 \pm 15/5$ ، نمره پایان نامه آنها  $18/6 \pm 0/5$ ، نمره درس تحقیقات آنها  $15/1 \pm 2/2$  و بالاخره فاصله زمانی بین ثبت پروپوزال تا دفاع از پایان نامه آنها  $12/4 \pm 3/82$  ماه بود. توزیع پایان نامه‌ها بر حسب میزان صحت اصول نگارش فضول متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری در نمودار شماره ۱ ارائه شده است و نشان می‌دهد که نمونه‌گیری در نمودار شماره ۱ ارائه شده است و نشان می‌دهد که ۸۲ پایان نامه  $59/8$  درصد صحیح،  $32/6$  درصد نسبتاً صحیح و  $6/6$  درصد ناصحیح تدوین شده بودند. به این ترتیب فراوانی عدم صحت (ناصحیح و نسبتاً صحیح) نگارش متغیرهای تحقیق، عدم صحت (ناصحیح و نسبتاً صحیح) نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری در نمونه‌ها به میزان  $40/2$  درصد بود و با اطمینان  $95$  درصد میزان واقعی (CI) عدم صحت نگارش این فضول از حداقل  $32$  تا  $48$  درصد برآورد می‌گردد.

دندانپزشکی<sup>(۷)</sup> و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سعی می‌شود کیفیت پایان نامه‌ها ارتقاء یابد<sup>(۸)</sup>. اما اگر این تمهدات میسر واقع نشود علاوه بر ایجاد نگرانی برای دانشجویان و مستولین دانشگاه منجر به عدم تبدیل پایان نامه به مقاله، تضعیف رتبه دانشگاه و به هدر رفتن امکانات مادی و معنوی دانشگاه خواهد شد<sup>(۹)</sup>.

به نظر می‌رسد یکی از عمدۀ ترین اولویت‌های پژوهشی، ارزشیابی کیفیت متداول‌وزیری پایان نامه‌های تحقیقاتی دفاع شده باشد، برای پاسخ به این ۳ سؤال که آیا در تدوین پایان نامه‌ها، اصول نگارش صحیح رعایت نشده است؟ یا در صورت وجود چند درصد پایان نامه‌ها را تشکیل می‌دهد؟ نیز عوامل مرتبط با آن کدام است؟ در بررسی پیشینه، میزان صحت متداول‌وزیری بسیار متفاوت گزارش شده است<sup>(۱۰)</sup>. علی‌هذا با توجه به خلاء اطلاعاتی در خصوص صحت نگارش فضول متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و عوامل مرتبط با آن، این تحقیق روی کلیه پایان نامه‌هایی که از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۳۱ لغایت ۱۳۸۷/۶/۳۱ در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دفاع شده اند انجام گرفت.

#### مواد و روش‌ها:

تحقیق با طراحی Cross-Sectional انجام گرفت. کلیه پایان نامه‌های دفاع شده از امور پایان نامه‌های معاونت پژوهشی واحد دانشگاه متبع تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. در هر پایان نامه فضول متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری با ۱۳ شاخص که بر مبنای روش‌های متداول نگارش متون علمی مشخص گردیده بودند<sup>(۵)</sup>، شامل: وجود ۳ یا ۴ قسمت متغیرها (متغیرهای تحقیق، وضعیت آنها، جدول و فرم اطلاعاتی)، متغیرهای اهداف اختصاصی، ذکر و نحوه رفتار با متغیرهای مداخله‌گر، ذکر متغیر زمینه‌ای، جدول و متغیرها با عناصر و صحت آن، ذکر تمامی متغیرها در جدول و عدم درج متغیر جدید یا مرکب، ابزار سنجش متغیرها با ذکر منبع، صحت تنظیم فرم اطلاعاتی، مکان یابی متغیرها و تعداد فرم اطلاعاتی، جامع بودن جامعه مورد بررسی، ذکر تعداد نمونه، توجیه حجم نمونه و صحت روش نمونه‌گیری در یک طیف سه‌گانه (صحیح، نسبتاً صحیح و ناصحیح) بررسی شد بدین ترتیب که به طور مثال در خصوص حجم نمونه اگر بر اساس یک مطالعه آزمایشی، برآورد شده بود، به عنوان گزینه صحیح و اگر براساس تحقیقات قبلی با ذکر منبع در نظر گرفته شده بود، نسبتاً صحیح و در غیراینصورت ناصحیح تلقی شد. ضمناً قابل ذکر است که این شاخص‌های ۱۳ گانه، در تحقیقات تجربی، به طور کامل مصدق




نمودار ۳: توزیع ۱۳۷ پایان‌نامه مورد بررسی بر حسب عدم صحت نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری آنها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی

توزیع پایان‌نامه‌های مورد بررسی بر حسب میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و به تفکیک عوامل مرتبط در جدول شماره ۱ ارائه شده است و نشان می‌دهد که پایان‌نامه‌هایی که صحیح تدوین نشده بودند در مواجهه بیشتری از نظر جنس، معدل پائین، نمره پایان‌نامه پائین، نمره درس تحقیقات پائین، تأخیر در زمان دفاع، فاصله زمانی ثبت پروپوزال تا دفاع از پایان‌نامه بیشتر از یک سال، نداشتن استاد مشاور و نبود استاد مشاور ۲ و همچنین مرتبه پائین هیئت علمی نبودند.

جدول ۱: توزیع پایان‌نامه‌های مورد بررسی بر حسب میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و به تفکیک عوامل مرتبط

P	ندارد	دارد	صحت	عوامل مرتبط
			جنس	
$p < 0.3$	۳۳ (۶۰)	۵۷ (۶۹/۵)	- دختر	-
	۲۲ (۴۰)	۲۵ (۳۰/۵)	- پسر	
$p < 0.3$	۲۴ (۴۳/۶)	۴۴ (۵۳/۷)	معدل کل	-
	۳۱ (۵۶/۴)	۳۸ (۴۶/۳)	- بالا	
$p < 0.7$	۱۷ (۳۰/۹)	۲۹ (۳۵/۴)	نمره پایان‌نامه	-
	۳۸ (۶۹/۱)	۵۳ (۶۴/۶)	- پائین	
			- بالا	



نمودار ۱: توزیع ۱۳۷ پایان‌نامه مورد بررسی بر حسب میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری در پایان‌نامه‌های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۶-۸۷

توزیع پایان‌نامه‌های مورد بررسی بر حسب درصد عدم صحت نگارش فضول متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری به تفکیک شاخص‌های آنها در نمودار شماره ۲ ارائه گردیده است و نشان می‌دهد که بیشترین درصد عدم صحت مربوط به توجیه نکردن حجم نمونه بمیزان ۷۱ درصد بود و در مرحله دوم تنظیم ناصحیح فرم اطلاعاتی بمیزان ۵۳ درصد و بعد از آن عدم ذکر تمامی متغیرها در جدول و یا ذکر متغیر جدید یا مرکب به میزان ۳۷ درصد قرار داشت. عدم ذکر متغیرهای زمینه‌ای در تحقیقات با طراحی کارآزمایی بالینی بمیزان ۳۱ درصد و عدم ذکر منع برای ابزار سنجش متغیرها بمیزان ۲۵ درصد در مراحل بعدی بودند. کمترین میزان اشتباہ و یا بالاترین صحت مربوط به مشخص کردن تعداد نمونه به میزان ۴ درصد بود و در مرحله بعد وجود حداقل ۳ یا ۴ قسمت متغیرها به میزان ۵ درصد قرار داشت و باز هم بهترین‌ها در رتبه‌های بعدی مربوط به مکان‌یابی صحیح متغیرها و تعداد مناسب فرم اطلاعاتی و نیز جامع بودن جامعه مورد بررسی بوده که ۹۰ درصد صحیح گزارش شده بودند.

پرتوز ثابت و پریو نسبت به بخش‌های اندو، ترمیمی، تشخیص و پرتوز متحرک بودند.

جدول ۲: توزیع پایان نامه‌های مورد بررسی بر حسب صحت نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و به تفکیک بخش‌ها

OR	P			بسخ‌ها	صحت
		ندارد	دارد		
۴/۴	p<0.005	۲۷ (۵۷/۴)	۴۷ (۸۵/۵)	اندو، ترمیمی، تشخیص، پرتوز متحرک	
		۲۰ (۴۲/۶)	۸ (۱۴/۵)	پرتوز ثابت، پریو	

از نظر نوع مطالعه (روش تحقیق یا Design) تعداد ۲ پایان نامه ۱/۵ درصد) با طراحی همگردهی تاریخی، ۲/۲ درصد با طراحی مورد شاهدی، ۲/۹ درصد با طراحی داده‌های موجود و ۴/۴ درصد به روش تشخیصی وجود داشت. بیشترین پایان نامه‌ها به روش تجربی آزمایشگاهی به میزان ۴۹/۶ درصد و بعد تحقیقات توصیفی به میزان ۲۸/۵ درصد و بالاخره تحقیقات کارآزمایی بالینی به میزان ۱۰/۹ درصد انجام گرفته بود. توزیع پایان نامه‌های مورد بررسی با ۳ روش بیشتر به کار گرفته شده و بر حسب صحت نگارش متداول‌تری در جدول ۳ ارائه شده است و نشان می‌دهد که میزان کاستی‌های نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری در روش توصیفی ۳۳ درصد و در روش‌های تجربی آزمایشگاهی و کارآزمایی بالینی بترتیب ۴۱ و ۶۷ درصد بوده است و آزمون (کای دو) نشان داد که اختلاف به لحاظ آماری معنی دار است. (p < 0.09)

جدول ۳: توزیع پایان نامه‌های مورد بررسی بر حسب صحت نگارش متداول‌تری و به تفکیک نوع طراحی

جمع	ندارد	دارد			صحت
			نوع طراحی		
۶۸ (۱۰۰)	۲۸ (۴۱)	۴۰ (۵۹)	تجربی آزمایشگاهی		
۳۹ (۱۰۰)	۱۳ (۳۳)	۲۶ (۶۷)	توصیفی		
۱۵ (۱۰۰)	۱۰ (۶۷)	۵ (۳۳)	کارآزمایی بالینی		
۱۲۲ (۱۰۰)	۵۱ (۴۲)	۷۱ (۵۸)	جمع		

#### بحث:

تحقیق نشان داد عدم صحت نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری بمیزان ۴۰/۲ درصد وجود داشت و بیشترین درصد عدم صحت مریبوط به توجیه

		صحت		عوامل مرتبط
		ندارد	دارد	نمره درس تحقیقات
p < 0.2	۲۲ (۴۰/۷)	۴۲ (۵۳/۲)	- پائین	زمان دفاع
	۳۲ (۵۹/۳)	۳۷ (۴۶/۸)	- بالا	
p < 0.3	۱۳ (۲۴/۱)	۲۶ (۳۲/۹)	- به موقع	فاصله ثبت پروپوزال تا
	۴۱ (۷۵/۹)	۵۳ (۶۷/۱)	- با تأخیر	دفاع از پایان نامه
p < 0.4	۲۲ (۴۰)	۴۰ (۴۸/۸)	- کمتر از یک سال	- بیشتر از یک سال
	۳۳ (۶۰)	۴۲ (۵۱/۲)	-	
p < 0.4	۳۷ (۶۷/۳)	۶۱ (۷۴/۴)	- دارد	استاد مشاور
	۱۸ (۳۲/۷)	۲۱ (۲۵/۶)	- ندارد	
p < 0.8	۱۱ (۲۰)	۱۹ (۲۳/۲)	- دارد	استاد مشاور ۲
	۴۴ (۸۰)	۶۳ (۷۶/۸)	- ندارد	
p < 0.8	۶ (۱۰/۹)	۱۱ (۱۳/۴)	- دانشیار و بالاتر	مرتبه علمی استاد راهنما
	۴۹ (۸۹/۱)	۷۱ (۸۶/۶)	- استادیار و پائین تر	
p < 0.8	۳۱ (۸۳/۸)	۵۳ (۸۶/۹)	- استادیار و پائین تر	مرتبه علمی استاد مشاور ۱
	۶ (۱۶/۲)	۸ (۱۳/۱)	- دانشیار و بالاتر	

از ۱۳۷ پایان نامه مورد بررسی بیشترین پایان نامه‌ها مربوط به بخش اندو به تعداد ۲۳ پایان نامه (۸/۸ درصد) بود و در مرحله دوم بخش ترمیمی با تعداد ۲۲ پایان نامه (۱۶/۱۱ درصد) قرار داشت. کمترین پایان نامه‌ها در بخش بهداشت به تعداد ۳ مورد و بعد رادیولوژی به تعداد ۴ مورد، پاتولوژی ۵ مورد، جراحی ۶ مورد، ارتوپنی ۸ مورد و بالاخره کودکان با ۹ پایان نامه قرار داشتند. تمام پایان نامه‌های بخش کودکان صحیح تدوین شده بودند و در واقع مشکلی از لحاظ صحت نگارش نداشتند. توزیع پایان نامه‌های غیر از بخش‌های فوق الذکر بر حسب صحت اصول نگارش و به تفکیک بخش‌ها در جدول شماره ۲ ارائه شده است و نشان می‌دهد که پایان نامه‌هایی که ناصحیح تنظیم شده بودند ۴۲/۶ درصد در بخش‌های پرتوز ثابت و پریو قرار داشتند و پایان نامه‌هایی که صحیح تنظیم شده بودند ۱۴/۵ درصد در دو بخش نامبرده قرار داشتند (p < 0.005) و پایان نامه‌های دارای اشکال نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری ۴/۴ برابر بیشتر در مواجهه با بخش‌های

چرا باید بر اساس پیشینه تحقیق به حجم نمونه اکتفا کرد؟! اگر واقعاً این حجم نمونه در مطالعه قبلی کافی باشد، آیا تحقیق ما تکراری تلقی نمی شود؟ به نظر می رسد ارجح این باشد که یک مطالعه آزمایشی برای تعیین حجم نمونه انجام گیرد تا یافته تحقیق ما قربانی حجم نمونه نشود. انجام این مطالعه آزمایشی علاوه بر کمک در برآوردن صحیح حجم نمونه؛ عملی بودن و همچنین برآوردن زمان، بودجه و نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت و به این سوال پاسخ می دهد که ابزارها و مجری و همکاران یک طرح تحقیقی تا چه حد در اندازه گیری متغیرها ثبات دارند؟ بیان این گزارش اعتماد بیشتر پژوهشگران، اعضای هیئت تحریریه، داوران و از همه مهمتر خوانندگان را در پی خواهد داشت.

دومین شاخص آسیب پذیر پایان نامه های تدوین شده " تنظیم ناصحیح فرم اطلاعاتی " بود که در ۵۳ درصد پایان نامه ها فرم اطلاعاتی صحیح تنظیم نشده بود. از آنجائیکه صحت فرم اطلاعاتی یعنی، دریافت صحیح داده های مورد نیاز جهت پردازش اطلاعات و به دنبال آن نتیجه گیری درست و مطلوب، لذا در صورت عدم تنظیم صحیح فرم اطلاعاتی، یافته های تحقیق و به دنبال آن بحث صورت گرفته مخدوش خواهد بود. در بررسی پیشینه تحقیق مشابه این یافته وجود نداشت و یا لااقل در دسترس قرار نگرفت.

تحقیق نشان داد که کمترین میزان اشتباه و با بالاترین صحت مربوط به " ذکر تعداد نمونه " بود که در ۹۶ درصد پایان نامه ها تعداد نمونه قید شده بود. در تحقیقی که دکتر شیبانی نیا و همکاران انجام داده بودند نیز در ۹۶ درصد مقالات حجم نمونه ذکر شده بود.<sup>(۵)</sup>

یکی دیگر از یافته های این تحقیق " روش تحقیق " یا طراحی (Design) در پایان نامه های تدوین شده بود و مشاهده گردید که متداول ترین روش تحقیق، مطالعات (تجربی آزمایشگاهی) به میزان ۴۹/۶ درصد و بعد توصیفی ۲۸/۵ درصد) و کارآزمایی بالینی ۱۰/۹ درصد (درصد) بود. در تحقیق دکتر شیبانی نیا متداول ترین روش تحقیق مطالعات تجربی *In vitro* به میزان ۴۴ درصد و بعد توصیفی با ۳۳ درصد و کارآزمایی بالینی با ۱۱ درصد گزارش شد.<sup>(۶)</sup> در تحقیق دیگری بر روی مقالات منتشر شده پژوهشی در یک مجله پژوهشی، تحقیق توصیفی ۵۰ درصد، مطالعات تجربی *In vitro* ۱۲/۵ درصد و کارآزمایی بالینی ۷/۵ درصد ذکر گردید.<sup>(۷)</sup>

در مجله نامه و در طی سال های ۱۳۸۰-۸۴ فراوانی مقالات توصیفی ۳۹/۲ درصد، کارآزمایی بالینی ۲۰/۴ درصد، مطالعات

نکردن حجم نمونه به میزان ۷۱ درصد بود و در مرحله دوم تنظیم ناصحیح فرم اطلاعاتی به میزان ۵۳ درصد و بعد از آن عدم ذکر تمامی متغیرها در جدول و یا ذکر متغیر جدید یا مرکب به میزان ۳۷ درصد قرار داشت. کمترین میزان خطأ و یا به عبارتی بالاترین صحت مربوط به مشخص کردن تعداد نمونه بود که ۹۶ درصد صحیح گزارش شده بود. در بررسی پیشینه، تحقیقی که مشابه این تحقیق همه پایان نامه ها را از یک زاویه خاص یعنی فصل های متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه گیری بررسی کرده باشد وجود نداشته یا لااقل در دسترس نبوده است، اما مقالات چندی درباره صحت متداوله از مقالات منتشر شده وجود داشته است. اگرچه منطقاً انتظار داریم که مقالات به دلیل روند داوری و نحوه پذیرش آنها با کیفیت بهتری ارائه شود، اما سؤال این است، مگر نه اینکه این مقالات ناشی از طرح های تحقیقاتی و به ویژه پایان نامه های مصوب هستند پس علی الاصول می بایست این بستر کار به درستی تنظیم شده باشد.

این تحقیق نشان داد از ۱۳ شاخص صحت متداوله از بررسی شده، ضعیف ترین و پر اشتباه ترین قسمت مربوط به " توجیه نکردن حجم نمونه " به میزان ۷۱ درصد بود. بسیاری از یافته های تحقیق قربانی حجم ناصحیح نمونه می شوند بدین ترتیب که اگر تعداد نمونه کافی نباشد، نتیجه آزمون آماری معنی دار نیست و اگر تعداد نمونه خیلی زیاد باشد، نتیجه آزمون آماری معنی دار است. در حالی که نتیجه تحقیق غیر از این می تواند باشد<sup>(۱۱)</sup>.

در مطالعه ای مشخص شد که فقط ۴/۴ درصد از دندانپزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه در کارگاه های تعیین حجم نمونه شرکت کردند<sup>(۱۲)</sup> و شاید بهمین دلیل باشد که نویسنده این مقالات، حجم نمونه را توجیه نکرده اند. در تحقیقی که دکتر شیبانی نیا و همکاران در بررسی میزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور در سال ۱۳۸۵، انجام دادند عدم توجیه حجم نمونه به میزان ۹۳ درصد در مقالات گزارش شده است.<sup>(۱۳)</sup> همانطور که گفته شد اگر حجم نمونه زیاد باشد به غیر از مسائل اخلاقی و طولانی بودن و هزینه بر بودن تحقیق، به طور کاذب اختلاف معنی داری در یافته ها مشاهده می شود و نتیجه آزمون را مخصوصاً در تحقیقات کارآزمایی بالینی و تحلیلی، مشیت گزارش می کند و بر عکس اگر حجم نمونه کم باشد باز هم به طور کاذب در این نوع تحقیقات اختلاف را به لحاظ آماری معنی دار تلقی نمی کند. عموماً دیده شده که حجم نمونه را بر مبنای پیشینه تحقیق تعیین می کنند. سؤال این است که

داشتم که تمام نگارش پایان نامه به صورت منطقی تنظیم شده باشد<sup>(۱۶)</sup> و در واقع جنبه‌های مثبت این پایان نامه‌ها مطرح نبود زیرا که انتظار داشتم پایان نامه‌ای که در سال‌های اخیر و با دقت و ممیزی سخت گیرانه تری توسط شورای پژوهشی دانشگاه تصویب می‌شوند نباید کاستی‌های اساسی اجتناب پذیر داشته باشند و لذا در راستای آن اگر هر یک از شاخص‌های ۱۲ گانه صحیح انتخاب نشده بودند به عنوان ناصحیح تلقی شدند اعم از اینکه ممکن بود تا حدودی و یا به طور نسبی قابل قبول باشند و این شاید یکی دیگر از ضعف‌های این تحقیق باشد. اگر چه، هدف تحقیق رسیدن به واقعیت و مبارزه با جهل است و این اشتباه کم نیز می‌توانست روی نتیجه تحقیق تأثیر بگذارد، ضمن اینکه در تحقیقات مشابه نیز همین رویه لحاظ گردید<sup>(۱۷)</sup>. ولی به هر حال یک نوع سخت‌گیری در داخل ارزیابی وجود داشته است. شاید مسئله مهم تر تعداد پایان نامه‌های مورد بررسی بود که ۱۳۷ پایان نامه را شامل شد و احتمالاً اگر تعداد پایان نامه‌های بیشتری و در سال‌های دیگر بررسی می‌شد نتایج مناسب تری ارائه می‌گردید، اما همانطور که مکرر گفته شده است این نوع تحقیقات در کشور ما کمتر ارائه شده است و واقعاً هم وقت گیر و طاقت فرسا است مخصوصاً اینکه مسئله داوری مطرح باشد، جهت مزید اطلاع به استحضار می‌رساند در مقاله مشابه ای از این دست که توسط دکتر شیبانی نیا انجام شد تعداد ۱۰۰ مقاله مورد بررسی قرار گرفته بود<sup>(۱۸)</sup> و همچنین در تحقیق دکتر عزیزی، ۵۲ نمونه مورد بررسی قرار گرفته بود<sup>(۱۹)</sup>.

در یک جمع بندی کلی به نظر می‌رسد که مسئله کیفیت وجود کاستی‌ها در پایان نامه‌های تدوین شده جای نگرانی دارد خصوصاً اینکه برخی از خطاهای قابل اجتناب بوده و برای برطرف کردن آنها نیازمند دوره‌های آموزشی هستیم. بخصوص برنامه‌هایی که مطابق نیاز و در راستای رفع کاستی‌های تدوین پایان نامه‌ها باشد. در یک تحقیق در مورد میزان انطباق برنامه‌های آموزشی مداوم با نیازهای حرفه‌ای پژوهشکان، در ۷۵-۸۵ درصد موارد عدم انطباق مشاهده شده است<sup>(۲۰)</sup>. با توجه به نقد، به عنوان ضرورت پالایش و رشد دانش<sup>(۲۱)</sup> و نیز با توجه به اهمیت کلیدی نقد تحقیق، آموزش آن را در کلیه مقاطع نظام آموزشی به ویژه آموزش تحصیلات تکمیلی توصیه می‌نماید. تحقیق شامل یک پیشنهادیه پایان نامه، پیشنهادیه طرح تحقیقاتی، پایان نامه آماده دفاع، گزارش پایانی طرح‌ها و به ویژه مقالات است. نقد این نوع تحقیقات موجب می‌شود برای تعیین و گسترش عملی آموزش متداول‌وزی تحقیق، جلوگیری از انتشار مطالب غیر علمی، ایجاد مهارت و توانمندی برای انتخاب طراحی و اجرای بهتر تحقیق، به

تجربی آزمایشگاهی ۱۱/۶ درصد و تحلیلی‌ها ۶/۷ درصد بود<sup>(۲۲)</sup>. در یک مطالعه در چین که طراحی تحقیق و متداول‌وزی را در مجلات پژوهشی کشور چین بررسی نموده، طی ده سال، مقالات کارآزمایی بالینی و آینده نگر و تحقیقات علوم پایه از ۱۸ درصد ۳۱ درصد افزایش یافته است<sup>(۲۳)</sup>. همانطور که ملاحظه می‌کنید نوع طراحی در تحقیقات دندانپزشکی بسیار متفاوت از نوع طراحی در تحقیقات پژوهشی می‌باشد.

در مطالعات تجربی *In vitro*، تحقیق عموماً در شرایط آزمایشگاهی انجام می‌گیرد تا اعتبار درونی تحقیق افزایش یابد و طبعاً این نوع تأکید بر اعتبار درونی موجب کاهش اعتبار خارجی یا تعیین پذیری می‌شود<sup>(۲۴)</sup> و احتمالاً آنچه که در تحقیقات تجربی آزمایشگاهی بدست می‌آید در شرایط بالینی تعیین پذیری ندارد. اگرچه انجام مطالعات کارآزمایی بالینی در برخی از تحقیقات دندانپزشکی به لحاظ عملی یا به لحاظ اجرایی و یا اخلاقی مقدور نیست ولی به هر حال یافته تحقیق *In vitro* نمی‌تواند معیاری برای کاربرد آن در شرایط *In vivo* باشد و شاید یک بازنگری نسبت به این نوع طراحی‌ها (Design) ضروری باشد.

در این تحقیق شبیه به تمامی تحقیقات می‌نیز محدودیت‌هایی داشتم، آنچه که بیش از همه مطرح است، خطاها اجتناب‌پذیری بود که احتمالاً می‌شد با لحاظ کردن آنها، در ارزیابی کیفیت، پایان نامه‌ها رتبه بالاتری اخذ نمایند. شاید حجم نمونه که بالاترین عدم صحت را به خود اختصاص داده است توجیه داشته باشد ولیکن همانطور که در بخش مواد و روش تحقیق آمده است، ملاک و معیار ما صرفاً مندرجات پایان نامه‌ها بوده و در واقع به نوعی برای داوری ملاک تمیز داشتم و طبعاً این نوع ارزیابی می‌تواند یافته‌های ما را متأثر نماید همچنین این احتمال وجود داشت که برخی از شاخص‌های ۱۳ گانه که انتظار داشتم در فضول مربوط به متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه گیری مطرح شده باشد در قسمت‌های دیگر آمده باشد و لذا در ارزیابی‌ها لحاظ نشده باشد. یکی دیگر از مشکلات ما رتبه بندی بین "صحیح"، "نسبتاً صحیح" و "ناصحیح" متداول‌وزی پایان نامه‌ها بود. در تعیین پایانی خودمان برای اندازه گیری صحت متداول‌وزی از روش Test-Retest استفاده شد که با فاصله زمانی یک هفته‌ای انجام پذیرفت و پایانی به میزان ۹۶ درصد بدست آمد. اما در ورای آن و در واقعیت برخی از موقع افتراق آنها به سختی انجام می‌شد و نظر به اینکه متداول‌وزی ما برای ارزیابی صحت اصول نگارش برمبنای Problem Oriented Research بود ابتدا مشکل مطروحه در پایان نامه و به دنبال آن در هر قسمت، مشخص شده و انتظار

بین‌المللی مطرح شده و در مجلات ISI چاپ گردد به عنوان یک سند افتخار ملی محسوب می‌گردد.

**تقدیر و تشکر:**

از باشگاه پژوهشگران جوان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر پشتیبانی و حمایت‌های معنوی آنان و نیز از معاونت محترم پژوهشی، اعضای محترم شورای پژوهشی و همکاران محترم آن معاونت صمیمانه سپاسگزاری می‌نماید.

صحنه آوردن اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، فعالیت‌هایی صورت گیرد. توصیه می‌شود مقالات نقد شاخص مهم و با ارزشی در سوابق آموزشی و پژوهشی (CV) نویسنده‌گان آن باشد. به هر حال انجام این نوع مطالعات مصراً از همه اساتید محترم و داشت پژوهان درخواست می‌گردد.<sup>(۱۹)</sup>

در خاتمه درخواست می‌شود که دانشجویان و اساتید ارجمند در تدوین پایان نامه‌ها مراقبت بیشتری نمایند که نتایج بهتری حاصل گردد چرا که پایان نامه‌ها و به تبع آن مقالات حاصله مهمترین شاخص بروند داد یک دانشگاه تلقی می‌شود و اگر در مجتمع

## References:

۱. آصفزاده سعید. استفاده از رویکردهای کمی و کیفی در پژوهش‌های علوم پزشکی. پژوهش در پزشکی. بهار ۱۳۸۲؛ ۲۷(۱) : ۷۵-۶۹.
۲. منتجب فروغه. بررسی میزان رعایت استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی طی سالهای ۱۳۷۹-۸۱. دانشگاه ایران، ۱۲۴۶۱.
۳. قیوم زاده محمدرضا، کریمی نیا محمد، عالم زاده انصاری سعید، یامینی محمد. بررسی کیفی پایان نامه‌ها ای رائمه شده در مقطع دکترای عمومی در سالهای ۱۳۷۰-۷۵. دانشگاه ایران، ۸۸۳۱.
- ۴ - Jawaid Shaukat A , Jawaid M , Jafary Maqbool H. Deficiencies in original articles accepted for publication in Pakistan journal of medical sciences : a retrospective analysis. Pak J med Sci 2009 ; 25 : 1-6 .
۵. شبیانی نیا احمد، ولایی ناصر، محمد صادقی شاهین، عزیزی فریدون. بررسی میزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور در سال ۱۳۸۵. پژوهش در پزشکی. بهار ۱۳۸۸؛ ۳۳(۱) : ۱۱-۵.
۶. رسیدی علی. بررسی وضعیت طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی و ایران طی سالهای ۱۳۶۸-۷۲. دانشگاه ایران، ۷۱۰۵.
۷. (محتوای سرفصل دانشگاه‌ها) مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی مصوب هفتمین دوره شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، سال ۱۳۷۹.
۸. میرصادی میرمنصور، چهره بی علی، باقرزاده امیرحسین. بررسی پایان نامه‌های فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از نظر رعایت اصول علمی نگارش در نیمه اول سال ۱۳۷۸. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۱؛ ۹(۳۲) : ۷۴۱-۷۴۹.
۹. عزیزی فریدون، رئیس زاده فربد، زارعی شبنم، طریقت صابر گلبرگ، گرزن رضا. بررسی کیفیت ذکر منابع در مقالات پژوهشی مجلات علمی پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش در پزشکی. زمستان ۱۳۸۰؛ ۲۵(۴) : ۲۵۵-۲۴۹.
۱۰. آصفزاده سعید. ارزیابی مهارت‌های مدیریتی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. بهار ۱۳۸۳؛ ۹۵-۸۶.
۱۱. عزیزی فریدون. روش‌های تحقیق بالینی. تهران : مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ ۱۳۸۵.
۱۲. عبادی فر اصغر، محمدی محمدراضا، ولایی ناصر. عملکرد پژوهشی و نیازهای آموزشی پژوهشی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی کشور در سال ۱۳۸۳. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. زمستان ۱۳۸۴؛ ۱۸(۴) : ۹۱-۱۰۱.
۱۳. اردستانی سیمین. گزارش مقالات منتشره در پژوهش در پزشکی. بهار ۱۳۸۲؛ ۲۷(۱) : ۲۷.

۱۴. ولایی ناصر، کوثریان مهرنوش، نصیری ابراهیم، موسوی سید فاطمه. بررسی کمی و کیفی مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه) از شماره ۱-۴۷. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. خرداد و تیر ۱۳۸۵؛ ۱۶(۵۲) : ۱۳۰-۱۲۴.
- 15 - Wang Q , Zhang B. Research design and statistical methods in Chinese medical journals. JAMA 1998 Jul ; 280(3) : 283-285 .
۱۶. کوه بومی ژاله، عزیزی فریدون، ولایی ناصر، رضائی منصور، مهربان بهمن، کهریزی مهوش. وضعیت شاخصهای روش تحقیق در پایاننامه‌های دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۱۳۶۷-۸۴). بهبود. تابستان ۱۳۸۵؛ ۱۰(۲) : ۱۸۵-۱۷۷.
۱۷. زبیری مهدی، عطایی ماری، عبدالمالکی پروانه. میزان انطباق برنامه‌های آموزشی مداوم با نیازهای حرفه‌ای پزشکی از دیدگاه پزشکان عمومی شهر کرمانشاه. بهبود. بهار ۱۳۸۶؛ ۱۱(۱) : ۹۲-۸۷.
۱۸. آصف زاده سعید. تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی. پژوهش در پزشکی. پائیز ۱۳۸۴؛ ۲۹(۳) : ۲۰۱-۱۹۵.
۱۹. آصف زاده سعید. راهنمای ارزیابی کارورزان و دستیاران پزشکی. قزوین : دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ ۱۳۷۹.