

بررسی میزان فلوئوراید آب آشامیدنی مناطق سکونت گاهی شهرستانهای نکا، جویبار و سوادکوه در سال ۱۳۸۷

دکتر مسعود رضائی[#] دکتر ابراهیم مجیدی قره تپه^{*}

- ۱- دانشیار گروه تشخیص و بیماریهای دهان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
۲- عضو هیئت علمی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه:

سابقه و هدف: با توجه به گزارشات متفاوت از میزان فلوئوراید آب آشامیدنی در مناطق کشور و نقش آن با بروز پوسیدگی و یا فلوئوروزیس و عدم اطلاع از میزان فلوئوراید آب آشامیدنی در سکونت گاههای شهرستانهای (نکا، جویبار و سوادکوه) این تحقیق در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: تحقیق با روش توصیفی انجام گرفت. لیست بهنگام کلیه سکونت گاههای شهرستان‌های فوق و واستگی آنها به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی از شبکه‌های بهداشت و درمان اخذ گردید. با مراجعه به کلیه سکونت گاهها تعداد خانوار، جمعیت، منابع آب آشامیدنی (چشم، چاه، بقات، روودخانه) و ارتفاع از سطح دریا مشخص و مقدار ۱۰۰ سی سی آب آشامیدنی تهیه و در ظرفهای پلاستیکی به آزمایشگاه واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منتقل و میزان فلوئوراید آن با روش استاندارد پتانسیومتری تعیین گردید. ومیزان واقعی آن با احتمال ۹۵٪ برآورد گردید.

یافته‌ها: تحقیق در ۳۴ مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی با ۳۹۵ سکونت گاه و جمعیت تحت پوشش ۲۳۶۹۶۰ نفر انجام گرفت. میزان فلوئوراید آب سوادکوه برابر $۰/۰۶۷ \pm ۰/۰۰۱$ نکا به میزان $۰/۰۱۸۵ \pm ۰/۰۰۴$ و جویبار به میزان $۰/۰۲۷ \pm ۰/۰۱۳$ یعنی صد درصد از حد مناسب کمتر بوده است.

نتیجه گیری: میزان فلوئوراید در کلیه شهرستانهای فوق و سکونتگاههای مورد بررسی بسیار پایین بوده و جای نگرانی دارد انجام مطالعه برای تعیین تاثیر افزایش میزان فلوئوراید آب بر میزان پوسیدگی و فلوئوروزیس دندان را توصیه می‌نماید.

کلید واژه‌ها: فلوئوراید آب - نکا - جویبار - سوادکوه - پتانسیومتری.

وصول مقاله: ۸۸/۲/۹ اصلاح نهایی: ۸۹/۶/۷ پذیرش مقاله: ۸۹/۴/۲۷

مقدمه:

را گزارش نمود (۳) در بعضی مناطق مثل شهرستانهای نکا، جویبار و سوادکوه گزارشی از میزان فلوئوراید آب وجود ندارد و یا لاقل در دسترس نیست اما اگر میزان فلوئوراید کمتر از میزان نرمال باشد DMF را افزایش می‌دهد (۱) و اگر بیشتر از نرمال باشد موجب بروز فلوئوروزیس (۴) و نیز کاهش بهره هوشی می‌شود (۵) نظر به اینکه میزان فلوئوراید آب را از حداقل $۰/۵$ درصد ppm تا $۹/۷$ ppm در چاه طولاً جریزه قسم گزارش نمودند (۶) و با توجه به خلاء اطلاعات در مناطق

یکی از نگرانیهای دغدغه‌های جامعه به ویژه متخصصین بهداشت و پیشگیری از بیماریها و علی الخصوص دندانپزشکان مسئله میزان فلوراید آب آشامیدنی است که هم مسئله کمبود آن و هم زیادی آن مشکل ساز است مطالعات میزان کمبود فلوئوراید آب آشامیدنی رادر بعضی مناطق تا ۹۵ درصد گزارش کردند. (۱) و در بعضی مناطق میزان فلوئوراید بیشتر از حد نرمال را تا ۱۰۰ درصد گزارش دادند (۲) اولین بار دکتر Fredreek McKay در سال ۱۹۰۱ مسئله فلوئوراید آب آشامیدنی

میزان فلوراید آب آشامیدنی آنها 0.58 ± 0.058 ppm حداکثر ۰/۴ و حداقل ۳ صدم درصد ppm میزان واقعی فلوراید آب آشامیدنی شهرستانهای فوق را با احتمال ۹۵ درصد از حداقل $0.19/0$ تا $0.178/0$ برآورد می‌گردد و نشان می‌دهد که در $0.178/0$ درصد سکونت گاه، میزان فلوراید کمتر از ۱ دهم ppm و $0.178/0$ درصد سکونت گاه میزان فلوراید آب کمتر از ۲ دهم ppm بود.

جدول شماره ۱: توزیع مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای (نکا، جویبار، سوادکوه) و میزان فلوراید آب آشامیدنی بر حسب ۱۳۸۷ سال ppm

میزان فراوانی				
درصد	مطلق	تجمعی	میزان فلوراید آب آشامیدنی مراکز بهداشتی درمانی	
۱۴/۷	۱۴/۷	۵	۰/۳-۰/۴	
۳۲/۳	۱۷/۶	۶	۰/۲-۰/۳	
۶۷/۶	۳۵/۳	۱۲	۰/۱-۰/۲	
۱۰۰	۳۲/۴	۱۱	۰/۰۳-۰/۱	
	۱۰۰	۳۴	جمع	

میزان فلوراید شهرستان نکا: بر اساس آخرین آمار رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نکا کل جمعیت شهرستان در سال ۱۳۸۷ برابر $110,547$ نفر که در $221,09$ خانوار و 127 سکونت گاه شامل 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 10 مرکز روستایی 57 خانه بهداشت و 57 روستای قمر ساکن بودند. آب آشامیدنی اهالی شهرستان 59 درصد از چشم و 41 درصد از چاه تامین می‌شد. میزان فلوراید آب آشامیدنی مردم شهرستان برابر $4\% \pm 18.5$ بود. میزان آن بر حسب مراکز بهداشتی درمانی در جدول شماره 2 ارائه گردید و نشان می‌دهد که از حداقل $0.12/0$ در مرکز بهداشتی درمانی چهارین تا $0.31/0$ در مرکز بهداشتی درمانی ابچین بوده است.

مذکور و بنظر تعیین میزان فلوراید آب آشامیدنی نقاط سکونت گاهی شهرستانهای نکا، جویبار و سوادکوه این تحقیق به روش پتانسیومتری در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.

مواد و روش ها :

این تحقیق با طراحی Cross-sectional انجام گرفت. پس از تصویب طرح و کسب مجوز مسئولین واحد دندانپزشکی سازمان آب و فاضلاب و مرکز بهداشت استان مازندران، تحقیق بمرحله اجرا گذاشته شد. لیست بهنگام کلیه مناطق مسکونی شهرستان های نکا، جویبار و سوادکوه از مرکز گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور تهیه گردید. نقشه راهنمای شهرستان های نکا، جویبار و سوادکوه تهیه جایگاه و ارتفاع هر کدام از مناطق مسکونی مشخص گردید. (۸)- با مراجعه به کلیه مناطق مسکونی نام محل، ارتفاع از سطح دریا، منبع آب، مشخص و یک نمونه از آب آشامیدنی محل اخذ گردید. منبع آب در مناطق شهری با استعلام از سازمان آب و فاضلاب تعیین شد. و در مناطق روستائی با پرسش از متقدمین روستایی در چهار گروه چاه، چشم، قنات و رودخانه مشخص شد. از هر منبع 100cc آب در ظرفهای پلاستیکی اخذ و در حداقل زمان ممکن حداقل 48 ساعت به آزمایشگاه واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منتقل گردید. - در آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه با روش پتانسیومتری و دستگاه Metrhome سوئیسی آمریکائی با استفاده از کیت مربوطه میزان فلوراید هر سکونت گاه را مشخص و در یک فرم اطلاعاتی همراه با اطلاعات سکونت گاه ثبت کرد. (۹)- میزان فلوراید آب آشامیدنی هر سکونتگاه تعیین و میزان واقعی آن با احتمال 95 درصد برآورد گردید.

یافته ها:

تحقیق در شهرستانهای نکا جویبار و سوادکوه انجام گرفت جمعیت تحت پوشش این سه شهرستان در سال ۱۳۸۷ برابر $236,960$ نفر بود که تحت پوشش 34 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی مشتمل بر 395 سکونت گاه ساکن بودند.

منبع کیاکلا (شهری جویبار ، شهری روستایی جویبار ، بیزکی و سروکلا به میزان ۰/۴) طالش محله (طالش محله و لاریم به میزان ۰/۲) و بالاخره منبع بهنمیر (کوهی خیل و انار مرز بهمیزان ۰/۱) تامین می شده است .

جدول ۳ : میزان فلوئوراید آب آشامیدنی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار و جمعیت آن سال ۱۳۸۷

نام مرکز بهداشت درمانی	جمعیت (نفر) (ppm)	میزان فلوئوراید (ppm)	نام مرکز بهداشت درمانی
جویبار ۲	۹۲۰۹	۰/۴	جویبار
جویبار ۱	۱۷۴۵۳	۰/۴	سروکلا
بیزکی	۳۹۵۰	۰/۴	لاریم
طالش محله	۴۴۳۸	۰/۴	کوهی خیل
۸۷۸۹	۰/۲	۰/۲	انارمرز
۸۹۱۰	۰/۲	۰/۱	مجموع
۹۰۴۹	۰/۱	۱۰۴۵۸	۷۲۲۵۶
۱۰۴۵۸	۰/۱	۰/۲۷±۰/۱۳	۰/۱۸۵±۰/۰۴

جدول ۲ : میزان فلوئوراید آب آشامیدنی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نکا و جمعیت آن سال ۱۳۸۷

نام مرکز بهداشتی درمانی	جمعیت (نفر) (ppm)	میزان فلوئوراید (ppm)
نکا ۱	۱۷۹۸۳	۰/۲
نکا ۲	۱۴۴۶۹	۰/۲
نکا ۳	۳۱۴۰۴	۰/۱۵
گل خیل	۷۴۵۲	۰/۱۵
طوسکلا	۷۴۹۵	۰/۱۴
خورشید	۵۴۶۷	۰/۱۵
نوذرآباد	۴۱۱۴	۰/۱۳
زرندین	۷۵۴۸	۰/۱۸
درویش خلیک	۲۳۹۹	۰/۱۸
استخر پشت	۳۳۳۴	۰/۱۲
سوچلما	۳۱۷۱	۰/۲۴
ابچین	۲۷۵۵	۰/۳۱
چناربن	۲۹۵۶	۰/۱۲
جمع	۱۱۰۵۴۷	۰/۱۸۵±۰/۰۴

میزان فلوئوراید شهرستان سوادکوه: بر اساس آخرین آمار رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سوادکوه کل جمعیت شهرستان در سال ۱۳۸۷ برابر ۵۴۱۵۷ نفر که در ۱۱۰۴۰ خانوار ساکن بودند. آب آشامیدنی اهالی شهرستان ۱۷ درصد از چاه و ۸۳ درصد از چشمه تامین می شد. میزان فلوئوراید بر حسب مراکز بهداشتی درمانی در جدول شماره ۴ ارائه گردید و نشان می دهد که میزان فلوئوراید آن به طور متوسط برابر ۰/۰۷۶ که حداقل ۰/۲۲ و حداقل ۰/۰۳ ppm بوده است به تعییری ۰/۰۷۶٪ مردم شهرستان از آب آشامیدنی کمتر از ۰/۰۱ و ۰/۰۱۵ درصد با میزان بالاتر از ۰/۰۱ استفاده می کنند.

میزان فلوئوراید شهرستان جویبار: بر اساس آخرین آمار رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جویبار کل جمعیت شهرستان در سال ۱۳۸۷ برابر ۷۲۲۵۶ نفر که ۱۹۴۷۰ خانوار و ۹۲ سکونتگاه شامل ۲ مرکز بهداشتی درمانی شهری و ۶ مرکز روستایی ۲۸ خانه بهداشت و ۵۶ روستای قمر ساکن بودند. آب آشامیدنی اهالی شهرستان از چاه تامین می شد و یک روستا به نام چوباغ از منبع آب آشامیدنی شهر ساری استفاده کرد . میزان فلوئوراید آب آشامیدنی اهالی جویبار بر حسب مرکز بهداشتی درمانی در جدول شماره ۳ ارائه گردید و نشان می دهد میزان فلوئوراید آب برابر ۰/۰۷۶±۰/۰۱۳ ppm با حداقل ۰/۰۱ تا حداقل ۰/۰۱ بوده است . کل آب مصرفی شهرستان از

مشاهده میشود که میزان فلوراید آب شهرستان بهشهر مشابه شهرستان جویبار بوده است با این تفاوت که سکونت گاههای در بهشهر وجود داشت که میزان فلوراید آن در حد مناسب بود ضمن اینکه روش اندازه گیری فلوراید به روش اسپکتروفوتومتری (spands) بوده است.

در حالیکه میزان فلوراید آب در این تحقیق کلا به روش پتانسیومتری بدست آمد و مطالعات نشان می دهد که دقیق تر از روش spands بوده و میزان واقعی را که بالاتر از روش spands است نشان می دهد.^(۸) اما میزان فلوراید آب شهرستان نکا بویژه سواد کوه بمراتب از مقادیر اعلام شده در بهشهر کمتر است. میزان فلوراید آب ورامین در بهار سال ۱۳۸۸ به میزان (0.0031 ± 0.064) و در تابستان (0.0495 ± 0.065)^(۹) در استان قم بمیزان (0.026 ± 0.035)^(۱۰) و در شهر ساری (0.014 ± 0.033)^(۱۱) و شهرستانهای گرم‌سار و سمنان و دامغان (0.019 ± 0.055)^(۱۲) بوده است. اینکه صد درصد میزان فلوراید آب آشامیدنی منطقه مورد بررسی کمتر از حد مناسب ($0.06-0.12$) میباشد جای نگرانی دارد زیرا کمبود فلوراید آب موجب افزایش پوسیدگی دندانها میگردد که این امر موجب شده اکثر شرکتهای سازنده خمیر دندانهای داخلی و خارجی داشتن مواد کمکی حاوی فلوراید را به عنوان یک عامل تبلیغاتی محصول خود اعلام نمایند ($13\text{--}14$) در یک تحقیق نشان داده شد در شهرستان بهشهر مناطقی که میزان فلوراید مناسب ($0.06-0.12$) دارند در مقایسه با سکونت گاههایی که فلوراید کمتر از 0.04 داشتند میزان 0.039 کاهاش پوسیدگی دندانی مشاهده شده است.^(۷) اگر چه در این تحقیق کاستی هایی از نظر بهداشت عمومی، نحوه مسواک کردن، وضعیت تغذیه بررسی نشده است که این عوامل میتوانند در میزان DMFT موثر باشند.^(۱۴)

نتیجه گیری:

حال این سوال مطرح است در این سالهای متمادی چرا تحقیق در مورد فلوراید آب مناطقی که کمبود فلوراید آن قبل از گزارش شده است صورت نپذیرفته است.^(۷)

جدول ۴: میزان فلوراید آب آشامیدنی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سوادکوه و جمعیت آن سال ۱۳۸۷

نام مرکز بهداشت درمانی	جمعیت (نفر)	میزان فلوراید (ppm)	ملفه
شیرگاه	11723	0.07	
بورخیل	3965	0.07	
لغورک	1909	0.06	
کالیکلا	2940	0.09	
سرخکلا	3073	0.03	
زیراب	11616	0.03	
آتو	1566	0.22	
له بند	1339	0.07	
پل سفید	10913	0.08	
آلاشت	265	0.04	
بالادوآب	610	0.12	
ورسک	778	0.03	
جمع	54157	0.067 ± 0.001	

بحث:

این تحقیق نشان داد که میزان فلوراید آب سواد کوه (0.067 ± 0.001) و جویبار (0.027 ± 0.013) و نکا برابر (0.04 ± 0.0185) می باشد که حداقل میزان فلوراید آب آشامیدنی در سکونت گاههای مورد بررسی 0.04 و حداقل 0.03 ppm بوده است. در مطالعه مشابه دکتر رمضانی و همکاران در شهرستان بهشهر در سال ۱۳۸۲ میزان فلوراید آب شهرستان بهشهر برابر (0.026 ± 0.012) ppm و از حداقل 0.03 ppm تا 0.023 ppm بوده است و در ۹۷ درصد سکونت گاهها میزان فلوراید کمتر از حد مناسب بوده است.^(۷)

References:

- 1.Farrokhian A: A survey of Tehran drinking water FLouride ,Spring 1382.[dissertation] Islamic Azad University –Dental Branch -1381.
2. Ramezani GH, Valaei H, Eikani N: prevalence of DMFT and Fluorosis in the students of Dayer city (IRAN). Journal of indian society of pedidontics & preventive dentistry: 2004; Vol: 22; N: 2, P: 49-53.
- 3.New burn E. Effectiveness of water Fluoridation journal public Health Dental 1989, 49: 279-89.
- 4.Gholamhoseini GH: Prevalence of dental fluorosis in the Maku region, Iran J of Iranian dental society 1986 ; (4); Page 4-7
- 5.Seraj B, Shahrabi M, Fallahzade F,Akhoudi N: Effect of high levels of Flouride in drinking water on intelligence of children. Journal of Dentistry ,Tehran University of Medical Sciences 1385; 19 (2) :80-86
- 6.Jafari P: Relationship between dental caries and the amount of drinking water in Flouride 1374 (Qeshm Island) [dissertation], Islamic Azad University Dental branch .1376
- 7.Ramezani GH , Majidi E: Survey of Flouride in drinking water in Behshahr (1382) Jof Research in Dental Sciences 2005;(2):72-7.
8. Ramezani GH,Valaie N,Safaei S .Comparison between potentiometry and spectrophotometry for evaluation of Flouride in drinking water.Pajoohandeh J,2008;13(2):143-147.
- 9.Norouzi N: Evaluation Of flouride in Varamin city spring 1387 [dissertation]1387 Dental Branch, Islamic Azad University(Tehran)
- 10.Ahmadi R: Evaluation of Drinking Water Flouride of Qom in 1387 [dissertation] Islamic Azad University ,Dental Branch.
- 11.Shabab Roomy P: Survey of Flouride in drinking water and DMFT levels of students in the first year of tips ,Sari 1385 [dissertation]1386. Islamic Azad University ,Dental Branch.
- 12.Nasiri, Jam B: Assessment of drinking water Flouride in Garmsar ,Semnan ,Damghan 1387 [dissertation] Islamic Azad University ,Dental Branch.
- 13.Shiva A: Relationship between the amount of drinking water Flouride and [dissertation] Islamic Azad University Dental Branch.
14. Arora A, Evans RW, Sivaneswaran S, Sujeer AN, Blinkhorn AS. Parental support for water fluoridation in Lithgow, New South Wales. Aust Dent J. 2010 Dec;55(4):417-22