

بررسی یکساله نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک کاربرد ایمپلنت های Tapered Wide platform در جایگزینی فوری دندانهای مولر

دکتر سعید سادات منصوری[#] دکتر ساندرا مهرعلیزاده^۱ دکتر فروزش شیرگاهی^۲

- ۱- دانشیار گروه آموزشی پریودنلولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران
- ۲- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران
- ۳- دندانپزشک

خلاصه:

سابقه و هدف: نظر به اهمیت و نقش دندان های مولر در عملکرد جویدن و به جهت جلوگیری از تحلیل ریح باقی مانده، ضرورت جایگزینی فوری این دندان ها به شیوه ای موثر احساس میگردد. لذا این تحقیق با هدف بررسی نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک ایمپلنت های Tapered Wide Platform قرار داده شده در ساخت دندان های مولریکسال پس از بارگذاری در مراجعین به کلینیک خصوصی در سال ۸۸-۸۹ انجام گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تعداد ۱۲ نمونه شامل دندان های چند ریشه ای مولر اول و دوم مربوط به ۱۰ بیمار با میانگین سنی 46 ± 4 سال که در سال ۱۳۸۷ به شیوه ای مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند و به طریق جایگذاری فوری توسط ایمپلنت جایگزینی شدند، با گذشت یکسال از زمان بارگذاری ایمپلنت ها ارزیابی ثبات با تکنولوژی پریوست اندازه گیری و ثبت گردید، سنجش رادیوگرافیک توسط رادیوگرافی پری اپیکال به منظور تعیین تغییرات استخوان کرستال با تکنیک موازی و Longcone از ناحیه به عمل آمد و نتایج حاصل با آزمون آماری T-test مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها: در هیچ یک از نمونه ها درد، عفونت، ترشح چرک و رادیولوسنسمی ممتد رادیوگرافیک مشاهده نشد و میانگین $1/6 \pm 2/81$ PTV (Perio Test Value) با دامنه (۱-۶) نشان دهنده عدم وجود لقی ایمپلنت ها و میانگین تغییرات استخوان کرستال $0/01 \pm 0/22$ میلیمتر بود.

نتیجه گیری: استفاده از ایمپلنت های با قطر بالای Platform به صورت جایگذاری فوری ایمپلنت در صورت انتخاب صحیح نمونه ها و کاربرد تکنیک صحیح جراحی در جایگزینی ناحیه خلفی فکین موفقیت آمیز و قابل پیش بینی است.

کلید واژه ها: میزان موفقیت، میزان ماندگاری، ایمپلنت قطور، جایگذاری فوری ایمپلنت.

وصول مقاله: ۸۹/۱۱/۲۵ اصلاح نهایی: ۹۰/۱/۲۶ پذیرش مقاله: ۹۰/۲/۱۷

مقدمه: محققین بی شماری بوده که زمینه ساز مطالعات در از مد متعددی شده است^(۱). نظر به اهمیت و نقش دندان های مولر در دستیابی به اسئواینستگریشن با درجه پیش بینی بالا مورد توجه

نویسنده مسئول مکاتبات: دکتر سعید سادات منصوری، تهران پاسداران نیستان دهم پلاک ۴ بخش پریودانتیکس

تلفن: ۰۲۵۶۴۵۷۱ Email:Dr saeed_sadat mansouri@yahoo.com

خصوصی دندانپزشکی در سال ۱۳۸۸-۸۹ انجام گرفت.

مواد و روشها:

در این تحقیق توصیفی تعداد ۱۲ نمونه شامل دندان های چند ریشه ای مولر اول و دوم فکین (۶ مولر اول و ۶ مولر دوم) مربوط به ۱۰ بیمار بزرگسال (۴ زن و ۶ مرد) با میانگین سنی $46 \pm 4/71$ که در سال ۱۳۸۷ در مطب دندانپزشکی به دلایلی چون تخریب شدید تاج کلینیکی خارج شده پس از آماده شدن ساخت دندان های مربوطه، به طریق جایگذاری Tapered Wide Diameter فوری توسط ایمپلنت های Tapered Wide Platform (با قطر $4/8$ میلیمتر یا $5/8$ میلیمتر و قطر 6 میلیمتر *Implantium, Superline Platform* یا 7 میلیمتر) (ساخت کارخانه Dentium کره جنوبی) جایگزین شدند و *Healing Aboutment* با قطر های $5/5$ میلیمتر یا $6/5$ میلیمتر روی ایمپلنت ها قرارداده شد. ارزیابی های کلینیکی و رادیوگرافی پس از گذشت ۴ ماه از جایگذاری (زمان بارگذاری ایمپلنت ها) انجام گرفت. نمونه های مورد بررسی در این تحقیق یکسال پس از بارگذاری مجدد "مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی ثبات و میزان لقی با تکنولوژی پریوتوست ساخت شرکت Medizintechnik Gulden/Germany از طریق یک هندپیس دینامیک و میکرو کامپیوترا به منظور ارزیابی استئواینتگریشن اطراف ایمپلنت ها با مقیاس (-8 تا $+50$) انجام شد و سنجش رادیوگرافیک توسط رادیوگرافی پری اپیکال با تکنیک موازی و LongCone از ناحیه به عمل آمد واز طریق آن میزان رادیولوگیسی اطراف ایمپلنت که نشانه شکست ایمپلنت میباشد و میزان تحلیل استخوان کرستال محاسبه و ثبت گردید. در ضمن میزان بقا و میزان موفقیت بر مبنای معیارهای Buser^(۶) محاسبه گردید جهت مقایسه میزان میانگین PTV فک بالا و پایین از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Student T-Test استفاده گردید.

عملکرد جویدن و به جهت جلوگیری از تحلیل ریج باقی مانده ضرورت جایگزینی فوری این دندان ها به شیوه ای موثر با حداقل مراحل جراحی و در محل و مسیر ریشه های خارج شده احساس می گردد^(۳). اولین بار کاربرد ایمپلنت های با قطر بالا در سال ۱۹۹۳ توسط Burton Langer ارائه شد^(۴).

به طور کلی کاربرد یک ایمپلنت استاندارد (قطر $3/75$ و طول 12 میلیمتر) در نواحی خلفی به جای دندان های مولر مورد سوال است چرا که در اغلب موارد کیفیت استخوان در این نواحی کافی نیست و بعلاوه امکان دست اندازی به ساختارهای آناتومیکی سینوس ماقریلا و کanal آلوئولار تحتانی وجود دارد همچنین در نواحی خلفی نیروهای اکلوزالی شدید تر وجود دارد. وسعت زیاد سطح اکلوزال باعث ایجاد نیروهای خارج محوری خصوصا در جهات مزیال و دیستال می گردد^(۵). برای جبران این نقیصه استفاده از دو ایمپلنت استاندارد به جای یک مولر پیشنهاد می گردد اما در بسیاری از موارد به دلیل کمبود فضا این امکان وجود ندارد^(۶).

Tapered wide diameter لذا کاربرد یک ایمپلنت and wide platform در محل مولر از دست رفته با افزایش (BIC) Bone-Implant-Contact استخوان کورتیکال میزان استئواینتگریشن و ثبات اولیه را افزایش می دهد^(۷). و با جایگزینی به صورت فوری امکان استقرار ایمپلنت در محل مناسب با حداقل زمان و مراحل جراحی و تحلیل ریج باقی مانده را فراهم کرده و تا حد زیادی به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ می دهد^(۳).

بین تحقیقات گوناگون در زمینه میزان موفقیت این روش اختلاف نظرهایی وجود دارد^(۸). به طور مثال برخی مطالعات کوتاه مدت، میزان موفقیت را بیش از ۹۱ درصد اعلام کردند. این در حالی است که دسته ای دیگر، این میزان را زیر حد قابل قبول کلینیکی ۷۳ درصد طی مطالعات ۳-۵ ساله اعلام کردند^(۹-۱۵). نظر به تناظرات موجود، این تحقیق با هدف بررسی نتایج کلینیکی و رادیوگرافی یک سال پس از بارگذاری Tapered wide diameter and wide platform، قرار داده شده در ساخت دندان های مولر، در مطب ایمپلنت های platform، قرار داده شده در ساخت دندان های مولر، در مطب

کلیه نمونه ها تا پایان تحقیق فاقد درد، حساسیت، دیس استزی، ترشح چرک و عفونت و رادیو لوستنسی ممتد رادیو گرافیک بودند، به این ترتیب میزان موفقیت بر مبنای معیارهای $(^{16})$ 100% در نظر گرفته شد. میزان لقی ایمپلنت ها در ارزیابی یکسال پس از بارگذاری با پریوتوست در دامنه $1-6$ و با میانگین $1/6 \pm 2/81$ اندازه گیری شدند و همچنین میانگین PTV اندازه گیری شده به تفکیک هر دو فک به شرح جدول شماره ۲ میباشد.

جدول ۲- مقایسه PTV به تفکیک هر فک

PTV	ناحیه فکی
$-2/81 \pm 1/6$	هردو (کل)
$-2/80 \pm 1/7$	ماگزیلا
$-2/83 \pm 1/9$	مندیبل

بین میزان PTV دو گروه اختلاف آماری معناداری مشاهده نگردید ($P = 0.99$). در ارزیابی رادیو گرافیک تغییرات سطح استخوان کرستال از طریق رادیو گرافی پری اپیکال با تکنیک موازی در مزیال و دیستال هر ایمپلنت نسبت زمان بارگذاری محاسبه و به طور میانگین 0.01 ± 0.22 میلیمتر گزارش شد.

بحث:

در تحقیق حاضر شاخص های کلینیکی و رادیو گرافی ۱۱ ایمپلنت Tapered Wide Platform جایگذاری شده در ساكت دندان های مولر تازه کشیده شده، در بررسی یکسال پس از بارگذاری بیانگر موفقیت صد درصد نمونه ها می باشد. مطابق با نظرات Adell، گذشت $6-12$ ماه از زمان خارج کردن دندان برای التیام کامل استخوان لازم است^(۱۷)، در صورتیکه تحقیقات نشان دادند متعاقب کشیدن دندان تا 50 درصد ضخامت ریج در جهت باکولینگوال کاهش می یابد، لذا به نظر می رسد بهتر است بلافاصله پس از کشیدن دندان نسبت به جایگزینی ایمپلنت اقدام نمود^(۱۸, ۱۹). اکثریت مقالات در ارتباط با جایگزینی ایمپلنت در ساكت دندان تک ریشه بوده و کمتر به انجام درمان در دندان چند ریشه اقدام شده است که دلایل آن جایگاه نامناسب جهت قرار گیری

یافته ها:

در این تحقیق تعداد ۱۲ ایمپلنت Tapered Wide Platform که در محل دندان های مولر اول و دوم فکین به صورت جایگذاری فوری در 10 بیمار با میانگین سنی $\pm 4/71$ 46 سال قرار داده شده بودند و یکسال از زمان بارگذاری آنها می گذشت مورد ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافی قرار گرفتند. از این ۱۲ ایمپلنت یک مورد به جهت عدم انجام درمان پروستودونتیک و باقی ماندن با Healing Abutment از مطالعه حذف شد. از این تعداد 4 بیمار زن و 5 بیمار مرد بودند، کلیه بیماران غیر سیگاری بودند. شاخص پلاک oleary کمتر از 20% بود. از 11 ایمپلنت مورد مطالعه 5 ایمپلنت در ماگزیلا (با کیفیت استخوانی D_4) و 6 ایمپلنت در مندیبل (با کیفیت استخوانی D_3) مستقر شده بودند. از تعداد ایمپلنت های مستقر 9 مورد ایمپلنت های WD با قطر بدنه $4/8$ میلیمتر و قطر ناحیه platform 6 میلیمتر و 2 مورد ایمپلنت های $5/8$ میلیمتر با قطر platform 7 میلیمتر بودند. همچنین طول ایمپلنت های بکار رفته 8 ، 10 و 12 میلیمتر بود. توزیع ایمپلنت های به کار رفته بر حسب ناحیه استقرار و طول و قطر platform ایمپلنت در جدول شماره ۱ آمده است.

جدول ۱- توزیع ایمپلنت ها بر حسب ناحیه استقرار، قطر platform و طول ایمپلنت

ناحیه فکی	تعداد(درصد)	طول ایمپلنت	platform * قطر
مولر اول ماگزیلا	$3(27/27)$	$6*10$ $6*10$ $6*8$	$7*10$ $6*8$
	$2(18/18)$	$6*12$ $6*12$	$6*10$
مولر اول مندیبل	$2(18/18)$	$7*8$ $6*10$	$6*8$
	$4(36/36)$	$6*8$	
مولر دوم مندیبل			

میانگین ۱/۲ میلیمتر (۰ تا ۳ میلیمتر) قابل ردیابی بوده است. این گزارش میزان تحلیل را از اولین پیچ ایمپلنت اندازه گیری کرد.^(۱۷) مطالعات دیگر میانگین تحلیل در سال اول را ۰/۹۳ میلیمتر و متوسط تحلیل سالانه پس از سال اول ۰/۱ میلیمتر بوده است.^(۲۷) در ضمن طبق تحقیق Alberktsson میزان تحلیل سالانه استخوان پس از سال اول به میزان ۰/۲ میلیمتر در سال میباشد.^(۲۸) در تحقیق حاضر میزان تحلیل استخوان کرستال یکسال پس از بارگذاری، $0/0.1 \pm 0.22$ میلیمتر بدست آمد که مورد قبول میباشد.

یکی از ابزار رایج در سنجش میزان لقی ایمپلنت، پریوست میباشد که یک ابزار رایانه ای - مکانیکی با مقیاس (۸-۰ تا +۵۰) است که توسط schult ابداع شد.^(۲۹) در مطالعه حاضر از پریوست با مشخصات ذکر شده استفاده گردید و میزان گزارش شده برای تمامی ایمپلنت های مستقر شده، در محدوده نرمال برای ایمپلنت یعنی (۸-۰ تا +۹) بود. میانگین PTV (۱/۶ تا $2/81 \pm 0.30$) میباشد، از آنجا که بلافاصله پس از قرار گرفتن پروتز بر روی ایمپلنت میزان PTV اندازه گیری نشده، مقایسه میانگین PTV قبل از بارگذاری با Healing Abutment منطقی نیست چرا که ارتفاع اکلوزالی پروتز، وجود سمان و فریم فلزی بر نتایج PTV تاثیر گذار است.^(۳۰)

استفاده از ایمپلنت های WD مزایایی چون افزایش سطح تماس، جبران عوامل نامطلوب مربوط به نیرو، جبران تراکم استخوانی ضعیف و افزایش سطح تماس در ایمپلنت های کوتاه را دارد.^(۳۱) افزایش قطر ایمپلنت اگرچه باعث افزایش سطح تماس استخوان و ایمپلنت در نواحی خلفی فکین و ثبات اولیه مطلوب تر Drilling میگردد اما برداشت حجم بیشتر استخوان طی پروسه

بر حجم استخوان مورد نیاز جهت اسکواینترگریشن تاثیر منفی دارد، لذا اندیکاسیون کاربرد این ایمپلنت ها در نواحی خلفی فکین با ضخامت کافی استخوان میباشد.

در مطالعات Garlini, Friberg, Bahat, Lekholm, Romeo و همکاران افزایش

Platform و کیفیت پایین استخوان در ناحیه خلفی (دندانهای چند ریشه ای) بوده است(۲۰, ۲۱). برخی از محققین ترجیح داده اند که در صورت انجام جایگذاری فوری نسبت به قرار دادن ایمپلنت در هر دو ساخت دندان اقدام گردد.^(۵) نخستین نتایج جایگذاری فوری بر روی گروه وسیعی از بیماران توسط Schulte و همکاران ارائه گردید^(۲۲) که این امر را روی قطرهای متفاوت ایمپلنت ها در نواحی مختلف فکین مطالعه کردند، پس از آنها Schwartz-Arad, با مروری بر Schulte کلیه مقالات موجود تا آن زمان و در تایید نتایج میزان بقای ایمپلنت های مستقر شده به صورت جایگذاری فوری رادر نواحی مختلف فکین به جز مولر ها ۹۳ تا ۱۰۰ درصد اعلام کردند.^(۲۳) در مطالعات Wegenberg و Schwartz Arad و همکاران، در نواحی مختلف فکین به روش جایگذاری فوری بالاترین میزان شکست مربوط به ناحیه مولرهای مازگزیلا بوده است. در این مطالعات میزان پایین تر موفقیت جایگذاری فوری در ناحیه مولرهای فکین بالاخص مولرهای مازگزیلا به دلیل کاربرد ایمپلنت های با قطر استاندارد بوده است.^(۲۴, ۲۵)

در تحقیق حاضر ضمن استفاده از مزایای جایگذاری فوری، به منظور کاهش میزان شکست کاربرد قطرهای استاندارد ایمپلنت از ایمپلنت های با قطر بالا استفاده شده و به صورت یک مرحله ای استفاده گردید و با قرار دادن Healing Abutment پس از ۴ ماه بدون انجام جراحی مرحله دوم نسبت به بارگذاری آن و یکسال پس از بارگذاری نسبت به ارزیابی نتایج موفقیت، توسط پارامترهای کلینیکی و رادیوگرافی Buser^(۱۶) اقدام گردیده است. چنانچه تا پایان تحقیق، در هیچ یک از نمونه ها علایمی از درد، دیس استزی، ترشح چرک و عفونت مشاهده نشد و در رادیوگرافی بیماران رادیولوسنسمی ممتد رادیوگرافیک دیده نشد همچنین همه نمونه ها فاقد لقی بودند.

از دست رفتن استخوان کرستال به طور محدود در طی سال اول بارگذاری مشاهده میشود.^(۲۶) Adell و همکاران اولین کسانی بودند که چگونگی تحلیل استخوان کرستال را گزارش کردند. میزان تحلیل استخوان در سال اول به طور

تکنیک جایگذاری فوری و ۱۵۴ ایمپلنت در Healed Site جایگذاری شدند، به میزان موفقیت ۹۸/۴٪ رسیده اند.^(۸) در تحقیقات Fugazzotto و همکاران این میزان ۹۹/۱٪ برای ایمپلنت های با قطر ۶/۵ Platform میلیمتر در محل مولرهای مندیبل و ۹۹/۵٪ را برای جایگزینی مولرهای ماسگزیلا گزارش شده است.^(۱۸)

به هر حال با بررسی کلیه گزارشات به نظر میرسد در صورت امکان نگهداری استخوان اینترادیکولار و فاصله کافی از عصب آلوئول تحتانی به جهت ضروریات جایگذاری فوری میتوان نسبت به این عمل اقدام نمود. در این صورت با کاربرد Drilling ایمپلنت های Tapered WD & WP به لحاظ کمتر استخوان در نواحی اپیکالی و بیشتر بودن قطر ایمپلنت در ناحیه کرونال میتوان فاصله میان ایمپلنت و ساكت Basal bone Periperal socket wall anchorage از anchorage هم بهره برد و به این ترتیب نتایج قابل پیش بینی بدست آورد.

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از ایمپلنت های با قطر بدنه بالا و ناحیه platform به صورت جایگزینی فوری در صورت انتخاب صحیح نمونه ها و کاربرد تکنیک صحیح جراحی (حفظ حداقل استخوان باقی مانده به خصوص سپتوم بین ریشه ای) باعث اینتگریشن مطلوب بافت سخت و نرم شده در ضمن ایجاد تمہیدات پروستودنتیک مناسب با فراهم کردن نیروی اکلوزالی مطلوب میتوان سبب حفظ اسٹو اینتگریشن به دست آمده شد. لذا پیشنهاد میشود جهت بدست آوردن نتایج کلینیکی بهتر و تکیه بر اطلاعات دقیق تر اقدام به بررسی نمونه های بیشتر و مطالعات طولانی تر گردد.

احتمال شکست با کاربرد ایمپلنت های WP & WD متعاقب قرار دادن ایمپلنت در Healed Site گزارش نشد.^(۳۲-۳۷) این در حالی است که Ivanoff و همکاران میزان شکست را به ترتیب ۰/۵٪ و ۰/۱۸٪ در کاربرد ایمپلنت های ۳/۷۵ و ۴ و ۵ میلیمتری گزارش کردند. در این تحقیق علت میزان شکست بالا (۰/۱۸٪) ایمپلنت های ۵ میلیمتری به طور عمده به دلیل طراحی جدید ایمپلنت ها و عدم تجربه کافی متخصص، تراکم پایین استخوان، کاربرد ۴۵٪ ایمپلنت ها به عنوان ایمپلنت های ناجی و یا کاربرد آن در شرایطی که ثبات اوایله کافی توسط ایمپلنت های با قطر استاندارد تامین نمیشود میباشد. Eckert و همکارانش در سال ۲۰۰۱، در کاربرد ایمپلنت های قطور به میزان شکست ۱۹٪ در مندیبل و ۲۹٪ در ماسگزیلا دست یافتند.^(۳۸) Shin و همکاران دریافتند که میزان موفقیت ایمپلنت های با قطر ۵ میلیمتر در مقایسه با ایمپلنت های با قطر معمولی در طی ۵ سال ۸۰/۹ درصد در مقابل ۹۶ درصد است، در این مطالعه مهمترین مشخصه پیشگویی کننده موفقیت ایمپلنت های با قطر بالا

Remain Cancellous Bone

Cancellous Bone

(هر ۱٪ افزایش این نسبت ۳٪ میزان شکست را افزایش میدهد). در واقع Shin و همکارانش با در نظر گرفتن این فرمول میزان موفقیت ایمپلنت های با قطر بالا را نشان دادند.^(۳۹) این در حالی بود که مقادیر کمتر از ۱۳٪ نسبت اشاره شده با افزایش شکست ایمپلنت های WD به دلیل نقش پراهمیت Cancelluac Bone در متابولیسم طبیعی استخوان همراه است.

در خصوص کاربرد فوری ایمپلنت های WD در ناحیه مولرهای تحقیقات کمتری صورت گرفته است، چنانچه در تحقیقات Artzi و همکارانش جایگذاری فوری ایمپلنت های Platform با Tapered ۶ میلیمتر، همراه با بالابردن کف سینوس به منظور افزایش ارتفاع استخوان باقی مانده و بدون کنار زدن بافت نرم حین جایگذاری مولرهای اول و دوم فکین را عملی و موثر معرفی می کنند.^(۵) در ضمن Degidi و همکاران^(۸) در کاربرد سیستم های مختلف ایمپلنت به گونه ای که ۱۵۰ ایمپلنت با قطر Platform بیش از ۵ میلیمتر با

References:

1. Branemark P-I, Hanson Bo, Adell R. Osseointegration Implants in the treatment of edentulous Jaw. Experience from a 10-year period. *Scand J plast Reconstr surg.* 1997;16(suppl): 1-132.
2. Schroeder A, van der Zypen E, Stich H, Sutter F. The reaction of bone connective tissue and epithelium to endosteal implants with titanium-sprayed surface. *J Oral Maxillofac Surg.* 1981 Jan; 9(1):15-25.
3. Bornstein MM, Harnisch H, Lussi A, Buser D. Clinical performance of wide-body implants with a sandblasted and acid-etched (SLA) surface: Results of a 3-year follow-up study in a referral clinic. *The Int J Oral Maxillofac Implants.* 2007 Jul-Aug; 22(4):631-638.
4. Pplizi G, Ranger B, Lekholm U, Guualini F, Lindstrom H. Branemark system wide-platform implants for single molar replacement. *Clinical Implant Dent Related Research.* 2000 Apr; 2:61-68.
5. Artzi Z, Parson A, Nemcovsky CE. Wide diameter implants placement and internal sinus membrane elevation in the immediate post extraction phase: clinical and radiographic observation in 12 consecutive molar sites. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2003 Mar-Apr; 18(2):242-249.
6. Chen ST, Wilson TG, Hammerle CHF. Immediate or Early placement of implants following tooth extraction, A review of biological basis, clinical procedures and outcome. *The Int J Oral Maxillofac Implants.* 2004; 19(suppl).
7. Anner R, Better H, Chaushu G. The clinical effectiveness of 6 mm diameter implants. *J Periodontology.* 2005 Jun; 76(6):1013-1015.
8. Degidi M, Piattelli A, Lezzi G, Carnici F. Wide-diameter implants: Analysis of clinical outcome of 304 fixtures. *J Periodontology.* 2007 Jan; 78(1):52-58.
9. Langer B, Langer L, Herrmann I, Joraneus L, Eng M. The wide fixture: A Solution for Special bone situations and a rescue for the compromised implant. part 1. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1993 Apr; 8(4):400-408.
10. Mordenfeld M H, Johnsson A, Hedin M, Billstrom C, Fyberg K.A. A retrospective clinical study of wide-diameter implants used in posterior edentulous areas. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2004 Apr; 19(3):387-392.
11. Arad Ds, Grossman Y, Chaushu G. The clinical effectiveness of implants placed immediately in to fresh extraction sites of molar teeth. *J Periodontology.* 2000 Apr; 71(4):839-844.
12. Lazzara RJ. Platform switching: A new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels, *Int J Periodontics & rest dent.* 2006 Jan-Feb; 26(1):9-17 .
13. Graves SL, Jason CE, Siddiqui AA. Wide diameter implants: indication , considerations and preliminary results over a two year period. *Austprosthont J.* 1994 Jan; 8(1):31-37.
14. Bahat O, Handlsman M. Use of wide implant and double implants in posterior jaw:A clinical report. *Int Oral Maxillofac Implants.* 1996 May-Jun; 11(3):379-386
15. Sadat Mansouri S, Harandi S. Clinical and Radiological evaluation of Tapered Wide Diameter & Wide Platform implants in molar immediate implantation.(preliminary study). *JRDS2008;5(3):41-52*
16. Buser D, Mericsk SR, Bernard JP. Long term evaluation of non-submerged ITI implants. Part -1: 8 year life table analysis of prospective multi-center study with 2359 implants. *Clin Oral Implants Res.* 1997 Jun; 8(3):161-172.
17. Adell R, Lekholm U, Rokler B et al: A 15 years study of osseointegrated Implants in the treatment of the edentulous jaw. *Int J Oral Surg.* 1981 Des; 10(6):387-416.
18. Paul A. Fugazotto. Implant placement at the time of mandibular molar extraction: description of technique and preliminary results of 341 cases. *J Periodontology.* 2008 Apr; 79(4):737-745.
19. Po-Sung Fu, Yi-Min Wu, Ching-Fang Tsai, Jen-Chyan Wang, Ta-Ko Huang, Wen-Cheng Chen and Chun-Cheng. Immediate implant placement following minimally invasive extraction: A case report with a 6 year follow up. *J Medical sciences.* 2010 Oct; 26(1):47-52.
20. Chih Long Chen, Chih Ling Chang, Shin Jung Lin. Immediate implant placement and provisionalization with simultaneous guided bone regeneration in the esthetic zone. *J dental sciences.* 2011 mar; 6(1): 53-60.
21. Ivanoff C J, Grondahl K, Bergetorn C, Lekholm U. Influence of variation in implant diameter A 3-5 years retrospective

- clinical report. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1999 Feb;14(2):173-180.
22. Schulte W, Hoedt D, Lukas D, Maunz M. Periotest for measuring periodontal characteristic – correlation with bone loss. *J periodontal res.* 1992 May;27(3):184-190.
23. Schwartz-Arad D, Samet N. Single tooth replacement of missing molars: A retrospective study of 78 implants. *J periodontology.* 1999 Apr;70(4):449-454.
24. Wegenberg B, From S.J. A retrospective study of 1925 consecutively placed Immediate implants from 1988 - 2004. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2006 Jan-Feb;21(1):71-80.
25. Schwartz-Arad D, Gullayen N, Chaushu G. Immediate versus non immediate implantation for full arch reconstruction following extraction of all residual teeth. A retrospective comparative study. *J periodontology.* 2000 Apr;71(4):923-928.
26. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark P.I., Lindhe J, Eriksson B, Sbordon L. marginal tissue reactions at osseointegrated titanium fixtures (1). A 3 years longitudinal prospective study. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 1986 Feb; 15(1):39-52.
27. Quijnen M, Naert I, Van Steenberghe D. Fixture design and overload influence on marginal bone loss and fixture success in the Branemark implant system. *Clin Oral Implants Res.* 1992 Sep;3(3):104-111.
28. Alberktsson T. Direct bone anchorage of dental implants. *J Prosthet Dent.* 1983 Aug; 50(2):255-261.
29. Teerlinck J, Quirynen M, Darius Ms, et al: periotest, an objective clinical Diagnosis of bone apposition towards implants, *Int J oral maxillofac Implants.* 1991 Jan; 6(1):55-61.
30. Terrenc J, Griffi Wai S, Cheung , The use of short, wide implants in Posterior areas with reduced bone height.A retrospective investigation, *J Prosthet Dent.* 2004 Feb; 92(2):139-144.
31. Younis L, Taher A, Abu-Hassan MI, Tin O. Evaluation of bone healing following immediate and delayed dental implant placement. *J Contemp Dent Pract.* 2009; 10(4):35-42
32. Lekholm U, Gunne J, Henry P, Higuchi K, Linden U, Survival of Branemark. Implant in partially edentulous jaw : *Int J Oral maxillifac implants* 1999 Aug; 14(4):639-645.
33. Bahat O. Branemark system implants in the posterior maxilla: clinical study Of 660 implant. *Int J Oral maxillofac implants.* 2000 Sep-Oct; 15(5):646-653.
34. Fridberg B, Ekestubbe A, Sennerby L. Clinical outcome of Branemark System implants of various diameter: A retrospective study. *Int J Oral maxillofac implants.* 2002 Sep-Oct; 17(5):671-674.
35. Garlini G, Bianchi C, Chierichetti V, Singurta D, Maiorana C, Santoro F. Retrospective clinical study. *J Oral & maxillofac implants.* 2003 Jul - Aug; 18(4):589-593.
36. Romeo E, Lops D, Margutti, Chisolfi M, Chiapasco M. Long term survival and success of oral implants in the treatment of full and partial arches: A 7 year prospective study with the ITI dental implants systems. *Int J Oral & maxillofac implants.* 2004 Mar-Apr; 19(2):247-259.
37. Lemmermann K, Lemmermann NE. Osseointegrated dental implants in Private practice: A long term case series study. *J Periodontology.* 2005 Feb; 76(2):310-319.
38. Eckert S.E, Meraw S. J, Weaver A.L, Lohse C.M. Early Extraction with wide - platform MK2 Implants. Part 1: implant survival. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2001 Mar-Apr; 16(2):208-216.
39. Shin SW, Brayan SR, Zard GA. A retrospective study on the treatment outcome of wide-bodies implants. *Int J prosthodont.* 2004 Mar; 17(1):52-58.