

## بررسی نقش سلول های ماکروفاژ در التهابات کانال دندانی

دکتر سیامک صندوقچیان<sup>۱\*</sup>، دکتر هایده مبین<sup>۱</sup>، دکتر لیلا سادات حاتم نژاد<sup>۲</sup>

۱- گروه میکروبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

۲- استادیار گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

### خلاصه:

**سابقه و هدف:** پالپیت یک بیماری التهابی دندانی است که با تجمع مدیاتورهای التهابی مانند سیتوکائین ها کموکائین ها شناخته می شود که بیشتر بدلیل عفونتهای باکتریایی استرپتوکوک می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان IL36 $\gamma$  بر روی سلول های ماکروفاژی استخراج شده از بافت ملتهب پالپ دندان و بررسی عوامل افزایش دهنده التهاب پالپ دندان بوسیله IL36 $\gamma$  می باشد. **مواد و روش ها:** در این مطالعه مورد-شاهدی از ۲۵ بیمار نمونه های بافت پالپ سالم از دندان عقل کشیده شده و نمونه های بافت ملتهب از دندان های دارای پالپیت برگشت ناپذیر حین پالپکتومی بدست آمد. سلولهای ماکروفاژ بعد از استخراج بوسیله پروتئین های TLR4 بصورت تایمر تحریک شده و با تریزول mRNA سلولی استخراج شدند و سپس با استفاده از دستگاه Real Time PCR میزان IL36 $\gamma$  در سلولهای ماکروفاژ تحریک شده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی آماری با استفاده از آزمون one way ANOV و آزمون تعقیبی TUKEY انجام شد.

**یافته ها:** نتایج نشان داد که میزان سایتوکائین در بافت ملتهب بیشتر از بافت سالم پالپ بوده (۴۳/۰۹ و ۱۸/۲۱ pg/ml) همچنین نتایج استخراج mRNA سلولهای کشت شده بعد از تحریک با TLR4 نشان داد که بعد از ۱۲ ساعت تحریک با TLR4 میزان بیان IL36 $\gamma$  افزایش چشمگیری نسبت به سایر ساعات داشت. (P<۰/۰۰۱)

**نتیجه گیری:** به نظر می رسد در موارد التهاب پالپ دندان IL36 $\gamma$  از سلول های ماکروفاژی تحریک شده تولید می شود.

واژه های کلیدی: رسپتور ایمنی ذاتی، پالپیت و اینتر لوکین ۳۶ گاما

وصول مقاله: ۹۵/۵/۳۰ اصلاح نهایی: ۹۵/۱۲/۱۶ پذیرش مقاله: ۹۵/۱۲/۱۸

### مقدمه:

آن در کنترل پاسخهای Th-17 می باشد. (۴) IL-36 $\alpha$  و IL-36 $\beta$  نقش مهمی را در التهابات ایجاد نمی کنند ولی مطالعات قبلی نشان داده است که IL-36 $\gamma$  بر روی التهابات نقش عمده ای دارد ولی نقش آن در التهابات دندانی مطالعه نشده است. (۴) مطالعات اخیر نشان داده است که IL-36 $\gamma$  با رسپتورهای ایمنی ذاتی بخصوص رسپتورهای Toll Like ارتباط داشته و می تواند بوسیله آنها بیان گردد. این گیرنده ها شبیه به پروتئینی هستند که توسط ژن Drosophila Toll کد می شوند. (۵) گیرنده های شبه زنگوله ای عمدتاً بر روی سلولهای سیستم ایمنی ذاتی بیان می شوند. البته این گیرنده ها در بافت های پرپودنتال نیز شناسایی شده اند. پاتوژنها از طریق اتصال به اینتگرین و با تکثیر خود و در حالیکه از مکانیسم های

پالپیت یک بیماری التهابی بافت پالپی دندانی است که با تجمع مدیاتورهای التهابی مانند سیتوکائین ها و کموکائین ها شناخته می شود که بیشتر بدلیل عفونتهای باکتریایی استرپتوکوک می باشد. (۱) استرپتوکوک موتانس، گونه ای از استرپتوکوک است که فلور نرمال دهان و سیستم تنفسی فوقانی در انسان می باشد. این باکتری به عنوان بیماریزای فرصت طلب شناخته می شود و در صورت راهیابی به جریان خون، موجب سپتی سمی در بیماران مبتلا به نوتروپنی می شود. (۲) استرپتوکوک موتانس در حضور سوکروز در محیط کشت، کپسول تولید می کند. سایتوکائین ها و کموکائین ها باعث بیان و تحریک یکسری عوامل سلولی می شود که نقش فعالی در پروسه های تخریب و ترمیم بافت پالپی دارند. (۳) IL-36 جز سایتوکائین های است که عملکردی شبیه IL-1 دارد و مهمترین عملکرد

مستقیم و درمان ترمیمی با آمالگام نداشت. بیماران سیگاری و نیز نمونه هایی که از دهان شویه های گوناگون مصرف می کردند از مطالعه حذف شدند. برای نمونه های سالم بخاطر رعایت اصول اخلاق پزشکی و پژوهشی بافت دندان های عقلی که کشیده شدند استفاده شد.<sup>(۳)</sup>

بافت در داخل محیط کشت Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) توسط کاتر جراحی شماره ۱۰ به چند قطعه بریده شد و ذرات بریده شده به همراه آنزیم کلاژناز ۱۰ درصد وارد فالكون شدند و به مدت ۸ ساعت داخل یخچال قرار گرفته و پس از سانتریفوژ و جدا شدن آنزیمها و بافت های لیز شده محتوی فالكون در زیر هود وارد فلاسک کوچکی شدند. سلول های ماکروفاژ توسط فلوسایتومتری و با مارکر CD14 شمارش شدند.<sup>(۳،۴)</sup>

سلولها بوسیله پروتئین های TLR4 بصورت تایمر بمدت ۲، ۴، ۸ و ۱۲ و ۲۴ ساعت تحریک شده و بعد از استفاده از روش تریزول (mRNA) سلولی استخراج شده و سپس با استفاده از دستگاه Real Time PCR میزان Th17, IL36 $\gamma$  در سلولهای ماکروفاژ تحریک شده مورد بررسی قرار گرفتند.

در مطالعه حاضر میزان سایتوکاین IL36  $\gamma$  در مایع سوپرناتانت کشت سلولی بوسیله کیت شرکت ebioscience طبق راهنمای کیت، مورد سنجش قرار گرفت. بعد از پارافینه شدن سلولها، نمونه ها در داخل بافر بلوکه کننده به مدت یک ساعت قرار داده شد و آنتی بادی اولیه anti-IL17, anti-CD4 به مدت ۲ ساعت در دمای اطاق بر روی نمونه ها قرار گرفت بعد از شستشو، آنتی بادی ثانویه بمدت یک ساعت اضافه شد و بعد از انکوبه کردن و شستشو، مقدار hocheat از ۵۰ $\mu$ L روی اسلایدها ریخته و با میکروسکوپ ایمونوفلورسانس بررسی گردید.<sup>(۳)</sup> جهت آنالیز داده های مطالعه از نسخه SPSS=17 استفاده شد. مقایسه دو به دو گروهها با آزمون تعقیبی و جهت مقایسه میزان زمان تحریک سلولها از آزمون one way ANOVA و تست تعقیبی


حفاظتی میزان پنهان مانده اند، سلولهای اپیتلیال لته را مورد تهاجم قرار دهند.<sup>(۶)</sup> گیرنده های شبه زنگوله ای موجود بر سلولهای اپیتلیال لته میتوانند ریز ساختارهایی که به فراوانی در پاتوژنها وجود دارند، را شناسایی کنند.<sup>(۷)</sup> هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان IL36 $\gamma$  بر روی سلول های ماکروفاژی استخراج شده از بافتهای التهابی کانال دندان و بررسی عوامل افزایش دهنده التهاب در کانال دندان بوسیله IL36 $\gamma$  بود.

### مواد و روشها:

تحقیق با طراحی مورد- شاهدهی انجام گرفت. گروه مورد افراد مبتلا به پالپیت و گروه شاهد افراد سالم بودند. مطالعه فوق در کمیته اخلاق دانشکده مطرح و با کد IR.IAU.TABRIZ.REC.1395.4 مورد تأیید قرار گرفت.


نمونه های بافتی از داخل کانال دندان بعد از گرفتن رضایت نامه از ۲۵ بیمار که به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه کرده بودند انجام شد. نمونه های بافتی سالم از دندان عقل حذف شده بدست آمدونمونه های بافت ملتهد از دندان های دارای پالپیت برگشت ناپذیر حین پالپکتومی بدست آمد. نمونه های بافتی پالپی کاملاً بصورت آسپیتک استخراج شده و در محلول بافر Hanks در تیوبهای پلاستیکی ۱۰ میلی متری قرار داده شد. نمونه ها برای تشخیص عامل باکتریایی به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تبریز فرستاده شده و از نظر باکتری استرپتوکوکوس موتانس کشت داده شد. بیماران مبتلا به دیابت، هیپاتیت، بیماری های اتوایمیون نظیر لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و آرتریت روماتوئید و نیز بیماران دارای ضایعات اندودنتیک و بیماریهایی که تحت درمان ارتودنتیک قرار گرفته بودند و در نهایت بیماریهایی که طی دو هفته گذشته آنتی بیوتیک مصرف نموده بودند، از مطالعه خارج شدند. به منظور کاهش التهاب و دستکاری بیش از حد، بیماریهایی انتخاب شدند که یک ایمپلنت تک دندان خلی دریافت کرده و دندان متناظر ایمپلنت در سمت مقابل دهان هیچ رستوریشن مستقیم یا غیر

TUKEY استفاده شد. برای اندازه گیری الایزا از نرم افزار curve export استفاده گردید.




نمودار ۳- میزان بیان IL-36 گاما بر اساس الایزا

برای بررسی نفوذ سایتوکاینهای التهابی و همچنین برای نشان دادن وجود مکانیسم التهاب در پالپیت از آنتی بادی های نشان دار IL-17، CD4 بروش ایمونوفلورسانس استفاده شد. نمودار ۳ نشان میدهد که میزان نفوذ TH17 در بافت پالپیت نسبت به بافت سالم اطراف آن بیشتر میباشد همچنین این روند در کشت سلول نیز انجام گرفت که همان نتیجه را نشان داد. (شکل ۱ و ۲)



IL-17

CD-4




merge

شکل ۱ - میزان نفوذ TH17 در بافت پالپیت نسبت به بافت سالم

#### یافته ها:


نتایج نشان داد که میزان سایتوکاین در گروه بیمار بیشتر از قسمت سالم بافت بوده (۴۳/۰۹ و ۱۸/۲۱ پیکوگرم بر میلی لیتر) (نمودار ۱)



نمودار ۱- میزان سایتوکاین IL36Y بر حسب گروه های مورد مطالعه

همچنین نتایج استخراج mRNA سلولهای کشت شده بعد از تحریک با TLR4 نشان داد که بعد از ۱۲ ساعت تحریک با TLR4 میزان بیان  $\gamma$  IL36 افزایش چشمگیری نسبت به سایر ساعات داشت. ( $P < 0.001$ ) (نمودار ۲)

این نتیجه نشان دهنده وجود رابطه ای بین TLR4 که لیگاندش lps می باشد را با سایتوکاین های پیش التهابی نشان داد. نتایج الایزا نشان داد که میزان  $\gamma$  IL36 در سوپرناتانت سلولهای کشت شده قسمت پالپیت بیشتر از قسمت سالم بافت میباشد که حاکی از نفوذ سلولهای التهابی و سایتوکاین های التهابی به بافت مذکور می باشد. (نمودار ۳)



نمودار ۲- میزان IL36 بر حسب زمان پیگیری


رشدی تغییر شکل دهنده ( $TGF\beta$  و IL6) برای آغاز عملکرد IL17 ضروری است، در حالی که IL23 باعث افزایش عملکرد IL17 می شود. <sup>(۱۴)</sup> پالپ دندان با سلول های سیستم ایمنی بدن مجهز شده است. التهاب پالپ مزمن به احتمال زیاد توسط آنتی ژن های باکتری که از طریق توپولهای عاجی به پالپ منتشر شده است بوجود می آید. TLR4 در لایه سلولی دندان و مناطقی که با عروق خونی در سطوح مختلف دندان در تماسند و دندانهای سالم تحت تاثیر پوسیدگی بیان می شود. TLR4 را می توان با تحریکات از LPS و عصاره استرپتوکوکوس موتانس افزایش داد. <sup>(۱۵)</sup> Yu Suna با مطالعه در مورد اثر IL36 بر روی التهابات ریه به این نتیجه رسید که این سایتوکاین سلولهای پیش التهابی را فعال می کند. <sup>(۱۶)</sup> در مطالعه دیگری مشخص شد که انواع سلول های ایمنی بدن در طول پوسیدگی دندان تغییر می یابد. <sup>(۱۷)</sup>

در مطالعه دیگری استدلال شد که آنتی ژن های مرتبط با عوامل بیماری زای پوسیدگی ترجیحاً ممکن است در طول حمله پوسیدگی انواع مختلف سلول های ایمنی بدن استخراج شود. <sup>(۱۸)</sup> در تحقیقی دیگر مشخص شد که در ضایعات پوسیدگی دندانی، به احتمال زیاد تغییر از استرپتوکوک موتانس در پوسیدگی کم عمق به لاکتوباسیلوس کازئی در ضایعات عمیق پوسیده اتفاق می افتد. <sup>(۱۹)</sup>

#### جدول ۱ - بررسی نقش رسپتورهای ایمنی، التهاب کانال دندانی

Pvalue	پالپ سالم	پالپیت	گروه ها
			شاخص های رسپتورهای ایمنی
$P < 0.001$	$18/21 \pm 1/0.9$	$43/0.9 \pm 3/2$	سایتوکاین IL-36 گاما
$P > 0.005$	$21/21 \pm 1/0.6$	$23/0.1 \pm 1/4$	IL-36 الفا
$P > 0.005$	$12/21 \pm 1/0.7$	$13/0.1 \pm 1/8$	IL-36 بتا

مطالعات بر روی IL-36 $\gamma$  نشان داده است که TLR4 می تواند IL-36 $\gamma$  را زیاد کند. به طور کلی عوامل متعددی در پاتوژن ضایعات پالپی نقش دارند. <sup>(۱۶-۱۹)</sup> موسوی و همکاران در



شکل ۲- نفوذ IL-17 به سلولهای تحت درمان

#### بحث:

پالپ دندان، بافت همبند بسیار پویایی است که به تحریکات خارجی به شکل های مختلفی پاسخ می دهد. <sup>(۸)</sup> نقش سلول های موجود در پالپ و گردش خون بسیار با اهمیت است. <sup>(۹)</sup> سلول های T، حدود ۶۰-۷۰ درصد لنفوسیت های گردش خون را تشکیل می دهند که به زیرگروه های CD4+ و CD8+ تقسیم می شوند. سلول های TCD4<sup>+</sup>، تحت عنوان T-helper و سلول های CD8<sup>+</sup> T، تحت عنوان T-cytotoxic c نامیده شده اند. <sup>(۱۰)</sup> اخیراً زیرگروه جدیدی از سلول های CD4+T کشف شده اند، که بسیاری از نارسایی ها و تناقضات مربوط به مدل Th1/Th2 را برطرف می سازد و با توجه به سایتوکاین التهابی ویژه آن به نام IL17، از آن تحت عنوان Th17 یاد می شود. <sup>(۱۱)</sup> در مورد عملکرد آن که حفاظتی است یا تخریبی هنوز ابهاماتی وجود دارد. با این همه بسیاری از مطالعات، اثر تخریبی و زیانبار Th17 و خصوصاً IL17 را در بیماری های خود ایمنی التهابی آشکار ساخته اند. <sup>(۱۲)</sup> عملکرد اصلی IL17 تقویت پاسخ ایمنی با تحریک و ترشح کموکین ها و سایتوکین ها و مارکرهای سطح سلولی است. این اینترلوکین در آغاز و ماندگاری پاسخ ایمنی نقش محوری دارد. <sup>(۱۳)</sup> عامل

**نتیجه گیری:** در موارد التهاب کانال دندان IL36 $\gamma$  از سلول های ماکروفاژی تحریک شده، تولید می شود. TLR4 بر روی بیان رسپتور IL36 $\gamma$  نقش دارد. اثر TLR4 بر روی بیان رسپتور IL36 $\gamma$  بر روی سلول های ماکروفاژی پالپ دندان در زمانهای مختلف یکسان نیست.

**سپاسگذاری:** این مقاله از طرح تحقیقاتی با بودجه پژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به انجام رسیده استخراج شده است.

سال ۲۰۰۶ وجود Natural Killer Cell (NKC) ها را در پالپ ملتهب اثبات کردند، در حالی که در پالپ نرمال این سلول ها یافت نشده بودند.<sup>(۲۰)</sup> افزایش IL17 هم تائیدی دیگر بر این ادعاست که در پالپ ملتهب، عوامل پاتوژنیک و پیش التهابی افزایش معنی داری پیدا می کنند. با توجه به مطالعات گذشته و مطالعه حاضر مشخص شد که در پالپیت، رسپتورهای سیستم ایمنی نقش فعالی در افزایش سایتوکاین های پیش التهابی و التهابی شده و به طبع آن میتوانند باعث افزایش IL-36 گاما را نیز بکنند با توجه به مطالعات قبلی IL-36 الفا و بتا نقشی در التهابات ندارند. این مطالعه اولین مطالعه ای میباشد که نقش رسپتورهای ایمنی را در التهابات کانال دندان نشان می دهد.

**References:**

1. Karapanou V, Kempuraj D, Theoharides TC. Interleukin-8 is increased in gingival crevicular fluid from patients with acute pulpitis. *J Endod* 2008; 34(2): 148-51
2. Ricucci D, Loghin S, Siqueira JF Jr. Correlation between clinical and histologic pulp diagnoses. *J Endod* 2014; 40(12): 1932-39
3. Allareddy V, Rampa S, Lee MK, Allareddy V, Nalliah RP. Hospital-based emergency department visits involving dental conditions: profile and predictors of poor outcomes and resource utilization. *J Am Dent Assoc* 2014; 145(4): 331-7
4. Hughes RM. Strategies for cancer gene therapy. *J surg Oncol*. 2004; 85(1):28-35.
5. Eshghyar N, Asgari M, Rahrotaban S, Monshizadeh R. The immunohistochemical study of angiogenesis in normal oral mucosa and oral lichen planus by CD34 and DC105 markers. *J Res Dent Sci* 2016, 13(1): 36-42
6. Kowalczyk DW, Wysocki PJ, Mackiewicz A. Cancer immunotherapy using cells modified with cytokine genes. *Acta biochim Pol* 2003; 50(3): 613-24.
7. Zarour HM, Ferrone S. Cancer immunotherapy: Progress and challenges in the clinical setting. *Eur J Immunol* 2011; 41(6): 1510-5.
8. Wold WS, Toth K. Adenovirus vectors for gene therapy, vaccination and cancer gene therapy. *Curr Gene Ther* 2013; 13(6): 421-33.
9. Bhatia S1, Menezes ME, Das SK, Emdad L, Dasgupta S, Wang XY, et al. Innovative approaches for enhancing cancer gene therapy. *Discov Med* 2013; 15(84): 309-17.
10. Zehnder M, Rechenberg DK, Bostanci N, Sisman F, Attin T. Comparison of vehicles to collect dentinal fluid for molecular analysis. *J Dent*. 2014; 42: 1027±1032
11. Azmudeh F, Hajikhani SH, Alizadeh SA. Evaluation of the hydroalcoholic chamomile extract antifungal activity on *Candida albicans*-Invitro Study. *J Res Dent Sci* 2016, 13(4): 210-215
12. Lakkis FG, Baddoura FK, Cruet EN, Parekh KR, Fukunaga M, Munger KA. Anti-inflammatory lymphokine mRNA expression in antibody-induced glomerulonephritis. *Kidney Int* 1996; 49(1), 117-26.
13. Rashidi Meibodi F, Kazeronizadeh N, Karimi Nasab M. The average number of *Candida albicans* colonies in gingival crevicular fluid in patients with chronic periodontitis. *J Res Dent Sci* 2016, 13(1): 30-35
14. Hempel L, Korholz D, Bonig H, Schneider M, Klein-Vehne A, Packeisen J, et al. Interleukin-10 directly inhibits the interleukin-6 production in T-cells. *Scand J Immunol* 1995; 41(5): 462-6.
15. Rechenberg DK, Bostanci N, Zehnder M, Belibasakis GN. Periapical fluid RANKL and IL-8 are differentially regulated in pulpitis and apical periodontitis. *Cytokine* 2014; 69(1): 116-9
16. Yu Suna, Mozaffariana A, Heather A, Huyen Dinha A, Esther S, Trueblood J, Townea E. IL-36 induces inflammation and collagen deposition in the lung. *Cytokine*. 2013: 63; (3); 303
17. Matsushima K, Ohbayashi E, Takeuchi H, Hosoya S, Abiko Y, Yamazaki M. Stimulation of interleukin-production in human dental pulp cells by peptidoglycan from *Lactobacillus casei*. *J Endod* 1998; 24(4): 252-5
18. Barral-Netto M1, Barral A, Brownell CE, Skeiky YA, Ellingsworth LR, Twardzik DR, et al. Transforming growth factor-beta in leishmanial infection: a parasite escape mechanism. *Science* 1992; 257(5069): 545-8
19. Barton BE, Jackson JV. Protective role of interleukin-6 in the lipopolysaccharide-galactosamine septic shock model. *Infect Immun* 1993; 61(4): 1496-9.
20. Prabhu A, Michalowicz BS, Mathur A. Detection of local and systemic cytokines in adult periodontitis. *J Periodontol* 1996; 67(5): 515-22