

مقایسه اثر ضد قارچی و ضدبacterیایی میخک بر روی کلونی های کاندیدا آلبیکنс و استرپتوکوکوس موتانس

دکتر شهرزاد امیرخان^۱، دکتر فاطمه رشیدی میبدی^{۲*}، دکتر مهدی رفیعی^۳، دکتر شیوا برمر^۴

۱-دانش آموخته دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خواراسگان)، اصفهان، ایران

۲-استادیار، گروه بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خواراسگان)، اصفهان، ایران

۳-استادیار، گروه ارتودننسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خواراسگان)، اصفهان، ایران

۴-دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خواراسگان)، اصفهان، ایران

وصول مقاله: ۱۴۰۱/۵/۳۰ اصلاح نهایی: ۱۴۰۱/۶/۲۲ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۶/۱۷

Comparison of the Antifungal and Antibacterial Effects of Cloves and Fluconazole Solution on Candida albicans and Streptococcus mutans Colonies

Shahrzad Amirkhan¹, Fatemeh Rashidi Meybodi², Mehdi Rafiei³, Shiva Brmar⁴

¹ Dentistry graduate student, school of dentistry, Isfahan (khorasan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

² Assistant professor, Department of oral diseases, Faculty of dentistry, Isfahan (khorasan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

³ Assistant professor, Department of orthodontics, Faculty of dentistry, Isfahan (khorasan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

⁴ postgraduate student, Department of oral & maxillofacial radiology, Faculty of dentistry, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

Received: Aug 2022 ; Accepted: Jun 2022

Abstract

Background and Aim : Candida albicans and Streptococcus mutans are common microorganisms that cause infection in the form of caries and candidiasis. The aim of this study was to compare the antifungal and antibacterial effects of clove extract and fluconazole solution on Streptococcus mutans and Candida albicans.

Materials and methods: In this laboratory study were used Streptococcus mutans (ATCC 35668) and Candida albicans (ATCC 5027). Clove extract was prepared in concentrations of 6/25 -12/5 -25-50 -100. Then 10 mg of fluconazole powder was dissolved in methanol and brought to the desired volume and inoculated separately into wells in Sabouraud Dextrose Agar culture medium for Candida albicans and Mitis Salivarius Agar for Streptococcus mutans. After 24-48 hours, the minimum inhibitory concentration and diameter of their growth inhibition zone were determined. The data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.

Results: The mean diameter of the non-growth halo of Streptococcus mutans in the vicinity of clove extract had a significant difference ($p<0.001$). And in fluconazole solution, no growth halo diameter was observed against Streptococcus mutans bacteria. The halo diameter of Candida albicans fungus was not observed in different concentrations of clove extract. But in the solution of fluconazole, there was an average diameter of the halo of non-growth against this fungus.

Conclusion: Clove extract has high antibacterial activity, but no evidence of antifungal effect was found in clove extract.

Key words: Clove, Fluconazole solution, Albicans Candida, Streptococcus mutans

***Corresponding Author:** mahtab.rashidi.mr@gmail.com

J Res Dent Sci.2023;20(3): 98-103

خلاصه:

سابقه و هدف: کاندیدا آلبیکنس و استرپتوكوکوس موتانس از میکرو ارگانیسم های شایع عامل عفونت زایی به صورت کاندیدیازیس و پوسیدگی دهانی هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره میخک بر روی باکتری استرپتوكوکوس موتانس و قارچ کاندیدا آلبیکنس بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی از گونه استرپتوكوکوس موتانس (ATCC 35668) و کاندیدا آلبیکنس (ATCC 5027) استفاده شد. عصاره میخک در غلظت های ۱۰۰-۵۰-۲۵-۵/۱۲-۲۵-۵ mg/ml تهیه شد، سپس ۱۰ میلی گرم از پودر فلوکونازول در متانول ۸۰٪ حل شده و به حجم مورد نظر رسانده شد و به صورت جدآگانه درون چاهک هایی در محیط کشت سابلر و دکستروز آگار برای کاندیدا آلبیکنس و میتیس سالواریوس آگار برای استرپتوكوکوس موتانس تلقیح گردید. پس از ۲۴-۴۸ ساعت حداقل غلظت بازدارنده و قطر هاله عدم رشد آن ها تعیین شد داده ها با آزمون های Kruskal-Wallis و Mann-U-Whitney تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری استرپتوكوکوس موتانس در مجاورت عصاره میخک تفاوت معناداری داشت ($P < 0.001$) و در محلول فلوکونازول قطر هاله عدم رشد علیه باکتری استرپتوكوکوس موتانس مشاهده نشد. قطر هاله عدم رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس در غلظت های مختلف عصاره میخک مشاهده نشد. ولی در محلول فلوکونازول میانگین قطر هاله عدم رشد علیه این قارچ تفاوت معنادار داشت ($P < 0.001$)

نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره میخک اثر ضدبacterی بر علیه استرپتوكوک موتانس داشته و فاقد اثر ضد قارچی بر علیه کاندیدا آلبیکنس می باشد

کلید واژه ها: میخک، محلول فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس، استرپتوكوکوس موتانس

مقدمه:

با توجه به ظهر گونه های مقاوم قارچی به خصوص گونه های کاندیدا در عفونت های کاندیدیایی، ضرورت کشف داروهای جدید با عوارض جانبی کمتر، احساس می شود.

دسته دوم از عوامل بیماری زایی دهان استرپتوكوکوس موتانس می باشد که یک باکتری گرم مثبت است که می تواند سبب تولید مقادیر زیادی گلوبولین و اسید و در نهایت باعث تغییر ظرفیت بافری بzac گردد. این باکتری می تواند در محیط اسیدی زنده بماند و مسیر متابولیسم آن در حفره دهان مهم ترین قدم برای بیماری زایی آن است^(۶).

فلوکونازول یک عامل ضد قارچی با طیفی گسترده می باشد^(۷). مصرف موضعی فلوکونازول، فاقد اثرات جانبی سیستمیک و تداخلات دارویی است. سوسپانسیون دهانی فلوکونازول مناسب افرادی است که دارای مشکل در بلع قرص یا کپسول هستند^(۹,۸).

مطالعات نشان داده که دهانشویه ای فلوکونازول در درمان کاندیدیازیس دهانی بسیار مؤثر است^(۱۰,۱۱).

قارچ کاندیدا یکی از میکروارگانیسم های فرصت طلب در حفره های دهان بوده و از آن میان کاندیدا آلبیکنس به عنوان یک گونه ای شایع بیماریزا برای انسان مطرح است^(۴-۱) قارچ کاندیدا در دهان حدود ۲۵ تا ۶۵ درصد از افراد سالم یافت می شود. عوامل زمینه ساز کاندیدیازیس دهانی شامل: تغییر فلور میکروبی، استفاده از آنتی بیوتیک های طیف گسترده، کورتیکوسترونیدها و سایر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، استفاده طولانی از دهان شویه ها، دنچرهای و دستگاه های ارتودنزی، مصرف سیگار، بهداشت ضعیف دهان و بارداری هستند^(۵). اقدام مناسب برای درمان کاندیدیازیس، شناسایی عامل اتیولوژی، حذف عوامل مستعد کننده و استفاده از داروهای ضد قارچی در درمان است.

تاثیرات فلوکونازول در کاهش خطر درمان های قارچی در کاندیدیازیس دهانی نسبت به داروهای دیگر ارجح است^(۷). هم چنین اثر آنتی باکتریال فلوکونازول در ممانعت از رشد سویه های هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به مترونیدازول در تعدادی از مطالعات دیده شده است^(۱۲).

ظهور گونه های مقاوم کاندیدا به داروهای ضدقارچی و مسائل مربوط به اینمی نگه دارنده های شیمیایی و داروها، محققان را بر آن داشته است تا به مطالعه عوامل ضد میکروبی از منابع طبیعی بپردازند. بیش از ۳۵ هزار گونه گیاهی وجود دارد که برای اهداف پزشکی در فرهنگ های مختلف استفاده می شود.^(۱۳)

میخک یک آنتی بیوتیک طبیعی به همراه خواص گستردۀ ضدبacterیایی، ضدقارچی و ضد ویروسی می باشد که به عنوان مرهم برای زخم های کوچک و یک ضد درد برای بیماری های دردناک و عفونی حفره دهان استفاده گردد. اوژنول مورد استفاده در دندانپزشکی شامل ۹۰ - ۷۲٪ روغن می باشد که از میخک استخراج می شود و برای کاهش درد ایجاد شده در حفره خشک که از عوارض احتمالی کشیدن دندان است، استفاده می شود.^(۱۴)

بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی انسان ها و داروهای گیاهی ثابت کرده اند که بسیاری از داروهای گیاهی خواص آنتی بیوتیکی بسیار مهمی از خود نشان می دهند^(۱۵-۱۷). ولی در اثر ضد قارچی این داروها نتایج ضد و نقیضی وجود دارد^(۱۸-۱۹). بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد قارچی و ضدبacterیایی میخک و محلول فلوکونازول بر روی کلونی های کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوکوس موتانس بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه آزمایشگاهی با کد اخلاق IR.IAU.KHUISF.REC.1399.187 در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان انجام شد، از گونه استرپتوکوکوس موتانس (ATCC 35668) و کاندیدا آلبیکنс (ATCC 5027) استفاده شد.

برای تهیه عصاره میخک، ۵۰۰ گرم پودر گیاه میخک به ۱۰۰۰ میلی لیتر اتانول ۷۰٪ اضافه شد بعد از اینکه خالص کلی با غلظت ۶۰٪ بدست شدنده محلول صاف شد. عصاره خالص کلی با غلظت ۶۰٪ بدست آمد و جهت انجام آزمایش های میکروبی در یخچال نگهداری شد. رقت های مورد نظر ۱۲/۵-۲۵-۵۰-۱۰۰ (۱۰۰-۵۰-۲۵-۶/۲۵) آماده شد و رقت

سازی در شرایط استریل انجام شد^(۳). برای آماده سازی محلول فلوکونازول (داروسازی پارس دارو، ایران)، ۱۰ میلی گرم از پودر فلوکونازول را در متابول حل کرده تا به حجم مورد نظر رسید برای آماده سازی قارچ و باکتری، ویال حاوی باکتری استرپتوکوکوس موتانس و کاندیدا آلبیکنس را تهیه کرده و سپس پودر لیوفیلیزه شده (خشک شده به وسیله انجماد سخت) آنها در محیط کشت اختصاصی (Saborauds Dextrose Agar) SDA (Mitis Salivarius Agar) MSA کشت داده شد. جهت کشت استرپتوکوکوس موتانس در محیط کشت داده شد. میتیس سالواریوس آگار نمونه رقیق شده با یک لوپ استاندارد معادل با ۰/۱ میلی لیتر به محیط کشت منتقل گردید و کشت چمنی داده شد هم چنین نمونه های کاندیدا آلبیکنس نیز بر روی محیط سابارو دکستروز آکار کشت چمنی داده شد. سپس چاهک هایی حاوی رقت های عصاره میخک و محلول فلوکونازول بر روی محیط های کشت ایجاد شد و جهت رشد استرپتوکوکوس موتانس، محیط های کشت در دستگاه انکوباتور CO₂ دار(پارس آزمایشگاه، تهران، ایران) به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفتند تا کلونی ها تشکیل بشوند. و برای تشکیل کلونی های کاندیدا آلبیکنس، محیط های کشت به مدت ۲۴ ساعت در دستگاه انکوباسیون با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفتند.


MIC: Minimum Inhibitory Concentration برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و قطر هاله عدم رشد، چاهکی که دارای حداقل غلظتی از عصاره بود که رشد قارچ و باکتری را مهار کرده و لذا تعداد کمی کلونی رشد کرده بود به عنوان حداقل غلظت مهاری یا MIC در نظر گرفته شد. زمان مؤثر برای تأثیر حداقل غلظت عصاره بر رشد ۲۴ ساعت بود و بررسی قطر هاله عدم رشد نمونه ها هم بعد از گذشت مدت زمان ۴۸-۲۴ ساعت انجام گرفت.

داده های بدست آمده با آزمون های Kruskal-Wallis و نسخه ۲۲ نرم افزار SPSS و Mann-Whitney شدنده و سطح خطا ۵ درصد در نظر گرفته شد

یافته ها:

در مقایسه مقدار قطر هاله عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس موتانس در مجاورت عصاره میخک و محلول فلوکونازول، میانگین قطر هاله عدم رشد بین غلظت های ۵۰ و ۱۰۰ mg/ml عصاره میخک

میانگین قطر هالهی عدم رشد علیه این فارج مشاهده شد. در مقایسه دو به دو گروه ها، قطر هالهی عدم رشد قارج کاندیدا آلبیکنس در مجاورت غلظت ۵۰ و ۱۰۰ mg/ml عصاره میخک بطور معناداری کمتر از قطر هالهی عدم رشد این فارج در مجاورت محلول فلوکونازول بود ($p < 0.001$)



شکل ۲. هاله عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس موتناس در مجاورت عصاره میخک

حداقل غلظت بازدارنده باکتری استرپتوکوکوس موتناس در عصاره میخک ۵۰ mg/ml بوده و محلول فلوکونازول بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتناس بدون تاثیر بود. همچنین حداقل غلظت بازدارنده قارج کاندیدا آلبیکنس در محلول فلوکونازول ۲ mg/ml بوده و عصاره میخک بدون تاثیر بر روی آن بود.

بحث:

در بررسی اثر ضد قارچی و ضد باکتریایی میخک و محلول فلوکونازول بر روی کلونی های کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوکوس موتناس نتایج نشان داد عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس موتناس در مجاورت محلول فلوکونازول مشاهده نشد. بنابراین محلول فلوکونازول بر این میکرو ارگانیسم تاثیری ندارد. ولی قطر هالهی عدم رشد این میکرو ارگانیسم در غلظت های ۵۰ و ۱۰۰ mg/ml عصاره میخک به طور معناداری با هم تفاوت داشتند بنابراین عصاره میخک می تواند در غلظت های بالا تاثیرات ضدبacterیایی داشته باشد. همچنین هالهی عدم رشد برای کاندیدا آلبیکنس در غلظت های مختلف عصاره میخک مشاهده نشد در حالیکه قطر هالهی عدم رشد این میکرو ارگانیسم در محلول فلوکونازول بیشتر بود بنابر این می توان نتیجه گرفت که محلول فلوکونازول در مقایسه با عصاره میخک اثر ضد قارچی بیشتری دارد.

مطالعه Golpour و همکاران^(۳) در زمینه ارزیابی اثر ضد قارچی کورکومین محبوس شده در نانو ذرات میسلی بر بیان ژن CDR1

میخک و محلول فلوکونازول تفاوت معنادار داشت ($p < 0.001$). در محلول فلوکونازول قطر هالهی عدم رشد علیه باکتری استرپتوکوکوس موتناس مشاهده نشد و در مقایسه دو به دو گروه ها، قطر هالهی عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس موتناس در مجاورت غلظت ۵۰ و ۱۰۰ mg/ml عصاره میخک بطور معناداری بیشتر از قطر هالهی عدم رشد این باکتری در محلول فلوکونازول بود ($p < 0.001$).

جدول ۱- میانگین قطر هالهی عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس موتناس در مجاورت عصاره میخک و محلول فلوکونازول

ماده	غله	تعداد	انحراف معیار \pm میانگین	حداقل حداکثر	Pvalue
عصاره میخک	۵۰ mg/ml	۲۰	۱/۰۸ \pm ۰/۹۷	۰/۴۵	<0.001
عصاره میخک	۱۰۰ mg/ml	۲۰	۲/۰۷ \pm ۰/۳۸	۱/۵۰	
محلول فلوکونازول	-	۲۰	۰/۰۰ \pm ۰/۰۰	۰/۰۰	

در مقایسهی مقدار قطر هاله عدم رشد قارج کاندیدا آلبیکنس در مجاورت عصاره میخک و محلول فلوکونازول، میانگین قطر هالهی عدم رشد بین غلظت های ۵۰ و ۱۰۰ mg/ml عصاره میخک و محلول فلوکونازول تفاوت معناداری داشت ($p < 0.001$) (جدول ۲).

جدول ۲. میانگین قطر هالهی عدم رشد قارج کاندیدا آلبیکنس در مجاورت عصاره میخک و محلول فلوکونازول

ماده	غله	تعداد	انحراف معیار \pm میانگین	حداقل حداکثر	Pvalue
عصاره میخک	۵۰ mg/ml	۲۰	۰/۰۰ \pm ۰/۰۰	۰/۰۰	<0.001
عصاره میخک	۱۰۰ mg/ml	۲۰	۰/۰۰ \pm ۰/۰۰	۰/۰۰	
محلول فلوکونازول	-	۲۰	۲/۷۲ \pm ۰/۲۹	۲/۰۰	



شکل ۱- هاله عدم رشد قارج کاندیدا آلبیکنس در مجاورت محلول فلوکونازول

در غلظت های مختلف عصاره میخک قطر هالهی عدم رشد علیه قارج کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد. ولی در محلول فلوکونازول

مطالعه برخلاف مطالعه حاضر تنها یک غلظت مورد بررسی قرار گرفته است

در مقایسه نتایج مطالعه حاضر و مطالعه Purkait و همکاران^(۱۹) که به بررسی اثر ضد باکتریایی، ضد قارچی و اثر آنتی اکسیدان و خصوصیات شیمیایی و ارزیابی میزان سمیت ترکیب روغن سه ادویه فلفل سیام، دارچین و میخک پرداختند، فعالیت ضد باکتریایی بالای ترکیب روغن دارچین و میخک با مطالعه حاضر مطابقت داشت اما در اثبات خاصیت ضد قارچی میخک هیچ گونه تاثیری بر قارچ کاندیدا آلبیکنس نداشت که مغایر نتایج مطالعه حاضر می باشد.

در مطالعه Azmoudeh و همکاران^(۲۰)، شیرین بیان خاصیت ضد باکتریایی بالای داشت ولی اثر ضد قارچی بر روی کاندیدا آلبیکنس Movaghari در غلظت‌های ۲-۲۵۶ mg/ml نداشت. در مطالعه Pour و همکاران^(۲۴) نیز نیستاتین دارای اثر ضد قارچی بالاتری در مقایسه با عصاره آبی و الکلی پونه کوهی بر روی کاندیدا آلبیکنس بود.

با توجه به ظهور و گسترش جهانی مقاومت ضد میکروبی هم در پاتوژن‌های باکتریایی و هم قارچی، درمان و مدیریت بیماری‌های عفونی از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین برای غلبه بر این مشکل، روش‌های درمانی جدید در حال بررسی هستند. یکی از این روش‌های استفاده از گیاهان دارویی و سنتی برای درمان و پیشگیری از پاتوژن‌های قارچی است. البته بایستی در نظر داشت که عصاره همه داروهای گیاهی در از بین بردن باکتری‌ها و قارچ‌های دهانی یکسان عمل نمی‌کنند و در بسیاری از داروهای گیاهی غلظت‌های بالاتر اثر بخشی بهتری دارند

تأثیر میخک از طریق حضور اجزای بالقوه فعال مانند اوژنول (۲-متوكسی-۴-۲- (پروپنیل فنل)، گلیکوزیدها، فلاونوئیدها، ساپونین و تانین و روغن‌های ضروری بوده^(۲۵) و ترکیبات فنولی موجود در عصاره آن پروتئین‌ها را دناتوره و با فسفولیپید‌های غشای سلولی واکنش داده و در نتیجه نفوذ پذیری آن‌ها را تغییر می‌دهد و این گونه مانع از رشد باکتری‌ها می‌شوند^(۲۶).

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد عصاره میخک اثر ضدباکتری بر علیه استرپتوکوک موتانس داشته و فاقد اثر ضد قارچی بر علیه کاندیدا آلبیکنس می‌باشد

در سویه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول نشان داد کورکومین دارای اثر هم افزایی بر ویژگی ضد قارچی فلوکونازول در سویه‌های مقاوم کاندیدا آلبیکنس می‌باشد که با نتایج مطالعه حاضر در خصوص اثر ضد قارچی فلوکونازول مطابقت دارد.

Alshaikh و همکاران^(۲۲) در مطالعه خود دریافتند که انسان آویشن به طور موثری از رشد کاندیدا آلبیکنس جلوگیری کرده و انسان آویشن در غلظت‌های بسیار پایین قارچ کش بوده و در از بین بردن پاتوژن‌های قارچی قوی تر از فلوکونازول عمل می‌کند که با نتایج مطالعه حاضر مغایرت دارد ولی در مطالعه حاضر عصاره میخک اثر ضد قارچی کمتری نسبت به فلوکونازول داشت ولی اثر ضد باکتریایی آن بیشتر بود.

در بررسی تأثیر سیستمیک فلوکونازول بر کاندیدا آلبیکنس دهانی توسط Faujdar و همکاران^(۲۳)، فلوکونازول در کوتاه‌مدت مؤثر بود اما احتمال مقاومت به فلوکونازول در طولانی‌مدت افزایش یافته بود. در این مطالعه مصرف فلوکونازول به صورت سیستمیک و به مدت ۶ ماه بوده و در طولانی‌مدت تاثیری نداشت. نتایج مطالعه حاضر مبنی بر تاثیر فلوکونازول در کوتاه مدت در طی ۴۸-۲۴ ساعت برکاهاش رشد کاندیدا آلبیکنس با مطالعه ایشان و همکاران مطابقت داشت. Aslanimehr و همکاران^(۱۸) در بررسی تأثیر عصاره‌ی هسته‌ی انگور بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس و قارچ کاندیدا آلبیکنس به این نتیجه رسید که عصاره هسته‌ی انگور خاصیت آنتی میکروبیال قابل توجهی بر استرپتوکوکوس موتانس داشته و در غلظت‌های بالا بر کاندیدا آلبیکنس نیز موثر است که با مطالعه حاضر مغایرت دارد البته شاید با افزایش غلظت میخک نیز بتوان تاثیر ضد قارچی آن را بالا برد و یا با استفاده چند گیاهی طیف وسیعی از میکروب‌ها را پوشش داده و میزان بهبودی در طولانی مدت را افزایش داد.

در مطالعه Bansal و همکاران^(۱۴) که به بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضد قارچی عصاره‌های neem و میخک علیه استرپتوکوکوس موتانس و کاندیدا آلبیکنس پرداخته شد، میخک دارای تاثیر ضد باکتریایی و ضد قارچی بود که از نظر تاثیر باکتریایی با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد ولی در تاثیر ضد قارچی آن در مقایسه با neem و کلرهگزیدین اثر کمتری ذکر شده که با مطالعه حاضر مغایرت دارد که علت این تفاوت احتمالاً در رابطه با نحوه استخراج و تهیه عصاره گیاهان مورد آزمایش می‌باشد چراکه در این

References:

- 1-He XY, Meurman JH, Kari K, Rautemaa R, Samaranayake LP. In vitro adhesion of *Candida* species to denture base materials. *Mycoses* 2006; 49(2): 80-4.
- 2-Thein ZM, Samaranayake YH, Samaranayake LP. Characteristics of dual species *Candida* biofilms on denture acrylic surfaces. *Arch Oral Biol* 2007; 52(12): 1200-8.
- 3-Vediyappan G, Chaffin WL. Non glucan attached proteins of *Candida albicans* biofilm formed on various surfaces. *Mycopathologia* 2006; 161(1): 3-10.
- 4-Nevzatoğlu EU, Ozcan M, Kulak-Ozkan Y, Kadir T. Adherence of *Candida albicans* to denture base acrylics and silicone-based resilient liner materials with different surface finishes. *Clin Oral Investig* 2007; 1(3): 231-6
- 5-Naeini A, Jalayer Naderi N, Shokri H, Davati A, Rabiei SM. Evaluation of the Antifungal Effects of Compound Mouthwash (Cuminum cyminum, Melissa officinalis and Camellia sinensis) on Standard Strain of *Candida albicans*. *J Mash Dent Sch.* 2015;39(3):273-82.
- 6-Bhagavathy S, Mahendiran C, Kanchana R. Identification of glucosyl transferase inhibitors from *Psidium guajava* against *Streptococcus mutans* in dental caries. *J Tradit Complement Med e.* 2019;9(2):124-37
- 7-Fang J, Huang B, Ding Z. Efficacy of antifungal drugs in the treatment of oral candidiasis: A Bayesian network meta-analysis. *J Prosthet Dent.* 2021;125(2):257-265
- 8-Mima EG, Pavarina AC, Vargas Fda S, Giampaolo ET, Machado AL, Vergani CE. Effectiveness of chlorhexidine on the disinfection of complete dentures colonised with fluconazole-resistant *Candida albicans*: in vitro study. *Mycoses* 2011; 54(5): e506-e512.
- 9-Williams D, Lewis M. Pathogenesis and treatment of oral candidosis. *Oral Microbiol.* 2011;3
- 10-Taillandier J, Esnault Y, Alemanni M. A comparison of fluconazole oral suspension and amphotericin B oral suspension in older patients with oropharyngeal candidosis. Multicentre Study Group. *Age Ageing* 2000; 29(2): 117-23.
- 11-Sholapurkar AA, Pai KM, Rao S. Comparison of efficacy of fluconazole mouthrinse and clotrimazole mouthpaint in the treatment of oral candidiasis. *Aust Dent J* 2009; 54(4): 341-6.
- 12-Aghah S, Fereshtehnejad SM, Yousefnejad A, Siavashi F. Antimicrobial Activity of Ketoconazole and Fluconazole against Metronidazole Resistance Strains of *Helicobacter pylori*: An in Vitro Study. *Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics.* 2008;7(1):57-0.
- 13-Yu H, Oho T, Tagomori S, Morioka T. Anticariogenic effects of green tea. *Fukuoka Igaku Zasshi.* 1992;83(4):174-80.
- 14-Bansal V, Gupta M, Bhaduri T, Shaikh SA, Sayed FR, Bansal V, Agrawal A. Assessment of Antimicrobial Effectiveness of Neem and Clove Extract Against *Streptococcus mutans* and *Candida albicans*: An in vitro Study. *Niger Med J.* 2019;60(6):285-289.
- 15-Khan A, Ahmad A, Manzoor N, Khan LA. Antifungal activities of *Ocimum sanctum* essential oil and its lead molecules. *Nat Prod Commun.* 2010 Feb;5(2):345-9.
- 16-Ahmad A, Khan A, Manzoor N, Khan LA. Evolution of ergosterol biosynthesis inhibitors as fungicidal against *Candida*. *Microb Pathog.* 2010;48(1):35-41.
- 17-Pinto E, Pina-Vaz C, Salgueiro L, Gonçalves MJ, Costa-de-Oliveira S, Cavaleiro C, et al. Antifungal activity of the essential oil of *Thymus pulegioides* on *Candida*, *Aspergillus* and dermatophyte species. *J Med Microbiol.* 2006;55(Pt 10):1367-1373.
- 18-Aslanimehr M, Alizadeh A, Azmoudeh F. The effects of the grape seed extract on *Streptococcus mutans* and *Candida albicans*: An In Vitro Study. *Avicenna J Dent Res.* 2020;12(2):35-39.
- 19-Purkait S, Bhattacharya A, Bag A, Chattopadhyay RR. Synergistic antibacterial, antifungal and antioxidant efficacy of cinnamon and clove essential oils in combination. *Arch Microbiol.* 2020;202(6):1439-1448
- 20-Azmoudeh F, Aslanimehr M, Lourizadeh N. Effect of *Glycyrrhiza glabra* extract on *Streptococcus mutans* and *Candida albicans* (in vitro study). *Stud Med Sci.* 2017;28(6):394-400
- 21-Golpour H, Ranji N, Sharami SH. Investigation of antifungal effect of nanoparticle-encapsulated curcumin on CDR1 gene expression in fluconazole-resistant isolates of *Candida albicans*. *Journal of Microbial World* 2017;10(3):222-230
- 22-Alshaikh NA, Perveen K. Susceptibility of Fluconazole-Resistant *Candida albicans* to Thyme Essential Oil. *Microorganisms.* 2021;9(12):2454.
- 23-Faujdar Sameer S, Bisht Dakshina and Sharma Amisha. Antibacterial activity of *Syzygium aromaticum* (clove) against uropathogens producing ESBL, MBL, and AmpC beta-lactamase: Are we close to getting a new antibacterial agent? *J Family Med Prim Care.* 2020;9(1):180-186
- 24-Movaghari Pour A, Sheikh Fathollahi M, Poor Zamani M, Abedini S, Jamali Z. Comparison of anti-fungal effect of *Origanum vulgare* extract versus nystatin on *Candida albicans*; an in vitro study. *J Mash Dent Sch.* 2018;42(3):277-1.
- 25-Parthasarathy VA, Chempakam B, Zachariah TJ. *Chemistry of Spices.* London: CAB International , 2008.
- 26-Figueiral MH, Fonseca P, Lopes MM, Pinto E, Pereira-Leite T, Sampaio-Maia B. Effect of denture_related Stomatitis Fluconazole Treatment on Oral *Candida albicans* Susceptibility profile and Genotypic Variability. *Open Dent J.* 2015;9:46-51