

بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلنگ بهاره

حسن طهماسبی زاده^{*}، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران.

حمید مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

غلامرضا نادری بروجردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلنگ بهاره رقم محلی اصفهان در سال ۱۳۸۹ در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۴۸ کرت اجرا شد. تیمارها شامل دو تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت و ۲۰ خرداد (کشت تاخیری) و سطوح مختلف نیتروژن شامل ۴۶، ۹۲ و ۱۳۸ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و دو تراکم ۴۰۰ و ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بود تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به صورت دو ردیف کاشت در طرفین پشته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد بیشترین عملکرد دانه به میزان ۳۱۰۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بود. همچنین بالاترین میزان عملکرد روغن ۹۹۵/۸۵ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار می باشد. همچنین کمترین میزان عملکرد روغن ۴۳۲/۳۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کشت ۲۰ خرداد، ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد و بالاترین درصد روغن به میزان ۳۳/۴ درصد مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار و ۹۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بنابراین تراکم تاثیر بسیاری در عملکرد روغن گلنگ بهاره دارد پس بر اساس نتایج فوق تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار نسبت به تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار تاثیر مسقیم در عملکرد روغن گلنگ بهاره دارد.

واژه های کلیدی: گلنگ، تاریخ کاشت، تراکم بوته، نیتروژن، عملکرد دانه، عملکرد روغن

* نویسنده مسئول: E-mail: h_tahmasbi2@yahoo.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۲/۳۰

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۸/۳

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت جهان در چند دهه اخیر، محدودیت شدید منابع انرژی غذایی را به دنبال داشته است، اگرچه ذخایر غذا به طور معمول با تکیه بر گندم، برنج، حبوبات و ذرت به عنوان غذایی اصلی، مورد بحث قرار می‌گیرند، اما دانه‌های روغنی در مقام دوم منابع مهم انرژی غذایی برای انسان به شمار می‌آیند (۲۵ و ۱۶). محصولات دانه‌های روغنی، یعنی روغن‌های خوارکی و کنجاله‌های مقوی پروتئینی که حاصل فرایند روغن کشی هستند، بخشی از غذای روزانه انسان و دام را تشکیل می‌دهند، علاوه بر این، دانه‌های روغنی مصارف صنعتی، دارویی و غیره دارند (۲۵). تا دهه ۱۳۴۰ عملده ترین روغن مصرفی در ایران، روغن حیوانی بوده است، ولی از آن پس، قوزه آمارهای ارائه شده در ایران، مصرف روزانه روغن‌های نباتی طی سیزده سال (۱۳۵۱-۶۳) دو برابر شده است (۳۵ و ۲۷).

گلنگ زراعی (*Carthamus tinctorius* L.) گیاهی یکساله از خانواده کاسنی. این گیاه، بومی قسمت هایی از آسیا، خاورمیانه و آفریقا است. در گذشته کشت گلنگ بیشتر به منظور تهیه کارتامین یا رنگدانه قرمز رنگ که از گلچه‌های این گیاه قابل استخراج است و استفاده از آن در رنگرزی البسه و نیز به عنوان رنگ غذا صورت می‌گرفت، ولی امروزه این گیاه در گروه گیاهان روغنی جا گرفته و به این منظور کشت می‌شود (۹ و ۲۱). روغن این گیاه کیفیت قابل ملاحظه‌ای دارد. میزان اسید لینولئیک این روغن بین ۷۳ تا ۸۵٪ است. اسید لینولئیک موجود در روغن گلنگ حاوی خواصی نظیر کاهش چربی خون، کلسترول و سختی رگ‌ها می‌باشد. روغن گلنگ به عنوان ماده خام جهت افزودن به مواد رنگی، جوهر چاپ و فیلم، نوار مغناطیسی، روغن جلا بکار برده می‌شود. گلچه‌های این گیاه به عنوان ماده اولیه جهت استخراج پیگمان‌هایی رنگی به میزان قابل ملاحظه‌ای در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها و غیره می‌توان آن را بکار برد (۱۳). ایالات متحده آمریکا با عملکرد ۱۴۸۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین متوسط عملکرد جهانی را در بین کشورهای تولید کننده گلنگ دارد (۳۲). متوسط عملکرد دانه گلنگ در ایران حدود ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد گردیده است (۹). طی بررسی مجد نصیری و احمدی (۱۳۷۹) مشخص شد که جذب نور در تمام عمق کنوبی برای همه ارقام ولاین‌های مورد بررسی در کشت بهاره بیشتر از کشت تابستانه بود. همچنین بیشترین میزان جذب نور را در مرحله گلدھی نشان داد. توانایی کلیه رقم‌های مورد بررسی در جذب تشعشعات خورشیدی متأثر از تراکم بوته بود به طوری که بیشترین تراکم بوته موجود بیشترین میزان جذب نور را به همراه داشت. میزان وزن خشک بوته و عملکرد دانه متأثر از میزان کل جذب نور بوده و تراکم‌های بالاتر از نور خورشید استفاده بیشتری نموده اند. پور هادیان (۱۳۸۴) اعلام نمود با کاهش فاصله ردیف کاشت، آرایش کاشت به سمت آرایش مربعی نزدیک تر می‌شود و این امر باعث کاهش رقابت درون و بردن بوته‌ای می‌گردد. این شرایط سبب بهره‌وری بیشتر از عوامل محیطی از جمله مواد غذایی و نور می‌شود و کارایی فتوستتر افزایش می‌یابد. همچنین با

افزایش تعداد بوته در متر مربع، از تعداد دانه در طبق کاسته شد. اما به نظر می رسد افزایش تعداد طبق در متر مربع در اثر افزایش تراکم بوته این کاهش را تا حدی جبران کرده و سبب افزایش مختصه در عملکرد دانه شده است. همچنین اعلام نمود حداکثر وزن خشک اندام های هوایی که در زمان کوتاهی بعد از مرحله اتمام گلدهی حاصل شد، گویائی از تعداد شاخ و برگ و اندازه آنها و در نهایت معیاری از پتانسیل تولیدی گیاه می باشد (۳). بر اساس بررسی جانسون (۲۰۰۳) و یعقوب نژاد (۱۳۸۳) مشخص شد در صورت ثبات تراکم بوته، همراه با کاهش فاصله ردیف کاشت، توزیع بوته ها در واحد سطح یکنواخت تر می شود و بهره وری از عوامل محیطی بهبود می یابد. همچنین هم آهنگی بهتری بین گسترش افقی بوته ها و فاصله ردیف بوجود می آید. این شرایط سبب می شود که سرعت بسته شدن تاج پوشش افزایش یابد.

پورهادیان و خواجه پور (۱۳۸۳) گزارش کردند آرایش کاشت از طریق تاثیر بر شاخص های رشد بر عملکرد تاثیر می گذارد و با کاهش فاصله ردیف کاشت، تاج پوشش گیاهی زودتر بسته شد، دوام سطح برگ افزایش یافت و تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول تا اواسط دوره رشد دانه بیشتر بود. نحوه توزیع و تراکم بوته در مزرعه می تواند بر جذب و بهره وری از عوامل محیطی موثر بررشد و نیز رقابت بروون و درون گونه ای تاثیر گذارد (۳، ۸ و ۹) و همچنین ممکن است برای کشت های تاخیری از کشت های زود هنگام متفاوت باشد (۵ و ۶). با کاهش فاصله ردیف کاشت، تاج پوشش زودتر بسته می شود، مزرعه زودتر به حداکثر شاخص سطح برگ برای جذب کامل تشعشع خورشیدی می رسد، مقدار بیشتری مواد فتوستزی برای رشد رویشی تولید شده، سرعت رشد بیشتری به دست می آید و زیر بنای لازم برای تشکیل شمار بیشتری اجزای عملکرد دانه به وجود می آید (۳، ۸ و ۹). تسریع پوشش گیاهی مزرعه و افزایش شمار ساقه و طبق در بوته در اثر کاهش فاصله ردیف های کاشت گلنگ نشان داده شده است (۲، ۷ و ۱۵). در فاصله ردیف های کاشت نزدیک به هم توزیع بوته ها یکنواخت تر است (۱).

حیدری و آсад (۱۳۷۷) در تحقیقی با سطوح مختلف نیتروژن بر روی گلنگ مشاهده کردند نیتروژن بر روی تمامی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد بیولوژیک قوزه، شاخص برداشت گیاه و سرعت رشد محصول اثر معنی داری داشت حداکثر عملکرد دانه از مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمده است. همچنین دانه های کوچک معمولاً درصد پوست کمتری نسبت به دانه های بزرگتر دارند و بنابراین دارای درصد روغن بیشتری هستند (۳۹). نژاد شاملو (۱۳۷۵) نشان داد در بهار تاریخ کشت زودتر به گیاه امکان تولید در اکثر اندام رویشی را داده و گیاه به خاطر داشتن ذخیره غذایی کافی در مرحله رویشی با اطمینان بیشتر اقدام به تولید اندام های زایشی زیادتری می کند.

نبوی (۱۳۸۴) اعلام کرد یافتن بهترین زمان کاشت هر محصول با توجه به شرایط اقلیمی از ضروریات مدیریت زراعی می باشد همچنین تراکم مطلوب گیاه که بر اساس آن و در حداکثر رشد کنوبی بیشترین کارایی استفاده از نوردست یافت از مهمترین اهداف در مدیریت زراعی است از دیگر مواردی که به آن باید توجه خاص داشت میزان مناسب مصرف نیتروژن سبب افزایش محصول می گردد.

طهماسبی زاده (۱۳۸۷) اعلام نمود تاخیر در کشت به هر حال باعث تسریع نمو و آن نیز به نوبه خود سبب کاهش فرصت برای رشد رویشی، تولید سطح برگ مناسب برای فتوستزر کافی و بنیان های لازم برای تشکیل و رشد اجزای عملکرد گردیده و در نهایت عملکرد را کاهش می دهد. همچنین مصرف میزان مناسب نیتروژن (۹۲ کیلوگرم در هکتار) و رعایت تراکم مناسب (۸۰۰ هزار بوته در هکتار) به علت افزایش شاخص سطح برگ و ارتفاع و عملکرد بالای بیولوژیک نسبت به سایر تیمارها از میزان سرعت رشد محصول بالاتری برخوردار بوده که این امر باعث افزایش عملکرد گردید (۱۲). بنابراین این پژوهش با هدف بررسی مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم گیاه و میزان نیتروژن و رسیدن به حداکثر عملکرد روغن در شرایط اقلیمی اراک انجام گردیده است که با توجه به بومی بودن گلنگ در اراک می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد

مواد و روش ها

این آزمایش در بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن گلنگ بهاره رقم محلی اصفهان در اراک اجرا شد. مختصات جغرافیایی محل مورد آزمون ۳۴ درجه و ۳ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۴۸ دقیقه طول شرقی و ارتفاع از سطح دریا ۲۱۹۲ متر می باشد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در ۴ تکرار اجرا شد. طول هر کرت ۶ متر و شامل ۵ ردیف با فواصل ۶۰ سانتی متر و فاصله هر کرت با کرت های مجاور ۱۲۰ سانتی متر و فواصل تکرارها با هم ۳ متر در نظر گرفته شد. کاشت در دو تاریخ ۲۰ اردیبهشت (S₁) و ۲۰ خرداد یا تاریخ کشت تاخیری (S₂) با تراکم های مختلف کاشت شامل ۴۰۰ هزار بوته در هکتار (D₁) و ۸۰۰ هزار بوته در هکتار (D₂) انجام شد. تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به صورت آرایش کاشت دو ردیف بر روی پشتہ انجام شد. سطوح نیتروژن مصرفی نیز شامل ۴۶ (N₁) و ۹۲ (N₂) و ۱۳۸ (N₃) کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار بود که از منبع اوره ۴۶٪ تامین گردید.

نتایج حاصل از آزمون خاک در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. مزرعه مورد آزمایش سال قبل آیش بوده و در پاییز با شخم نیمه عمیق به همراه دیسک آماده سازی گردید. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن، وزن صد دانه، تعداد قوزه در بوته، تعداد قوزه

نابارور در بوته، درصد پوکی دانه و ارتفاع شاخه دهی می باشند. کلیه داده های حاصل از نمونه برداریها، توسط نرم افزار MSTAT-C تجزیه و تحلیل شد و سپس مقایسه میانگین ها با کمک آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند و از نرم افزار Excel برای رسم نمودار ها استفاده شد.

جدول ۱: نتایج آزمون خاک محل آزمایش

نتایج و بحث

عملکرد دانه

براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول ۲) عملکرد دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و تفاوت میان تاریخ های کاشت در سطح احتمال آماری یک درصد معنی داربود. بر اساس جدول مقایسه میانگین (جدول ۳) تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه با میانگین ۲۲۰۵/۷ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را تولید کرد. بین سطوح مختلف نیتروژن در سطح احتمال آماری پنج درصد نیز تفاوت معنی داری بود. مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین تولید دانه به میزان ۲۱۷۶/۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین تاثیر را داشت. تراکم بوته در واحد سطح نیز با احتمال آماری یک درصد اثر معنی داری بر عملکرد دانه داشت. در این بررسی تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۲۱۹۰/۱ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را تولید کرد. همچنین بر همکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار بوده و تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت و میزان ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد را به میزان ۲۲۵۱/۴ کیلوگرم در هکتار را به دست آورد. تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد و میزان ۴۶ کیلوگرم نیتروژن در هکتار کمترین عملکرد دانه را به میزان ۱۹۵۷/۲۶ کیلوگرم در هکتار را به دست آورد.

عملکرد دانه تحت برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم بوته قرار نگرفت. برهمکنش نیتروژن در تراکم بوته بر صفت عملکرد دانه در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با تولید ۲۹۰۲ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را تولید کرد. همچنین عملکرد دانه تحت تاثیر بر همکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم قرار گرفت (در سطح احتمال آماری پنج درصد) و تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن

در هکتار با تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار توانست ۳۱۰۱ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را تولید کند. تاخیر در کشت تاثیر مهمی در کاهش عملکرد گلنگ بهاره در شرایط آب و هوایی اراک دارد و تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت نسبت به کشت تاخیری زمان مناسب برایکشت و تولید گلنگ بهاره است (۱۲).

شارما و ورما (۲۰۰۲) گزارش کردند با مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش معنی دار در عملکرد دانه گلنگ در مقایسه با سایر مقادیر مصرفی به وجود آمد. نصر و همکاران (۲۰۰۳) نیز گزارش کردند مصرف ۸۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای عملکرد مطلوب دانه و روغن گلنگ مناسب است. گوبیلز و ددیو (۲۰۰۴) اعلام کردند با مصرف نیتروژن، مقدار روغن دانه گلنگ و رشد گیاهی افزایش یافت و بیشترین عملکرد دانه با مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. سوندا (۱۹۸۹) واکنش گلنگ به نیتروژن را به طورکلی نسبت به فسفر و پتاسیم بیشتر دانسته است. ورکنیون و ماسانتینی (۱۹۷۷) اعلام کردند مصرف نیتروژن سبب افزایش قابل توجه محصول گلنگ در شرایط آبی شد بوهرا (۲۰۰۰) اعلام نمود کاربرد سطوح مختلف نیتروژن سبب افزایش عملکرد دانه گلنگ شده است و بیشترین عملکرد دانه در شرایط مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آورد.

آلسی و همکاران (۲۰۰۰) گزارش کردند عملکرد دانه تحت تاثیر تراکم بوته قرار نمی گیرد و در تراکم های بوته مختلف عملکرد دانه یکسانی حاصل می شود. همچنین زوب و همکاران (۱۹۹۹) عنوان کردند با کاهش تراکم از ۳۳ بوته در مترمربع به ۱۱ بوته در مترمربع عملکرد دانه در ارقام مختلف از ۲۲۶۷ کیلوگرم به ۱۷۶۱ کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. در مطالعه ای در هندوستان چنین عنوان شد که با کاهش فاصله ردیف ها از ۷۵ سانتی متر به ۶۰ سانتی متر، عملکرد دانه گلنگ افزایش می یابد، ولی پس از آن با کاهش فاصله ردیف ها تا ۴۵ سانتی متر، تفاوت معنی داری پیدا نمی کند (۳۳).

عملکرد روغن

طی بررسی بعمل آمده اثر سطوح مختلف نیتروژن و برهمکنش نیتروژن در تراکم با سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد. بر همکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار گردید و اثر تراکم نیز در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار شد و اثرات تاریخ کاشت، تراکم و برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم و برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم معنی دار نشد. بالاترین میزان عملکرد روغن ۹۹۹/۸۵ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت و تیمار ۱۳۸ کیلوگرم کود نیتروژن و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار و کمترین میزان عملکرد روغن ۴۳۲/۳۴ کیلوگرم و مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد و ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین تفسیر نمود، بیشترین تاثیر برافزایش عملکرد روغن از تراکم منشا گرفته زیرا گیاه گلنگ از لحاظ تغذیه اصولا گیاهی کم توقع است و تیمار نیتروژن به دلیل کم توقع

بودن و نمی تواند تاثیر زیادی بر عملکردن روغن بگذارد که نتایج به دست آمده از جدول موئید این موضوع می باشد و بالا بودن عملکرد در واحد سطح با استفاده از افزایش تراکم و همچنین دو ریفه بودن بر روی یک پشته در تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار یعنی نزدیک شدن به آرایش کاشت مربوطی بهترین دلیل برای این موضوع می باشد. محمدی نیکپور (۱۳۷۴) اعلام کرد اثر تراکم های مختلف گلنگ بر میزان روغن بی تاثیر بود. اثر تراکم های مختلف بوته اثر معنی داری بر میزان روغن نداشت و اعلام نمود که با افزایش تراکم بوته از ۱۶۶۰۰۰ به ۲۵۰۰۰۰ بوته در هکتار حدود ۷۴/۸ کیلوگرم به عملکرد روغن دانه اضافه شده است (۱۴). نصر و همکاران (۲۰۰۳) اعلام کردند کاهش فواصل بین ردیف های کاشت اثر معنی داری بر میزان روغن نداشت. اثر فواصل بین و روی ردیف های کاشت بر میزان روغن فاقد اثر معنی دار بود (۳). کمترین میزان روغن دانه در پایین ترین تراکم گزارش شده است (۴۰). عملکرد روغن تحت تاثیر تراکم های مختلف بوته در واحد سطح در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد. اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد روغن در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار می باشد. در تاریخ کاشت زودتر به دلیل مناسب بودن شرایط محیطی برای رشد و نمو، ارقام گلنگ توانسته اند عملکرد دانه نسبتاً زیادی در مقایسه با تاریخ کاشت دوم و سوم حاصل نمایند، که به تبع آن عملکرد روغن بالاتری نسبت به تاریخ کاشت دوم و سوم به دست آمده است (۱۶).

درصد روغن

صفت درصد روغن تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در سطح احتمال آماری پنج درصد قرار گرفته و معنی دار شد بطیریکه تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت و ۴۶ کیلوگرم نیتروزن با ۳۳ درصد بیشترین میزان درصد روغن را داشت. همچنین تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم قرار گرفته و در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۳۲/۹۸ درصد بالاترین میزان را به دست آورد. برهمکنش نیتروژن در تراکم در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار شده و تیمار ۴۶ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۳۳/۵۷ درصد بیشترین تاثیر را داشته است. این صفت تحت تاثیر اثرات تاریخ کاشت، نیتروژن، تراکم و برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم قرار نگرفته و معنی دار نشد. میزان خانی (۱۳۸۰) اعلام کرد با تغییر تاریخ کاشت اختلاف آماری در درصد روغن دانه گلنگ اتفاق نیفتاد. بعضی از محققان به بالاتر بودن اسیدهای چرب غیر اشباع در روغن های گیاهی که در دوره پر شدن دانه های آنها در هوای خشک صورت گرفته است اشاره کرده اند. اثر فواصل بین ردیف های کشت بر میزان روغن دانه را غیر معنی دار دانسته است (۴).

سرودی (۱۳۸۲) گزارش کرد اثر متقابل تراکم و ارقام مختلف بر روی درصد روغن غیر معنی دار بود. درصد روغن همبستگی منفی و معنی داری با وزن صد دانه دارد. این امر می تواند به دلیل افزایش درصد

پوست و در نتیجه کاهش درصد روغن در دانه های درشت باشد. همبستگی منفی بین مقدار روغن با درصد پوست و وزن دانه وجود دارد (۴۱). در کرج بالاترین درصد روغن را در ارقام بهاره و پاییزه گلرنگ به ترتیب معادل ۲۹/۹ و ۳۴/۱٪ گزارش کردند (۲).

چاکرالحسینی (۱۳۸۵) اعلام نمود برسی میانگین درصد روغن دانه گلرنگ نشان داد که به طورکلی کاربرد نیتروژن نه تنها درصد روغن را افزایش نداده است بلکه در بعضی از تیمارها اثر کاهشی بر این ویژگی داشته است. در این رابطه تحقیقات انجام شده بر روی روغنی نشان داده است که کاربرد نیتروژن میزان پروتئین را افزایش و در مقابل میزان چربی را کاهش داده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس و جدول مقایسه میانگین ها جنین می توان نتیجه گرفت که گیاه برای رسیدن به حداقل درصد روغن و در شرایط محیطی مختلف به یک حد بهینه از نیتروژن نیاز دارد و هرگاه مقدار نیتروژن خارج از این محدوده باشد درصد روغن کاهش می یابد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین ها و نتایج دیگر محققان می توان گفت افزایش درصد نیتروژن بیش از حد معمول به دلیل افزایش میزان پروتئین، باعث کاهش درصد روغن می گردد.

تعداد دانه در قوزه

در این برسی صفت تعداد دانه در قوزه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت (در سطح احتمال آماری پنج درصد) به طوری که تاریخ کاشت ۲۰ خرداد ماه با میانگین ۲۳/۲۷ دانه در قوزه بیشترین تعداد دانه را تولید کرد. تعداد دانه در قوزه تحت تاثیر نیتروژن قرار نگرفت و معنی دار نشد. برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن بر روی تعداد دانه در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار شد و تاریخ کاشت ۲۰ خرداد ماه با مصرف، ۹۲ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بالاترین تعداد دانه در قوزه را تولید کرد. نتایج نشان داد تعداد دانه در قوزه تحت تاثیر تراکم قرار گرفت و در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار شد. تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۲۳/۳۱ دانه در قوزه بیشترین تعداد را صفت تعداد دانه در قوزه تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم قرار نگرفت. تاثیر برهمکنش نیتروژن در تراکم در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با وجود تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۲۵/۸ دانه در قوزه بیشترین تعداد را داشت. برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم بوته بر تعداد دانه در قوزه در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار و تاریخ کاشت ۲۰ خرداد ماه و مصرف ۹۲ کیلوگرم نیتروژن با تراکم گیاهی ۴۰۰ هزار بوته در هکتار بیشترین میانگین را به تعداد ۲۶ دانه در قوزه به وجود آورد.

احمدی و امیدی (۱۳۷۳) و اشری و همکاران (۱۹۷۴) متوسط تعداد دانه در قوزه را به ترتیب ۲۸ و ۳۱/۹ عدد گزارش کردند. تفاوت تعداد دانه در قوزه می تواند ناشی از تفاوت طول دوره پر شدن دانه و شرایط آب و هوایی متفاوت و اختلاف در تراکم و آرایش کاشت باشد. اثر فواصل بین ردیف کاشت بر روی

تعداد دانه در قوزه در سطح احتمال یک درصد، معنی دار شد. احتمالاً دلیل کاهش تعداد دانه در قوزه در تراکم های بالا، محدودیت در عوامل محیطی است (۱۴).

تعداد قوزه در بوته

تعداد قوزه در بوته گلنگ در این بررسی تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد. تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه با تولید میانگین ۶ قوزه در بوته بیشترین قوزه را تولید کرد. همچنین تحت تاثیر نیتروژن قرار گرفت و در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین ۷/۵ بیشترین تعداد قوزه در بوته را تولید کرد. برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن برای این صفت معنی دار نشد. تاثیر تراکم بر تعداد قوزه در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۶/۶ بیشترین تعداد قوزه در بوته را به دست آورد. تعداد قوزه در بوته تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم قرار نگرفت. اما تحت تاثیر برهمکنش نیتروژن در تراکم قرار گرفت و در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد، مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۸/۱ بیشترین تعداد قوزه در بوته را نشان داد، برهمکنش تاریخ کاشت و تراکم در نیتروژن برای این صفت معنی دار نشد. اشری و همکاران (۱۹۷۴) در مطالعه ۹۰۳ لاین گلنگ از نقاط مختلف جهان، متوسط تعداد قوزه در گیاه را ۲۲/۷ عدد گزارش کردند. بیچ و نورمن (۲۰۰۲) گزارش نمودند تعداد قوزه گلنگ آبی از ۲۲۰ عدد در متر مربع در تیمار شاهد یا عدم مصرف نیتروژن به ۲۶۰ عدد در متر مربع با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن رسید (۳۰). همچنین نصر و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کردند در شرایط دیم، تعداد قوزه گلنگ در متر مربع از ۹۵ عدد در متر مربع در تیمار شاهد بدون مصرف نیتروژن به ۱۴۰ عدد در متر مربع با مصرف ۴۶ کیلوگرم در هکتار نیتروژن رسید (۳۵). میرزا حانی (۱۳۸۰) تعداد قوزه در گیاه در تاریخ کاشت زودتر را معادل ۱۶ قوزه در گیاه اعلام نمود که نسبت به دو تاریخ کاشت بعدی از برتری محسوسی برخوردار بود. در مطالعه اثرات فاصله بین و روی ردیف بر عملکرد دانه و اجزاء آن در گلنگ در منطقه اصفهان، اثر فاصله بین ردیف کاشت بر تعداد قوزه در گیاه فاقد اختلاف معنی دار و اثر فواصل بین بوته ها در روی ردیف کاشت را بر تعداد قوزه در گیاه در سطح احتمال یک درصد معنی دار گزارش شد (۳). طی مطالعات انجام شده، اثر تراکم های بوته بیشترین تعداد قوزه در گیاه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و بیشترین تعداد قوزه در گیاه در تراکم ۱۶۶ هزار بوته در هکتار حاصل شد (۱۴). در مطالعه اثرات فواصل مختلف ردیف کاشت بر رشد و عملکرد ارقام گلنگ، مشاهده شد که با کاهش تراکم بوته از آرایش کاشت 30×10 سانتی متر (۳۳۳ هزار بوته در هکتار) به آرایش کاشت 45×20 سانتی متر (۱۱۱ هزار بوته در هکتار)، تعداد قوزه در گیاه، تعداد دانه در قوزه و وزن هزار دانه به طور معنی داری افزایش یافت (۴۳). افزایش تراکم بوته تاثیر معنی داری بر تعداد قوزه

در گیاه و وزن هزار دانه داشت، در حالی که تعداد دانه در قوزه تحت تاثیر تراکم کاشت واقع نشد (۱۶). با افزایش تراکم بوته تا حد متوسط ۸۰ تا ۱۷۵ هزار بوته در هکتار، تعداد قوزه و تعداد دانه در قوزه افزایش می یابد (۲۳).

جدول ۲: تجزیه واریانس صفت های مورد آزمایش

ارفع شده نمایم	ردیم دانه	میانگین مربعات	منابع تغییر									
			تعداد قوزه نابارور	تعداد قوزه بوته	وزن دانه	وزن قوزه	درصد رون	میکروگرم رون	میکروگرم دانه	برآورد آزادی	تکرار	
۳/۴۹ ns	۲/۰۰۱ ns	۰/۰۴۱	۰/۱۱۹	۲/۷۹۰ ns	۱/۸۰۲ ns	۱۷۳۷۱/۰۸ ns	۱۸۴۵۱/۳۷ ns	۳			تاریخ کاشت	
۱/۷۸ ns	۱/۴۵ *	۱/۰۴ *	۳/۷۵ **	۱۳/۱۳ *	۹/۵۲ ns	۹۸۷۲۳/۰۵ ns	۵۴/۲۸۹/۲۲ **	۱			نیتروژن	
۹/۴۶ **	۲/۱۳ **	۲/۰۲ **	۴۱/۸ **	۱/۴ ns	۰/۰۷ ns	۸۷۴/۱۱ **	۹۲۵۳/۲۴ *	۲			تاریخ کاشت × نیتروژن	
۱/۴۳ ns	۰/۰۵ ns	۰/۰۷ ns	۰/۰۶ ns	۱۰/۷۱ *	۴/۹۰ *	۱۴۳۲/۵۶ *	۹۹۷۸/۹۱ *	۲			خطا	
۱/۷۹	۰/۰۸	۰/۰۵	۰/۳۱	۱/۲۱	۱/۸۰	۱۳۰۱۲/۷۱	۲۸۰۳۷/۱۱	۱۵			تراکم	
۱۸۹/۳۲ **	۱۷/۵۰ **	۵/۴ **	۳۳/۶۰ **	۱۸/۴۷ *	۰/۰۹ ns	۳۸۱۹۶/۴۲ *	۳۱۰۳۶/۱۲ **	۱			نیتروژن × تراکم	
۰/۰۵۸ ns	۰/۰۲۲ ns	۰/۰۲۶ ns	۰/۰۲ ns	۵/۲۲ ns	۹/۸۱ **	۸۵۱۶/۸۷ ns	۲۸۹۴/۲۱ ns	۱			تاریخ کاشت × تراکم	
۶۵۱/۲۴ **	۱/۰۰۱ ns	۰/۰۷۵ **	۰/۱۰۲ **	۵۳/۴۹۶ **	۱۵/۷۴۱ *	۸۷۴۶/۹۲۳ **	۸۹۶۳۱/۸/۹ **	۲			نیتروژن × تراکم	
۱/۷۳ ns	۲/۷۱ ns	۰/۱۲ ns	۰/۳۱ ns	۱۳/۴۸ *	۰/۰۵ ns	۳۸۵۳۵/۱۲ ns	۸۷۶۱۳/۶/۸ *	۲			تاریخ کاشت × نیتروژن × تراکم	
۱/۴	۰/۰۲۸	۰/۰۴	۰/۱۱	۱/۰۸	۰/۰۹	۴۱۲۶۱/۱۱	۱۹۴۵۰/۰۹	۱۸			خطا	
۱۴/۲	۱۸/۰	۱۸/۵	۱۴/۱۵	۱۵/۳۶	۱۵/۹	۱۶/۹	۱۷/۴۹				ضریب تغییرات (%)	

ns * و ** : به ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح آماری ۵٪ و ۱٪ می باشد

تعداد قوزه نابارور در بوته

نتایج تجزیه واریانس صفت تعداد قوزه نابارور در بوته نشان داد تحت تاثیر تاریخ کاشت در سطح احتمال آماری پنج درصد قرار گرفته و معنی دار شد به طوری که تاریخ کاشت ۲۰ خرداد با میانگین ۱/۱۹ عدد بیشترین قوزه نابارور در بوته را داشت همچنین تحت تاثیر مصرف مقادیر مختلف نیتروژن در سطح احتمال آماری یک درصد قرار گرفت و معنی دار شد بطوريکه مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین تاثیر را در کاهش قوزه نابارور با میانگین ۰/۶۹ عدد را داشته است، تاثیر تراکم بر تعداد قوزه نابارور در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بوده است و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بالاترین تعداد قوزه نابارور در بوته را با میانگین ۱/۴ عدد تولید کرد. اثرات متقابل نیتروژن در تراکم های مختلف تعداد قوزه نابارور در بوته را در سطح احتمال آماری یک درصد تحت تاثیر قرار دارد. مصرف ۴۶ کیلوگرم نیتروژن با تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بیشترین تعداد قوزه نابارور در هر بوته را با میانگین ۱/۷۶ قوزه نابارور در بوته بوجود آورد، اثر متقابل تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم بوته بر تعداد قوزه نابارور در بوته اختلاف معنی داری را نشان نداد. بررسی های میرزا خانی (۱۳۸۰) نشان داده است که

تاریخ کاشت زود با تولید ۲/۸۶ عدد قوزه نابارور در گیاه در گروه اول و تاریخ های کاشت دوم و سوم با ۲/۳ عدد قوزه نابارور در گروه دوم قرار داشتند.

درصد پوکی دانه

تیمارهای سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر صفت درصد پوکی دانه اثر گذاشت و با سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شد و تحت تاثیر تاریخ کاشت در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار شد. برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن و برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم، برهمکنش نیتروژن در تراکم و همچنین برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم معنی دار نشد. بالاترین میزان درصد پوکی دانه در تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد، ۹۲ کیلوگرم کود نیتروژن و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۳/۷۰ بدست آمد. کمترین میزان نیز ۱/۵ درصد در تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت، ۴۶ کیلوگرم کود نیتروژن و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد. به نظر می رسد با افزایش تراکم میزان درصد پوکی دانه افزایش یافته همچنین با کاهش مصرف نیتروژن درصد پوکی افزایش می یابد. با افزایش درصد پوکی دانه ها وزن صد دانه کاهش یافته که این عامل باعث کاهش عملکرد دانه خواهد شد.

ارتفاع شاخه دهی (اولین شاخه فرعی از سطح زمین)

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول ۲) مشاهده شد که فاصله اولین شاخه فرعی از سطح خاک تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفته و معنی دار نشد. تاثیر نیتروژن بر ارتفاع شاخه دهی در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شده و تیمار ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین ۴/۶ سانتی متر بیشترین و تیمار ۴۶ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین ۹/۴ سانتی متر کمترین ارتفاع شاخه دهی را بدست آورده است. صفت ارتفاع شاخه دهی تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن قرار نگرفته و معنی دار نشده است اما تحت اثر تراکم قرار گرفته و در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار شده است و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۴/۷ سانتی متر بیشترین ارتفاع شاخه دهی را به دست آورده است. ارتفاع شاخه دهی تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم قرار نگرفته و معنی دار نشده است. اثر نیتروژن در تراکم بر ارتفاع شاخه دهی در سطح احتمال آماری ۱ درصد معنی دار شده و تیمار ۹۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۴/۵ سانتی متر بیشترین و تیمار ۴۶ کیلوگرم نیتروژن و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار با میانگین ۳/۸ سانتی متر کمترین ارتفاع شاخه دهی را دارا بودند. صفت ارتفاع شاخه دهی تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت در نیتروژن در تراکم قرار نگرفته و معنی دار نشده است. همان طور که ملاحظه شد با افزایش تراکم همراه با افزایش ارتفاع گیاه بر ارتفاع اولین شاخه فرعی افروده می شود که علت این امر را شاید بتوان در نفوذ بیشتر نور در تراکم های کم بوته در داخل اجتماع گیاهی جستجو کرد که باعث تحریک و تولید بیشتر شاخه های جانبی می شود. در گزارشی دیگر نیز نتایج مشابهی بدست آمده، اثر فواصل روی

ردیف کشت بر فاصله اولین شاخه بندی از سطح زمین معنی دار اعلام شد. این صفت با صفات ارتفاع بوته و تعداد قوزه در بوته و شاخص بهداشت همبستگی مستقیم و معنی داری در سطح احتمال آماری یک درصد داشته و با صفات تعداد دانه در قوزه همبستگی منفی و معنی داری در سطح احتمال یک درصد داشته است (۱۹).

جدول ۳: مقایسه میانگین صفات مورد بررسی

ارتفاع شاخص دهی (cm)	درصد شاخص دهی پوکی دانه	تعداد قوزه نابارور در بوته	تعداد قوزه در بوته	تعداد دانه در قوزه	درصد روغن	عملکرد روغن	عملکرد دانه	عملکرد تیمار	تاریخ کاشت (S)	
									(g)	(g/m ²)
نیتروژن (N)										
۴۵/۸۳۶a	۲/۷۷ab	۱/۱۲b	۷۰۱۲a	۳۱۲ab ۲۲	۳۰/۱۷b	۶۶۵/۴۷۲ab	۲۲۰۵/۷۴ a	S1		
۴۵/۵۲۱a	۲/۹۱۴a	۱/۹۱a	۵/۷۱۲b	۲۳/۲۷۶a	۳۲/۸۴a	۶۵۳/۰۲۰a	۱۹۸۸/۴۹ b	S2		
اثر متقابل تاریخ کاشت در نیتروژن (SN)										
۴۴/۹۷۱c	۲/۴۴۳b	۱/۴۱۷a	۴/۶۱c	۲۲/۷۰۱a	۳۲/۰۱۷b	۶۵۰/۱۶۲a	۲۰۳۰/۶۷b	N1		
۴۵/۸۹۶b	۳/۰۱۹a	۱/۳۰۱a	۵/۷۲۱b	۲۲/۴۹۳b	۳۲/۰۶۸b	۶۶۸/۴۸۸a	۲۰۸۴/۵۹b	N2		
۴۷/۴۶۵a	۲/۷۳۶b	۰/۷۹b	۷/۵۲۱a	۲۳/۰۱۲a	۳۲/۲۱۲b	۷۰۱/۰۴۵b	۲۱۷۶/۳۴ a	N3		
تراکم (D)										
۴۵/۱۲b	۲/۱۱۷e	۱/۵۱۱a	۴/۶۴۱c	۲۲/۳۵۲ab	۳۳/۰۲۴۱a	۷۰۷/۹۷۶d	۲۱۴۰/۷۹ abc	S1N1		
۴۷/۳۸۷a	۳/۱۸۷a	۱/۳۷a	۵/۹۱۲b	۲۱/۲۹۴b	۳۲/۱۳b	۷۰۴/۴۶۴c	۲۱۹۲/۵۴ a	S1N2		
۴۷/۵۲۱a	۲/۰۱۲e	۰/۸۱a	۷/۷۶۱a	۲۳/۲۳۱a	۳۱/۴۸c	۷۰۸/۷۳۷d	۲۲۵۱/۳۸ a	S1N3		
۴۵/۱۱۲b	۲/۱۸۱d	۱/۳۱۸a	۴/۳۱۰c	۲۲/۷۵۹ab	۳۲/۰۰b	۶۲۷/۳۲۵a	۱۹۵۷/۲۶d	S2N1		
۴۵/۳۹۸b	۳/۱۰۴b	۱/۴۴۱a	۵/۳۱۴b	۲۴/۲۰۱a	۳۲/۱۵b	۶۳۲/۹۴۷b	۱۹۶۸/۷۳d	S2N2		
۴۷/۵۸۱a	۲/۸۹۶c	۰/۶۹۸b	۷/۴۱۰a	۲۲/۹۴۶ab	۳۱/۹۸b	۶۷۳/۰۹۴b	۲۱۰۴/۷۳ c	S2N3		
اثر متقابل تراکم در تاریخ کاشت (SD)										
۴۴/۱۱۲b	۳/۳۴۹a	۰/۸۴۹b	۷۶۱۹a	۲۳/۳۱۴a	۳۱/۹۵a	۶۴۱/۸۴۷a	۲۰۰۸/۹۱b	D1		
۴۷/۴۵۱a	۲/۰۱۲b	۱/۴۱۹a	۵/۰۱۷b	۲۲/۱۰۲b	۳۲/۱۲a	۷۰۳/۴۶۷b	۲۱۹۰/۱۲a	D2		
اعدادی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ می باشند.										
S1: تاریخ کاشت اول (۲۰ اردیبهشت)، S2: تاریخ کاشت دوم (۲۰ خرداد)، D1: ۴۰۰ هزار بوته و D2: ۸۰۰ هزار بوته در هکتار و N1: ۴۶ کیلوگرم، N2: ۹۲ کیلوگرم و N3: ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار										

جدول ۴: مقایسه میانگین صفات مورد بررسی

ارتفاع شاخه دهی (cm)	درصد پوکی دانه	تعداد قوزه نایارور در بوته	تعداد قوزه در بوته	تعداد دانه در قوزه (g)	درصد روغن (g)	عملکرد روغن (g/m ²)	عملکرد دانه (kg/h)	تیمار
اثر متقابل نیتروژن در تراکم (ND)								
۳۸/۲۶۱d	۱/۵۱۸e	۰/۸۴۱cd	۵/۶۱d	۲۲/۱۸b	۳۳/۵۷a	۵۲۳/۲۳۹	۱۵۵۸/۶۵۳d	N1D1
۴۵/۱۲۱c	۳/۷۱۰a	۱/۷۶۵a	۳/۱۰۲۴f	۲۴/۲۲a	۳۱/۴۰c	۸۱۷/۹۲۱	۲۶۳۱/۸۳b	N1D2
۴۵/۸۲c	۲/۸۴۶b	۱/۲۱۹b	۷/۴۶c	۲۴/۲۱a	۳۱/۵۷c	۸۸۹/۷۶۰	۲۸۱۸/۳۷a	N2D1
۵۳/۴۱۵a	۳/۶۸۹a	۱/۳۶a	۴/۸۷e	۲۲/۰۱b	۳۳/۰۰a	۴۳۲/۵۳۶	۱۳۱۰/۷۱e	N2D2
۴۹/۱۰۱b	۲/۳۱۵d	۰/۶۱d	۸/۱۰a	۲۵/۸a	۳۲/۱۷b	۵۴۰/۸۴۰	۱۶۸۳/۸۱d	N3D1
۴۳/۸۹۶c	۲/۶۲۹c	۰/۸۴۳c	۷/۰۱b	۲۱/۰۱b	۳۲/۸۲b	۹۵۲/۵۹۶	۲۹۰۲/۴۸a	N3D2
اثر متقابل تاریخ کاشت در نیتروژن (SND)								
۴۵/۲۹۱c	۱/۵۱۸f	۰/۸۹de	۵/۸۲de	۲۱/۲۱d	۳۳/۱۸a	۵۳۷/۵۲۳	۱۶۱۷/۰۴d	S1N1D1
۴۴/۵۱۹c	۳/۷۱۰a	۲/۰۱a	۳/۶۱e	۲۵/۳۱ab	۳۱/۱۹c	۷۲۰/۵۹۵	۲۳۱۰/۳۴c	S1N1D2
۵۳/۷۱۲a	۲/۸۴۶d	۱/۲۱cd	۷/۴۱cd	۲۱/۶cd	۳۲/۲۸b	۴۵۸/۴۰۹	۲۷۱۸/۳۴b	S1N2D1
۳۹/۲۳۲d	۳/۶۸۹a	۱/۴۱۲c	۵/۲۲de	۲۱/۳d	۳۰/۱۲d	۸۱۸/۷۶۴	۱۴۱۵/۷۱de	S1N2D2
۴۴/۱۲۴c	۲/۳۲۵e	۰/۶۰۱f	۸/۴۱a	۲۶/۱a	۳۰/۷۱d	۸۳۸/۵۰۰	۲۷۳۰/۳۸b	S1N3D1
۴۸/۹۲۱b	۲/۶۲۹d	۰/۶۹۸e	۷/۳bc	۲۱/۳d	۳۲/۲۴b	۹۹۹/۸۵	۳۱۰۱/۲a	S1N3D2
۴۴/۳۵۱c	۲/۱۰۱ef	۰/۸۴۱de	۵/۲۱۸de	۲۲/۳bcd	۳۳/۰۰a	۵۳۷/۳۲۲	۱۶۲۸/۲۴d	S2N1D1
۴۵/۱۲۱c	۳/۱۰۴c	۱/۶b	۳/۴۵e	۲۴/۰۱abc	۳۱/۰۰c	۷۸۰/۰۷۷	۲۵۱۶/۳۸bc	S2N1D2
۵۴/۳۴۱a	۲/۲۵۳e	۱/۲۲d	۷/۴۳d	۲۷/۴a	۳۳/۴۲a	۴۴۰/۶۱۸	۲۷۰۰/۳۴b	S2N2D1
۳۷/۲۹۱e	۳/۶۹۴a	۱/۸۲۱ab	۴/۶۱ef	۲۱/۸cd	۳۲/۹۴a	۸۸۹/۴۹	۱۳۱۸/۴۵ef	S2N2D2
۴۴/۰۱۲c	۲/۳۸۴e	۰/۴۱۲f	۷/۸۳b	۲۴/۳۴۱ab	۳۲/۱۵b	۴۳۲/۳۴۶	۱۳۴۴/۷۸e	S2N3D1
۴۸/۷۱۹b	۳/۴۹۳b	۰/۹۰d	۷/۹۱cd	۲۲/۰۱cd	۳۲/۸۴b	۸۳۰/۱۹۵	۲۵۲۸/bc	S2N3D2

اعدادی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ می باشند.

S1: تاریخ کاشت اول (۲۰ اردیبهشت)، S2: تاریخ کاشت دوم (۲۰ خرداد)، D1: ۴۰۰ هزار بوته و D2: ۸۰۰ هزار بوته در هکتار و N1: ۴۶ کیلوگرم، N2: ۹۲ کیلوگرم و N3: ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار

طبق بررسی محمدی (۱۳۸۴) تاثیر تراکم بر بالاترین فاصله معنی دار نشد اما بالاترین اولین شاخه فرعی از سطح خاک مربوط به تراکم ۱۶۴ هزار بوته در هکتار به اندازه ۲۳/۵ سانتی متر بوده و در سایر تراکم ها با توجه اینکه تراکم کاهش یافته است، اختلاف معنی داری مشاهده نشده است. در بررسی دیگر اعلام شد رابطه عملکرد دانه با ارتفاع شاخه دهی منفی و معنی دار ($r=-0.74^{*}$) می باشد. میرزاخانی (۱۳۸۰) اشاره کرد با توجه به همبستگی منفی و معنی دار بین ارتفاع شاخه دهی با تعداد قوزه در بوته علت عدم افزایش عملکرد به هنگام کاهش ارتفاع شاخه دهی را می توان افزایش تعداد شاخه های اولیه و ثانویه و در نتیجه افزایش تعداد قوزه در بوته دانست. همچنین با افزایش ارتفاع شاخه دهی به دلیل کاهش عملکرد هر یک از قوزه ها، عملکرد کل کاهش می یابد. همچنین در آزمایشی دیگر نشان داده شد که با

افزایش ارتفاع اولین شاخه بندی از سطح زمین، عمق کنونی کاهش می یابد و باعث نفوذ در کنونی و استفاده بیشتر برگ های پایین از نور می شود ولی همبستگی مثبت غیر معنی داری بین عملکرد دانه با فاصله اولین شاخه بندی از سطح زمین و همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته وجود دارد. به طوریکه می توان استنباط کرد که با افزایش ارتفاع بوته، شاخه بندی در ارتفاع بیشتری انجام شده و عمق کنوبی کاهش می یابد.

بر اساس نتایج فوق انتخاب تاریخ های مختلف کاشت سبب برخورد مراحل رشد، رویش و زایش گیاه گلنگ بهاره با دما، تشبع خورشیدی و طول روز متفاوت می گردد و از این طریق بر رشد، نمو و عملکرد بوته تأثیر می گذارد. در کاشت بهاره گلنگ غالباً با افزایش دما و طول روز طی دوران رشد رویش و زایش گیاه و در نتیجه با تسريع نمو همراه می باشد ولی تأخیر بسیار زیاد در کشت بهاره گلنگ می تواند طول فصل رشد را شدیداً کاهش داده، سبب برخورد دوران گل دهی و دانه بندی با دمای پایین شده و در نهایت موجب شود که محصول به رسیدگی کاملی نرسد. به هر حال تسريع رشد و نمو، سبب کاهش فرصت رشد رویشی، تولید سطح برگ مناسب برای فتوستز کافی و مواد فتوستزی لازم برای تشکیل و رشد اجزای عملکرد گردیده و در نهایت عملکرد را کاهش می دهد. بنابراین توصیه می شود جهت کشت گلنگ بهاره با توجه به دمای پایه گلنگ و شرایط آب و هوایی منطقه در بهار هر چه سریعتر به کشت اقدام شود زیرا تأثیر مستقیم در عملکرد را به همراه دارد همچنین مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بهترین عملکرد گلنگ را در پی خواهد داشت.

منابع

- ۱- احمدی، م. و امیدی، ح. ۱۳۸۰. شناخت گلنگ و بررسی مقدماتی ساختار تولید آن در ایران. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت.
- ۲- احمدی، م. و امیدی، ح. ۱۳۷۳. گزارش تحقیقات گلنگ. موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج.
- ۳- اسمی، ر. ۱۳۷۶. بررسی اثرات فاصله بین ردیف و روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد و سایر خصوصیات زراعی دو رقم گلنگ بهاره در منطقه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
- ۴- ایران نژاد، ح، شهبازیان، ن. و پیری، پ. ۱۳۸۵. بررسی پراکندگی و اثر کود ازته بر روی عملکرد گیاه دارویی ختمی در منطقه کاشان. اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر. ص ۴
- ۵- پورهادیان، ح. و خواجه پور، م. ر. ۱۳۸۳. تأثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلنگ، توده محلی اصفهان "کوسه" در کشت تابستانه.
- ۶- پورهادیان، ح. ۱۳۸۴. تأثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد سرعت پوشش کانویی و عملکرد گلنگ توده اصفهان «کوسه» در کشت تابستانه. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشکده صنعتی اصفهان

- ۷- حیدری، س. و آсад، م. ت. ۱۳۷۷. تاثیر رژیم های آبیاری، میزان کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد گلنگ رقم زرقان ۲۷۹ در منطقه ارسنجان. پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ انتشارات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ص ۴۸۵.
- ۸- چاکرحسینی، م. ر. ۱۳۸۵. اثرات نیتروژن وفسفر بر عملکردکمی و کیفی گلنگ در شرایط دیم نیمه گرمسیری.
- ۹- زینلی، ا. ۱۳۷۸. گلنگ (شناخت تولید و مصرف)، چاپ اول، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
- ۱۰- سروdi، ا. ۱۳۸۲. بررسی اثر تراکم بوته بر روی عملکرد گلنگ در منطقه جیرفت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
- ۱۱- طهماسبی زاده، ح. ۱۳۸۷. بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد گلنگ بهاره در اراك. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك.
- ۱۲- طهماسبی زاده، ح. ۱۳۸۷. بررسی آنالیز رشد گلنگ بهاره و تاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراك. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی. سال سوم- شماره ۲- زمستان ۱۳۸۷
- ۱۳- فروزان، ک. ۱۳۷۸. گلنگ. انتشارات شرکت کشت دانه های روغنی. ۱۵۱ صفحه
- ۱۴- عمارت پرداز، ج. ۱۳۶۷. بررسی مناسب ترین تراکم و رقم برای کاشت گلنگ در تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان.
- ۱۵- کاظمی شیرازی، ر. و کراتز. اج. ۱۳۵۸. کنجاله گلنگ به عنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذایی طیور. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد سوم. ۶۶-۷۴.
- ۱۶- محمدی نیکپور، ع. ر. ۱۳۷۴. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلنگ در منطقه مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۱۷- محمدی، م. ر. ۱۳۸۴. مقایسه عملکردکمی وکیفی وخصوصیات فیزیولوژیکی رشد ونموارقام مختلف گلنگ بهاره در تراکم های متفاوت درمنطقه اراك. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی واحد اراك.
- ۱۸- مجید نصیری، ب. و احمدی، م. ر. ۱۳۷۹. تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلنگ *Carthamus tinctorius* L.
- ۱۹- میرزاخانی، م.، اردکانی، م. ر.، شیرانی راد، ا. ح. و عباسی فر، ا. ر. ۱۳۸۰. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلنگ بهاره در استان مرکزی. مجله علوم زراعی ایران. جلد چهارم، شماره ۲. صفحات ۱۵۰-۱۳۸.
- ۲۰- میرزاخانی، م. ۱۳۸۰. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنالیز رشد ارقام گلنگ بهاره در استان مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان.
- ۲۱- نژاد شاملو، ع. ر. ۱۳۷۵. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام گلنگ بهاره در اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان (اصفهان).
- ۲۲- یعقوب نژاد، ف. ۱۳۸۳. اثر فاصله ردیف، فاصله بوته و رقم بر رشد، اندازه غده و عملکرد سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ۲۳- یزدی صمدی، ب. و عبد میشانی. س. ۱۳۷۰. اصلاح نباتات زراعی. مرکز نشر دانشگاهی تهران.

-۲۴- نبوی کلات، س. م. و همکاران. ۱۳۸۳. تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت در کشت تابستانه پاییزه گلنگ در منطقه جوین سبزوار.

- 25- Able, G. H. and Driscoll, M. F. 1976.** Sequential trait development and breeding for high yield in safflower. *Crop Sci.* 16: 213-216.
- 26- Able, G. H. 1976.** Effects of irrigation regimes planting dates nitrogen levels andow spacing on safflower cultivars. *Agronoj.* 68:448-451.
- 27- Alessi, j., Power, j. F. and Zimmerman, D. C. 2000.** Effect of seeding date and population on water-use efficiency and safflower yield. *Agron.J.* 73: 783-
- 28-Ashri, A., Zimmer, D. E., Urie, A. L., Cahaner, A. and marni, A. 1974.** Evaluate of the word conection of safflower (carthamust in ctoriusl) IV. Yield and Yield components and their relationships. *Cropsci.* 14 : 799-802.
- 29- Baranauska, R., Venskutonis, p., Viskelis, p. and dombrauskiene, E. 2003.** Inbluence of nitrogen Fertilizers on the yield and composition on the yield and composition thyme (*thymus Vulgaris*) j gric. *food chem* Dec 17 , 56 (26) 7751 – 8
- 30-Beech, D. F. and Norman, M. j. T. 2002.** The effect of time of planting on yatributes of varieties of safflower. *Aust. j. Exp. Agric, Anim. Husb.* 3: 140 -148.
- 31- Bohra, G. 2000.** Effect of levels of nitrogen and row spacing in safflower. Vol 63. No 23. P: 652.
- 32- FAO. 1993.** Production year book 1992. Vol 46. FAO, UN, Rome
- 33- Hashim, R. M. and schinter, A. A. 1988.** semidwarf and conventional height sunflower performance at fire plant population. *Agron. J.* 80: 821-829.
- 34- Johnson, B. L. and Hanson, B. K. 2003.** Row spacing interactions on spring canola performance in the nor then Great plains. *Agrom. J.* 95:703-708.
- 35- Nasr, H. G., Katkhud, N. and Tannir, L. 2003.** Effect of fertilization and papulation rate- spacing on safflower yield and other characteristics. *Agron. J.* 72: 683-684.
- 36- Gubbles, G. H., and Dedio, W.2004.** Effect of plant density and soil fertility and oil seed safflower genotypes. *Canadian J.Plant Sci.* 66: 521-527.
- 37-sharma, K. and Verma, A. 2002.** Effect of plant population and row spacing on sunflower agronomy. *Can. J. plant Sc.* 75 491-499.
- 38-Sounda, G. 1989.** Effect of levels of nitrogen and plant papulations, yield crop Abs. Vol 42. No 11. P: 801.
- 39- Yermanson, D. M., Hemestreet, S. and Garber, M. J. 1967.** Inheri tance of guality and quantity of seed-oil in safflower. *Crop Sci.* 7:417-422.
- 40-Yazdi- Samadi, B., and Zafar, M. 1980.** Planting date, plant densities soil cultivation practices and irrigation regimes as factors in Ron irrigation safflower production. *Indian. J. Agric. Res.* 14: 65-72
- 41-Werkniven, C. H. E. and Massantini, F. 1967.** Effect of phosphorus and nitrogen placement on safflower growth and phosphorus absorbtion. *Agron. J.* 59: 169-171.
- 42-Zope, R. E., Parlekar, D. S., Ghorpade, D. S. and Tambe, S. i. 1999.** Effect of different row spacing on the growth and yield of safflower. *Third Int. Safflower conf. Bijng. China.* PP: 34-39