

بررسی پرایمینگ بر صفات فنولوژی، مورفولوژیکی و عملکرد علوفه دو هیبرید

ذرت با کشت تأخیری تابستانه در استان مازندران

احمد محسنی کفشگر کلائی*، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، بجنورد، ایران

حمیدرضا مبصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استادیار و عضو هیات علمی، گروه زراعت، قائم شهر، ایران
حمید حاتمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، استادیار و عضو هیات علمی، گروه زراعت، بجنورد، ایران
رضا رضایی سوخت آبدانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان، گروه زراعت، تهران، ایران

چکیده

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی قراخیل قائم شهر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد، تیمارها شامل دو هیبرید ذرت (S.C.704 و S.C.640) و ۸ محلول پرایمینگ شامل پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ با غلظت های ۵ و ۱۰٪، نترات پتاسیم با غلظت های ۰/۵ و ۱٪، کلرور پتاسیم با غلظت ۱ و ۲٪، آب خالص و شاهد (بدون پرایم) بودند. نتایج نشان داد اختلاف ارقام تنها بر تعداد بلال در بوته و طول بلال معنی دار بود. حداکثر درصد و سرعت سبز شدن و بیشترین تعداد بوته در متر مربع برای محلول پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ بدست آمد کمترین تعداد روز از کاشت تا مرحله شیری برای غلظت ۵٪ پلی اتیلن گلیکول حاصل شد. حداکثر عملکرد علوفه تر به ترتیب برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ بدست آمد که در مقایسه با شاهد به ترتیب ۲۰/۴ و ۱۸/۴٪ افزایش داشت. حداکثر نسبت وزن خشک بلال به کل برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ بدست آمد که در نسبت به شاهد به ترتیب ۱۷/۴ و ۱۸/۲٪ بیشتر بود. حداکثر درصد فیبر به ترتیب برای محلول پلی اتیلن گلیکول ۱۰٪ (۳۳/۴)٪ و آب (۳۳/۲)٪ حاصل گردید. به طور کلی پرایمینگ بذر ذرت به ترتیب با پلی اتیلن گلیکول ۵ و ۱۰٪ در کشت تأخیر تابستانه به خاطر افزایش درصد و سرعت سبز شدن و کوتاه کردن تعداد روز تا مرحله شیری موجب افزایش عملکرد علوفه تر و خشک شد.

واژه های کلیدی: ذرت، پرایمینگ، علوفه تر و درصد فیبر.

* نویسنده مسئول: Ahmadmohseny61@yahoo.com E-mail:

مقدمه

پرایمینگ بذر روشی است که اجازه جذب آب به صورت کنترل شده به بذر قبل از کشت تا سطحی داده می شود که فعالیت های اولیه جوانه زنی شروع گردد، اما ریشه چه خارج نشود و سپس بذر خشک شده و تا زمان کاشت، قابلیت نگهداری را دارا باشد (۳). استقرار نامناسب گیاهچه یکی از مشکلات مهم در نواحی دیم کم باران یا نیمه دیم می باشد. پائین بودن رطوبت در اطراف بذر، کاشت عمیق بذر و سله بستن خاک توسط باران قبل از سبز شدن گیاهچه از استقرار آن جلوگیری می کند. سبز شدن یکنواخت و سریع مزرعه یک پیش شرط لازم جهت رسیدن به پتانسیل عملکرد و کیفیت مناسب در گیاهان یکساله می باشد. استفاده از روش پرایمینگ یکی از روش های بهبود کارکرد بذر و افزایش کیفیت بذر در شرایط نامناسب محیطی می باشد (۲). اهداف پرایمینگ افزایش قوه نامیه بذر، افزایش سرعت جوانه زنی در درجه حرارت های پائین، افزایش عملکرد، کاهش نیاز به آب جهت سبز شدن و در نهایت استقرار بهتر بوته در واحد سطح می باشد (۸). گزارش های متعددی مبنی بر تأثیر مثبت پرایمینگ بر جوانه زنی و سبز شدن در گیاهان مختلف وجود دارد (۵، ۷ و ۱۴). تیمار پرایمینگ باعث کوتاه کردن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیر زنده در مرحله بحرانی استقرار گیاهچه می شود، همچنین این عمل سبب یکنواختی سبز شدن و در نهایت استقرار یکنواخت و بهبود عملکرد در محصول می شوند (۲). پرایمینگ در محصولاتی که بذور آنها مستقیم در زمین اصلی کشت می شوند مانند گندم جو و ذرت، سبب افزایش درصد و سرعت جوانه زنی و بهبود کمیت و کیفیت محصولات می شود (۱۵). خیساندن بذور گندم و جو به مدت ۱۲ ساعت، سورگوم و ارزان مروارید به مدت ۱۰ ساعت و بذر نخود در طی ۸ ساعت به ترتیب باعث افزایش ۳۷، ۴۰، ۳۱، ۵۶، و ۵۰٪ عملکرد گردید (۱۰). پرایم نمودن ذرت شیرین با استفاده از پلی اتیلن گلیکول موجب افزایش عملکرد محصول به نسبت ۱۸٪ شد (۴). پرایمینگ بذر کلزا با محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول ۱۰۰۰۰ به مدت ۸ ساعت باعث افزایش شاخص های رشد، افزایش جذب مواد معدنی و افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شده است (۱۸). پورکلهر (۲۰۰۸) گزارش کرد که حداکثر درصد جوانه زنی ذرت در تیمار پرایم شده با محلول پلی اتیلن گلیکول ۵٪ با ۱۲ ساعت به دست آمد و کمترین درصد جوانه زنی تحت تیمار نیترات پتاسیم با غلظت یک درصد در زمان ۳۶ ساعت حاصل شد. پرایمینگ در گیاه ذرت، نخود و گندم سبب شروع زودتر گلدهی گردید (۱۳). با توجه به اهمیت پرایمینگ بر درصد و سرعت سبز شدن و کاهش دوره رشد گیاه و استقرار گیاه در سطح زمین این طرح تحقیقاتی با بررسی پرایمینگ بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای در کشت تأخیری تابستانه به ویژه بعد از برداشت برنج در شرایط نیمه دیم در استان مازندران انجام شد.

مواد و روش ها

به منظور بررسی تأثیر محلول های پرایمینگ بر صفات فنولوژیکی و عملکرد علوفه ی ذرت در کشت تأخیری تابستانه (۹ مرداد ماه) در استان مازندران، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی قراخیل (قائم شهر) که در طول جغرافیایی ۱۸ دقیقه و ۵۶ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸ دقیقه و ۳۶ درجه و ارتفاع ۷/۱۴ متر از سطح آب های دریای آزاد قرار دارد، انجام شد. خاک محل آزمایش با pH برابر ۷/۷۲ و مقدار آلی و مقدار نیتروژن خاک به ترتیب ۳/۶۵ و ۰/۱۷ با بافت لومی بوده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دو هیبرید سینگل کراس ذرت (S.C.640 و S.C.704) و هفت محلول پرایمینگ شامل، پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت ۵ و ۱۰٪ نترات پتاسیم (KNO_3) با غلظت های ۰/۵ و ۱٪ کلرید پتاسیم (KCL) با غلظت های ۱ و ۲٪، آب خالص و شاهد (بدون پرایمینگ) بود. یک هفته قبل از کاشت بذور در محلول های پرایمینگ در آب مقطر به صورت ۲۴ ساعت قرار گرفت (۲). ابتدا در هوای آزاد به تدریج خشک شده و سپس آماده برای کاشت در مزرعه شد. زمین محل اجرای آزمایش در ۹ مرداد پس از عملیات شخم اولیه و دو دیسک عمود بر هم اقدام به کشت ذرت با فاصله ۷۵ سانتی متر بین ردیف و ۱۶ سانتی متر بین بوته ها گردید. سپس زمین به چهار تکرار و هر تکرار شامل ۱۶ تکرار تقسیم بندی شد هر کرت شامل ۵ ردیف و طول هر ردیف ۶ متر بود. در هر نقطه یک بذر کشت شد، قبل از کاشت ۱۵۰ کیلوگرم کودسوپر فسفات تریپل و ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار مصرف گردید و ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره به صورت سرک در دو مرحله ۷-۶ برگی و ۱۴-۱۳ برگی به کار برده شد. مبارزه با علف های هرز به صورت دستی انجام گرفت یک روز بعد از کاشت تمامی بذرهای جوانه زده برای هر روز جداگانه شمارش و این عمل تا آخرین روز برای جوانه زنی ثبت و یادداشت گردید و در نهایت سبز شدن و سرعت سبز شدن محاسبه شد. صفات مرفولوژیکی مانند ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول و قطر بلال و تعداد بلال در بوته با اندازه گیری از روی ۱۰ بوته در هر کرت انجام شد. تعداد بوته در متر مربع با شمارش بوته ها در هر کرت بدست آمد. عملکرد علوفه تر و خشک با برداشت بوته ها از سه ردیف وسط هر کرت و با حذف اثرات حاشیه ای حاصل گردید. سپس از همین نمونه های برداشت شده نسبت وزن خشک برگ ها ساقه و بلال به کل اندام های هوایی به دست آمد. نمونه های برداشت شده جهت تعیین درصد فیبر به آزمایشگاه کیفی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ارسال گردید. در پایان داده های بدست آمده با نرم افزار آماری MSTAT-C مورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD در سطح احتمال ۰/۵ صورت گرفت.

نتایج و بحث

صفات جوانه زنی

درصد و سرعت سبز شدن و تعداد بوته در واحد سطح از نظر آماری تنها تحت تأثیر پرایمینگ در سطح احتمال ۱٪ قرار گرفتند (جدول ۱). همان طور که در جدول ۲ مشهود است حداکثر درصد و سرعت سبز شدن برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ به دست آمد. تعداد بوته در مترمربع با پرایم بذور در محلول های ۵ و ۱۰٪ پلی اتیلن گلیکول به نسبت ۲۲/۸٪ در مقایسه با شاهد (۵/۴ بوته در متر مربع) حداکثر بود. مورانگو و همکاران (۲۰۰۳) دریافتند که پرایمینگ سبب افزایش درصد و سرعت سبز شدن ذرت نسبت به بذرهای پرایم نشده می گردد. پور کلهر (۲۰۰۸) بیان کرد حداکثر درصد جوانه زنی ذرت با کاربرد پلی اتیلن گلیکول با غلظت ۵٪ بدست آمد و کمترین آن برای تیمار نترات پتاسیم ۱ درصد بود. شاهسون و همکاران (۱۳۸۵) نشان دادند که پرایمینگ با محلول پلی اتیلن گلیکول (۶۰۰۰) باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی در علف گندمی، علف پشمکی، چچم دائمی و چاودار کوهی نسبت به بذور پرایم نشده گردید.

تعداد روز از کاشت تا مرحله شیری

همانطور که در جدول ۱ ملاحظه می شود تعداد روز از کاشت تا مرحله شیری از نظر آماری تنها تحت تأثیر پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری را نشان داد. کمترین تعداد روز از کاشت تا مرحله شیری (۷۲/۵ روز) برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت ۵٪ حاصل شد که در مقایسه با شاهد (بدون پرایم نمودن) ۵/۳ روز کمتر بود (جدول ۲). هریس و همکاران (۲۰۰۱) اظهار کردند که عمل پرایمینگ سبب شروع زودتر گل دهی در ذرت گردید. باسرا و همکاران (۲۰۰۴) بیان کردند که عمل پرایمینگ باعث کوتاه تر شدن زمان کاشت تا سبز شدن و سبب یکنواختی سبز شدن می شود. پرایمینگ در کاهو باعث زودرسی و افزایش محصول شد (۱۳).

صفات مرفولوژیکی

پرایمینگ از نظر آماری بر تعداد بلال در بوته، طول و قطر بلال، طول ساقه و ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و اثر ساده ارقام بر طول بلال در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد بلال در بوته در سطح احتمال ۵٪ اثر معنی دار داشتند (جدول ۱). تعداد بلال در هیبرید سینگل کراس ۶۴۰ در کشت تأخیری تابستانه (به ترتیب از ۱/۴ عدد و ۲۴/۳ سانتی متر) بیشتر از هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (به ترتیب ۱/۳۳ عدد و ۲۳/۴ سانتی متر) بود. حداکثر تعداد بلال در بوته و بیشترین قطر ساقه برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت ۵٪ (به ترتیب ۱/۷۷ عدد و ۲۱/۸ میلی متر) حاصل شد که در مقایسه با شاهد به ترتیب ۴۴/۶ و ۲۳/۳٪ بیشتر شد. حداکثر قطر بلال برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت ۱۰٪ (۵۱ میلی متر) بدست آمد که در مقایسه با شاهد ۱۶/۴٪ بیشتر بود. همان طور که در جدول ۲ دیده می شود بلندترین طول بلال و ارتفاع بوته برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ حاصل گردید. به طوری که طول بلال به ترتیب برابر ۲۸ و ۲۷/۹ سانتی متر و ارتفاع بوته به ترتیب

۲۹۱/۲ و ۲۸۸/۶ سانتی متر می باشد که در مقایسه با شاهد ۲۲/۸، ۲۲/۵، ۱۳/۸ و ۱۳/۰٪ بیشتر گردید. الیاس فر (۲۰۱۰) نشان داد که پرایمینگ ذرت از طریق افزایش تعداد بوته در واحد سطح سبب افزایش طول بلال و وزن صد دانه شده است. واریج و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کردند که پرایمینگ بذر کلزا با پلی اتیلن گلیکول (۱۰۰۰۰) باعث افزایش رشد گیاه و سرعت رشد نسبی در مقایسه با شاهد شدند. پور کلهر (۲۰۰۸) دریافت که پرایمینگ بذر ذرت با کلرید پتاسیم دو درصد موجب افزایش طول ریشه و کمترین طول ساقه چه برای محلول پلی اتیلن گلیکول ۰.۵٪ بدست آمد. بر اساس گزارشات گری و اشلینگر (۲۰۰۳) و دومان (۲۰۰۶) در بذور پرایم شده گندم و جو به علت جوانه زنی مطلوب و رشد سریع در ابتدای فصل تعداد پنجه بارور بیشتر و طول سنبله نیز زیادتر گردید، علاوه بر این دانه بندی و پر شدن دانه ها نیز بهبود یافت.

جدول ۱: میانگین مربعات صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی

منابع تغییرات	درجه آزادی	درصد سبز شدن	سرعت سبز شدن	تعداد بوته در مترمربع	روز از کاشت تا مرحله شیرگی	تعداد بلال در بوته	طول بلال با پوشش	قطر بلال با پوشش	قطر ساقه	ارتفاع بوته
تکرار	۳	۶۲۹/۸۴ ^{oo}	۴۶۷۰۴ ^{oo}	۳/۲۶ ^{oo}	۱۵۱/۹۷ ^{oo}	۰/۰۵ ^{ns}	۴/۱۳ ^{ns}	۱۴/۵۳ ^{oo}	۲/۵۰ ^o	۵۰۹/۸ ^{ns}
ارقام	۱	۱/۲۷ ^{ns}	۶۷۳ ^{ns}	۰/۰۱ ^{ns}	۷/۴۳ ^{ns}	۰/۰۸ ^o	۱۴/۷۴ ^{oo}	۵/۳۴ ^{ns}	۰/۰۸ ^{ns}	۷۰/۳ ^{ns}
پرایمینگ	۷	۵۰۰/۵۳ ^{oo}	۵۱/۳۹ ^{oo}	۴/۰۹ ^{oo}	۵۰/۰۳ ^{oo}	۰/۴۱ ^{oo}	۵۴/۱۹ ^{oo}	۹۴/۰۴ ^{oo}	۲۷/۲۳ ^{oo}	۲۱۹۱/۰ ^{oo}
ارقام×پرایمینگ	۷	۱۷/۲۴ ^{ns}	۱/۷۶ ^{ns}	۰/۰۵ ^{ns}	۱۴/۲۶ ^{ns}	۰/۰۴ ^{ns}	۱/۱۸ ^{ns}	۴/۵۶ ^{ns}	۰/۴۵ ^{ns}	۱۰۰/۵ ^{ns}
خطای آزمایش	۴۵	۱۷/۸۹	۲/۷۹	۰/۰۹	۱۲/۶۱	۰/۰۲	۱/۷۷	۳/۲۳	۰/۶۸	۲۳۷/۸۴
ضریب تغییرات (%)		۵/۹۱	۹/۵۸	۵/۱۷	۴/۶۲	۱۰/۶۴	۵/۵۷	۴/۰۲	۴/۴۶	۵/۸۲

***، * و ns: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪، ۵٪ و غیر معنی دار

جدول ۲: مقایسه میانگین اثرات ساده صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی

تیمارها	درصد سبز شدن	سرعت سبز شدن	تعداد بوته در مترمربع	تعداد روز از کاشت تا مرحله شیرگی	تعداد بلال در بوته	طول بلال با پوشش (cm)	قطر بلال با پوشش (mm)	قطر ساقه	ارتفاع بوته (cm)
۷۰۴	۷۱/۷۵a	۱۷/۱۳a	۶/۰۵a	۷۷/۲۶a	۱/۳۲b	۲۳/۴۰b	۴۴/۴۳a	۱۸/۵۲a	۲۶۵/۸۰a
۶۴۰	۷۱/۴۷a	۱۷/۷۸a	۶/۰۴a	۷۶/۵۸a	۱/۴۰a	۲۴/۳۶a	۴۵/۰۱a	۱۸/۴۵a	۲۶۳/۷۰a
PEG 5%	۸۴/۳۵a	۲۱/۵۸a	۷/۰۶a	۷۲/۵۷d	۱/۶۷a	۲۸/۰۷a	۴۸/۷۶b	۲۱/۸۰a	۲۹۱/۲a
PEG 10%	۸۱/۹۶a	۲۰/۹۳a	۷/۰۷a	۷۴/۲۲cd	۱/۴۶b	۲۷/۹۱a	۵۱/۰۹a	۲۰/۵۸b	۲۸۸/۶a
KNO ₃ 1%	۶۶/۶۵c	۱۵/۲۶d	۵/۴۹c	۷۷/۷۱ab	۱/۳۶d	۲۲/۴۱cd	۴۲/۳۳d	۱۷/۳۳d	۲۴۷/۹c
KNO ₃ 0/5%	۶۵/۳۷c	۱۶cd	۵/۵۹c	۷۹/۱۳a	۱/۴۰bc	۲۲/۳۷cd	۴۲/۳۳d	۱۷/۵۰d	۲۵۵/۹c
KCL 1%	۶۷/۳۳c	۱۶/۹۶bc	۵/۶۱c	۷۹/۲۸a	۱/۲۳d	۲۲/۸۶bc	۴۲/۶۷d	۱۷/۵۷d	۲۵۸/۷bc
KCL 2%	۶۶/۵۳c	۱۵/۶۴d	۵/۵۴c	۷۸/۹۴a	۱/۳۳cd	۲۲/۱۰cd	۴۲/۶۰d	۱۷/۵۶d	۲۵۷/۴bc
آب	۷۵/۷۳b	۱۸/۱۰b	۶/۵۲b	۷۵/۶۵bc	۱/۴۵b	۲۳/۶۹b	۴۵/۴۷c	۱۹/۱۱c	۲۶۷/۴b
شاهد	۶۴/۹۸c	۱۵/۲۳d	۵/۴۸c	۷۷/۸۸ab	۰/۹۸e	۲۱/۶۶d	۴۲/۶۷d	۱۶/۷۸e	۲۵۰/۹c

در هر ستون و در هر گروه تیمار میانگین های دارای حروف مشترک تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵٪ ندارند

عملکرد و اجزای عملکرد علوفه

همان طور که در جدول ۳ مشهود است عملکرد علوفه تر و خشک و نسبت وزن خشک برگ، ساقه و بلال به کل اندام هوایی از نظر آماری تنها تحت تأثیر پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند. حداکثر عملکرد علوفه تر برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد (بترتیب برابر ۵۳۱۷۰ و ۵۱۸۷۰ کیلوگرم در هکتار) حاصل شد که در مقایسه با شاهد به ترتیب ۲۰/۴ و ۱۸/۴٪ بیشتر بود بیشترین عملکرد علوفه خشک نیز برای محلول برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ به دست آمد که در مقایسه با تیمار بدون پرایم کردن یا شاهد (۷۳۲۰ کیلو گرم در هکتار) به ترتیب ۲۳/۳ و ۱۸/۴٪ افزایش داشت. حداکثر نسبت وزن خشک برگ به کل برای پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ (به ترتیب ۱۸/۸، ۱۹/۱٪) حاصل شد. بیشترین نسبت وزن خشک بلال به کل نیز برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ بدست آمد (جدول ۴). تیمار پرایمینگ باعث کوتاه تر شدن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیر زنده در مرحله بحرانی استقرار گیاهچه می شود، همچنین سبب یکنواختی سبز شدن و در نهایت بهبود عملکرد در ذرت می شوند (۲)، لذا پرایمینگ در محصولاتی که بذور آنها مستقیم در زمین اصلی کشت می شوند مانند جو، گندم و ذرت سبب افزایش درصد و سرعت سبز شدن و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصول می شود (۱۵). خیساندن بذور گندم و جو به مدت ۱۲ ساعت، سورگوم و ارزن مروارید به مدت ۱۰ ساعت و بذر نخود در ۸ ساعت به ترتیب باعث افزایش ۳۷، ۴۰، ۳۱، ۵۶ و ۵۰٪ عملکرد گردید (۲). پرایم نمودن کلزا با محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول (۸۰۰۰) باعث افزایش جذب مواد معدنی و عملکرد دانه نسبت به شاهد شده است (۱۲ و ۱۸). پرایمینگ ذرت با محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول موجب افزایش عملکرد به نسبت ۱۸٪ در مقایسه با عدم پرایم بذرها گردید (۴). پرایمینگ در برنج موجب افزایش عملکرد دانه و سبب کاهش مصرف مقدار بذر برای کشت شده است (۱۷). الیاسی فر (۲۰۱۰) در بررسی پرایمینگ بر ذرت دانه ای نشان داد که محلول پرایمینگ پلی اتیلن- گلیکول (۸۰۰۰) از طریق افزایش تعداد بوته در واحد سطح موجب افزایش عملکرد دانه در واحد سطح نسبت به شاهد گردید.

درصد فیبر

درصد فیبر از نظر آماری تنها تحت تأثیر پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت (جدول ۳). حداکثر درصد فیبر به ترتیب برای محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلیکول با غلظت ۱۰٪ (۳۳/۴٪) و تیمار آب یا هیدرو پرایمینگ (۳۳/۲٪) حاصل گردید. درصد فیبر برای شاهد یا بدون پرایم کردن بذور برابر ۲۱/۸٪ بود (جدول ۴). عمل پرایمینگ در ذرت، گندم و جو موجب بهبود کمیت و کیفیت محصولات می شود و

همچنین بیان کردند که پرایمینگ در کاهو موجب افزایش عملکرد محصول گردید ولی کیفیت محصول را افزایش نداد (۱۵).

جدول ۳: میانگین مربعات صفات عملکرد و اجزای عملکرد علوفه خشک

منابع تغییرات	درجه آزادی	عملکرد علوفه تر در هکتار	عملکرد علوفه خشک در هکتار	نسبت وزن خشک برگ به کل	نسبت وزن خشک ساقه به کل	نسبت وزن خشک بلال به کل	درصد فیبر
تکرار	۳	۱۷۷۵۷۸۹۴/۵۹۹ ^{ns}	۱۰۳۱۹۱۷/۳۹۱ ^{ns}	۶/۸۱۴ ^{ns}	۴۴/۹۱۰*	۳۷/۴۷۵**	۵/۹۸۲ ^{ns}
رقم	۱	۲۲۶۴۴۵۱۱/۹۱ ^{ns}	۷۲۵۶۹۱/۰۱۶ ^{ns}	۳/۳۳۱ ^{ns}	۲۹/۷۰۲ ^{ns}	۱۲/۷۸۱ ^{ns}	۰/۱۶۰ ^{ns}
پرایمینگ	۷	۱۷۸۴۸۴۵۴۹/۵۱۶**	۸۴۱۳۶۶۵/۵۸۷**	۳۲/۵۷۱**	۲۰/۳۸۱**	۹۴/۶۲۹**	۹۰/۲۵۹**
پرایمینگ×رقم	۷	۵۵۱۶۵۵۷/۱۰۵ ^{ns}	۵۸۵۳۱۶/۹۰۸ ^{ns}	۴/۱۳۷ ^{ns}	۱۵/۵۳۵ ^{ns}	۴/۳۷۶ ^{ns}	۳/۳۵۱ ^{ns}
خطای آزمایش	۴۵	۶۶۹۱۲۶۶/۹۱۰	۸۲۵۰۰۷/۸۸۰	۳/۹۳۶	۱۰/۸۸۲	۳/۴۵۱	۷/۵۱۳
ضریب تغییرات (%)		۵/۶۷	۱۱/۸۴	۱۲/۰۲	۸/۰۹	۴/۳۵	۱۰/۴۳

***، * و ns: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪، ۵٪ و غیر معنی دار

جدول ۴: مقایسه میانگین اثرات ساده صفات عملکرد و اجزای عملکرد علوفه خشک

تیمارها	عملکرد علوفه تر در هکتار (kg/ha)	عملکرد علوفه خشک در هکتار (kg/ha)	نسبت وزن خشک برگ به کل	نسبت وزن خشک ساقه به کل	نسبت وزن خشک بلال به کل	درصد فیبر
۷۰۴	۴۶۲۷۴/۸۱ a	۷۵۶۲/۱۲a	۱۶/۲۷a	۴۱/۴۷a	۴۲/۲۵a	۲۶/۳۳a
۶۴۰	۴۵۰۸۵/۱۵ a	۷۷۷۵/۰۹a	۱۶/۷۲a	۴۰/۱۱a	۴۳/۱۴a	۲۶/۲۳a
PEG 5%	۵۳۱۷۰ a	۹۵۵۶a	۱۹/۱۰a	۴۴/۴۰a	۴۷/۶۰a	۲۵/۷۰d
PEG 10%	۵۱۸۷۰ a	۸۹۷۹a	۱۸/۸۰a	۳۳/۰۰c	۴۸/۱۱a	۳۳/۴۰a
KNO ₃ 1%	۴۰۶۷۰e	۶۹۶۲b	۱۶c	۴۱/۷۰b	۳۹/۵۵d	۲۳/۶۰e
KNO ₃ 0/5%	۴۱۵۰۰e	۷۰۸۵b	۱۸/۵۰ab	۳۱/۹۰c	۴۱/۵۶c	۲۹/۲۰bc
KCl 1%	۴۴۸۷۰ c	۶۸۶۷b	۱۵/۸۰c	۴۱/۴۰b	۴۱/۷۰c	۲۷/۴۰cd
KCl 2%	۴۳۶۴۰ cd	۶۹۷۹b	۱۵/۱۰c	۳۲/۱۰c	۴۰/۳۹cd	۲۹/۵۰b
آب	۴۷۴۱۰ b	۷۶۰۲b	۱۷/۱۰ab	۳۳/۷۰d	۴۳/۳۸b	۳۳/۲۰a
شاهد	۴۲۳۱۰ de	۷۳۲۰ b	۱۶/۳۰c	۴۲/۴۰ab	۳۹/۳۱d	۲۱/۸۰e

در هر ستون و در هر گروه تیمار میانگین های دارای حروف مشترک تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵٪ ندارند

پرایم کردن بذر ذرت در کشت تأخیری تابستانه با پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰٪ به خاطر افزایش درصد و سرعت سبز شدن و کاهش تعداد روز از کاشت تا مرحله شیری موجب افزایش عملکرد علوفه تر و خشک شد. دو هیبرید سینگل کراس ۶۴۰ و ۷۰۶ از نظر عملکرد علوفه تر و خشک تفاوت معنی داری نداشتند.

منابع

1. Ashraf, M. and Rauf, H. 2001. Inducing salt tolerance in maize throught seed priming with chloride salts: growth and ion transport at early growth stages. *Acta Physiol. Plant.* 23: 407-414.
2. Basra, S. M. A., Ashraf, M., Iqbal, N., Khaliq, A. and Ahmad, R. 2004. Physiological and biochemical aspects of pre-sowing heat stress on cotton seed. *Seed Science Tecnocal.* 32: 765-774.
3. Berg, R., Jawson, M., Franzluebbers, A. and Kubik, K. 1989. Bradyrhizobium japonicum inoculation and seed priming for fluid drilled soybean. *Soil Sci. Soci. Americ. Jour.* 53 (6):17.
4. Chiu, K. Y., Chen, C. L. and Sung, J. M. 2002. Effect of priming temperature on storability of primed Sh-2 sweet corn seed. *Crop Sci.* 42: 1996-2003.
5. Demir, I. and Venter, H. A. 1999. The effect of priming treatment on the performance of watermelon seeds under temperature and osmotic stress. *Seed Sci. and Technol.* 27: 871-875.
6. Duman, I. 2006. Effects of seed priming with PEG and K3PO4 on germination and seedling growth in lettuce. *Pakistan J. of Bio. Sci.* 9(5): 923-928.
7. Elyasifar, M. 2010. Priming Effects on yield and yield components of maize (SC704). Master's thesis, Department of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. 91 pages.
8. Galileans, A., Tvakol afshari, R. 2004. Osmoprining Effects of drought stress on seed germination of sugar beet, *Journal of Agriculture*, Vol 27, No. 2, pp. 2-9.
9. Giri, S. G. and W. F. Schillinger. 2003. Seed priming winter wheat for germination, emergence and yield. *Crop Sci.* 43:2135-2141.
10. Harris, D. 2005. Priming seed DFID Plant Science Research Program, Center for Arid Zone studies, University of Bangor.
11. Harris, D. and Tisdall, J. M. 1996. The effect of manure, genotype, seed priming, depth and date of sowing on the emergence and early of sorghum bicolor moench in semi-arid Boswana. Special issue. *Crop establishment. Soil and Tillage Research.* 40: 73-88.
12. Harris, D., Joshi, A., Khan, P. A., Gothakar, P. and Sodhi, P. S. 1999. On-farm seed priming in semi-arid agriculture: Development and evolution in corn, rice and chickpea in India using participatory methods. *Exp. Agric.* 35: 15-29.
13. Khan, A., Miura, H., Prinsinski, J. and Ilyas, I. 1990. Matri conditioning of seeds to improve emergence. In proceeding of national symposium in stand establishment of horticultural crops. Pp. 19-40.
14. Murungu, F. S., Nyamugafata, P., Chiduza, C., Clark, L. J. and Whalley, W. R. 2003. Effects of seed priming aggregate size and soil matric potential on emergence of cotton and maize. *Soil and Till. Res.* 74: 161-168.
15. Parera, C. A. and Cantliff, D. J. 1994. Presowing seed priming in *Horticulture Reviews.* 16: 119-141.
16. Poorklhr, V. 2008. Effects of priming on germination and seedling a medicinal plants and oils. Master's thesis, Department of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. 95 pages.
17. Thakuria, R. and Sarma, N. N. 1990. Effect of seed priming and rate on direct-seeded, rafted summer rice. *Indian Journal of Agronomy.* 40 (2): 288-290.
18. Warrich, M. A., Shahzand, M., Bassra, A. and Ehsanullah, E. A. 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola seeds. *Journal of Agriculture and Biology.* 117-120.