

فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران

فخری فلاخ^۱، فهیمه سلیمپور^{*۲}، فریبا شریفنیا^۳

۱- کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲- استادیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

۳- دانشیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

مکان انجام تحقیق: گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

*مسؤول مکاتبات: دکتر فهیمه سلیمپور، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق

پستی: ۱۹۵۸۵-۹۳۶، پست الکترونیکی: drsalimpour@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۸۸/۱۲/۲۳

تاریخ دریافت: ۸۸/۱/۲۲

چکیده

منطقه شش رودبار در جنوب غربی شهر پل سفید در شهرستان سوادکوه استان مازندران واقع شده است. وسعت منطقه حدود هشت هکتار است. جمع‌آوری نمونه و مطالعه فاکتورهای اکولوژیکی منطقه مورد نظر طی دو سال رویشی ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انجام گردید و نتایج زیر به دست آمد: شناسایی ۲۷۸ گونه متعلق به ۶۹ تیره و ۲۰۰ جنس که از این تعداد، تیره‌های Asteraceae، Poaceae و Brassicaceae، Lamiaceae و Fabaceae فراوان‌ترین تیره‌های منطقه هستند، در بررسی شکل زیستی گیاهان منطقه نتایج زیر حاصل شد: همی‌کریپتووفی‌ها با ۱۱۶ گونه، بیشترین و هیدروفی‌ها با ۳ گونه کمترین تعداد را شامل می‌شوند. اکثر گونه‌ها خاص منطقه ایرانو-تورانی-اوروسیبری با ۸۳ گونه (۳۱ درصد گونه‌ها) هستند. موارد فوق به عواملی نظیر شیب، جهت شیب و ارتفاع و شدت وزش باد بستگی دارد.

واژه‌های کلیدی: فلور، سوادکوه، شکل زیستی، کوروتیپ، ایران

مقدمه

رسوبات سیلیسی و رسی و آهک‌های یک‌ساله و ذغال‌دار است. رده‌بندی خاک، نوعی طبقه‌بندی طبیعی است که توسط سازمان خواربار و کشاورزی صورت گرفته و بر اساس آن، بافت خاک منطقه عمده‌تا از نوع سیلت- رسی با $pH=6.6$ است.


توجه به اهمیت و نقش مناطق حفاظت‌شده برای حفظ و احیای منابع طبیعی در جهت مسائل آموزشی و علمی و نیز برای جذب گردشگر و از همه مهمتر حفظ تنوع زیستی در این منطقه بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تدوین فهرست گیاهی از گونه‌های موجود در فلور منطقه اطلاعات بالارزشی از پوشش گیاهی موجود به دست می‌دهد. حضور

منطقه حفاظت‌شده شش رودبار، یکی مناطق حفاظت‌شده استان مازندران است که در شهرستان سوادکوه واقع شده است. این منطقه جهت حفاظت تکثیر و پرورش نسل حیات وحش باقی مانده و حفظ پوشش گیاهی منطقه، در سال ۱۳۸۰ از طرف شورای عالی محیط زیست به منطقه حفاظت شده اختصاص یافته است. این منطقه در بین دو محور آلاشدست و در اسله و دو رودخانه چرات و در اسله قرار گرفته است (اداره محیط زیست پل سفید). بر اساس شواهد و اسناد زمین‌شناسی موجود، رسوبات محدوده منطقه، مربوط به دوران سوم زمین‌شناسی است. این دوران شامل تشکیلات ماسه ریز مارن ماسه سنگ قرمز و

عملیات صحرایی برای شناخت منطقه مورد نظر و جمع آوری گونه های گیاهی و شناسایی آنها در طی فصل های رویشی ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به صورت تصادفی از تمام نقاط منطقه انجام گرفت (هفتاهی دو یا سه بار به منطقه مراجعه شد). پس از جمع آوری، با استفاده از فلور ایران (۱-۲۹)، فلور رنگی ایران (۳۰)، رستنی های ایران (۳۱)، ردبهندی گیاهی (۳۳)، فلور شوروی چتریان (۳۲)، ردبهندی گیاهی (۳۴)، فلور ترکیه (۳۶) و فلور فلسطین (۳۷) مورد شناسایی دقیق قرار گرفتند. مناطق انتشار گونه های گیاهی منطقه، با استفاده از فلور های مذکور و فلور اروپا و همچنین منابع موجود، تشخیص داده شد. سپس کوروکوژی گونه ها بر اساس تقسیم بندی نواحی رویشی توسط زهری (۳۸) و تختجان (۳۹) و لیونارد (۴۰) تعیین گردید.

نتایج

به طور کلی ۲۷۸ گونه گیاهی مشخص شد که از این تعداد ۱۲ گونه متعلق به پنج تیره از نهانزادان آوندی، یک گونه بازدانه، ۵۶ تیره متعلق به دولپه ها و ۲۰۰ تیره متعلق به تکلپه ها است. این گونه ها به ۷ تیره متعلق دارند. مهم ترین تیره های منطقه، جنس تعلق دارند. مهم ترین تیره های منطقه، ۲۳ گونه Asteraceae با ۳۰ گونه، Lamiaceae گونه، Poaceae با ۲۲ گونه، Rosaceae با ۲۰ گونه، Brassicaceae با ۱۹ گونه، Fabaceae با ۱۶ گونه، Euphorbiaceae Boraginaceae و Ranunculaceae هر یک با ۷ گونه، بیشترین تعداد گونه را به خود اختصاص داده اند (نمودار ۱). شکل زیستی گونه های گیاهی منطقه بر اساس سیستم Raunkiaer تعیین گردید (جدول های ۱ و ۲ و نمودار ۲).




نمودار ۱- فراوانی تیره های پر گونه منطقه.

گونه های گیاهی می تواند سبب حفظ تنوع جانوری منطقه و نیز مانع فرسایش خاک شود. با انجام مطالعات صحرایی، انواع گونه ها و تیپ های گیاهی منطقه تعیین شد و نظر به این که هر یک از گونه ها و تیپ ها معرف عمده شرایط اکولوژیکی و نمادی از امکانات و قابلیت های طبیعی موجود در منطقه است، شناخت رویشگاه های گیاهی و نیز گونه های در معرض انقراض می تواند کمک موثری در حفظ گونه ای باشد. از این رو، در تحقیق حاضر سعی بر آن بود که کلیه مناطق حساس از حیث پوشش گیاهی مورد توجه قرار گیرد تا تحت نظارت و حفاظت بیشتر قرار گرفته و از عوامل تهدید کننده دور بماند. در مجموع، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

شناخت شکل زیستی گونه های گیاهی موجود در منطقه؛ پی بردن به میزان تنوع گیاهی منطقه و معرفی گونه های منطقه و نواحی رویشی یا نواحی پراکنش.

مواد و روش ها

منطقه شش رو دیار در جنوب غربی شهر پل سفید در شهرستان سوادکوه واقع شده است. وسعت منطقه، ۷۹۲۰ متر مربع است. این منطقه در محدوده عرض های جغرافیایی $35^{\circ}59'$ الی $36^{\circ}59'$ و در محدوده طول های جغرافیایی $47^{\circ}53'$ الی $52^{\circ}59'$ قرار دارد. بلند ترین نقطه منطقه ۲۴۵۳ متر و پست ترین نقطه آن ۸۰۰ متر است. متوسط بارش سالانه در منطقه $733.5/5$ میلی متر و متوسط دمای سالانه $16/8$ درجه سانتی گراد است. اقلیم منطقه، سرد و کوه هستنی است.



نمودار ۲ - طیف زیستی بخشی از گیاهان منطقه سوادکوه.

همی کریپتووفیت‌ها با ۱۱۶ گونه (۳۸/۹۸ درصد) و تروفیت‌ها با ۷۹ گونه (۲۸/۸۸ درصد) مهم‌ترین شکل‌های زیستی منطقه مورد مطالعه هستند (جدول ۱).

تنوع بالای شکل زیستی، به عوامل اکوسیستمی منطقه، نظیر باد، شدت وزش باد، میزان برودت هوا، میزان گرمای هوا، شدت و مقدار تابش نور خورشید و شبیب منطقه بستگی دارد. نتایج حاصل از طبقه‌بندی شکل‌های زیستی گیاهان نشان داد که

جدول ۱- بررسی اشکال زیستی تیره‌های گیاهی مورد مطالعه در منطقه سوادکوه.

ردیف:	تیره‌ها	تروفیت	همی کریپتووفیت	کامفیت	فانرووفیت	کریپتووفیت	زئوفیت	هیدرووفیت
پتریدوفیت‌ها								
-	۲	-	-	-	-	-	-	Equisetaceae ۱
-	۴	-	-	-	-	-	-	Aspleniaceae ۲
	۳							Asplidiaceae ۳
-	۱	-	-	-	-	-	-	Hypolepidiaceae ۴
-	۲	-	-	-	-	-	-	Polypodiaceae ۵
-	-	-						بازدانه
	۱							Taxaceae ۶
	۱							نهاندانه دولپه
	۱							Aceraceae ۷
							۱	Amaranthaceae ۸
						۳	۲	Apiaceae ۹
						۱		Apocynaceae ۱۰
	۱							Aquifoliaceae ۱۱
		۲		۲		۲۰	۶	Asteraceae ۱۲
								Berberidaceae ۱۳

ردیف	تیره ها	ترووفیت	کامفیت	فانروفیت	کریپتووفیت	ژئوفیت	هیدروفیت	کریپتووفیت همی
۱	Betulaceae							
۲	Boraginaceae	۳	۱					
۳	Brassicaceae	۱۰	۵					
۴	Brassicaceae	۱						
۵	Campanulaceae							
۶	Caprifoliaceae							
۷	Caryophyllaceae	۲	۸					
۸	Celasteraceae							
۹	Chenopodiaceae	۳						
۱۰	Cistaceae	۱						
۱۱	Convolvulaceae		۲					
۱۲	Cornaceae			۱				
۱۳	Crassulaceae		۲					
۱۴	Dipsaceae		۱					
۱۵	Euphorbiaceae	۱	۶					
۱۶	Fabaceae	۱۱	۵					
۱۷	Fagaceae			۲				
۱۸	Fumariaceae	۲	۱					
۱۹	Geraniaceae	۳		۱				
۲۰	Hypericaceae		۱					
۲۱	Juglandaceae			۱				
۲۲	Lamiaceae	۱	۲۱					
۲۳	Linaceae	۱						
۲۴	Loranthaceae		۱					
۲۵	Malvaceae		۲					
۲۶	Oleaceae			۱				
۲۷	Orobanchaceae		۱					
۲۸	Oxalidaceae		۲					
۲۹	Papaveraceae	۱						
۳۰	Paronychiaceae		۱					
۳۱	Phytolacaceae		۱					
۳۲	Plantaginaceae		۱					
۳۳	Polygonaceae	۱	۵					
۳۴	Primulaceae		۱					

ردیف	تیره ها	تروفیت	همی کریپتوفت	کامفیت	فانروفیت	کریپتوفت	ژئوفیت	هیدروفیت
۱	Punicaceae							۴۷
	Ranunculaceae	۳	۴					۴۸
	Resedaceae		۱					۴۹
	Rhamnacae							۵۰
۲	Rosaceae		۱	۱۶	۱			۵۱
	Rubiaceae	۱				۳		۵۲
	Salicaceae						۱	۵۳
۱	Scrophulariaceae	۱	۳				۱	۵۴
	Solanaceae	۲					۲	۵۵
	Ulmaceae						۲	۵۶
۱	Urticaceae		۱					۵۷
	Valerianaceae	۱						۵۸
	Verbenaceae		۱					۵۹
۱	Violaceae	۲				۱		۶۰
	Zygophyllaceae		۱					۶۱
	نهاندانه تک لپه							
۱	Cyperaceae							۶۲
۱	Iridaceae							۶۳
۱	Juncaceae							۶۴
۵	Liliaceae		۱	۱				۶۵
۱	Orchidaceae							۶۶
۱	Poaceae	۱۳	۴	۱	۳			۶۷
۳	جمع	۷۹	۱۱۶	۴	۳۷	۳۶	۳۶	

جدول ۲ - شکل زیستی گیاهان منطقه.

ردیف	طیف زیستی	تعداد گونه ها	درصد پراکنش در منطقه
۱	همی کریپتوفت	۱۱۶	۴۱/۷۲
۲	تروفیت	۷۹	۲۸/۴۱
۳	ژئوفیت	۳۶	۱۲/۹۴
۴	کامفیت	۴	۱/۴۳
۵	فانروفیت	۳۷	۱۲/۳۰
۶	کریپتوفت	۳	۱/۰۷
۷	هیدروفیت	۳	۱/۰۷

پراکنش جغرافیایی یا کوروکوژی گیاهان منطقه مورد مطالعه با استفاده از فلورهای مختلف و منابع موجود تعیین گردید (جدول ۳).

جدول ۳- کوروکوژی گونه های منطقه.

Pteridophyta	شکل زیستی	منطقه
Equisetaceae		
<i>Equisetum arvense</i> L.	Ge	Cosm
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Ge	IT
Aspleniaceae		
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Ge	ES
<i>Asplenium onopteris</i>	Ge	ES
<i>Asplenium tricomas</i> L.	Ge	ES
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm.	Ge	ES
Aspidiaceae		
<i>Dryopteris affinis</i>	Ge	ES
<i>Polystichum setiferum</i> L. (Forks.)	Ge	IT, ES
<i>Polystichum woronowii</i> Fom.	Ge	IT, ES
Hypolepidaceae		
<i>Peteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Ge	Cosm
Polypodiaceae		
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas.	Ge	IT, ES
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Ge	IT, ES
Gymnospermac		
Taxaceae		
<i>Taxus baccata</i> L.	Ph	ES
Angiosperms		ES
Dicotyledonae		
Aceraceae		
<i>Acer cappadocicum</i> Gled.	Ph	IT, ES
Amaranthaceae		
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Th	Cosm
Apiaceae		
<i>Ammi majus</i> L.	Th	IT, SS
<i>Caucalis platycarpos</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	He	IT, ES
<i>Eryngium caeruleum</i> M. B.	He	ES
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	He	IT
Apocynaceae		
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. & Kit.	He	IT, ES
Aquifoliceae		
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Ph	ES
Asteraceae		
<i>Achilla millefolium</i> L.	He	IT
<i>Anthemis altissima</i> L.	Th	IT
<i>Antennaria austriaca</i> Jacq.	He	ES
<i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill.	He	IT, ES
<i>Artemisia fragrans</i> Willd.	He	IT
<i>Artemisia oliveriana</i> J. Gay ex DC.	He	IT
<i>Centaurea hyrcanica</i> Bornm.	He	IT
<i>Cephalorrhynchus brassicifolius</i> (Boiss.) Tuisl	He	IT, ES
<i>Chrysanthemum roseum</i> Adams	He	IT
<i>Cirsium hygrophilum</i> Boiss.	He	IT
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	He	IT, ES
<i>Cousinia bachtiarich</i> Boiss. & Hausskin	Th	ES
<i>Cousinia Halbilitzii</i> C. A. Mey	He	IT

Pteridophyta	شكل زیستی	منطقه
<i>Crepis elbursensis</i> Boiss.	He	IT
<i>Echinopas heteromorphus</i> Bunge.	He	IT, ES
<i>Erigeron acer</i> L.	He	IT, ES
<i>Lactuca serriola</i> L.	Th	IT, ES, SS
<i>Lapsana communis</i> L.	He	IT, ES
<i>Lasiopogon muscoides</i> (Desf.) DC.	Th	IT, ES, M
<i>Scrozonera cana</i> C. A. Mey.	Ch	IT, ES
<i>Senecio cineraria</i> D.C.	He	ES
<i>Senecio erucifolius</i> L.	He	ES
<i>Senecio vernalis</i> Waldst & Kit.	Th	IT, ES
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Ch	IT, ES
<i>Solidago virga-aurea</i> L.	Cr	ES
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Cr	Cosm
<i>Taraxacum roseum</i> Bornm. ex Hand- Mzt.	He	IT
<i>Taraxacum syriacum</i> Boiss.	He	Cosm
<i>Tussilago farfara</i> L.	He	IT, ES
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Th	Cosm
Berberidaceae		
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Ph	IT, ES, M
Betulaceae		
<i>Alnus subcordata</i> C. A. Mey.	Ph	Es
Boraginaceae		
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Th	IT, ES
<i>Echium amoenum</i> Fisch. et Mey.	Ch	IT, ES
<i>Lappula microcarpa</i> (Ledeb) Gurke	Th	IT
<i>Lindelofia kandavanensis</i> Bornm. & Gauba	Ge	Es
<i>Lithospermum arvanse</i> L.	Ge	Es
<i>Nonnea Lutea</i> (Desr.) Reichenb.	Th	Es
<i>Onosma demawendicum</i> H. Riedl	Ge	IT
Brassicaceae		
<i>Aethionema trinervium</i> (DC) Boiss	He	IT, ES, SS
<i>Alliaria petiolata</i> (M.B.) Cavara. & Grande.	TH	IT, M
<i>Alyssum bracteatum</i> Boiss. & Buhse.	He	IT
<i>Alyssum dasycarpum</i> Steph. ex Willd.	Th	IT, M
<i>Alyssum longistylum</i> (Sommier. & Levier)	Th	IT
Grossh. & Schischk.		
<i>Alyssum marginatum</i> Steud. ex Boiss	Th	IT
<i>Arabidopsis pumila</i> (Steph) N. Busch	Th	IT
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol) DC.	He	Es
<i>Bunias orientalis</i> L.	He	IT
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	Th	Cosm
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. & Berth.	Th	Cosm
<i>Draba nemorosa</i> L.	Th	ES
<i>Isatis buschiana</i> Schischk.	He	IT, ES
<i>Nasturtium officinalis</i> (L.) R. Br.	Hy	IT, ES, SS
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Th	IT
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Th	IT
Campanulaceae		
<i>Campaunula rapunculus</i> L.	Th	Es
Caprifoliaceae		
<i>Lonicera floribunda</i> Boiss. & Buhse	Ph	Es
<i>Lonicera iberica</i> M. B.	Ph	IT, ES
<i>Sambucus ebulus</i> L.	He	Es
Caryophyllaceae		
<i>Dianthus crinitus</i> Sm. subsp. <i>crinitus</i>	He	IT
<i>Dianthus szowitsianus</i> Boiss.	He	IT
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Th	IT, ES
<i>Minuartia lineata</i> Bornm.	He	ES
<i>Petrorthagia saxifrage</i> (L.) Link	He	IT, ES

Pteridophyta	شكل زیستی	منطقه
<i>Silene aucheriana</i> Boiss.	He	ES
<i>Silene conoidea</i> L.	He	IT
<i>Silene schafra</i> Gmel.	He	IT, ES
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Heldr. & Sart	Th	IT, SS
<i>Stellaria holostea</i> L.	He	IT, ES
Celastraceae		
<i>Evonymus latifolia</i> (L.) Mill.	Ph	Es
Chenopodiaceae		
<i>Chenopodium album</i> L.	Th	IT, ES
<i>Chenopodium murale</i> L.	TH	IT
<i>Chenopodium vulvaira</i> L.	Th	IT, ES
Cistaceae		
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller	Th	IT, ES, M
Convolvulaceae		
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	He	IT
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	He	IT, M
Cornaceae		
<i>Cornus australis</i> C. A. Mey	Ph	Es
Crassulaceae		
<i>Sedum obtusifolium</i> C. A. Mey	He	IT, ES
<i>Sempervivum iranicum</i> Bornm. & Gauba	He	IT, ES
Dipsacaceae		
<i>Pterocephalus canus</i> Coulter. ex DC.	He	IT
Euphorbiaceae		
<i>Acalypha australis</i> L.	Th	ES
<i>Euphorbia aellenii</i> Rech. f	He	ES
<i>Euphorbia aucheri</i> Boiss.	He	IT, ES, SS
<i>Euphorbia cheirolepioides</i> Rechi. f.	He	IT, ES
<i>Euphorbia cheiradenia</i> Boiss. et Hohen	He	IT, ES
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	He	IT, ES, M
<i>Euphorbia macrostegia</i> Boiss	He	IT, SS
Fabaceae		
<i>Astragalus mollis</i> Bieb.	He	IT
<i>Astragalus susianus</i> Emend	He	IT, ES
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Th	IT, ES
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Th	IT, ES
<i>Colutea gracilis</i> Freyn. & Sint.	Ph	IT, ES
<i>Medicago lupulina</i> L.	Ge	IT, ES, M
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Th	IT, ES
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) BartaLini	Th	IT, ES
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Th	IT, ES, M
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr.	He	IT, ES
<i>Onobrychis bungei</i> Boiss.	He	IT, ES
<i>Onobrychis mazanderanica</i> Rech. f.	He	ES
<i>Trifolium arvense</i> L.	Th	IT, ES
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Th	IT, ES, M
<i>Trifolium tumens</i> Stev. ex M.B	Ge	IT, M
<i>Trigonella stellata</i> Forssk.	Th	IT, ES, M
<i>Vicia hybrid</i> L.	Th	IT, ES
<i>Vicia peregrine</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Vicia sativa</i> L.	Th	IT, ES
Fagaceae		
<i>Fagus orientalis</i> Lipsky.	ph	ES
<i>Quercus castaneaefolia</i> C. A. Mey. subsp. <i>castaneifolia</i>	Ph	ES
Fumariaceae		
<i>Corydalis chiophila</i> Czernjak	Ge	ES
<i>Fumaria asepala</i> Boiss.	Th	IT, ES, SS
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Th	IT, ES

Pteridophyta	شكل زیستی	منطقه
Geraniaceae		
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Th	IT, ES, M
<i>Geranium collinum</i> Steph. ex Willd.	Ge	IT, ES, M
<i>Geranium dissectum</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Geranium lucidum</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	He	ES
Hypericaceae		
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Ph	ES
<i>Hypericum perforatum</i> L.	He	IT, ES, SS
Juglandaceae		
<i>Juglans regia</i> L.	Ph	IT
Lamiaceae		
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy.	He	Es
<i>Calamintha officinalis</i> Moench	He	IT
<i>Deracocephalum kotschy</i> Boiss.	He	IT
<i>Eremostachys laciniata</i> (L.) Bunge	He	IT, ES
<i>Hyssopus angustifolius</i> M. B.	He	IT, ES
<i>Lamium album</i> L.	He	ES
<i>Lamium purpureum</i> L.	Th	ES
<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq.	He	IT
<i>Marrubium parviflorum</i> Fisch & C. A. Mey	He	ES
<i>Marrubium vulgar</i> L.	He	IT, ES, M
<i>Mentha persica</i> Boiss.	He	ES
<i>Nepeta heliotropifolia</i> Lam.	He	IT
<i>Nepeta kotschy</i> Boiss.	He	IT, M
<i>Nepeta persica</i> Boiss.	He	IT, ES
<i>Origanum vulgare</i> L.	He	ES
<i>Prunella vulgaris</i> L.	He	ES
<i>Salvia choloroleuca</i> Rech. f. & Aell.	He	ES
<i>Salvia nemorosa</i> L.	Ge	IT, M
<i>Salvia rhytidia</i> Benth.	He	ES
<i>Scutellaria pinnatifida</i> Arth. et Hamilt.	He	IT, ES
<i>Stachys byzantina</i> C. Koch.	He	ES
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	He	IT, ES
<i>Teucrium hyrcanicum</i> L.	He	ES
Linaceae		ES
<i>Linum strictum</i> L.	Th	IT, SS
Loranthaceae		
<i>Viscum album</i> L.	He	ES
Malvaceae		
<i>Alcea crassicaulis</i> I. Riedl	He	IT, M
<i>Althaea armeniaca</i> Ten.	He	ES
<i>Malva sylvestris</i> L.	He	IT
Oleaceae		
<i>Jasminum fruticans</i> L.	Ph	ES
Orobanchaceae		
<i>Orobanch vulgaris</i> Par.	He	Cosm
Oxalidaceae		
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Th	IT, ES
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Th	IT, ES
Papaveraceae		
<i>Chelidonium majus</i> L.	He	ES
<i>Glaucium fimbrilligerum</i> Boiss.	He	IT
<i>Papaver dubium</i> L.	Th	IT
Paronychiaceae		
<i>Herniaria incana</i> Lam.	He	ES
Phytolaccaceae		
<i>Phytolacca americana</i> L.	He	ES

Pteridophyta	شكل زیستی	منطقه
Plantaginaceae		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	He	IT
<i>Plantago major</i> L.	Th	Cosm
<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Th	IT, ES, M
Podophyllaceae		
<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Boiss.	Ge	IT, M
Polygonaceae		
<i>Polygonum aviculare</i> L.	He	IT, ES, M
<i>Polygonum hyrcanicum</i> Rech. f.	Th	ES
<i>Polygonum orientale</i> L.	He	IT, ES
<i>Polygonum persicaria</i> L.	He	ES
<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	He	IT, ES
<i>Rumex crispus</i> L.	He	IT
Primulaceae		
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Androsace maxima</i> L.	Th	IT
<i>Primula multicolor</i> L.	He	ES
Punicaceae		
<i>Punica granatum</i> L.	Ph	ES
Ranunculaceae		
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Anemone biflora</i> DC.	He	IT, ES, M
<i>Cosolida orientalis</i> (Gay) Schrob.	Th	IT, ES, M
<i>Delphinium cyphoplectrum</i> Boiss.	He	IT, ES, M
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	He	ES
<i>Ranuculus lomatocarpus</i> Fisch. & C. A. Mey	He	IT, ES
<i>Ranunculus polyanthemos</i> L.	He	ES
Resedaceae		
<i>Reseda lutea</i> L.	He	IT, SS
Rhamnaceae		
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Ph	IT, M
Rosaceae		
<i>Cotoneaster ovata</i> Pojark.	Ph	IT, ES
<i>Crataegus elbursensis</i> Rech. f.	Ph	ES
<i>Crataegus microphylla</i> C. Koch	Ph	ES
<i>Geum urbanum</i> L.	He	IT, ES, M
<i>Potentilla argentea</i> L.	Ge	IT, ES
<i>Potentilla recta</i> L.	Cr	IT, ES
<i>Potentilla reptans</i> L.	Ge	IT, ES, M
<i>Prunus spinosa</i> L.	Ph	ES
<i>Pyrus communis</i> L.	Ph	IT, ES
<i>Pyrus boissieriana</i> Buhse.	Ph	IT, ES
<i>Pyrus sp.</i>	Ph	IT, ES
<i>Malus orientalis</i> Ugl.	Ph	IT, ES
<i>Mespilus germanica</i> L.	Ph	ES
<i>Rosa albicans</i> Godet	Ph	IT, ES
<i>Rosa canina</i> L.	ph	IT, ES
<i>Rubus persicus</i> Boiss.	Ph	IT, ES
<i>Rubus anatolicus</i> (Focke) Focke ex Hausskn.	Ph	IT
<i>Rubus caesius</i> L.	Ph	IT, ES
<i>Rubus hirtus</i> L.	Ph	IT, ES
<i>Rubus hyrcanus</i> Juz.	Ph	ES
Rubiaceae		
<i>Crucianella sintenisii</i> Bornm.	He	IT
<i>Cruciata taurica</i> (Pallas ex Willd.) Ehrend.	He	IT
<i>Galium aparine</i> L.	Th	IT, ES
<i>Galium humifusum</i> Bielb.	He	IT, ES
Salicaceae		
<i>Salix excelsa</i> S.G.Gmelin	Ph	IT

Pteridophyta	شكل زیستی	منطقه
Scrophulariaceae		
<i>Digitalis nervosa</i> Steud. & Hochst. ex Benth.	He	IT, ES
<i>Rhynchocorys elephas</i> (L.) Griseb	Ge	IT, ES
<i>Verbascum alceoides</i> Boiss. & Husskn.	He	IT, ES
<i>Veronica biloba</i> Schreb.	Th	ES
<i>Veronica persica</i> Poir	He	Cosm
Solanaceae		
<i>Atropa acuminata</i> Royle. ex Miers	He	IT, ES
<i>Atropa belladonna</i> L.	He	ES
<i>Hyoscyamus nigra</i> L.	Th	IT, ES
<i>Solanum nigrum</i> L.	Th	Cosm
Ulmaceae		
<i>Ulmus minor</i> Miller	Ph	IT, ES
<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall) Dipp.	Ph	ES
Urticaceae		
<i>Parietaria judaica</i> L.	Ge	ES
<i>Urtica dioica</i> L.	He	IT, ES
Valerianaceae		
<i>Valerianella uncinata</i> (M.B) Dufr	Th	ES
Verbenaceae		
<i>Verbena officinalis</i> L.	He	ES
Violaceae		
<i>Viola alba</i> Bess.	Ge	ES
<i>Viola odorata</i> L.	Th	IT, ES
<i>Viola riviniana</i> Reich.	He	IT, ES
<i>Viola tricolor</i> L.	Th	IT, ES
Zygophyllaceae		
<i>Peganum harmala</i> L.	He	Cosm
Monocotyledonae		
Asparaginaceae		
<i>Polygonatum polyanthemum</i> M. B.	Ge	Es
<i>Asparagus verticillatus</i> L.	He	IT, ES, SS
Cyperaceae		
<i>Carex caucasica</i> L.	Ge	IT, ES
Iridaceae		
<i>Crocus compressus</i> Caspius Fisch. & C. A. Mey.	Ge	IT, ES
Juncaceae		
<i>Juncus inflexus</i> L.	Hy	Cosm
Liliaceae		
<i>Allium rotundum</i> L.	Ge	IT, ES
<i>Ornithogalum sintenisii</i> Freyn.	Ge	IT, ES
<i>Smilax excelsa</i> L.	Ph	ES
<i>Tulipa chrysanthia</i> Boiss.	Ge	IT, ES, M
<i>Tulipa systola</i> Stapf.	Ge	IT, ES, M
Orchidaceae		
<i>Epipactis reichingeri</i> Renz.	Ge	IT, ES
Poaceae		
<i>Aegilops crassa</i> Boiss.	Th	IT, M
<i>Agropyrum intermedium</i> P. Beauv.	Th	IT
<i>Alopecurus apius</i> Ovcz.	Th	IT
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.	TH	IT, ES
<i>Bromus tectorum</i> L.	Th	Cosm
<i>Bromus sterilis</i> L.	Th	IT, ES, M
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beaur	Hy	IT, ES, SS
<i>Catapodium rigidum</i> (L) C. E. Hubb.	Th	IT, ES, M
<i>Dactylis glomerata</i> L.	He	IT, ES
<i>Festuca rubra</i> L.	He	ES, IT
<i>Hordeum glucum</i> Steud.	TH	IT, M
<i>Lolium persicum</i> Boiss & Hohen. ex Boiss.	Th	IT, M

Pteridophyta	شکل زیستی	منطقه
<i>Melica persica</i> Kunth.	CH	IT
<i>Nardurus subulatus</i> (Banks & Soland.) Bor.	Th	IT, ES, M
<i>Panicum antidotale</i> Retz.	Ge	IT, M
<i>Pennisetum orientale</i> L. C. Rich	He	IT
<i>Phleum paniculatum</i> Hudson	Th	ES
<i>Phleum iranicum</i> Bornm. & Gauba.	He	IT, ES
<i>Poa annua</i> L.	Th	ES
<i>Poa bulbosa</i> L.	Ge	IT, ES, M
<i>Poa nemoralis</i> L.	Ge	IT, ES
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	Th	IT, ES

IT= Irano- Turanian; ES= Euro- Siberian; IT-M= Irano-Turanian, Mediterranean; Cosm= Cosmopolid; IT-SS= Irano-Turanian, Sahra-Sidian; IT-ES-SS= Irano-Touranian, Euro-Siberian, Sahra-Siberian; IT-ES= Irano- Touranian, Euro-Siberian

بحث

تورانی، اوروپی و ۲۶/۹۷ درصد (۷۵ گونه) دارای پراکنش صرفا ES و ۱۶/۹ درصد (۴۷ گونه) دارای پراکنش ایرانو- تورانی هستند. وجود گونه‌های اروپی در منطقه، بدلیل نزدیکبودن منطقه به دامنه‌های شمالی البرز است (جدول ۴).

نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که گونه‌هایی با کوروتیپ ایرانو- تورانی، اوروپی فلور منطقه را تشکیل می‌دهند. این نتایج با نظر لیونارد در ۱۹۷۳، زهری در ۱۹۶۳، تختجان در ۱۹۸۶ و عصری در ۱۳۸۲ مطابقت دارد. ۳۱/۶۵ درصد (۸۸ گونه) فلور منطقه دارای پراکنش دو ناحیه‌ای ایرانو-

جدول ۴- بررسی آماری گونه‌ها از نظر میزان پراکندگی در نواحی مختلف رویشی.

-ES-M IT	ES	Cosm	IT-ES-SS	IT-M	IT-SS	IT-ES	IT
۳۰ ٪ ۱۰/۷۹	۷۵ ٪ ۲۶/۹۷	۱۵ ٪ ۵/۳۹	۸ ٪ ۲/۸۷	۱۱ ٪ ۳/۹۵	۴ ٪ ۱/۴۳	۸۸ ٪ ۳۱/۶۵	۴۷ ۱۶/۹

IT= Irano- Turanian; ES= Euro- Siberian; IT-M= Irano-Turanian, Mediterranean; Cosm= Cosmopolid; IT-SS= Irano-Turanian, Sahra-Sidian; IT-ES-SS= Irano-Touranian, Euro-Siberian, Sahra-Siberian; IT-ES= Irano- Touranian, Euro-Siberian.

بیشتر دامنه‌ها نسبت به ارتفاعات باشد، چرا که ارتفاعات، کمتر در معرض چرای دام قرار می‌گیرد. با افزایش ارتفاع، سهم گیاهان همی‌کریپتووفیت افزایش یافته است؛ با توجه به این با افزایش ارتفاع، دما رو به کاهش می‌گذارد و به نظر می‌رسد که دما در مقایسه با سایر عوامل محیطی، تاثیر بیشتری در شکل زیستی گیاهان دارد. در پایان می‌توان گفت منطقه شش رودبار با داشتن درصد بالای از گونه‌های اروپی، دارای تنوع بالایی از پوشش گیاهی می‌باشد.

با استناد به بررسی‌های انجام گرفته، بهطور کلی فراوانی همی‌کریپتووفیت‌ها و تروفیت‌ها در منطقه مورد مطالعه، بیشتر از سایر اشکال زیستی است که این وجود منطقه‌ای تقریبا نیمه‌مرطوب را نشان می‌دهد. آب و هوای منطقه، سرد و کوهستانی است که وجود یک اکوسیستم سرد و خشک و کوهستانی، دلیلی بر این ادعاست. همچنین می‌توان گفت نسبت تروفیت‌ها در دامنه‌های کم‌ارتفاع، به مراتب بیشتر از ارتفاعات است که این امر می‌تواند به دلیل تخریب

منابع مورد استفاده

- آزادی، ر. ۱۳۷۸. فلور ایران. تیره گل راعی. ج ۲۷، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

- آخانی سنجانی، ح. ۱۳۸۳. فلور مصور پارک ملی گلستان. دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.

- ۱۹- خاتم‌ساز، م. ۱۳۷۴. فلور ایران. تیره‌های جنتیانا و شبدر آبی. ج ۱۶ و ۱۷، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۰- خاتم‌ساز، م. ۱۳۸۱. فلور ایران. تیره سیب زمینی. ج ۲۴، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۱- خاتم‌ساز، م. ۱۳۸۱. فلور ایران. تیره گل گاو زبان. ج ۳۹، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۲- شریف‌نیا، ف، اسدی، م. ۱۳۷۹. فلور ایران. تیره کتان. ج ۳۴، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۳- طاهری، ز. ۱۳۷۲. فلور ایران. تیره سازو. ج ۱۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۴- عصری، ی. ۱۳۸۲. فلور، شکل‌های زیستی و کوروتیپ‌های گیاهان ذخیره‌گاه بیوسفر کویر. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اصفهان.
- ۲۵- مظہری، ن. ۱۳۷۸. فلور ایران. تیره زبق. ج ۳۱، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۶- مظہری، ن. ۱۳۸۳. فلور ایران. تیره خیارک و نرگس. ج ۴۶ و ۴۷، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۷- معصومی، ع. ا. ۱۳۷۲. گون‌های ایران. ج ۴۷، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۸- موسوی آلاشو، ا. ۱۳۸۰. فلور ایران. تیره گزنه. ج ۳۷، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۲۹- نوروزی، م. ۱۳۷۲. فلور ایران. تیره ورث. ج ۹، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۳۰- نوروزی، م. ۱۳۸۰. فلور ایران. تیره پیچک. ج ۴۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۳۱- قهرمان، ا. ۱۳۶۹. کروموفقیت‌های ایران. ج ۱، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
- ۳۲- مبین، ص. ۱۳۷۴. رستنی‌های ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۳۳- مظفریان، و. ۱۳۶۲. کلید شناسایی خانواده چتریان در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۳۴- مظفریان، و. ۱۳۸۳. رده‌بندی گیاهی. انتشارات امیرکبیر.
- 35- Komarov, V.L., Shishkin, B.K., 1974. Flora of the U.S.S.R.
- 36- Rechinger, K. H., 1963-1998. Flora Iranica. Akademische druck -u Verlagsanstalt, Graz.
- 37- Davis, P. H., 1988. Flora of Turkey. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- ۳- آزادی، ر. ۱۳۸۳. فلور ایران. تیره زیتون. ج ۴۸، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۴- اخیانی، خ. ۱۳۷۱. فلور ایران. تیره اسفند. ج ۷، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۵- اخیانی، خ. ۱۳۷۹. فلور ایران. تیره گل ناز. ج ۳۲، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۶- اسدی، م. ۱۳۶۷. راهنمای طرح فلور ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۷- اسدی، م. ۱۳۸۰. فلور ایران. تیره کاج، سرخدار، سرو و ارمک. ج ۱۹ تا ۲۲، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۸- اسدی، م. ۱۳۸۰. فلور ایران. تیره اسفناج. ج ۳۸، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۹- پاکروان، م، جلیلیان، ن، نعمتی، م. ۱۳۷۹. فلور ایران. تیره پروانه آسا. ج ۳۳، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۰- پرونده، لبی، لاله‌ها و زبق‌های ایران و گونه‌های مجاور، موسسه گیاهشناسی ایران.
- ۱۱- جانی قربان، م. ۱۳۷۴. فلور ایران. تیره بارهنگ. ج ۱۴، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۲- جانی قربان، م. ۱۳۷۹. فلور ایران. تیره گزنه. ج ۳۶، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۳- جم‌زاد، ز. ۱۳۷۱. فلور ایران. تیره طوسک. ج ۸، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۴- جم‌زاد، ز. ۱۳۷۷. فلور ایران. تیره گل پامچال. ج ۲۵، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۵- جم‌زاد، ز. ۱۳۸۵. فلور ایران. تیره شاه پسند. ج ۵۲، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۶- خاتم‌ساز، م. ۱۳۶۹. فلور ایران. تیره نارون. ج ۴، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۷- خاتم‌ساز، م. ۱۳۶۹. فلور ایران. تیره بنفسه. ج ۵، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۸- خاتم‌ساز، م. ۱۳۷۱. فلور ایران. تیره گل سرخ. ج ۶، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- 38- Zohary, M., Feindrun-Dothan, N., 1986. Flora Palaestina. The Jerusalem Academic Press, Israel.
- 39- Zohary, M., 1963. On the geobotanical structure of Iran, Bulletin of the Research Council of Israel, section D, Botany, Supplement, p. 113.

- 40- Takhtajan, A., 1986, Floristic regions of the world, University of California PRESS, Ltd. 522P.
- 41- Leonard, J., 1973, Comparisons between the Phytochorological spectra of three Iranian deserts and those of various surrounding regions. Bulletin of the National Plantentuin de Belgique 62: 389-396.