

بررسی اثرات ضد میکروبی انسانس و عصاره (آب) لیمو ترش بر میکرووارگانیسم های دهانی

فاطمه رفیعی¹، رضا رمضانی²

-1- مریم گروه میکروبیولوژی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران

-2- کارشناس ارشد گروه میکروبیولوژی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران

نویسنده مسؤول: فاطمه رفیعی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. Rafiee_ar@yahoo.com

دریافت: 91/7/3 پذیرش: 91/9/27

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق در زمینه میکروبیولوژی پژوهشکی انجام شد. لیمو ترش، میوه رسیده گیاه *C. limonum* از خانواده روتاسه (Rutaceae) می باشد که انسانس و عصاره (آب) میوه آن اثرات ضد میکروبی فوق العاده ای علیه میکرووارگانیسم ها دارد. هدف از انجام این تحقیق، جایگزینی ماده ای طبیعی به جای داروهای ضد میکروبی و جلوگیری از عوارض آنها، همچنین کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی میکرووارگانیسم های مختلف می باشد.

روش بررسی: در این تحقیق اثرات ضد میکروبی انسانس و عصاره لیمو ترش بر میکرووارگانیسم های مهم دهانی شامل استرپتوکوکوس سنگوئیس، استرپتوکوکوس موتناس، استرپتوکوکوس پایوژنز، استرپتوکوکوس گروه B، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوفیلوس فرمنتوم، استافیلوکوکوس ارئوس، کاندیدا الیکانس و کاندیدا گلابراتا با تعیین قطر هاله عدم رشد در روش انتشار دیسک و تعیین کمترین غلظت ممانعت کننده رشد و کمترین غلظت کشندگی در روش تهیه رقت، روی محیط مولر هیتون اندازه گیری شد. ابتدا این میکرووارگانیسم ها به صورت خالص تهیه و کشت داده شدند. انسانس لیمو از شرکت زردبند یاسوج تهیه گردیده و عصاره آن با دستگاه آبمیوه گیری از لیموی کامل به دست آمد.

یافته ها: با توجه به نتایج، تفاوت معنی داری بین قدرت ضد میکروبی عصاره و انسانس لیمو ترش وجود ندارد ولی انسانس آن با اختلاف کمی نسبت به عصاره دارای ارجحیت می باشد.

نتیجه گیری: انسانس لیمو را می توان به عنوان یک ماده ضد میکروبی قوی در درمان عفونت های دهانی به کار برد. بنابراین با توجه به رویکرد جهانی به داروهای بیولوژیک، انسانس لیمو ترش می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک در درمان بسیاری از عفونت ها باشد.

واژه های کلیدی: اثرات ضد میکروبی، لیمو ترش، باکتری های دهانی

مقدمه

اسانس های مرکبات بر باکتری های صنایع غذایی (لاکتوپاسیلوس کورواتوس، لاکتوپاسیلوس ساکئی و استافیلوكوکوس کارنووسوس) و باکتری های دیگری مانند انتروباکتر گرگوویا و انترو باکتر آمنیگنوسوس بررسی شده که اسانس های لیمو و گریپ فروت بهترین اثر را داشته اند (12). هدف از انجام این تحقیق، بررسی خواص ضد میکروبی اسانس و عصاره لیمو ترش برای استفاده در بیماری های عفونی دهان به منظور جایگزینی ماده ای طبیعی به جای داروهای ضد میکروبی از جمله آنتی بیوتیک ها و جلوگیری از عوارض آنها و همچنین کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های مختلف می باشد.

روش بررسی

اسانس و آب لیمو ترش : اسانس خالص لیمو به صورت تجاری از شرکت زردبند پاسوچ تهیه گردید و آب لیمو ترش پس از تهیه لیمو تازه جنوب ایران به روشن معمولی و با دستگاه آب میوه گیری هم از لیموی کامل با پوست و بدون پوست، آبگیری و در این تحقیق به کار گرفته شد .

سویه های میکروبی : استرپتوكوکوس سنگوئیس (PTCC 1449) / استرپتوكوکوس موتانس (PTCC 1683) / استرپتوكوکوس پاپوئنر (PTCC 1447) / استرپتوكوکوس گروه B (PTCC 1768) / لاکتوپاسیلوس کازائی (PTCC 1608) / لاکتوپاسیلوس فرمنتوم (PTCC 1638) / استافیلوكوکوس ارتوس (PTCC 1112) / کاندیدا البیکانس (PTCC 5027) / کاندیدا گلابراتا (PTCC 5297) که از کلکسیون میکروبی مرکز تحقیقات عصر انقلاب تهیه شدند.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس لیمو به روش انتشار دیسک (Disk Diffusion) : در این روش ابتدا یک سوسپانسیون از باکتری مورد آزمایش تهیه شد که کدورتی معادل 0/5 مک فارلن داشته باشد سپس یک سواب استریل وارد این سوسپانسیون کرده و در داخل لوله به جدار آن نیز فشرده شد تا مایع اضافی آن خارج گردد سپس به طور یکنواخت در سطح محیط کشت به صورت Surface به طریقی که تمام سطوح آن با باکتری پوشانده شود کشت داده

لیموترش میوه رسیده گیاه *Citrus limonum* از خانواده Rutaceae () است که دارای روغن فرار می باشد. اولین بار در کشور های چین و هندوستان پرورش یافته و به تدریج به سایر کشورها وارد شده است در ایران ارقام مختلف آن کاشته می شود نوعی که در شمال می روید «تفان» نامیده شده و در جنوب ایران هم به مقدار وسیعی کاشته می شود (1). لیمو ترش یکی از انواع مرکبات بوده که به دلیل داشتن ویژگی های مهم حائز اهمیت فراوانی است، این میوه به دلیل داشتن میزان بالایی از اسید های آلی به ویژه اسید سیتریک و ایجاد شرایط اسیدی در درمان پسیاری از عفونت های روده ای به کار می رود و کاربرد وسیعی در اپیدمی های بیماری وبا در مناطق مختلف جهان داشته است زیرا خاصیت ضد میکروبی بالایی را نسبت به باکتری مولد این بیماری یعنی ویریو کلرا دارد (2).

اسانس لیموترش که از فشردن قسمت خارجی پوست لیمو ترش تازه به دست می آید حاوی 92-95 درصد از ترپین های مختلف است. قسمت اعظم آن را لیمونن همراه با فلاندرن، کامفن، پین تشکیل می دهد. بوی مطبوع اسانس لیمو مربوط به وجود سیترال است که به مقدار 4-7 درصد در آن یافت می شود. به علاوه دارای ژرانيول آزاد، لینالول، سیترونلول و به مقدار کم از آلدئید نونیلیک و اسید آنترانیلیک است (4,5).

لیمو ترش منبع غنی از ویتامین ث بوده که یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های شناخته شده می باشد طوری که این ویتامین نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت بیماری آتروواسکلروزیز، سرطان، امراض قلبی و عفونت ها دارد. لیمو ترش دارای ماده ای به نام ترپین است که تولید کلسترول در بدن را کنترل می کند و مانع افزایش زیاد آن می شود و از سایر فواید آن می توان به مواردی همچون بالا بردن عملکرد سیستم ایمنی بدن، تصفیه کننده خون، نقرس، چاقی، دفع رسویات ادراری و صفرایی، برقان، مalaria، استفاده در محل گزیدگی حشرات، ضد تیفوس، ضد سرخک، مخلک، روشن کننده پوست و ... اشاره کرد (6, 7).

قابل ذکر است مطالعات بسیاری در مورد اثرات ضد میکروبی عصاره لیمو بر ویریو فراوانی انجام شده است (8,9). در برخی مطالعات، سمیت اسانس های مختلف از جمله اسانس لیمو ترش علیه قارچ ها (11) و باکتری های فاسد کننده غذا (12) بررسی شده است. در مطالعه دیگری اثر تعدادی از

تهیه شده باعث رقیق شدن محیط کشت نشود، سوسپانسیون میکروبی با محیط کشت براث تهیه گردید، به این صورت که میزان باکتری تلقیحی در این روش بایستی 106 CFU/mL - ۱۰۵ باشد، لذا چنانچه یک میلی لیتر از سوسپانسیون میکروبی که کدورتی معادل نیم مک فارلند دارد به ۱۰۰ میلی لیتر محیط کشت براث اضافه گردد، تعداد 106 CFU/mL باکتری در غلظت نهایی به دست می آید. سپس به اندازه ۱۰۰ میکرولیتر از این محیط کشت حاوی باکتری به هر خانه به جز دو خانه شاهد که جهت بررسی عدم آلوگی میکروبی اسانس و جهت استریل بودن محیط کشت بود افزوده شد. سپس پلیت فوق به مدت ۲۴ ساعت در دمای 37°C گرمخانه گذاری گردیده سپس چاهکها براساس رشد و یا عدم رشد میکروارگانیسم ها از بالاترین غلظت ماده ضد میکروبی بررسی و آخرین چاهکی که بعد از آن باکتری شروع به رشد کرده بود به عنوان کمترین غلظت ممانعت کننده (MIC) انتخاب و غلظت ماده ضد میکروبی به کار رفته در چاهک فوق ثبت گردید. لازم به ذکر است جهت بررسی صحت عملکرد، هر کدام از آزمایشات دو بار تکرار شدند. سپس برای تعیین کمترین غلظت کشنده (MBC) از کلیه چاهک ها کشت مجدد داده و پس از ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری نتایج بر اساس رشد و یا عدم رشد بررسی و ثبت گردید. لازم به ذکر است که دمای گرمخانه گذاری برای باکتری استرپتوکوکوس گروه B، ۳۷ درجه سانتی گراد و برای کاندیدا، ۲۵ درجه سانتی گراد در محیط کشت های متفاوت در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج به دست آمده از بررسی اثر ضد میکروبی عصاره لیمو ترش و اسانس آن به روش انتشار دیسک نشان داد که هر دو، قدرت اثر ضد میکروبی یکسان داشته و تفاوت معنی داری بین قدرت اثر ضد میکروبی عصاره لیموترش با اسانس آن وجود ندارد (جداول شماره ۱ و ۲).

همچنین نتایج به دست آمده از تعیین MIC و MBC اسانس و عصاره لیمو ترش نیز نشان داد که خاصیت ضد میکروبی عصاره لیمو و اسانس آن، تفاوت معنی داری با هم ندارد (جداول شماره ۳ و ۴). قابل ذکر است اسانس لیمو ترش نسبت به عصاره آن در درمان بیماری های دهانی با توجه به اختلاف اثر کمی که با هم دارند دارای ارجحیت می باشد (جداول شماره ۱، ۲، ۳ و ۴).

شد. برای انجام این آزمایش از پلیت هایی با قطر 100mm استفاده و حداکثر ۶ دیسک روی آن با فاصله 15 mm از دیواره پلیت قرار داده شده و فاصله مرکز دو دیسک از هم 24mm در نظر گرفته شد تا از تلاقی هاله های عدم رشد جلوگیری گردد. سپس دیسک های شاهد استریل حاوی غلظت های مختلف عصاره و اسانس (۳۲، ۱۶، ۸، ۴، ۲) مایکرولیتر به وسیله سمپلر روی هر دیسک قرار داده شد و آب به عنوان شاهد تهیه و به وسیله پنس استریل در سطح آگار قرار داده و به آرامی فشار داده شد تا با سطح آگار به طور کامل تماس پیدا کرده و به آن بچسبد. پلیت ها را در شرایط اپتیم از نظر دما، زمان و ... (37°C در دمای $18\text{-}24\text{h}$) در انکوباتور قرار داده و بعد از انکوباسیون نتایج براساس قطر هاله عدم رشد با استفاده از خط کش بر حسب میلی متر اندازه گیری و ثبت گردید (۶).

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس لیمو به روش تهیه رقت (Broth Microdilution): جهت تعیین حداقل میزان ممانعت کننده (Minimum Inhibitory Concentration) و حداقل میزان کشنده (Minimum Concentration) Bacteriocidal Concentration) تهیه رقت استفاده شد (۸). در یک پلیت ۹۶ خانه ای ابتدا در شش ردیف آن، مقدار 72 میکرولیتر و 9 ردیف افقی دیگر پلیت، 100 میکرولیتر محیط کشت مولرهینتون براث استریل (دو برابر غلظت) افزوده شد. سپس جهت تعیین غلظت های مختلف از عصاره و اسانس لیمو 128 میکرولیتر عصاره و اسانس لیمو به طور جداگانه با سمپلر استریل به شش ردیف اول افزوده شد. سپس با سمپلر استریل 100 میکرولیتر از خانه هشتمن با برداشته و به خانه دوم افزوده شد. این روش تا خانه هشتمن با سر سمپلر های استریل مختلف انجام شد. در انتهای 3 خانه یکی به عنوان شاهد رشد باکتری (فقط حاوی $100\mu\text{L}$ محیط کشت $100\mu\text{L}$ از Stock باکتری) جهت بررسی رشد میکروارگانیسم، دومی به عنوان شاهد ماده ضد میکروبی (فقط حاوی $100\mu\text{L}$ محیط کشت و $100\mu\text{L}$ اسانس و یا عصاره لیمو) جهت بررسی عدم آلوگی میکروبی اسانس و عصاره و سومی به عنوان شاهد محیط کشت که فقط حاوی محیط کشت می باشد، جهت اطمینان از استریل بودن محیط کشت استفاده شد. ضمنا یک کنترل منفی هم که فقط شامل آب بود در نظر گرفته شد. پس از تهیه غلظت های مختلف عصاره و اسانس در چاهکها، سوسپانسیون میکروبی برابر نیم مک فارلند تهیه شد؛ به دلیل اینکه سوسپانسیون میکروبی

بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره (آب) ...

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس لیمو به روش تهیه رقت: میزان MIC و MBC¹ به دست آمده به روش عصاره و اسانس لیمو در مورد میکرووارگانیسم های مورد نظر به شرح جداول شماره 3 و 4 می باشد.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس لیمو ترش به روش انتشار دیسک: نتایج به دست آمده به روش انتشار دیسک شامل قطرهای عدم رشد غلظت های مختلف عصاره و اسانس لیمو به شرح جداول شماره 1 و 2 می باشد.

جدول 3. میزان MIC و MBC عصاره لیمو بر حسب میکرولیتر

در میلی لیتر

		میکرووارگانیسم
MIC (μl/ml)	MBC (μl/ml)	
8	16	استرپتوکوکوس سنگوئیس
16	32	استرپتوکوکوس موتابس
16	32	استرپتوکوکوس پایوزنر
8	16	استرپتوکوکوس گروه B
4	8	لاکتوباسیلوس کازئی
4	8	لاکتوباسیلوس فرمنتوم
4	8	استافیلکوکوس ارئوس
8	16	کاندیدا الیکانس
8	16	کاندیدا گلابراتا

جدول 4. میزان MIC و MBC اسانس لیمو بر حسب میکرولیتر

در میلی لیتر

		میکرووارگانیسم
MIC (μl/ml)	MBC (μl/ml)	
4	8	استرپتوکوکوس سنگوئیس
8	16	استرپتوکوکوس موتابس
4	8	استرپتوکوکوس پایوزنر
8	16	استرپتوکوکوس گروه B
4	8	لاکتوباسیلوس کازئی
4	8	لاکتوباسیلوس فرمنتوم
8	16	استافیلکوکوس ارئوس
16	32	کاندیدا الیکانس
16	32	کاندیدا گلابراتا

جدول 1. قطرهای عدم رشد غلظت های مختلف عصاره لیمو بر

حسب میلی متر

							غلظت آب لیمو (μl)
							میکرووارگانیسم
32	16	8	4	2	1		
18	15	11	-	-	-		استرپتوکوکوس سنگوئیس
18	14	9	-	-	-		استرپتوکوکوس موتابس
15	10	9	-	-	-		استرپتوکوکوس پایوزنر
17	13	8	-	-	-		استرپتوکوکوس گروه B
20	16	14	8	-	-		لاکتوباسیلوس کازئی
20	16	14	8	-	-		لاکتوباسیلوس فرمنتوم
23	20	15	11	-	-		استافیلکوکوس ارئوس
17	15	14	-	-	-		کاندیدا الیکانس
17	15	14	-	-	-		کاندیدا گلابراتا

جدول 2. قطرهای عدم رشد غلظت های مختلف اسانس لیمو بر

حسب میلی متر

							غلظت اسانس لیمو (μl)
							میکرووارگانیسم
32	16	8	4	2	1		
23	20	11	8	-	-		استرپتوکوکوس سنگوئیس
21	16	9	-	-	-		استرپتوکوکوس موتابس
22	17	10	8	-	-		استرپتوکوکوس پایوزنر
17	13	8	-	-	-		استرپتوکوکوس گروه B
24	18	14	10	-	-		لاکتوباسیلوس کازئی
24	18	14	10	-	-		لاکتوباسیلوس فرمنتوم
20	15	12	8	-	-		استافیلکوکوس ارئوس
17	15	14	-	-	-		کاندیدا الیکانس
17	15	14	-	-	-		کاندیدا گلابراتا

در غلظت کم اثر سوزانندگی و سمیت سلولی برای انسان دارد، بنابراین هر ماده اسیدی را نمی توان صرف این که ماده ای ضد میکروبی است برای درمان عفونت های دهان به کار برد در حالی که لیمو ترش با این که دارای pH معادل 4/2 می باشد، همیشه به صورت آب لیمو یا خشک شده آن مورد مصرف عموم بوده و هیچگونه عوارضی از آن گزارش نشده است.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان دهنده این مطلب است که اسانس لیمو ترش را می توان به عنوان یک ماده ضد میکروبی قوی در درمان عفونت های دهانی به کار برد. بنابراین با توجه به رویکرد جهانی به داروهای بیولوژیک و طبیعی و اجتناب از داروهای شیمیایی به دلیل داشتن عوارض جانبی مختلف و زیاد، مطالعه روی مواد ضد میکروبی طبیعی که دارای قدرت بالایی می باشند حائز اهمیت بوده و می تواند جایگزین خوبی برای آنتی بیوتیک در درمان بسیاری از عفونت ها باشد که در این طرح اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره لیمو ترش بر میکروارگانیسم های دهان مورد تایید قرار گرفت.

تشکر و قدردانی

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برای حمایت های مالی و کمک در اجرای این پژوهه تشکر و قدردانی نموده همچنین از جناب آقای حسین جمالی فر که در طول مراحل پژوهه بنده را یاری نمودند نهایت سپاسگذاری را دارم.

References

1. Zargari A. *Pharmaceutical plants*, Tehran University Publications. 1989;1: 488
2. Burt SA. *Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods: a review*. Inter J Food Microbiol. 2004; 94:223-253.
3. Rodrigues A, Sandstrom A, Ca T, Steinsland H, Jensen H, Aaby P. *Protection from cholera by adding lime juice to food—results from community and laboratory studies in Guinea-Bissau, West Africa*. Trop Med Int Health.2000; 5: 418-422.
4. Calabrese V, Randazzo SD, Catalano C, Rizza V. *Biochemical studies on a novel antioxidant from lemon oil and its biotechnological application in cosmetic dermatology*. Drugs Exp Clin Res.1999; 25:219-225.

بحث

در این مطالعه نشان داده شد که اسانس و آب لیمو می توانند اثر ضد میکروبی بر روی پاتوژن های مختلف داشته باشند و لیکن قدرت اثر ضد میکروبی اسانس نسبت به آب لیمو کمی بالاست. در این زمینه تحقیقات زیادی در سایر کشورهای جهان نیز صورت گرفته است. Tomotake و همکارانش در سال 2005 اثر ضد میکروبی آب مرکبات مختلف از جمله لیمو را بر روی سویه های باکتری ویبریو بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که آب مرکبات بر روی همه سویه های ویبریو به ویژه ویبریو پراهمولیتیکوس خاصیت ضد میکروبی دارد و اسید سیتریک مهمترین اسید آلی موثر در خاصیت بازدارندگی از رشد پاتوژن ها می باشد (8). همکارانش در سال 2000 نیز با بررسی خاصیت ضد میکروبی آب لیمو تازه بر علیه باکتری ویبریو کلبرا به نتایج مشابهی دست یافتند (9). Prabuseenivasan و همکارانش در سال 2006 اثر ضد میکروبی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و از جمله اسانس لیمو را بر روی پاتوژن های گرم منفی مثل اشتریشیا کلی ، کلیبسیلا پنومونیه ، سودوموناس آئروجینوزا ، پوتئوس ولگاریس و پاتوژن های گرم مثبت مثل استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس مورد بررسی قرار دادند (10). در این مطالعه نیز اسانس لیمو دارای خاصیت ضد باکتریایی بر روی پاتوژن های مورد تست بود. Martos و همکارانش در سال 2007 اثر ضد قارچی اسانس لیمو ، پرتوکال و گریپ فروت را بر روی تعدادی از قارچ ها از جمله آسپریلیوس نایجر مورد مطالعه قرار دادند و نتایج به دست آمده نشان داد که اسانس این مرکبات می توانند خاصیت ضد قارچی نیز داشته باشند(11). همچنین Martos و همکارانش در تحقیقی دیگر در سال 2008 اسانس مرکباتی همچون لیموترش را بر روی باکتری های مختلف مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که اسانس لیمو می تواند اثر ضد میکروبی بهتری نسبت به سایر مرکبات داشته باشد (12). در این مطالعه نیز با بررسی اثر ضد میکروبی اسانس و عصاره لیمو بر روی پاتوژن های مختلف نتایج مشابهی با موارد ذکر شده به دست آمد به طوری که میزان اثر بازدارندگی اسانس لیمو نسبت به عصاره آن بر روی باکتری های مختلف از جمله استرپتوکوکوس سنگوئیس و استرپتوکوکوس پایپرینز بیشتر بود.

در مقایسه قدرت ضد میکروبی عصاره و اسانس لیمو ترش با اسید های دیگر باید متذکر گردید که بسیاری از اسید ها حتی

5. Manners GD. *Citrus limonoids: analysis, bioactivity, and biomedical prospects.* J Agric Food Chem. 2007; 55(21):8285-94.
6. Takarada K, Kimizuka R, Takahashi N, Honma K, Okuda K, Kato T. *A comparison of the antibacterial efficacies of essential oils against oral pathogens.* Oral Microbiol Immunol. 2002; 19:61-4.
7. Kawaii S, Tomono Y, Katase E. *Antiproliferative effects of the readily extractable fractions prepared from various citrus juices on several cancer cell lines.* J Agric Food Chem. 1999; 47(7):2509-12.
8. Tomotake H, Koga T, Yamato M, Kassu A, Ota F. *Antibacterial activity of Citrus fruit juices against Vibrio species.* J Nutr sci vitaminol. 2006; 52(2): 157-160.
9. Castillo MC, Allori CG, Gutierrez RC, Saab OA, Fernandez NP, Ruiz et al. *Bactericidal activity of lemon juice and lemon derivatives against Vibrio cholerae.* Biol Pharm Bull .2000; 23:1235-1238.
10. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. *In vitro antibacterial activity of some plant essential oils.* BMC Complement Altern Med. 2006; 6: 39.
11. Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Álvarez J. *Antifungal activity of lemon (*Citrus lemon L.*), mandarin (*Citrus reticulata L.*), grapefruit (*Citrus paradisi L.*) and orange (*Citrus sinensis L.*) essential oils.* J food control. 2008; 19(12): 1130-1138.
12. Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Álvarez J. *Antibacterial activity of lemon (*Citrus lemon L.*), mandarin (*Citrus reticulata L.*), grapefruit (*Citrus paradisi L.*) and orange (*Citrus sinensis L.*) essential oils.* J food safety. 2008; 28(4): 567-576.

Archive