

مطالعه تغییرات پلاسمایی بیومارکرهای قلبی-عروقی، سیستاتین C و آدنوزین د‌آمیناز در دیابت ملیتوس القاء شده با آلوكسان در سگ

کاوه عظیم‌زاده

استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

*نویسنده مسئول مکاتبات: kn_az@yahoo.com

(دریافت مقاله: ۹۵/۴/۱۰ پذیرش نهایی: ۹۵/۱/۲۰)

چکیده

دیابت ملیتوس (DM) از بیماری‌های متابولیک بوده که با عوارض متعدد خونی و بافتی همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات پلاسمایی سطح تروپونین قلبی (cTnI)، هموسیستئین (Hcy)، سیستاتین C (Cys-C) و فعالیت آدنوزین د‌آمیناز (ADA) در دیابت ملیتوس القاء شده با آلوكسان در سگ می‌باشد. در این مطالعه، پس از القاء دیابت ملیتوس در گروه تیمار و پس از سه ماه نگهداری، سطح سرمی Cys-C، cTnI و Hcy و فعالیت ADA با استفاده از تکنیک الایزا و الکتروکمی لومینسانس (ECL) در پلاسمای اندازه‌گیری و با گروه سالم مقایسه گردید. در پایان، افزایش معنی دار ($p < 0.01$) در سطوح پلاسمایی Cys-C، cTnI و Hcy با کاهش معنی دار ($p < 0.01$) در فعالیت ADA در گروه تیمار در مقایسه با گروه سالم مشاهده شد. نتایج مطالعه نشان داد در سگ‌های دیابتی آسیب‌های قلبی و کلیوی رخ می‌دهد که لزوم توجه هر چه بیشتر را در مدیریت دیابت سگ‌ها می‌طلبند. همچنین، کاهش فعالیت ADA با افت عملکردی سیستم ایمنی (مخصوصاً سلول‌های T)، با بالا ماندن غلظت آدنوزین جهت تسهیل ورود گلوکز به سلول و کاهش کاتیون روی می‌تواند ارتباط داشته باشد.

کلید واژه‌ها: بیومارکرهای قلبی-عروقی، سیستاتین سی، آدنوزین د‌آمیناز، دیابت ملیتوس، سگ.

مقدمه

عفونت یا بدخیمی‌ها تغییری در سطح Cys-C دیده نمی‌شود (Lassus and Harjola, 2012). در مقابل، کراتینین سرمی معمولاً زمانی که حداقل دو سوم کلیه Bostom *et al.*, 1999 آسیب دیده، افزایش خود را نشان می‌دهد (al., 1999). لازم به ذکر است که عواملی مانند جنسیت، سن، رژیم غذایی و حجم توده عضلانی بدن، غلظت کراتینین خون را تحت تاثیر قرار داده ولی تاثیری در میزان Cys-C ندارد (Lassus and Harjola, 2012). لازم به ذکر است که در دامپزشکی مطالعات مختلفی اهمیت Cys-C را به عنوان یک نشانگر با ارزش در ارزیابی عملکرد کلیه در سگ گزارش کرده‌اند (Jensen *et al.*, 2001; Almy *et al.*, 2002).

پروتئین‌های میوفیبرولار از جمله تروپونین I، C و T تعامل بین اکتین و میوزین را از طریق کلسیم در عضله قلبی و اسکلتی تنظیم می‌کنند (Fartashvand *et al.*, 2013). در میان آنها، تروپونین I قلبی (cTnI) به‌طور اختصاصی در میوکارد وجود داشته و نشانگر با ارزشمندی در آگاهی از آسیب میوکارد در حیوانات است (O'brien *et al.*, 1997). متعاقب افزایش نفوذپذیری کاردیومیوسیت و آسیب آنها، cTnI به خون نشست می‌کند و به عنوان نشانگر بسیار حساس و ارزشمندی برای تشخیص آسیب‌های عضله قلب شناخته شده و همبستگی مثبت بین غلظت cTnI خون Collinson *et al.*, 2007; Adams *et al.*, 1993) و آسیب میوکارد وجود دارد (Leonardi *et al.*, 2008; Fartashvand *et al.*, 2013; Lobettia *et al.*, 2012).

دیابت ملیتوس (DM) متعلق به یکی از بیماری‌های متابولیک است که با هیپرگلیسمی پایدار در گونه‌های جانوری و انسانی مشخص می‌شود (Ugarte *et al.*, 2012). دیابت ملیتوس در سگ و گربه شایع بوده و در سایر حیوانات خانگی به ندرت دیده می‌شود (Herrera *et al.*, 2007). در دهه‌های اخیر به دلیل چاقی، تغذیه نادرست و استفاده از آنتاگونیست‌های انسولین مثل پروژستازن‌ها (مگسترون استات) و گلوکوکورتیکوئیدهای اگروژن (Merrill, 2012)، شیوع دیابت در حیوانات به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است (Sohrabi Haghdoost *et al.*, 2007). دیابت ملیتوس به عنوان یکی از علل مهم در بروز آسیب‌های قلبی و کلیوی شناخته شده و ارزیابی جنبه‌های ناشناخته آن ممکن است در مدیریت دیابت ملیتوس مفید باشد. سیستاتین C (Cys-C) پروتئینی است کوچک با ۱۳ کیلودالتون وزن که به مهارکننده‌های سیستین پروتئاز متعلق است (Villa *et al.*, 2005). این پروتئین در تمام سلول‌های هسته‌دار به طور مداوم تولید شده و به داخل خون آزاد گردیده و نیمه عمر آن ۲ ساعت است (Filler *et al.*, 2005). این پروتئین به طور مستقل توسط گلومرول‌ها در کلیه فیلتر شده و دوباره در توبوهای پروگریمال بازجذب و کاتالیزه می‌شود (Antognoni *et al.*, 2007). CYS-C ارزش‌ترین بیومارکر سرمی در تعیین عملکرد کلیه شناخته شده است و به خصوص، انتخاب خوبی برای آگاهی از میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) در انسان است (Lassus and Harjola, 2012; Rosenthal *et al.*, 2007). علاوه بر این، در شرایط مختلف اعم از التهاب،

بروز کم خونی دارد. علاوه بر این، هیپرهموسيستئینی با چندین مکانیسم، آسیب سلول‌های آندوتیال عروقی را ایجاد می‌کند که شامل: اتوکسیداسیون، افزایش تولید گونه‌های فعال اکسیژن در پلاکت‌ها و تولید هموسيستئین تیولاکتون (فرم فعال هموسيستئین که متعاقب دهیدراسیون هموسيستئین تولید می‌شود) می‌باشد (Rasool, 2012; Tamura, 2002).

نظر به اینکه تاکنون هیچ مطالعه‌ای در زمینه تغییرات پارامترهای فوق (سطوح پلاسمایی Hcy، cTnI، Cys-C و فعالیت ADA) در دیابت ملیتوس سگ گزارش نشده است، از این‌رو بررسی حاضر اولین مطالعه‌ای است که جهت بررسی پارامترهای مذکور و آگاهی از وضعیت سلامتی قلب و کلیه‌ها در سگ‌های دیابتی انجام شده است.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه، ۱۰ قلاده سگ نر نژاد بومی (۲۴/۵۰ \pm ۲/۵۵ کیلوگرم، سن ۱۳-۱۵ ماه) به طور تصادفی به دو گروه مساوی (شاهد و دیابتی) تقسیم شده و در مرکز تحقیقات علوم دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی همراه با قفس تحت شرایط استاندارد و بهداشتی نگهداری شدند. ضمناً دمای محیط در ۲۱-۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت آن در ۴۱ درصد تنظیم گردید. برای پایش و ارزیابی سلامتی سگ‌ها، معاینات معمول کلینیکی و پاراکلینیکی، شامل بررسی نمونه‌های گسترش خون از لحاظ آلودگی به انگل‌های خونی (داخل سلولی و میکروفیلر)، انجام شد و واکسیناسیون هاری همراه با داروی ضد انگل (لوامیزول ۱۰ mg/kg) به همه آنها تجویز شد. پس از گذشت دو

آدنوزین به عنوان یک مهارکننده درونزا و ضروری سیستم ایمنی بدن شناخته شده است که فعالیت سرکوب‌کننگی آن تقریباً در همه سلول‌های سیستم ایمنی بدن مشخص شده است و سطح آن توسط آدنوزین دامیناز (ADA، EC ۳,۴,۴) تنظیم می‌شود آدنوزین (Rodrigues *et al.*, 2012). ADA در تخریب آدنوزین و داکسی آدنوزین به اینوزین و داکسی اینوزین شرکت می‌کند. ADA به عنوان یکی از آنزیم‌های بسیار مهم در بلوغ و تمایز لنفوцит‌های T و سیستم منوسمیتی بوده و همچنین فعالیت آن در سلول‌های T بیشتر از سلول‌های B است (Gopi *et al.*, 2006). لازم به ذکر است که ADA در مکانیسم‌های دخیل در اتساع عروق، رگزایی و تکثیر سلول‌ها شرکت کرده و فعالیت آن در بیماری‌هایی مثل سیروز کبدی، هپاتیت مزمن و سرطان کبد افزایش می‌یابد (Atakisi *et al.*, 2006; Aydin *et al.*, 2010). اگرچه افزایش فعالیت ADA به طور شاخص در سل گزارش شده است، اما همچنین می‌تواند در بیماری‌های دیگر (عفونی و یا غیرعفونی) مانند تب حصبه (تیفوئیدی)، سارکوئیدوز و لوسمی لنفوبلاستی حاد نیز افزایش می‌یابد (Rasoulinejad *et al.*, 2009).

هموسيستئین (Hcy)، به عنوان یک اسید‌آمینه حاوی گوگرد، متعاقب دمتیلاسیون داخل سلولی متیونین تولید می‌شود و ضمناً ثابت شده است که هموسيستئین در آسیب سلول‌های آندوتیال رگ‌ها در حیوانات آزمایشگاهی و بیماری‌های قلبی و عروقی انسان شرکت می‌کند. هیپرهموسيستئینیا (افزایش هموسيستئین در خون) در وقوع استرس اکسیداتیو شرکت کرده و نقش مهمی در اثرات پاتولوژیکی مثل

میزان فعالیت ADA با استفاده از روش الکتروکمی (Elesys, Roche, 2010) تعیین گردید (Glu، Urea، Crea)، کاتیون گلوکز (Glu)، اوره (Urea)، کراتینین (Crea)، کالریمتری با کیت‌های Parsazmoon Co. Tehran، Spekol-1500 (Iran) و با دستگاه اسپکتروفتوомتر اندازه‌گیری گردیدند.

تحلیل آماری داده‌ها

داده‌های به دست آمده به صورت میانگین \pm انحراف معیار ارائه و تعیین تغییرات بین داده‌ها با آزمون t -student با برنامه SAS v9.1 (Cary, NC, USA, SAS) در نظر گرفته شد. معیار معنی‌داری آماری $p < 0.01$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

نتایج پارامترها در جدول ۱ نشان داده شده است. افزایش معنی‌دار ($p < 0.01$) در سطوح سرمی سالم دیده شد. در مقابل، کاهش معنی‌دار ($p < 0.01$) فعالیت پلاسمایی ADA در گروه دیابتی نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید.

هفته جهت عادت به محیط جدید، تست تحمل گلوکز وریدی (IVGTT) برای حصول اطمینان از عدم وجود بیماری دیابت انجام شد و در ادامه پس از یک هفته، محلول آلوکسان (تراتراهیدراته سیگما، آلدربیچ) با دوز 50 mg/kg به صورت تک دوز در آب مقطر استریل به صورت داخل وریدی از طریق ورید سفالیک به گروه (Liu et al., 2002) و IVGTT پس از سه روز انجام شد، سپس وجود دیابت با افزایش قابل توجه گلوکز در خون تأیید گردید. در ضمن هر روز سه نوبت به سگ‌ها سرکشی می‌شد و دوبار خون‌گیری جهت سنجش گلوکز اندازه‌گیری انجام می‌گردید (به میزان ۱ میلی لیتر) تا احیاناً مشکلی از نظر عالیم شوک هایپرگلایسمیک نداشته باشند. پس از سه ماه نگهداری، از همه سگ‌ها (گروه شاهد و دیابتی) پنج میلی لیتر نمونه خون از طریق ورید سفالیک اخذ و به لوله‌های هپارینه انتقال داده شد و با دور 5000 در دقیقه سانتریفیوژ گردید تا نمونه‌های پلاسما جدا شوند. نهایتاً در پایان دوره مطالعه، سگ‌های دیابتی شده با تزریق داخل وریدی یک ویال کامل داروی بیهوده نسدونال، معدوم گردیدند. اندازه‌گیری Cys-C, cTnI و انسولین پلاسما به روش ELISA (RA1000) و به ترتیب با کیت‌های اختصاصی Mybiosource, San diego, USA; Elisa, (سگ)

جدول ۱- مقایسه پارامترهای پلاسمایی بیوکارکرهای قلبی، سیستاتین سی و آدنوزین دامیناز بین گروه دیابتی و سالم

پارامترها	گروه سالم	گروه دیابتی
سیستاتین سی (Cys-C, mg/l)	۰/۲۹ ± ۰/۰۷	۲/۲۲ ± ۰/۳۶ [†]
تروبونین قلبی (cTnI, pg/ml) I	۴۹/۱۲ ± ۷/۰۹	۱۵۲/۸۶ ± ۱۲/۳۷ [†]
هموسیستئین (Hcy, mg/dl)	۵/۸۶ ± ۰/۶۱	۲۱/۴۷ ± ۳/۶۲ [†]
آدنوزین دامیناز (ADA, U/L)	۴۲/۵۹ ± ۴/۸۴	۱۴/۵۲ ± ۱/۷۳ [†]
گلوکز (Glucose, mg/dl)	۹۲/۵۳ ± ۷/۸۷	۲۷۳/۳۸ ± ۱۱/۴۹ [†]
انسولین (Insulin, μU/ml)	۳۸/۵۷ ± ۶/۸۵	۸/۶۴ ± ۱/۸۲ [†]
کراتینین (Creatinine, mg/dl)	۰/۹۲ ± ۰/۲۱	۱/۰۶ ± ۰/۳۴
اوره (Urea, mg/dl)	۳۹/۲۵ ± ۳/۶۴	۴۳/۲۹ ± ۳/۸۴
روی (Zn ²⁺ , μg/dl)	۱۸۹/۶۶ ± ۵/۲۷	۷۲/۴۷ ± ۶/۳۱ [†]

داده‌ها به صورت میانگین±انحراف معیار نشان داده شده است. علامت † نشان‌دهنده وجود تغییرات معنی‌دار در هر ردیف می‌باشد ($p \leq 0.01$).

Yasuda *et al.*, 2003; *a/.., 2009*; *Yasuda et al., 2003*

احتمالاً کاهش فعالیت ADA با شرایط خاص در این بیماری (دیابت ملیتوس) مرتبط باشد. از آنجائی که بیماری دیابت ملیتوس از فاکتورهای مهم در بروز آسیب سلول‌های آندوتیال است و نقش محافظتی آدنوزین در کاهش آسیب سلول‌های آندوتیال عروق و تسهیل ورود گلوکز به سلول مشخص شده است، پس به احتمال زیاد جهت کاهش آسیب سلول‌های فوق و انتقال بهتر گلوکز، غلظت بالای آدنوزین نیاز است و سلول برای نیل به این هدف، فعالیت ADA را کاهش

بحث و نتیجه‌گیری

در این مطالعه فعالیت ADA در گروه دیابتی در مقایسه با گروه سالم به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. ADA در تخریب آدنوزین به اینوزین دخالت دارد. آدنوزین یکی از ضد التهابی‌های قوی بدن است که عملکرد سلول‌های دفاعی دخیل در واکنش‌های التهابی را تنظیم می‌کند و باعث مهار آسیب سلول‌های آندوتیال با واسطه نوتروفیل‌ها شده و تعامل سلول آندوتیال با لکوسیتها را تعدیل می‌کند (Tieles *et al.*, 2004). از طرفی دیگر، یکی از مهم‌ترین وظایف آدنوزین تسهیل ورود گلوکز به داخل سلول می‌باشد (Manjunath *et al.*,

گروه دیابتی نسبت به گروه سالم به طور قابل توجهی بالاتر بود. مطالعه منتشر شده‌ای در رابطه با تغییرات Cys-C در سگ مبتلا به دیابت ملیتوس وجود ندارد. با این وجود، غلظت نرمال سطح کراتینین و اوره همراه با افزایش خفیف غلظت Cys-C در سگ‌هایی که علائم بالینی نارسایی کلیوی را داشتند گزارش شده است (Scallya *et al.*, 2006). در این مطالعه، افزایش Cys-C در گروه DM به احتمال زیاد به دلیل آسیب گلومرولی ناشی از دیابت می‌باشد.

افزایش سطح cTnI پلاسمایی به عنوان بیومارکر اصلی با حساسیت بالا در تشخیص اختلالات کار迪ومیوسیت نسبت به لاكتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین کیناز (CK) کاربرد دارد. در مطالعه حاضر با افزایش قابل توجه غلظت cTnI در مقایسه با گروه سالم مواجه شدیم، مطالعه منتشر شده‌ای در رابطه با تغییرات پلاسمایی غلظت cTnI در سگ دیابتی گزارش نشده است، اما افزایش سطح cTnI به ترتیب در بیماران مبتلا به کتواسیدوز دیابتی و سگ‌های مبتلا به لیشمانيوز گزارش شده است که با پژوهش حاضر مطابقت دارد (Atabek *et al.*, 2004; Silvestrini *et al.*, 2012). آسیب قلبی در مطالعه حاضر ممکن است به علت کم خونی با واسطه دیابت باشد. به دنبال بروز دیابت، کم خونی و کمبود اکسیژن در بافت‌های بدن بارز بوده (Mehdi and Toto, 2009) و آزاد شدن تروپونین‌های قلبی از قبیل cTnI در خون مبتلایان به بیماری ممکن است در اثر ایسکمی رخ دهد که می‌تواند به درجه‌اتی از آسیب میوکارد در گروه دیابتی منجر شود.

می‌دهد تا آدنوزین کمتری تجزیه شود. علاوه بر این، در این مطالعه با کاهش قابل توجه غلظت پلاسمایی کاتیون روی در گروه DM در مقایسه با گروه شاهد مواجه شدیم. ارتباط بین کاتیون روی و ایمنی سلولی (سلول T) مشخص شده است و کمبود آن با کاهش شدید در عملکرد سیستم ایمنی بدن و به طور عمدۀ ایمنی سلولی (لنفوسيت‌های T) همراه است (Honscheid *et al.*, 2009). علاوه بر این، کاتیون روی جزوی از ساختار اصلی ADA بوده و در قسمت فعال آن قرار داشته و در مکانیسم کاتالیزوری آنزیم شرکت می‌کند (Cooper *et al.*, 1997). از این‌رو، ارتباط تنگانگی بین کاتیون روی و فعالیت ADA وجود دارد. بنابراین، یکی دیگر از علل احتمالی کاهش فعالیت ADA در گروه دیابتی می‌تواند ناشی از هیپوزینکمی باشد.

یکی از عوارض اصلی دیابت آسیب کلیوی است. کراتینین سرم و اوره به طور گسترده در ارزیابی عملکرد کلیه استفاده می‌شود، اما حساسیت آنها ناچیز است و به طور کلی تا زمانی که ۷۵ درصد از عملکرد کلیه از بین نرفته باشد آنچنان تغییر نمی‌کند (Kaneko, 2008). از این‌رو، اندازه‌گیری و بررسی آنها برای تشخیص اولیه اختلال در کارکرد کلیوی زیاد کافی به نظر نمی‌رسد. سیستاتین C به عنوان یک بیومارکر مهم در بررسی فیلتراسیون گلومرولی شناخته شده است (Villa *et al.*, 2005). در دامپزشکی، مطالعات محدودی وجود دارد که اهمیت Cys-C را نسبت به کراتینین و اوره در سگ‌های مبتلا به بیماری‌های کلیوی بررسی کرده و Cys-C را به عنوان بیومارکری بهتر از موارد فوق برای بررسی میزان فیلتراسیون گلومرولی نشان داده‌اند (Jensen *et al.*, 2001; Almy *et al.*, 2002;)

مطالعه، در گروه دیابتی کاهش غلظت ویتامین‌ها (بالاخص اسیدفولیک و ب_{۱۲}) منجر به افزایش غلظت Hcy می‌گردد.

در مجموع، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کاهش فعالیت آنزیم ADA می‌تواند نشان‌دهنده افت عملکردی سیستم ایمنی هومورال و یا کمبود کاتیون روى باشد و از طرفی در سگ‌های دیابتی، آسیب‌های قلبی و کلیوی رخ می‌دهد که لزوم توجه هر چه بیشتر به این مقوله را در مدیریت دیابت سگ می‌طلبد.

در رابطه با هموسیستئین (Hcy)، افزایش غلظت آن در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. گزارش منتشرشده‌ای در رابطه با تغییرات سطح خونی Hcy در دیابت سگ وجود ندارد، اما با این وجود افزایش سطح پلاسمایی Hcy در خرگوش‌های مبتلا به دیابت گزارش شده است که علت احتمالی آن کاهش غلظت اسیدفولیک و ویتامین ب_{۱۲} در دوره بیماری می‌باشد (عظیم‌زاده و همکاران، ۱۳۸۸) که با مطالعه اخیر هم خوانی دارد. این احتمال وجود دارد که در این

منابع

• عظیم‌زاده، ک.، عصری رضائی، س.، صافی، ش.، سهرابی حقدوست، ا. و ابراهیمی حامد، م. (۱۳۸۸). ارزیابی وضعیت هموسیستئین پلاسمای دیابت ملیتوس القاءشده با استرپتوزوتوسمین در خرگوش. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دوره ۳، شماره ۲، صفحات: ۴۵۱-۴۴۵.

- Ugarte, M., Brown, M., Hollywood, K.A., Cooper, G.L., Bishop, P.N. and Dunn, W.B. (2012). Metabolomic analysis of rat serum in streptozotocin-induced diabetes and after treatment with oral triethylenetetramine (TETA). *Genome Medicine*, 4: 35.
- Herrera, S.G.J., Vargas, R.L.M. and Bouda, J. (2007). Alterations in hemogram and selected biochemical analytes in diabetic dogs: retrospective study in 40 dogs. *Revista Veterinaria México*, 38(1): 55-62.
- Merrill, L. (2012). *Small Animal Internal Medicine for Veterinary Technicians and Nurses*. UK: Wiley-Blackwell, pp: 256.
- Sohrabi Haghdoost, I., Ghaleshahi, A.J. and Safi, S. (2007). Clinicopathological findings of diabetes mellitus induced by alloxan in goats. *Comparative Clinical Pathology*, 16: 53-59.
- Rohilla, A. and Ali, S. (2012). Alloxan Induced Diabetes: Mechanisms and Effects. *International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences*, 3(2): 819-821.
- Lassus, J. and Harjola, V.P. (2012). Cystatin C: a step forward in assessing kidney function and cardiovascular risk. *Heart Failure Reviews*, 17: 251-261.
- Villa, P., Jiménez, M., Soriano, M.C., Manzanares, J. and Casasnovas, P. (2005). Serum cystatin C concentration as a marker of acute renal dysfunction in critically ill patients. *Critical Care*, 9: 139-143.
- Filler, G., Bokenkamp, A., Hofmann, W., Le Bricon, T., Martinez-Bru, C. and Grubb, A. (2005). Cystatin C as a marker of GFR-history, indications, and future research. *Clinical Biochemistry*, 38: 1-8.
- Rosenthal, S.H., Marggraf, G., Husing, J., Goring, F., Pietruck, F., et al. (2004). Early detection of acute renal failure by serum cystatin C. *Kidney International*, 66: 1115-1122.

- Antognoni, M.T., Siepi, D., Porciello, F., Rueca, F. and Fruganti, G. (2007). Serum Cystatin-C Evaluation in Dogs Affected by Different Diseases Associated or Not with Renal Insufficiency. *Veterinary Research Communications*, 31(1): 269-271.
- Boston, A.G., Gohh, R.Y., Bausserman, L., Hakas, D., Jacques, P.F., Selhub, J., et al. (1999). Serum Cystatin C as a Determinant of Fasting Total Homocysteine Levels in Renal Transplant Recipients with a Normal Serum Creatinine. *Journal of American Society Nephrology*, 10: 164-166.
- Jensen, A.L., Bomholt, M. and Moe, L. (2001). Preliminary evaluation of a particle-enhanced turbidimetric immunoassay (PETIA) for the determination of serum cystatin C-like immunoreactivity in dogs. *Veterinary Clinical Pathology*, 30(2): 86-90.
- Almy, F.S., Christopher, M.M., King, D.P. and Brown S.A. (2002). Evaluation of cystatin C as an endogenous marker of glomerular filtration rate in dogs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 16(1): 45-51.
- Fartashvand, M., Nadalian, M.G., Sakha, M. and Safi, S. (2013). Elevated Serum Cardiac Troponin I in Cattle with Theileriosis. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 27: 194-199.
- O'Brien, P.J., Landt, Y. and Ladenson, J.H. (1997). Differential reactivity of cardiac and skeletal muscle from various species in a cardiac troponin I immunoassay. *Clinical Chemistry*, 43(12): 2333-2338.
- Collinson, P.O. and Gaze, D.C. (2007). Biomarkers of cardiovascular damage and dysfunction – an overview. *Heart Lung Circulation*, 16: 71-82.
- Adams, J.E., Bodor, G.S., Davila-Roman, V.G., Delmez, J.A., Apple, F.S., Ladenson, J.H., et al. (1993). Cardiac troponin I a marker with high specificity for cardiac injury. *Circulation*, 88: 101-106.
- Leonardi, F., Passeri, B., Fusari, A., De Razza, D., Beghi, C., Lorusso, R., et al. (2008). Cardiac Troponin I (cTnI) concentration in an ovine model of myocardial ischemia. *Research in Veterinary Science*, 85: 141-144.
- Lobettia, R.K., Kellerb, K., Kettnerb, F. and Dvirb, E. (2012). NT-ProBNP and cardiac troponin I in virulent canine babesiosis. *Remo Veterinary Parasitology*, 190: 333-339.
- Rodrigues, L.F.S., Emlia, M., Oliveira, F., Teixeira, P.P.M., Cavalcantec, J.M. and Valec, M.R. (2012). Adenosine deaminase activity as a biochemical marker of inflammatory response in goats infected by caprine arthritis–encephalitis virus. *Small Ruminant Research*, 108: 120-126.
- Gopi, A., Madhavan, S.M., Sharma, S.K. and Sahn, S.A. (2007). Diagnosis and treatment of tuberculosis pleural effusion in 2006. *Chest*, 131: 880-889.
- Atakisi, E., Karapehlivan, M., Atakisi, O., Kontas, T. and Marasli, S. (2006). Adenosine deaminase and Biochemical Liver Function Tests in the Dermatophytic Cattle. *Bulletin Veterinary Institute Pulawy*, 50: 481-483.
- Aydin, I., Bulbul, T., Polat, E.S. and Yazar, E. (2010). Serum antioxidant status and adenosine deaminase activity during the gestational period of sheep. *Revue de Medecine Veterinaire*, 161: 479-484.
- Rasoulinejad, M., Mousavi, S.J., Abdollahi, A., Fattahi, F. and Sarbiaei, A. (2009). Serum adenosine deaminase activity and C-reactive protein levels in patients with brucellosis. *Iranian Journal of Pathology*, 4(3): 113-117.
- Liu, S., Wang, W., Luo, X.M. and Ye, B. (2000). Chemically induced (streptozotocin-alloxan) diabetes mellitus in dogs. *Bulletin of Hunan Medical University*, 28: 2125-2128.
- Thiele, A., Kronstein, R., Wetzel, A., Gerth, A., Nieber, K. and Hauschmidt, S. (2004). Regulation of adenosine receptor subtypes during cultivation of human monocytes: role of receptors in preventing lipopolysaccharide-triggered respiratory burst. *Infection Immunology*, 72: 1349-1357.
- Hönscheid, A., Rink, L. and Haase, H. (2009). T-lymphocytes: a target for stimulatory and inhibitory effects of zinc ions. *Endocrine Metabolic Immune Disorders Drug-Targets*, 9: 132-144.

- Cooper, B.F., Sideraki, V., Wilson, D.K., Dominguez, D.Y., Clark, S.W., Quiocho, F.A., *et al.* (1997). The role of divalent cations in structure and function of murine adenosine deaminase. *Protein Science*, 6: 1031-1037.
- Scallya, M.P., Leisewitzb, A.L., Lobettia, R.G. and Thompsonc, P.N. (2006). The elevated serum urea:creatinine ratio in canine babesiosis in South Africa is not of renal origin. *Journal of South African Veterinary Association*, 77(4): 175-178.
- Mehdi, U. and Toto, R.D. (2009). Anemia, Diabetes, and Chronic Kidney Disease. *Diabetes Care*, 32: 7.
- Silvestrini, P., Piviani, M., Alberola, J., Rodríguez, A., Planellas, M., Roura, X., *et al.* (2012). Serum cardiac troponin I concentrations in dogs with leishmaniasis: correlation with age and clinicopathologic abnormalities. *Veterinary Clinical Pathology*, 41(4): 568-574.
- Atabek, M.E., Pirgon, O., Oran, B., Erkul, I. and Kurtoglu S. (2004). Increased cardiac troponin concentration in diabetic ketoacidosis. *Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism*, 17: 1077-1082.
- Kaneko, J.J., Harvey, J.W. and Bruss M.L. (2008). *Clinical Biochemistry of Domestic Animals*. 6th ed., California: San Diego, Academic Press, pp: 490.
- Rasool, S., Abid, S., Iqbal, M.P., Mehboobali, N., Haider, G. and Jafri, W. (2012). Relationship between vitamin B12, folate and homocysteine levels and *H. pylori* infection in patients with functional dyspepsia: A cross-section study. *BMC Research Notes*, 5: 206.
- Tamura, A., Fujioka, T. and Nasu, M. (2002). Relation of Helicobacter pylori infection to plasma vitamin B12, folic acid, and homocysteine levels in patients who underwent diagnostic coronary arteriography. *American Journal of Gastroenterology*, 97:861-866.
- Manjunath, S. and Sakhare, P.M. (2009). Adenosine and adenosine receptors: Newer therapeutic perspective. *Indian Journal of Pharmacology*, 41(3): 97–105.
- Yasuda, N., Inoue, T., Horizoe, T., Nagata, K., Minami, H., Kawata, T., *et al.* (2003). Functional characterization of the adenosine receptor contributing to glycogenolysis and gluconeogenesis in rat hepatocytes. *European Journal of Pharmacology*, 459(2-3): 159-166.

Study of cardiovascular biomarkers, cystatin-C and adenosine deaminase in alloxan-induced diabetes mellitus in the dog

Azimzadeh, A.

Associate Professor, Young Researchers and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

*Corresponding author's email: kn_az@yahoo.com
(Received: 2016/4/8 Accepted: 2016/6/30)

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease which may lead to considerable damages in most tissues. The purpose of this study was to assess whether the levels of serum Cardiac troponin I (cTnI), Homocysteine (Hcy), Cystatin c (Cys-C) and adenosine deaminase (ADA) activity are altered in alloxan induced diabetes mellitus in the dog. In this study, DM was induced by alloxan in the treatment group and three months later, plasma cTnI, Hcy and Cys-C were evaluated by Elisa technique and ADA activity was assessed by Electrochemiluminescence (ECL) method. The results showed significant increases ($p<0.01$) in cTnI and Cys-C along with a considerable decrease in ADA in the treatment group in comparison to the intact healthy group. Conclusively, increased plasma levels of cTnI and Cys-C in dogs with DM indicates heart and kidney damage respectively, which requires effective measures in the management of diabetes mellitus in dogs. Furthermore, reduction of ADA activity can be attributed to the decline of immune system (especially T cells), high levels of adenosine concentrations for facilitation of glucose transport and/or zinc ion decrease.

Key words: Cardiovascular biomarkers, Cystatin C, Adenosine deaminase, Diabetes mellitus, Dog.