



## ارزیابی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه‌ای

مهرنوش علیپور کریم‌آباد<sup>۱</sup>، غلامعلی رنجبر<sup>۲</sup>، سعید خاوری خراسانی<sup>۳</sup> و نادعلی بابائیان جلودار<sup>۴</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، (نویسنده مسئول: mehrnoosh.alipoor@yahoo.com)

۲ و ۴- دانشیار و استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳- استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۲۱ تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۲۴

### چکیده

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و صفات مرتبط با عملکرد ۶۰ هیبرید سینگل کراس ذرت دانه‌ای، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار، در دو شرایط نرمال (۵۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) و تنش خشکی (۸۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که در شرایط نرمال و تنش، اختلاف بین هیبریدها در تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین هیبریدها با روش آزمون چنددامنه‌ای دانکن نشان داد که بالاترین عملکرد دانه در شرایط نرمال مربوط به ترکیب هیبرید L5×k1263/1 با ۱۳/۳۰ تن در هکتار و در شرایط تنش مربوط به هیبرید L10×k1263/1 با ۹/۰۲ تن در هکتار و در شرایط نرمال عملکرد ۱۰/۶۰ تن در هکتار می‌باشد. با توجه به شاخص‌های HARM، GMP، MP و STI از بین هیبریدهای مورد مطالعه، L1×k1263/1، L5×k1263/1 و L10×k1263/1 بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. طول دوره رشد کمتر در این هیبریدها و عدم برخورد دوره گرده افشانی با دماهای بالا می‌تواند دلیلی بر برتری ترکیبات مذکور نسبت به سایرین باشد. نتایج همبستگی‌ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین عملکرد پتانسیل (بدون تنش) با شاخص‌های HARM، GMP، MP و STI، HARM و TOL می‌باشد. بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار بین شاخص‌ها، مربوط به GMP و STI (۰/۹۹) بود. بنابراین هیبریدهای L1×k1263/1، L5×k1263/1، L10×k1263/1 و L14×k1263/1 با توجه به بالا بودن میزان تحمل به خشکی در برنامه‌های اصلاح و معرفی و پیشنهاد هیبریدهای جدید در برنامه‌های اصلاحی می‌توان بهره برد.

واژه‌های کلیدی: ذرت دانه‌ای، تنش خشکی، تجزیه خوشه‌ای، شاخص‌های تحمل

## مقدمه

عملکرد را به همراه داشت.

احمدی و همکاران (۱) در بررسی تحمل به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتي ذرت دانه‌ای در سه رژیم آبیاری نشان دادند که بین هیبریدها از نظر صفات رویشی، مراحل نمو، عملکرد و اجزای آن تنوع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. در این بررسی اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شرایط تنش واکنش منفی نشان دادند و بیشترین اثر تنش بر عملکرد دانه بود که ناشی از کاهش تعداد دانه در ردیف، طول بلال و وزن ۵۰۰ دانه بوده است. خلیلی و همکاران (۹) نیز در بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هشت ژنوتیپ ذرت دیررس در شرایط بدون تنش و تنش در مرحله زایشی و رویشی نشان دادند که بر اساس شاخص‌های GMP و STI هیبریدهایی با عملکرد بالا در هر دو محیط تنش و بدون تنش و با استفاده از شاخص‌های SSI هیبریدهایی با میانگین عملکرد بالا در شرایط تنش انتخاب گردیدند. چوکان و همکاران (۲) در بررسی واکنش ۱۵ هیبرید ذرت به سطوح مختلف تنش و ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام متحمل را شناسایی کردند. در شرایط نرمال، تنش ملایم و تنش شدید هیبرید OSGT14 به ترتیب با عملکرد ۹/۴۴۵، ۹/۲۷۰، ۸/۳۵۲، تن در هکتار و در شرایط تنش خیلی شدید هیبرید SPGT12 با عملکرد ۷/۴۵۵ تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بودند. در این آزمایش از شش شاخص استفاده گردید و شاخص‌های

گیاه ذرت (*Zea mays L.*) گیاهی C4 است که در جهان سومین محصول مهم غذایی بعد از گندم و برنج می‌باشد و غذای اصلی میلیون‌ها انسان است (۶). میانگین بارندگی سالانه ۲۴۰ میلی‌متر، ایران را در زمره کشورهای خشک جهان قرار داده است. آب از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و تولید گیاهان به خصوص در مناطق خشک است. بهبود عملکرد در شرایط خشکی یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح گیاهان می‌باشد. با توجه به اینکه تنش خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی در بخش کشاورزی است، تلاش‌های زیادی برای حفظ عملکرد گیاهان تحت شرایط خشکی صورت گرفته است. درحالی که انتخاب طبیعی، سازوکار مناسبی برای سازگاری و حفظ حیات گیاه در شرایط کم‌آبی می‌باشد ولی هدف اصلاح‌گران انتخاب مستقیم جهت افزایش عملکرد اقتصادی ارقام زراعی می‌باشد (۷).

جعفری و ایمانی (۸) در بررسی اثر تنش خشکی در سه مرحله قبل از گلدهی، زمان گلدهی و زمان پرشدن دانه‌های ذرت به این نتیجه رسیدند که تنش خشکی در هر یک از مراحل فوق باعث کاهش معنی‌دار عملکرد ذرت می‌شود. تنش در مرحله گلدهی بیشترین خسارت را بر عملکرد دانه خواهد داشت و باعث کاهش ۴۲ درصدی عملکرد گیاه شد. تنش در مرحله پر شدن دانه ۱۵/۸ درصد و در مرحله قبل از گلدهی نیز ۱۲/۵ درصد کاهش

براساس آزمون خاک و توصیه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور کود شامل ۲۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم، ۲۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم و ۴۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار بود که تمامی کودهای فسفات و پتاسه به همراه یک چهارم کود ازته در زمان کاشت و مابقی کود ازته بصورت سرک در مرحله ۵-۲ برگی و ۱۰-۱۲ برگی با کودکار پشت تراکتوری مصرف گردید. به منظور جلوگیری از ایجاد غیریکنواختی در بلوکها، ۵۶ ترکیب هیبرید به همراه ۴ رقم شاهد به دو بخش ۳۰ تیماری تقسیم و در دو بلوک در مجاورت هم کشت شدند. در هر آزمایش هر کدام از هیبریدها روی دو خط ۵ متری با تراکم ۷/۶ بوته در متر مربع کشت شد. فاصله بین ردیفهای کشت ۷۵ سانتی متر و بین بوتهها روی هر ردیف ۱۷/۵ سانتی متر در نظر گرفته شد. بنابراین مساحت هر کرت آزمایشی ۷/۵ مترمربع بود.

کاشت بصورت دستی و عمق کاشت بذور ۴ سانتی متر در نظر گرفته شد. عمل وجین علفهای هرز با دست و در مراحل ۴-۶ برگی و ۸-۱۰ برگی انجام شد. آبیاری با استفاده از روش نشتی (شیار سطحی) انجام گردید. در آزمایش شرایط آبیاری کامل، آبیاری برحسب نیاز گیاه انجام گرفت. آبیاری نرمال بر اساس ۷۰ میلی متر و آبیاری شرایط تنش بر اساس ۱۴۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس آ انجام گرفت. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته تا بلال اصلی، ارتفاع بوته تا انتهای تاسل، طول تاسل، تعداد برگ بالای بلال، تعداد کل برگ، سطح برگ بلال و قطر ساقه،

MP، GMP، Harm و STI که دارای بیشترین همبستگی با عملکرد در شرایط نرمال و سطوح مختلف تنش بودند به عنوان شاخصهای برتر معرفی شدند. حاجی بابایی و عزیز (۷) با بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد چند هیبرید جدید ذرت به این نتیجه رسیدند که از هفت شاخص استفاده شده، شاخصهای MP، GMP و STI را با توجه به شرایط نرمال و تنش ملایم و شاخصهای TOL و SSI را با در نظر گرفتن شرایط نرمال و تنش شدید به عنوان بهترین شاخصها برای تعیین ارقام متحمل به تنش کم آبی میان هیبریدهای مختلف ذرت می توان معرفی نمود. این تحقیق با هدف غربالگری و گزینش هیبریدهای ذرت با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش انجام گردید.

### مواد و روشها

این پژوهش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (ایستگاه طرق) در سال ۱۳۹۲ اجرا گردید. تعداد ۶۰ ژنوتیپ ذرت دانه ای (شامل ۵۷ هیبرید ذرت دانه ای به همراه ۳ رقم هیبرید تجاری سینگل کراس کارون، KSC704، مبین به عنوان شاهد) در دو آزمایش جداگانه در شرایط آبیاری نرمال (۵۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) و تنش خشکی (۸۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) مورد بررسی قرار گرفتند.

هر آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار کشت گردید. برای تهیه زمین در پاییز سال قبل شخم عمیق و در بهار شخم نیمه عمیق زده شد. کودهای مصرفی

اندازه‌گیری شدند. در مرحله تنش آبیاری شاخص‌های مربوط به تحمل به خشکی محاسبه گردید. نحوه محاسبه شاخص‌ها بدین صورت بود:

روی ۱۰ بوته تصادفی و وزن هزار دانه با رطوبت ۱۴٪، درصد چوب، طول و قطر بلال، قطر چوب بلال، عمق دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال و عملکرد دانه بودند که روی ۱۰ بلال بطور تصادفی

$$1. Harm = \frac{2(Y_p \times Y_s)}{Y_p + Y_s} \quad 2. SSI = \frac{\left(\frac{Y_s}{Y_p}\right)}{1 - \left(\frac{Y_s}{Y_p}\right)} \quad 3. TOL = Y_p - Y_s$$

$$4. STI = \frac{Y_p \times Y_s}{(\bar{Y}_p)^2} \quad 5. GMP = \sqrt{(Y_p)(Y_s)} \quad 6. MP = \frac{Y_p + Y_s}{2}$$

جدول ۱- مشخصات هیبریدهای جدید استفاده شده در آزمایش سال ۱۳۹۲

مشخصه ژنوتیپ	ردیف	مشخصه ژنوتیپ	ردیف
L1×A679	۳۱	L1×k1263/1	۱
L2×A679	۳۲	L2×k1263/1	۲
L3×A679	۳۳	L3×k1263/1	۳
L4×A679	۳۴	L5×k1263/1	۴
L5×A679	۳۵	L6×k1263/1	۵
L7×A679	۳۶	L7×k1263/1	۶
L8×A679	۳۷	L8×k1263/1	۷
L9×A679	۳۸	L9×k1263/1	۸
L10×A679	۳۹	L10×k1263/1	۹
L11×A679	۴۰	L11×k1263/1	۱۰
L12×A679	۴۱	L13×k1263/1	۱۱
L13×A679	۴۲	L14×k1263/1	۱۲
L14×A679	۴۳	L15×k1263/1	۱۳
L15×A679	۴۴	L16×k1263/1	۱۴
L16×A679	۴۵	L18×k1263/1	۱۵
L17×A679	۴۶	L19×k1263/1	۱۶
L18×A679	۴۷	L20×k1263/1	۱۷
L19×A679	۴۸	L21×k1263/1	۱۸
L20×A679	۴۹	L22×k1263/1	۱۹
L21×A679	۵۰	L23×k1263/1	۲۰
L22×A679	۵۱	L24×k1263/1	۲۱
L23×A679	۵۲	L25×k1263/1	۲۲
L24×A679	۵۳	L26×k1263/1	۲۳
L26×A679	۵۴	L27×k1263/1	۲۴
L27×A679	۵۵	L28×k1263/1	۲۵
L28×A679	۵۶	L29×k1263/1	۲۶
L29×A679	۵۷	L30×k1263/1	۲۷
L31×A679	۵۸	L31×k1263/1	۲۸
k19×k3651	۵۹	کارون	۲۹
KSC704	۶۰	مبین	۳۰

1- Harm: Harmonic mean    2- SSI: Stress Susceptibility Index    Ys: Yield stress    Yp: Yield potential  
 3- TOL: Tolerance Index    4- STI: Stress Tolerance Index    5- GMP: Geometrical Mean Productivity  
 6- MP: Mean Productivity

را می‌توان به علت کاهش تمامی اجزاء عملکرد در شرایط تنش نسبت به نرمال بیان نمود. در بین اجزاء عملکرد بیشترین کاهش در تعداد دانه در ردیف بلال با منفی ۲۵ درصد مشاهده می‌شود.

مقادیر شاخص‌های تحمل به تنش خشکی با توجه به فرمول‌های تعریف شده در جدول ۴ خلاصه شده است که نتایج آن به شرح زیر است:

هرچه مقدار عددی شاخص SSI کوچکتر باشد، شاخص حساسیت به تنش کمتر و تحمل نسبی ژنوتیپ به تنش رطوبتی بیشتر است، عبارتی هر قدر عملکرد در شرایط تنش خشکی نزدیکتر به عملکرد پتانسیل (بدون تنش) باشد، به همان اندازه حساسیت آن هیبرید به خشکی کمتر خواهد بود (۵).

در این پژوهش طبق جدول (۴) مشاهده می‌شود هیبریدهای ۲۳ (-۱۵/۹۲)، ۵۶ (-۱۲/۹۲)، ۴۲ (۰/۳۴)، ۴۴ (۰/۵۴)، ۲۰ (۰/۷۲)، ۸ (۰/۷۷)، ۴۳ و ۵۱ (۰/۸۸)، ۴۱ و ۴۶ (۰/۹۰)، ۱۳ (۰/۹۴)، ۳۶ (۰/۹۸)، کمترین حساسیت را به تنش نشان دادند، در صورتی که رقم هیبرید شماره ۱ و ۶ و ۲۸ به ترتیب با ۱۲۰/۴ و ۲۱/۶ و ۱۴/۷ بیشترین میزان حساسیت به تنش را دارا بودند. ارزیابی ژنوتیپ‌ها با استفاده از شاخص حساسیت به تنش مواد آزمایشی را صرفاً بر اساس مقاومت و حساسیت به تنش دسته‌بندی می‌کند (۱۲). بنابراین شاخص SSI گزینش را بسوی ارقام متحمل و کم بازدهی که دارای تغییرات عملکرد کمتر در هر دو محیط تنش و بدون تنش هستند سوق می‌دهد. در ارزیابی

برای تجزیه واریانس داده‌ها، (Ver 9.1) SAS استفاده شد. برای تجزیه‌های آماری چند متغیره از نرم‌افزار Minitab (Ver 16) استفاده شده است.

## نتایج و بحث

نتیجه مقایسه میانگین هیبریدها با روش آزمون چنددامنه‌ای دانکن (جدول ۲) نشان داد که بالاترین عملکرد دانه در شرایط نرمال مربوط به L4×K1263/1 با ۱۳/۳۰ تن در هکتار و L1×K1263/1 با ۱۱/۵۷ تن در هکتار و در شرایط تنش مربوط به L10×K1263/1 با ۹/۰۲ تن در هکتار می‌باشد.

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که تحت هر دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی بین هیبریدها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد بدست آمده است که حاکی از وجود تنوع کافی از نظر این صفات بین هیبریدها است. تنش بر صفت درصد چوب اثر مثبت داشت که نشان می‌دهد که در شرایط تنش درصد چوب بلال بیشتر از شرایط نرمال بوده است. بیشترین درصد کاهش در شرایط تنش نسبت به نرمال در صفت عملکرد کل (۳۵ درصد) مشاهده شد (جدول ۳). پاک‌نژاد و همکاران (۱۳) در آزمایشی مشابه اعلام کردند که تنش خشکی موجب ۳۷ درصد کاهش عملکرد گردیده است. از آنجایی که عملکرد دانه در ذرت متأثر از تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد کل دانه، عمق دانه و وزن ۳۰۰ دانه می‌باشد لذا کاهش در عملکرد دانه

متحمل‌ترین و حساس‌ترین هیبریدها به تنش بودند. بعلاوه هیبرید L5×k1263/1 عملکرد نسبتا بالایی در هر دو شرایط تنش و بدون تنش داشت. هیبرید شماره ۴۲ با ۳/۴۹ و هیبرید شماره ۱ با ۸/۹۹ به ترتیب حساس‌ترین و متحمل‌ترین هیبریدها به کم‌آبیری بر اساس شاخص میانگین هندسی شناخته شدند. مقدار بالای شاخص STI حاکی از تحمل بیشتر ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی است. اگرچه چون شاخص STI حاصلضرب دو کمیت است و به دلیل خاصیت ضرب اعداد ممکن است برای جفت‌هایی از اعداد که با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند مربع میانگین هندسی یکسان باشد (۱۱). بطور کل این شاخص زمانی قابل اعتماد است که ژنوتیپ دارای عملکرد بالا در شرایط تنش داشته باشد. با توجه به عملکرد دانه هیبریدها، هیبرید شماره ۱ با ۱/۳۹ بیشترین تحمل را به تنش نشان داده است، بعلاوه شاخص HARM نیز برتری هیبرید شماره ۱ با ۸/۹۹ نسبت به سایرین از نظر تحمل به تنش نشان داد، در شرایطی که هیبرید شماره ۴۲ با ۲/۸۱۱ کمترین تحمل را نسبت به تنش توسط این شاخص نشان داد. شایان ذکر است که ترکیب هیبرید شماره ۴۴ از نظر شاخص‌های SSI و TOL نیز متحمل‌تر از سایر ترکیبات و ارقام تجاری مورد بررسی در این تحقیق شناخته شد و می‌تواند به عنوان یک ترکیب امید بخش در برنامه‌های به نژادی مدنظر قرار گیرد.

همبستگی میان شاخص‌های تحمل به خشکی و عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی محاسبه شد. نتایج همبستگی‌ها (جدول ۵)

هیبریدها با استفاده از شاخص TOL، مقدار بالای آن حاکی از تغییرات بیشتر عملکرد هیبریدها در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی است و حساسیت را نسبت به شرایط تنش آب نشان می‌دهد. بر اساس شاخص TOL تحمل نسبی بیشتر متعلق به هیبریدی است که شاخص TOL کمتری داشته باشد و گزینش برای تحمل تنش با حداقل اختلاف بین عملکرد پتانسیل و عملکرد شرایط تنش همراه است (۱۵). رزلی و هامبلین (۱۴) و فرناندز (۴) بیان نمودند که انتخاب براساس شاخص TOL باعث انتخاب ژنوتیپ‌هایی می‌شود که عملکردشان در محیط بدون تنش کم و نیز میانگین بهره‌وری (MP) پائینی دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که هیبریدهای شماره ۵۶، ۲۳، ۱، ۶ و ۲۸ به ترتیب با مقادیر ۰/۴۵۶، ۰/۴۲۶، ۰/۰۷۴، ۰/۳۰۱ و ۰/۴۱۳ متحمل‌ترین و هیبریدهای شماره ۴۴، ۸، ۴۲ و ۴۱ به ترتیب با مقادیر ۶/۰۳۵، ۵/۵۱۹، ۵/۱۵۰ و ۵/۱۲۲ حساس‌ترین هیبریدها بر اساس شاخص TOL نسبت به تنش خشکی می‌باشند. بنابراین شاخص TOL در گزینش هیبریدهای بالاتر از میانگین در شرایط بدون تنش موفق بوده است، ولی در رابطه با شرایط تنش رطوبتی نتوانسته است بنحو مطلوبی عمل نماید. یک شاخص مناسب برای گزینش آن است که منجر به انتخاب ژنوتیپ‌هایی با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش گردد (۱۰). شاخص MP گزینش را بسوی این انتخاب سوق می‌دهد. در این بررسی نیز هیبرید شماره ۱ با ۸/۹۹ و هیبرید شماره ۴۸ با ۴/۰۰۳ بترتیب

هندسی بهره‌وری (GMP)، میانگین هارمونیک (HARM) و شاخص فرناندز (STI) همبستگی بالا، مثبت و معنی‌داری با عملکرد در شرایط بدون تنش (آبیاری بدون تنش) و تنش خشکی نشان دادند، لذا به‌عنوان شاخص‌های برتر معرفی می‌شوند. فررز و همکاران (۴) معتقدند در بررسی واکنش ارقام نسبت به تنش خشکی بایستی بیشترین توجه را به حساسیت عملکرد آنها نسبت به خشکی معطوف کرد.

حاکمی از وجود رابطه قوی مثبت و معنی‌دار بین عملکرد پتانسیل (بدون تنش) با شاخص‌های MP، GMP، STI، TOL و HARM می‌باشد، در حالیکه همبستگی بین عملکرد در شرایط تنش فقط با شاخص TOL رابطه منفی و معنی‌دار ( $r = -0.61^{**}$ ) و با شاخص‌های HARM، GMP، STI، MP و SSI رابطه همبستگی مثبت و بسیار معنی‌دار (به ترتیب ۰/۹۳، ۰/۸۸، ۰/۸۸، ۰/۸۰ و ۰/۴۶) می‌باشد. در این پژوهش از آنجا که شاخص‌های میانگین بهره‌وری (MP)، میانگین

جدول ۲- نتایج مقایسه میانگین هیبریدهای ذرت دانه‌ای با روش آزمون چنددامنه‌ای دانکن در شرایط نرمال و تنش خشکی

S		N		هیبرید		S		N		هیبرید	
a	۶/۰۶	c-m	۱۰/۸۵	۳۱	a	۱۱/۴۱	a-g	۱۱/۵۷	۱		
bcd	۵/۲۳	g-r	۹/۲۶	۳۲	bcd	۸/۰۳	a-i	۱۱/۲۹	۲		
h-r	۴/۴۹	m-t	۸/۳۹	۳۳	h-r	۵/۷۸	g-r	۹/۱۷	۳		
b-h	۵/۴۱	i-r	۸/۹۲	۳۴	b-h	۷/۵۴	ab	۱۳/۳	۴		
b-h	۴/۸۴	j-r	۸/۷۲	۳۵	b-h	۷/۴۸	c-p	۱۰	۵		
bcd	۴/۵۷	h-r	۹/۰۲	۳۶	bcd	۸/۲۶	k-s	۸/۶۷	۶		
d-l	۵/۵۳	n-t	۸/۱۲	۳۷	d-l	۶/۹۰	b-k	۱۱/۰۸	۷		
k-t	۵/۶۴	o-t	۸/۰۵	۳۸	k-t	۵/۴۱	abc	۱۱/۳۱	۸		
b	۵/۲۱	g-r	۹/۲۶	۳۹	b	۹/۰۲	c-n	۱۰/۶	۹		
c-z	۵/۳۰	rst	۷/۲۹	۴۰	c-z	۷/۲۴	c-p	۹/۹۷	۱۰		
d-l	۵/۸۴	a-d	۱۲/۱۹	۴۱	d-l	۶/۹۷	i-r	۸/۸۷	۱۱		
b-h	۲/۲۴	i-r	۸/۸	۴۲	b-h	۷/۴۴	b-m	۱۰/۹	۱۲		
j-t	۴/۶۷	c-p	۱۰/۱	۴۳	j-t	۵/۴۷	a-z	۱۱/۲۳	۱۳		
f-o	۴/۱۰	a-f	۱۱/۷۸	۴۴	f-o	۶/۱۶	g-r	۹/۲	۱۴		
bcd	۳۳/۷	b-k	۱۱/۱۱	۴۵	bcd	۸/۲۵	a-h	۱۱/۴۹	۱۵		
d-l	۵/۸۷	a-e	۱۲/۰۹	۴۶	d-l	۶/۸۱	b-l	۱۰/۹۳	۱۶		
c-k	۵/۹۲	c-q	۹/۸۸	۴۷	c-k	۷/۱۵	d-r	۹/۷۵	۱۷		
d-n	۳/۸۶	t	۶/۲۳	۴۸	d-n	۶/۵۵	i-r	۸/۷۸	۱۸		
h-q	۶/۲۴	c-p	۱۰/۰۹	۴۹	h-q	۵/۹۵	c-p	۱۰/۱۴	۱۹		
p-t	۶/۰۰	l-t	۸/۴۱	۵۰	p-t	۴/۳۸	c-o	۱۰/۴۵	۲۰		
h-r	۴/۲۳	g-r	۹/۱۲	۵۱	h-r	۵/۸۲	e-r	۹/۶۸	۲۱		
d-l	۵/۴۱	f-r	۹/۳۹	۵۲	d-l	۶/۷۳	i-r	۸/۹۴	۲۲		
bc	۶/۰۴	n-t	۸/۱۴	۵۳	bc	۸/۸۵	p-t	۷/۹	۲۳		
m-t	۸/۱۴	g-r	۹/۰۵	۵۴	m-t	۴/۸۷	g-r	۹/۱۱	۲۴		
i-t	۶/۶۴	i-r	۸/۷۷	۵۵	i-t	۵/۶۰	c-p	۱۰/۳۷	۲۵		
j-t	۷/۴۷	st	۶/۳	۵۶	j-t	۵/۴۷	c-q	۹/۸۵	۲۶		
b-h	۶/۵۹	n-t	۸/۱۷	۵۷	b-h	۷/۴۵	i-r	۸/۸۱	۲۷		
b-g	۶/۷۳	e-r	۹/۶۲	۵۸	b-g	۷/۷۲	n-t	۸/۱۵	۲۸		
st	۷/۷۶	b-k	۱۱/۱	۵۹	st	۳/۹۵	q-t	۷/۴۱	۲۹		
b-f	۷/۹۸	a	۱۳/۵۱	۶۰	b-f	۷/۸۱	i-r	۸/۸۸	۳۰		

میانگین‌های با حروف مشترک در هر ستون با استفاده از آزمون چنددامنه‌ای دانکن فاقد تفاوت معنی‌دار آماری در سطح احتمال ۵ درصد می‌باشند.

جدول ۳- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مختلف هیبریدهای ذرت دانه‌ای تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی

صفات	منبع تغییر تکرار		ژنوتیپ		خطا		میانگین	ضریب تغییرات	درصد تغییرات
	درجه آزادی	۲	۵۹	۱۱۸	نرمال	تنش			
تعداد روز تا ظهور ۵۰٪ تاسل	نرمال	۳/۸۸۸	تنش	۱/۸۶۶	نرمال	۳/۸۴۹	۶۸/۷۶۶۶۷	۲/۰۴۲	۲/۶۸۲
تعداد روز تا ظهور ۵۰٪ کاکل	نرمال	۱۶/۷۰۵**	تنش	۹/۶۸۸	نرمال	۱/۸۹۱	۷۴/۲۲۷۷	۱/۹۶۳	۳/۶۹
فاصله بین گرده افشانی و ظهور کاکل	نرمال	۴/۵۳۷*	تنش	۴/۶۲۲	نرمال	۱/۳۴۶	۳/۴۷۲۲۲	۵/۴۶۱۱	۴۰/۵۰۶
ارتفاع بوته تا بلال (cm)	نرمال	۲۶۴/۷۰۰**	تنش	۱۲/۹۲۶	نرمال	۱۹/۱۴۶	۹۲/۶۲۱۸۷	۴/۷۲۴	۷/۲۰۳
ارتفاع بوته تا تاسل (cm)	نرمال	۱۱۹۱/۶۷**	تنش	۲۹۵/۵۶۹	نرمال	۵۵/۹۳۷	۱۹۲/۶۷۹۴	۳/۳۹۸	۶/۷۲۹
تعداد کل برگ	نرمال	۱/۰۷۲**	تنش	-/۲۹۷	نرمال	-/۰۹۱	۱۳/۶۳۱۱۱	۲/۲۱۵	۲/۵۸۲
سطح برگ	نرمال	۶۷۳۶/۹۵*	تنش	۱۲۳/۲۵۵	نرمال	۱۷۷۳۷/۴۳۹**	۵۵۸/۵۹۸۳	۷/۱۸۹	۴/۳۸۵
قطر ساقه (mm)	نرمال	۱۰۲/۶۳۱*	تنش	۲/۹۰۱	نرمال	۱/۸۱۸	۲۴/۱۸۳۳۳	۵/۵۷۶	۵/۴۶۶
وزن هزاردانه بارطوبت ۱۴٪	نرمال	۳۱۰۸/۴۷*	تنش	۱۳/۸۵۶	نرمال	۹۹۳/۸۵۷	۲۲۴/۷۲۱۷	۱۱/۰۳	۱۱/۱۸
طول بلال (cm)	نرمال	-/۴۷۸	تنش	۱۶/۵۱۵**	نرمال	۲/۶۴۹	۱۵/۲۶۲۷۸	۸/۲۳۲	۹/۰۹۷
عمق دانه (mm)	نرمال	۳/۷۵۷**	تنش	۵/۴۱۸*	نرمال	-/۲۲۷	۸/۷۵۷۸۳۳	۴/۵۸۴	۱۲/۶۶
تعداد دانه در ردیف بلال	نرمال	۷۶/۷۶۹*	تنش	۶۷/۰۰۳*	نرمال	۵/۸۷	۴۲/۰۲۸۸۹	۵/۷۶۴	۱۲/۳۶
تعداد ردیف دانه در بلال	نرمال	۱/۲۶۹**	تنش	۰/۰۷۸	نرمال	۰/۲۳	۱۵/۱۴۱۶۷	۳/۰۴۶	۴/۳۵۵
عملکرد نهایی	نرمال	۱۰/۲۳۰*	تنش	۰/۳۲۷	نرمال	۰/۹۴۴	۴/۹۶۰۶۶۷	۱۲/۷۵	۱۳/۹۲

\*\* : معنی‌دار در سطح احتمال ۱٪  
\* : معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪



جدول ۴- شاخص‌های تحمل به تنش خشکی محاسبه شده برای لاین‌های ذرت دانه‌ای در شرایط تنش خشکی

HARM	SSI	GMP	MP	TOL	STI	Ys	Yp	هیرید
۸/۹۹۸	۱۲۰/۴۹۰	۸/۹۹۸	۸/۹۹۸	-۰/۷۴	۱/۳۹۴	۸/۹۶۱	۹/۰۳۶	۱
۷/۳۹۸	۲/۴۵۸	۷/۵۰۶	۷/۶۱۵	۲/۵۷۴	-۰/۹۷۰	۶/۳۳۸	۸/۹۰۲	۲
۵/۵۱۸	۱/۸۸۳	۵/۶۴۳	۵/۷۷۲	۲/۴۲۲	-۰/۵۸۴	۴/۵۶۱	۶/۹۸۲	۳
۶/۸۷۶	۱/۴۸۲	۸/۱۳۹	۸/۴۱۱	۴/۲۴۳	۱/۱۴۱	۶/۳۸۹	۱۰/۵۳۲	۴
۶/۷۷۴	۲/۸۱۱	۶/۸۵۲	۶/۹۳۲	۲/۰۹۳	-۰/۸۰۹	۵/۸۸۵	۷/۹۷۹	۵
۶/۶۸۳	۲۱/۶۸۲	۶/۶۸۵	۶/۶۸۶	-۰/۳۰۱	-۰/۷۷۰	۶/۵۳۶	۶/۸۳۷	۶
۶/۶۲۹	۱/۶۱۰	۶/۸۲۳	۷/۰۲۳	۳/۳۳۸	-۰/۸۰۲	۵/۳۵۹	۸/۶۸۷	۷
۵/۹۴۹	-۰/۷۷۴	۶/۴۶۷	۷/۰۳۱	۵/۵۱۹	-۰/۷۲۰	۴/۲۷۲	۹/۷۹۱	۸
۷/۶۸۵	۶/۰۵۸	۷/۷۰۸	۷/۷۳۰	۱/۱۷۹	۱/۰۲۳	۷/۱۴۱	۸/۳۲۰	۹
۶/۶۰۵	۲/۷۴۸	۶/۶۸۵	۶/۷۶۵	۲/۰۸۳	-۰/۷۷۰	۵/۷۲۴	۷/۸۰۷	۱۰
۶/۱۰۰	۳/۸۵۳	۶/۱۴۰	۶/۱۸۱	۱/۴۲۰	-۰/۶۴۹	۴/۴۷۱	۶/۸۹۱	۱۱
۷/۰۲۴	۱/۹۸۶	۷/۱۷۰	۷/۳۲۰	۲/۹۴۴	-۰/۸۸۵	۵/۸۴۸	۸/۷۹۲	۱۲
۵/۸۱۴	-۰/۹۴۶	۶/۱۹۶	۶/۶۰۳	۴/۵۶۷	-۰/۶۶۱	۴/۳۲۰	۸/۸۸۷	۱۳
۵/۷۸۶	۲/۱۵۸	۵/۸۹۱	۵/۹۹۸	۲/۲۵۷	-۰/۵۹۸	۴/۸۷۰	۷/۱۲۶	۱۴
۷/۵۷۰	۲/۸۱۱	۷/۶۵۸	۷/۷۴۷	۲/۳۴۰	۱/۰۱۰	۶/۵۷۷	۸/۹۱۷	۱۵
۶/۵۴۵	۱/۷۵۶	۶/۷۱۲	۶/۸۸۴	۳/۰۵۱	-۰/۷۷۶	۵/۳۵۸	۸/۴۰۹	۱۶
۶/۵۰۹	۲/۶۷۶	۶/۵۹۱	۶/۶۷۵	۲/۱۰۱	-۰/۷۴۸	۵/۶۲۴	۷/۷۲۵	۱۷
۵/۸۴۱	۲/۸۷۱	۵/۹۰۶	۵/۹۷۲	۱/۷۷۲	-۰/۶۰۱	۵/۰۸۶	۶/۸۵۸	۱۸
۵/۹۱۷	۱/۳۹۴	۶/۱۴۵	۶/۳۷۲	۳/۳۶۴	-۰/۶۵۰	۴/۶۸۹	۸/۰۵۴	۱۹
۴/۹۰۷	-۰/۷۲۲	۵/۳۷۲	۵/۸۸۸	۴/۸۲۰	-۰/۴۹۷	۳/۴۷۸	۸/۲۹۸	۲۰
۵/۷۶۹	۱/۴۲۷	۵/۹۷۴	۶/۱۸۶	۳/۲۱۰	-۰/۶۱۵	۴/۵۸۱	۷/۷۹۱	۲۱
۶/۱۴۶	۲/۷۶۲	۶/۳۲۰	۶/۲۹۴	۱/۹۳۰	-۰/۶۶۶	۵/۳۳۹	۷/۲۵۹	۲۲
۶/۵۶۳	-۱۵/۹۲۱	۶/۵۶۶	۶/۵۷۰	-۰/۴۲۶	-۰/۷۴۳	۶/۷۸۳	۶/۳۵۷	۲۳
۵/۰۲۵	۱/۱۴۱	۵/۲۷۶	۵/۵۳۹	-۰/۳۷۵	-۰/۴۷۹	۳/۸۵۲	۷/۲۲۷	۲۴
۵/۶۶۴	۱/۲۵۱	۵/۹۱۰	۶/۱۶۷	۳/۵۲۲	-۰/۶۰۲	۴/۴۰۶	۷/۹۲۸	۲۵
۵/۵۷۵	۱/۲۴۳	۵/۸۲۰	۶/۰۷۶	۳/۴۸۶	-۰/۵۳۳	۴/۳۳۲	۷/۸۱۹	۲۶
۶/۲۹۷	۶/۴۷۴	۶/۳۱۴	۶/۳۳۰	-۰/۹۰۸	-۰/۶۸۷	۵/۸۷۶	۶/۷۸۴	۲۷
۶/۲۸۶	۱۴/۴۷۳	۶/۲۸۹	۶/۲۹۳	-۰/۴۱۳	-۰/۶۸۱	۶/۰۸۶	۶/۴۹۹	۲۸
۴/۱۳۸	۱/۳۳۷	۴/۳۲۱	۴/۵۱۲	۲/۵۹۸	-۰/۳۲۲	۳/۲۱۳	۵/۸۱۲	۲۹
۶/۷۰۸	۶/۶۷۴	۶/۷۲۴	۶/۷۴۰	-۰/۹۴۰	-۰/۷۷۹	۶/۲۷۱	۷/۲۱۰	۳۰
۶/۰۴۸	۱/۲۰	۶/۳۲۶	۶/۶۱۷	۳/۸۸۲	-۰/۶۸۹	۴/۶۷۶	۸/۵۵۸	۳۱
۵/۲۳۱	۱/۳۳	۵/۴۳۹	۵/۶۵۵	۳/۰۹۵	-۰/۵۰۹	۴/۱۰۷	۷/۲۰۲	۳۲
۴/۸۱۹	۱/۲۶	۵/۰۲۵	۵/۲۴۰	۲/۹۷۰	-۰/۴۳۵	۳/۷۵۵	۶/۷۲۵	۳۳
۵/۲۹۵	۱/۵۳	۵/۴۶۳	۵/۶۳۶	۲/۷۷۳	-۰/۵۱۴	۴/۲۵۰	۷/۰۲۲	۳۴
۴/۸۹۵	۱/۲۱	۵/۱۱۸	۵/۳۵۲	۳/۱۲۶	-۰/۴۵۱	۳/۷۸۹	۶/۹۱۵	۳۵
۴/۸۳۸	-۰/۹۸	۵/۱۴۱	۵/۴۶۳	۳/۶۹۴	-۰/۴۵۵	۳/۶۱۶	۷/۳۱۰	۳۶
۵/۱۷۱	۲/۱۶	۵/۲۶۵	۵/۳۶۱	۲/۰۱۹	-۰/۴۷۷	۴/۳۵۱	۶/۳۷۰	۳۷
۵/۱۸۸	۲/۴۵	۵/۲۶۴	۵/۳۴۱	۱/۸۱۰	-۰/۴۷۷	۴/۴۳۶	۶/۲۴۶	۳۸
۵/۲۴۸	۱/۲۷	۵/۴۷۰	۵/۷۰۱	۳/۲۱۶	-۰/۵۱۵	۴/۰۹۳	۷/۳۰۹	۳۹
۴/۸۴۴	۲/۹۱	۴/۸۹۷	۴/۹۵۰	۱/۴۵۱	-۰/۴۱۳	۴/۲۲۵	۵/۶۷۵	۴۰
۴/۲۶۰	-۰/۹۰	۶/۷۰۲	۷/۱۷۵	۵/۱۲۲	-۰/۷۷۴	۴/۶۱۴	۹/۷۳۶	۴۱
۲/۸۱۱	-۰/۳۴	۳/۴۹۲	۴/۳۳۹	۵/۱۵۰	-۰/۲۱۰	۱/۷۶۴	۶/۹۱۴	۴۲
۵/۰۱۵	-۰/۸۸	۵/۳۷۹	۵/۷۶۸	۴/۱۶۷	-۰/۴۹۸	۳/۶۸۵	۷/۸۵۱	۴۳
۴/۸۰۶	-۰/۵۴	۵/۴۸۵	۶/۲۶۰	۶/۰۳۵	-۰/۵۱۸	۳/۲۴۳	۹/۲۷۸	۴۴
۶/۹۶۸	۲/۱۹	۷/۰۹۱	۷/۲۱۷	۲/۶۸۳	-۰/۸۶۶	۵/۸۷۶	۸/۵۵۸	۴۵
۶/۲۶۱	-۰/۹۰	۶/۷۰۰	۷/۱۷۰	۵/۱۰۶	-۰/۷۷۳	۴/۶۱۷	۹/۷۲۳	۴۶
۵/۷۲۲	۱/۷۵	۵/۸۶۸	۶/۰۱۸	۲/۶۷۱	-۰/۵۹۳	۴/۶۸۲	۷/۳۵۳	۴۷
۳/۷۸۰	۱/۶۲	۳/۸۹۰	۴/۰۰۳	۱/۸۸۸	-۰/۲۶۱	۳/۰۵۹	۴/۹۴۷	۴۸
۶/۰۴۱	۱/۶۷	۶/۲۸۰	۶/۳۸۰	۲/۹۴۲	-۰/۶۶۴	۴/۹۰۹	۷/۸۵۱	۴۹
۵/۵۶۷	۲/۳۸	۵/۶۵۳	۵/۷۴۰	۱/۹۹۰	-۰/۵۵۰	۴/۷۴۵	۶/۷۳۵	۵۰
۴/۴۹۷	-۰/۸۸	۴/۸۲۴	۵/۱۷۵	۳/۷۴۶	-۰/۴۰۱	۳/۳۰۲	۷/۰۴۸	۵۱
۵/۳۲۳	۱/۲۸	۵/۵۴۷	۵/۷۸۰	۳/۲۴۹	-۰/۵۳۰	۴/۱۵۵	۷/۴۰۵	۵۲
۵/۴۳۴	۳/۰۱	۵/۴۹۰	۵/۵۴۶	۱/۵۸۰	-۰/۵۱۹	۴/۷۵۶	۶/۳۳۶	۵۳
۶/۶۸۹	۸/۸۲	۶/۶۹۹	۶/۷۰۹	-۰/۷۲۰	-۰/۷۷۳	۶/۳۴۹	۷/۰۶۸	۵۴
۶/۱۴۵	۲/۱۸	۶/۲۵۴	۶/۳۶۶	۲/۳۷۴	-۰/۶۷۴	۵/۱۷۹	۷/۵۵۳	۵۵
۵/۶۵۴	-۱۲/۹۲	۵/۶۵۸	۵/۶۶۳	-۰/۴۵۶	-۰/۵۵۱	۵/۸۹۱	۵/۴۳۵	۵۶
۵/۷۷۶	۳/۶۵	۵/۸۱۹	۵/۸۶۱	۱/۴۱۳	-۰/۵۸۳	۵/۱۵۵	۶/۵۶۸	۵۷
۶/۲۱۳	۲/۲۶	۶/۳۱۷	۶/۴۲۴	۲/۳۳۶	-۰/۶۸۷	۵/۲۶۱	۷/۵۸۶	۵۸
۶/۹۷۵	۳/۳۵	۷/۰۳۵	۷/۰۹۵	۱/۸۴۵	-۰/۸۵۲	۶/۱۷۳	۸/۰۱۷	۵۹
۷/۹۰۹	۱/۵۰	۸/۱۶۸	۸/۴۳۵	۴/۲۱۰	۱/۱۴۹	۶/۳۳۰	۱۰/۵۴۰	۶۰

جدول ۵- همبستگی بین شاخص‌های تحمل به خشکی هیبریدهای ذرت دانه‌ای

شاخص	HARM	SSI	GMP	MP	TOL	STI	Ys	Yp
Yp	۰/۵۷۸**	۰/۱۵۳ <sup>ns</sup>	۰/۶۸۴**	۰/۷۹۵**	۰/۵۹۱**	۰/۶۸۵**	۰/۲۷۷*	۱/۰۰۰
Ys	۰/۹۳۶**	۰/۴۶۷**	۰/۸۸۷**	۰/۸۰۳**	-۰/۶۶۱**	۰/۸۸۰**	۱/۰۰۰	
STI	۰/۹۷۸**	۰/۴۷۱**	۱/۹۹۱**	۰/۹۸۰**	-۰/۱۷۴ <sup>ns</sup>	۱/۰۰۰		
TOL	-۰/۳۱۰*	-۰/۲۶۶*	-۰/۱۸۱ <sup>ns</sup>	-۰/۰۲۰ <sup>ns</sup>	۱/۰۰۰			
MP	۰/۹۴۹**	۰/۳۹۰**	۰/۹۸۴**	۱/۰۰۰				
GMP	۰/۹۹۰**	۰/۴۰۸**	۱/۰۰۰					
SSI	۰/۴۱۵**	۱/۰۰۰						
HARM	۱/۰۰۰							

\*: معنی‌دار در سطح احتمال ۱٪    \*: معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪    ns: غیرمعنی‌دار

SSI: Stress Susceptibility Index

شاخص حساسیت

GMP: Geometrical Mean Productivity

میانگین هندسی

TOL: Tolerance Index

شاخص تحمل

MP: Mean Productivity

میانگین بهره‌وری

Harm: Harmonic mean

میانگین هارمونیک

Ys: Yield stress

عملکرد تنش

STI: Stress Tolerance Index

شاخص تحمل به تنش

Yp: Yield potential

عملکرد پتانسیل

بطور کلی هیبریدها بر اساس شاخص‌های مختلف در جدول ۶ دسته‌بندی شده‌اند:

جدول ۶- هیبریدهای انتخاب شده براساس شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی

شماره هیبریدهای انتخاب شده	شاخص‌های مختلف
۴ و ۸ و ۴۱ و ۴۶ و ۴۴ و ۱	انتخاب بر اساس YP
۱ و ۹ و ۲۳ و ۱۵ و ۶ و ۵۴	انتخاب بر اساس YS
۴۴ و ۸ و ۴۲ و ۴۱ و ۴۶ و ۲۰	انتخاب بر اساس TOL
۱ و ۶ و ۲۸ و ۵۴ و ۳۰ و ۲۷	انتخاب بر اساس SSI
۱ و ۴ و ۱۵ و ۹ و ۲ و ۱۲	انتخاب بر اساس MP
۱ و ۴ و ۹ و ۱۵ و ۲ و ۱۲	انتخاب بر اساس GMP
۱ و ۴ و ۹ و ۱۵ و ۲ و ۱۲	انتخاب بر اساس STI
۱ و ۴ و ۹ و ۱۵ و ۲ و ۱۲	انتخاب بر اساس HARM

STI بیشترین تحمل به خشکی را در شرایط آب و هوایی مشهد از خود نشان داد، پس از آن هیبریدهای ۴، ۹، ۱۲، ۲ و ۱۵ با این شاخص‌ها متحمل‌ترین هیبریدها شناخته

نتیجه‌گیری نهایی از این آزمایش نشان داد که از بین ۶۰ هیبرید مورد مطالعه، هیبرید L1×k1263/1 با عملکرد ۹/۰۳ تن در هکتار از طریق شاخص‌های MP، GMP، HARM و

والدینشان به‌عنوان والدین تلاقی در اهداف اصلاحی موردنظر استفاده نمود.

### تشکر و قدردانی

از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، ایستگاه طرق مهندس مهدی پور و سرکار خانم مهندس دری تشکر می‌شود. همچنین از جناب آقای مهندس علیرضا هادی‌نژاد، به خاطر مساعدت در امور رایانه‌ای قدردانی می‌شود.

شده‌اند. بطور کلی طول دوره رشد کمتر در این هیبریدها و عدم برخورد دوره گرده‌افشانی با دماهای بالا می‌تواند دلیلی بر برتری ترکیبات مذکور نسبت به سایرین باشد، همچنین صفات قطر بلال و تعداد دانه در ردیف بلال بالاترین همبستگی مثبت و معنی‌دار با عملکرد را داشته‌اند که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم این صفات روی عملکرد دانه هستند و آن را افزایش داده‌اند. لذا با توجه به زیاد بودن فاصله ژنتیکی آنها نیز می‌توانیم از این هیبریدها و

### منابع

1. Ahmadi, J., H. Zeinali Khanghah, M. Rostami and R. Choukan. 2000. Evaluation of drought tolerance in maize hybrids commercially delayed. *Iranian Journal of Agricultural Sciences*, 4: 891-906.
2. Choukan, R., R. Heidari, A. Mohammadi and M.H. Haddadi. 1998. Evaluation of drought tolerance in maize hybrids using indicators of drought tolerance. *Journal of Seed and Plant*, 24: 543-562
3. Fereres, E., C. Gimenez, J. Brenngena, J. Fernandez and J. Domiguez. 1983. Genetic variability of sunflower cultivar in response to drought. *Helia*, 6: 17-21.
4. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection Criteria for assessing plant stress tolerance. In *Proceedings of the international symposium on adaptation of vegetables and other food crop in temperature and water stress*. Taiwan. 13-16 Aug. pp: 257-270.
5. Fisher, R.A. and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. *Australian Journal of Agricultural Research*, 29: 897-912.
6. Golbashy, M., M. Shoa Hosseini, S. Khavari Khorasani, M. Farsi and M. Zarabi. 2009. Effect of drought stress on yield, yield components, morphological traits of single cross and three way cross of corn. *Abstract book of the national conferences on consumption pattern reforms in agriculture and natural resources*. 225 pp.
7. Hajibabaei, M. and F. Azizi. 2011. Evaluation of drought tolerance indices in some new hybrids of corn. *Electronic Journal of Crop Production*, Number III, 139-155.
8. Jaafari, P. and M.R. Imani. 2004. Study of drought stress and plant density on yield and some agronomical traits of maize KSC 301. *Abstracts of the 8th. Iranian Congress of Crop Sciences*. College of Agriculture, Universty of Guilan, Rasht, Iran. 235 pp. (In Persian)
9. Khalili, M., M. Kazemi, A. Moghaddam and M. Shakiba. 2004. Evaluation of drought tolerance indices at different growth stages of late-maturing corn genotype. *Proceeding of the 8<sup>h</sup> Iranian Congress of Crop Science and Breeding*. Rasht, Iran. 298 pp.

- Proceeding of the 8<sup>h</sup> Iranian Congress of Crop Science and Breeding. Rasht, Iran. 298 pp.
10. Moghaddam, A. and M.H. Hadizadeh. 2002. Response of corn (*Zea mays* L.) hybrids and their parental lines to drought using different stress tolerance indices, 18(3): 255-272.
  11. Naderi, A., A. Hashemi Dezfuli, A. Rezaee and GH. Noor Mohammadi. 2000. Analysis of performance indicators to assess the tolerance of crops to environmental stresses and introduces a new index. Seed and Plant, 15: 390-402
  12. Naderi Darbagshahi, M., R. Noormohamadi, G.H. Majidi, A. Darvish, F. Shirani Rad, A.H. and H. Madani. 2004. Effect of drought stress and plant density on the characteristics in line planting safflower in Isfahan. Seed Plant Journal. 20: 281-296.
  13. Pak nejad, F., S. Vazan, J. Ajali, M. Mirakhori and M. Nasri. 2006. Effects of drought stress and irrigation methods on yield, yield components of two maize varieties. Journal of Modern Agriculture, 18: 17-26.
  14. Rosielli, A. and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non- stress environment. Crop Science, 21: 493 pp.
  15. Shirinzade, E., R. Zarghami and M.R. Shiri. 2009. Evaluation of drought tolerance in corn hybrids using drought tolerance indices. Iran Agricultures Researchers, 4-10.

Archive of SID

## Evaluation of Drought Tolerance in Maize Hybrids (*Zea mays* L.)

Mehrnoosh Alipour<sup>1</sup>, Gholamali Ranjbar<sup>2</sup>, Saeed Khavari Khorasani<sup>3</sup> and Nadali Babaeian Jelodar<sup>4</sup>

---

1- M.Sc. Student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University  
(Corresponding author: Mehrnoosh.alipour@yahoo.com)

2 and 4- Associate Professor and Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

3- Assistant Professor, Agriculture Research Center, Khorasan Razavi Province, Mashhad, Iran.

Received: May 11, 2014

Accepted: September 15, 2014

---

### Abstract

This experiment was conducted to study the effects of water deficit stress on morphological traits, yield and yield components of 60 maize single cross hybrids at Torough Agricultural and Natural Resources Research Center located in Mashhad, Iran on 2013. This experiment was laid out in randomized complete block design with three replications. The irrigation treatments were consisted of two irrigation levels (50 and 80 percent allowed water depletion as normal and drought stress, respectively). The result of ANOVA showed significant differences among single cross hybrids for all of measured traits in both conditions. In non-stress or normal condition, hybrids No.4 and in stress condition, hybrids No.9 were the best hybrids for grain yield with 13.30 and 9.02 ton/ha, respectively. According to the indices MP, GMP, STI and HARM among the studied hybrids the promising hybrids No.1 and No.1,4 and 9 were recommended for water stress condition in Mashhad regions. During periods of lower growth in hybrid and non-treated with high temperatures during pollination can cause lead to the compounds than others. The correlation results showed the positive and significant relation between potential for performance (no stress) indices MP, GMP, STI, TOL and HARM. Most significant and positive correlation between the indices was related to GMP and STI (0.99). In general, hybrids L1×k1263/1, L5×k1263/1, L10×k1263/1 and 14×k1263/1 due to the high level of tolerance can be used in breeding programs.

**Keywords:** Cluster analysis, Drought stress, Drought tolerance indices, Maize (*Zea mays* L.)