

ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا چیتی به روش افزایشی

علی نصرالهزاده اصل^{1*}، علی چاوشنقلی²، ابراهیم ولیزادگان¹، رضا ولیلو³ و حمید نصرالهزاده اصل⁴

تاریخ دریافت: 89/9/22 تاریخ پذیرش : 90/12/17

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

3- مرتبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

4- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

* مسئول مکاتبه : E-mail: ali_nasr462@yahoo.com

چکیده

در راستای تحقق کشاورزی پایدار آزمایی به صورت کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا چیتی به روش افزایشی در سال زراعی 1387 در منطقه چاوشنقلی واقع در 10 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خوی اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل 8 تیمار کشت مخلوط افزایشی (آفتابگردان با تراکم 4 بوته در متر مربع + لوبيا چیتی به ترتیب با تراکم های چهار، هشت، 12، 16، 20، 24 و 32 بوته در متر مربع)، همراه با یک تیمار کشت خالص آفتابگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع و یک تیمار کشت خالص لوبيا چیتی با تراکم 40 بوته در متر مربع بودند. نتایج نشان دادند که در آفتابگردان اثر کشت مخلوط روی ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه در واحد سطح کشت معنی دار بود. بیشترین قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه در واحد سطح کشت در تیمار کشت خالص آفتابگردان مشاهده شد. در لوبيا چیتی نیز بیشترین ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد انشعاب در بوته، تعداد نیام در بوته، عملکرد دانه در بوته در حالت کشت مخلوط و در تیمار S3 = کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 10 درصد لوبيا چیتی (چهار بوته در متر مربع) و بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح کشت نیز در تیمار کشت خالص لوبيا چیتی مشاهده شد. بالاترین LER به مقدار 1/353 به تیمار S7، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 50 درصد لوبيا چیتی (20 بوته در متر مربع) تعلق داشت در نتیجه این ترکیب مخلوط با کارایی بیشتری از منابع محیطی استفاده کرده و جهت کشت قابل توصیه است.

واژه های کلیدی: آفتابگردان، کشت مخلوط، لوبيا چیتی، عملکرد و نسبت برابری زمین

Evaluation of sunflower (*Helianthus annus L.*) and pinto bean (*Phaseolus vulgaris L.*) intercropping based on additive method

A Nasrollahzadeh Asl^{1*}, A Chavoshgoli², EValizadegan¹, R Valiloo³ and

V Nasrollahzadeh Asl⁴

Received: 13 December 2010 Accepted: 7 March 2012

¹Assist Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agric, Islamic Azad University, Khoy Branch, Iran.

²MSc Graduated student of Agronomy Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agric, Islamic Azad University, Khoy Branch, Iran

³Member of Academic Board., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khoy Branch, Iran.

⁴Member of Academic Board., Payame Noor University, Iran

*Corresponding author: E-mail: ali_nasr462@yahoo.com

Abstract

In order to achieve sustainable agricultural systems, a field experiment was conducted at chavoshgoli region; 10 Km south-west of khoy city in 2007, as monocropping and intercropping of sunflower and pinto bean in additive method. The experiment carried out using randomized complete block design with three replications and 10 treatments. The treatments were as follows: Eight treatments of additive intercropping (with densities of 4 plants/m² for sunflower and 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28 and 32 plants/m² for pinto bean), one sole cropping of sunflower (4 plants/m²) and one sole cropping of pinto bean (40 plants/m²). For sunflower, the results showed that the effect of intercropping was significant on plant height; diameter of head; number of seed per head and grain yield. The maximum diameter of head; number of seed in head and seed yield per unit were obtained from sole cropping of Sunflower. For pinto bean the maximum plant height; number of leaves and branches per plant; number of pods per plant; grain yield per plant were obtained from S3 treatment (sunflower with density of 4 plants/m² + pinto bean with density of 4 plants/m²) and Maximum grain yield per unit was obtained from sole cropping treatment of pinto bean. The maximum LER (1.353) was obtained for S₇ treatment (sunflower with density of 4 plants/m² + pinto bean with density of 20 plants/m²). We can infer that these two crops have used more environmental resources and this treatment (S₇) was, therefore recommended at the best intercropping pattern in this experiment.

Key words: Intercropping, Pinto bean, Sunflower, Yield and LER

در حالت کشت مخلوط میزان سود مندی نسبت به کشت خالص آن‌ها بیشتر شد.

سینگ (2007) اعلام کرد با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا مقدار LER به ۱/۲۵ رسید. سادی و المتولی (2009) اعلام کردند که با کشت مخلوط آفتابگردان و سویا مقدار LER به ۱/۳۷ رسید. اهداف پژوهش در این آزمایش شامل بررسی عملکرد کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، تعیین سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، تعیین بهترین تراکم لوبيا به عنوان محصول ثانوی در کشت مخلوط با آفتابگردان جهت دستیابی به حداکثر سودمندی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی ۱۳۸۷ در منطقه چاوشقلی واقع در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان خوی اجرا شد. خاک محل اجرای آزمایش، جزو خاک‌های لومی و pH حدود ۷/۸ می‌باشد. ارتفاع این منطقه از سطح دریا ۱۱۰۳ متر و طول و عرض جغرافیایی آن به ترتیب ۴۴°، ۵۴' شرقی و ۲۹°، ۳۸' شمالی است. آزمایش بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و سه تکرار در سال ۱۳۸۶ انجام شد. تیمارها شامل هشت تیمار کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان (با تراکم چهار بوته در متر مربع) و لوبيا چیتی (با تراکم‌های چهار، هشت، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸ و ۳۲ بوته در متر مربع)، همراه با یک تیمار کشت خالص آفتابگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع و یک تیمار کشت خالص لوبيا چیتی با تراکم ۴۰ بوته در متر مربع را شامل می‌شود. تیمارها به ترتیب زیر نامگذاری شدند:

S1 = کشت خالص آفتابگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع.

S2 = کشت خالص لوبيا چیتی با تراکم ۴۰ بوته در متر مربع.

S3 = کشت مخلوط ۱۰۰ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + ۱۰ درصد لوبيا چیتی (چهار بوته در متر مربع).

مقدمه

کشت مخلوط، عبارت از کشت دو یا چند گیاه در یک قطعه زمین و در طول یک سال زراعی است (سالیوان 2003). کشت مخلوط در سطح وسیعی از کشورهای پیشرفته و نیز در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مناطق حاره رایج است (بایوم و همکاران 2002). در چین حدود یک سوم مناطق زراعی به صورت روش‌های مختلفی از کشت مخلوط، اجرا می‌شود و در حدود نیمی از کل عملکرد گیاهان دانه‌ای از طریق کشت مخلوط به دست می‌آید (زانگ و لی 2003). کشت مخلوط دارای کارایی بالا در استفاده از عوامل محیطی و حفاظت بیشتر محصولات در مقابل نامالیمات طبیعی است (نجوکو و همکاران 2007). در کشت‌های مخلوط ذرت با لوبيا و آفتابگردان با لوبيا مقدار علف‌های هرز، بیشتر از کشت خالص هر یک از اجزای کشت مخلوط کنترل می‌گردد (جوانشیر و همکاران 1379). استفاده از لگوم‌ها در کشت مخلوط موجب تثبیت بیولوژیکی نیتروژن می‌شود، مصرف کود نیتروژن کاهش می‌یابد و بر اثر آن از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می‌گردد (الیجاه و آکوندا 2001). این عقیده وجود دارد که علت افزایش عملکرد کشت مخلوط بقولات و غیر بقولات، عبارت از متفاوت بودن تغذیه آن‌ها از نیتروژن است. بدین ترتیب که بقولات از نیتروژن جوی و غیر بقولات از نیتروژن موجود در خاک تغذیه می‌کند و در نتیجه رقابت دو گونه از لاحاظ نیتروژن کاهش می‌یابد (هاگاردنسون و جنسون 2001). دیل و مولدر (1982) اعلام کردند که در کشت مخلوط ذرت و لوبيا، بدون استفاده از کود نیتروژن، ۷۲ درصد افزایش عملکرد دانه ذرت در حالت مخلوط نسبت به حالت تک کشتی ذرت، به دلیل انتقال نیتروژن از لوبيا به ذرت صورت می‌گیرد. کشت مخلوط آفتابگردان و ذرت باعث افزایش تولید در واحد سطح شده است (توحیدی نژاد و همکاران 1383). مورالس و فرانکومورا (2009) طی آزمایشی اعلام کردند که با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا از منابع محیطی با کارایی بیشتری استفاده گردید و مقدار LER به ۱/۸۰ رسید. رشید و همکاران (2002) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که

روز است. عملیات کاشت آفتابگردان و لوبيا چیتی بطور همزمان در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1387 انجام گرفت. بذرهای آفتابگردان و لوبيا چیتی قبل از کاشت توسط قارچ کش بنومیل 50 درصد با دز سه در هزار ضد عفنونی شدند. هر کرت آزمایشی شامل پنج جوی و پشتنه با فواصل 70 سانتی متر و به طول پنج متر بود. بذرهای آفتابگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع در وسط پشتنه و در عمق حدود هفت سانتی متر کشت شدند. بذر های لوبيا چیتی نیز با تراکم 40 بوته در متر مربع با ایجاد دو شیار موازی به فاصله حدود 30 سانتی متر در روی پشتنه در داخل شیارهای دو طرف پشتنه و به عمق حدود چهار سانتی متر کشت شدند. در حالت کشت مخلوط نیز بعد از کاشت آفتابگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع، بذرهای لوبيا چیتی نیز با تراکم های چهار، هشت، 12، 16، 20، 24، 28 و 32 بوته در متر مربع با کدن حفره هایی به عمق حدود سه سانتی متر در طرفین پشتنه ای که آفتابگردان کاشته شده بود کشت شدند و در هر حفره سه عدد بذر لوبيا چیتی قرار داده شد. بعد از سبز شدن محصولات و در مرحله چهار پرگی، بوته های آفتابگردان و لوبيا چیتی تنک شدند و فقط یک بوته سالم و قوی نگه داشته شد. اندازه گیری صفات مختلف آفتابگردان شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه در طبق، وزن صد دانه و برای لوبيا چیتی نیز صفات مختلف از قبیل ارتفاع بوته، تعداد انشعاب در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد نیام در بوته و تعدد دانه در نیام با انتخاب هشت بوته بطور تصادفی از ردیف های وسط هر کرت اجرا شدند و میانگین این صفت ها برای هر دو گیاه محاسبه شد. برداشت هر دو محصول آفتابگردان و لوبيا چیتی، تا حدودی بطور همزمان انجام گرفت. عملکرد اقتصادی هر دو گیاه پس از حذف اثر حاشیه ها (ردیف های کناری و نیم متر از طرفین ردیف های وسطی) در سطح چهار متر مربع محاسبه شد. برای تعیین وزن صد دانه برای آفتابگردان و لوبيا چیتی، از محصول دانه هر محصول، چهار نمونه 100 تایی بصورت تصادفی انتخاب و پس از توزیع، میانگین وزن صد دانه برای هر کرت آزمایشی محاسبه گردید.

$S4 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 20 \text{ درصد لوبيا چیتی (هشت بوته در متر مربع).}$

$S5 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 30 \text{ درصد لوبيا چیتی (12 بوته در متر مربع).}$

$S6 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 40 \text{ درصد لوبيا چیتی (16 بوته در متر مربع).}$

$S7 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 50 \text{ درصد لوبيا چیتی (20 بوته در متر مربع).}$

$S8 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 60 \text{ درصد لوبيا چیتی (24 بوته در متر مربع).}$

$S9 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 70 \text{ درصد لوبيا چیتی (28 بوته در متر مربع).}$

$S10 = \text{کشت مخلوط } 100 \text{ درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع)} + 80 \text{ درصد لوبيا چیتی (32 بوته در متر مربع).}$

قبل از کاشت طبق آزمون خاک میزان 150 کیلوگرم سوپرفسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 100 کیلوگرم کود اوره که نصف آن در این مرحله و بقیه کود اوره نیز به صورت سرک به کار برده شد. کاشت به صورت جوی و پشتنه و با فواصل 70 سانتی متر انجام شد. بعد از کاشت به فاصله هر 10 روز یکبار آبیاری بصورت نشتشی انجام گرفت. بذر آفتابگردان از نوع آجیلی از توده محلی شهرستان خوی با درصد جوانه زنی بالای 95 درصد بود که رقمی نیمه دیررس، دارای ساقه کلفت و بدون انشعاب، برگ های درشت، دمبرگ بلند و با طول دوره رشد 130 روز است. بذر لوبيا چیتی نیز از نوع محلی سرابی بود که در سراب به نام لوبيا چیتی آغ گون معروف است. رقمی نیمه رونده، گل ها به رنگ صورتی مایل به سفید با درصد جوانه زنی بالای 95 درصد و با طول دوره رشد حدود 120

نتایج و بحث

ارتفاع بوته آفتابگردان

اثر تیمار کشت بر ارتفاع بوته معنی دار بود (جدول 1). بالاترین ارتفاع بوته آفتابگردان در تیمار S10، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 80 درصد لوبيا چیتی (32 بوته در متر مربع) حاصل گردید (جدول 2). به علت بالا بودن تراکم گیاهی در این تیمار رقابت نوری افزایش یافته و در اثر آن ارتفاع بوته آفتابگردان بیشتر شده است. ایبرار و همکاران (2000) و رشید و همکاران (2002) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که در حالت کشت مخلوط ارتفاع آفتابگردان نسبت به کشت خالص افزایش یافت.

در نهایت داده ها توسط نرم افزار MSTATC

برای هرگونه زراعی مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و مقایسه میانگین ها در سطح احتمال 5 درصد توسط آزمون دانکن صورت گرفت. برای ارزیابی سودمندی کشت مخلوط نیز از شاخص نسبت برابری زمین یا LER استفاده گردید که این شاخص از رابطه زیر حاصل می‌گردد:

$$LER = \frac{y_{ab}}{y_{aa}} + \frac{y_{ba}}{y_{bb}}$$

y_{ab} = عملکرد گونه a در کشت مخلوط با گونه b

y_{aa} = عملکرد گونه a در کشت خالص

y_{ba} = عملکرد گونه b در حالت کشت مخلوط با گونه a

y_{bb} = عملکرد گونه b در حالت کشت خالص

اگر LER بزرگتر از یک باشد، کشت مخلوط از کشت خالص بهتر خواهد بود (ظاهری 1373).

جدول 1 - تجزیه واریانس صفات آفتابگردان در کشت مخلوط و خالص

متغیر	درجه آزادی	ارتفاع بوته در بوته	تعداد برگ	قطر طبق طبق	وزن صد دانه واحد سطح کشت	تعداد دانه در واحد دانه در	میانگین مربعات
تکرار	2	0/007	0/024	0/441	36199/593	6/481	16281/481
تیمار	8	0/023**	2/909	10/ 554*	79905/ 83*	8/565	83145/37*
اشتباه آزمایشی	16	0/004	2/048	4/020	30251/468	16/898	31321/065
CV%		6/10	7/73	9/87	14/58	11/64	16/82

* و ** به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 و 5 درصد.

ساهو و همکاران (2004) با کشت مخلوط آفتابگردان و بادام زمینی و سینگ (2007) با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که تعداد برگ های آفتابگردان تحت تاثیر قرار نگرفت.

تعداد برگ در بوته آفتابگردان

اثر تیمار کشت بر تعداد برگ در بوته آفتابگردان معنی دار نشد (جدول 1). از آنجاییکه این صفت بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی می باشد، لذا کشت مخلوط تاثیری روی این صفت نداشته است.

در اثر آن رشد طبق کاهش یافته و از قطر آن کاسته شده است. بوج جینا ایج و همکاران (1991)، ایبرار و همکاران (2000) و مورالس و همکاران (2009) نیز با کشت مخلوط آفتاگردان و لوبيا اعلام کردند که در کشت مخلوط رقابت برون گونه‌ای نسبت به رقابت درون گونه‌ای افزایش یافت و در اثر آن رشد بوته و قطر طبق آفتاگردان کاهش یافت که نتایج حاصل با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

قطر طبق

اثر تیمار کشت بر قطر طبق در بوته آفتاگردان معنی دار شد (جدول 1). بیشترین قطر طبق در تیمار S1 کشت خالص آفتاگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع مشاهده شد (جدول 2). در حالت کشت مخلوط، لوبيا به علت فرم رشدی رونده از بوته آفتاگردان بالا رفته و با سایه اندازی روی برگهای آفتاگردان، مقدار فتوسنترز این گیاه را کاهش داده و مقدار ماده فتوسنترزی کمتری به بخش زایشی (طبق) آفتاگردان منتقل شده و

جدول 2- میانگین صفات مورد اندازه گیری آفتاگردان در کشت مخلوط و خالص

تیمار	ارتفاع بوته (سانتی متر)	تعداد برگ در بوته	تعداد دانه در طبق	قطر طبق (سانتی متر)	وزن صد دانه (گرم)	عملکرد دانه در واحد سطح (گرم در متر مربع)
S1	289/3d	39/17a	1505a	30/12a	21/73 a	632/4 a
S2						
604/5 ab	292/3d	38/29a	1439ab	28/72ab	21/12 a	21/5 ab
S3						
566/2 ab	294/10cd	38/62a	1361 ab	27/53abc	21/66 a	21/2 ab
S4						
554/2 ab	300/30bcd	38/25 a	1332 ab	27/11abc	20/19 a	20/2 ab
S5						
527/5 ab	304/7 abc	37/08 a	1280b	26/39abc	20/12 a	20/5 ab
S6						
512/6 ab	305/7 abc	37/58 a	1244b	26/06bc	21/34 a	21/3 ab
S7						
494/4 ab	306/3 ab	37/25 a	1212 bc	25/61bc	20/09 a	20/0 ab
S8						
471/8 b	308/7ab	37/21 a	1156 bc	24/91bc	19/47 a	19/4 b
S9						
S10	316/11 a	36/94 a	1092 c	24/12c	18/86 a	443/3 b

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختلاف معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد است.

اندازی روی برگهای آفتاگردان، رشد طبق را کاهش داده بود بنابراین در اثر آن از تعداد دانه در طبق کاسته شده است. بوج جینا ایج و همکاران (1991) و مورالس و همکاران (2009) نیز با کشت مخلوط آفتاگردان و لوبيا اعلام کردند که در کشت مخلوط رقابت برون گونه‌ای افزایش یافت و در اثر آن قطر و تعداد دانه در طبق آفتاگردان کاهش یافت.

تعداد دانه در طبق

اثر تیمار کشت بر تعداد دانه در طبق آفتاگردان معنی دار شد (جدول 1). بیشترین تعداد دانه در طبق در تیمار S1، کشت خالص آفتاگردان با تراکم چهار بوته در متر مربع مشاهده شد (جدول 2). از آنجاییکه در حالت کشت مخلوط لوبيا به علت فرم رشدی رونده از بوته آفتاگردان بالا رفته و با سایه-

در صد لوبيا چیتی (چهار بوته در متر مربع) مشاهده شد (جدول 4). از آنجایی که در اين تيمار تراكم لوبياچیتی در واحد سطح پايین تر از ساير تيمارها بود بنابراین با کاهش رقابت درون گونه‌ای فضای بيشتری برای رشد و گسترش بوته‌های لوبياچیتی فراهم شد و همچنين لوبيا به دليل فرم رشد رونده از آفتابگردان به عنوان قيم استفاده کرد و رشد خود را افزایش داد و به تبع آن ارتفاع بوته لوبياچیتی افزایش یافت. يوج جينايلج و همكاران (1991) با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا چشم بلبلی اعلام کردند که در حالت کشت مخلوط، لوبيا از آفتابگردان به عنوان قيم استفاده کرده و ارتفاع خود را افزایش می دهد.

تعداد برگ و انشعاب در بوته

اثر تيمار کشت بر تعداد برگ و انشعاب در بوته لوبيا چیتی در سطح احتمال يک درصد معنی دار شد (جدول 3). بالاترین تعداد برگ و انشعاب در بوته لوبيا چیتی در تيمار S3، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) مشاهده شد (جدول 4). زيرا با کاهش تراكم لوبيا رقابت درون گونه‌ای کاهش یافته و فضا برای رشد بيشتر لوبيا فراهم شده و هم چنين در حالت کشت مخلوط افزایشی لوبيا به دليل فرم رشد رونده، از آفتابگردان به عنوان قيم استفاده کرده و رشد خود را افزایش داده و به تبع آن تعداد برگ و انشعاب در بوته لوبيا چیتی افزایش یافته است. يوج جينايلج و همكاران (1991) و رشید و همكاران (2002) اعلام کردند که در کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان و لوبيا، لوبيا از آفتابگردان به عنوان قيم استفاده کرد و تعداد برگ، تعداد انشعاب و ارتفاع خود را به طور معنی داري افزایش داد. جادوسکي و همكاران (2000) نيز در آزمایشي با تراكم‌های مختلف لوبيا اعلام کردند که با کاهش تراكم به علت کاهش رقابت درون گونه‌اي، تعداد برگ و تعداد انشعاب در بوته لوبيا افزایش می یابد.

وزن صد دانه آفتابگردان

اثر تيمار کشت بر وزن صد دانه آفتابگردان معنی دار نشد (جدول 1). از آنجاییکه وزن صد دانه بيشتر تحت تاثير ژنتوپ قرار دارد در نتيجه تحت تاثير کشت مخلوط قرار نگرفته است. ساهو و همكاران (2003) با کشت مخلوط آفتابگردان و بادام زميني و مورالس و همكاران (2009) نيز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که وزن صد دانه آفتابگردان تحت تاثير کشت مخلوط قرار نگرفت.

عملکرد دانه در واحد سطح کشت

اثر تيمار کشت بر عملکرد دانه در واحد سطح کشت آفتابگردان معنی دار شد (جدول 1). بيشترین عملکرد دانه در واحد سطح کشت در تيمار S1، کشت خالص آفتابگردان با تراكم چهار بوته در متر مربع مشاهده شد (جدول 2). در حالت کشت مخلوط لوبيا به علت فرم رشدی رونده با سایه اندازی روی برگهای آفتابگردان از نظر رقابتی به آفتابگردان غلبه کرد و قطر طبق و تعداد دانه در طبق و به تبع آن عملکرد آفتابگردان در کشت های مخلوط نسبت به کشت خالص 17/5 درصد کاهش یافت. کاندهرو و همكاران (2007) طی آزمایشي با کشت مخلوط آفتابگردان و ماش اعلام کردند که به علت افزایش يافتن رقابت برون گونه اى، عملکرد آفتابگردان در حالت کشت مخلوط نسبت به کشت خالص 22 درصد کاهش یافت. مورالس و همكاران (2009) نيز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که در کشت مخلوط رقابت برای منابع به ويزه نور افزایش یافته و عملکرد آفتابگردان کاهش می یابد.

لوبيا چیتی

ارتفاع بوته لوبيا چیتی

اثر تيمار کشت بر ارتفاع بوته لوبيا چیتی در سطح احتمال يک درصد معنی دار شد (جدول 3). بالاترین ارتفاع بوته در تيمار S3، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 10

جدول 3- تجزیه واریانس صفات لوبيا چیتی در کشت مخلوط و خالص

میانگین مربعات											منابع تغییرات	آزادی	درجه
عملکرد دانه در واحد سطح کشت	عملکرد دانه در بوته	وزن صد دانه	تعداد نیام در بوته	تعداد دانه در بوته	تعداد نیام در بوته	تعداد انشعباب در بوته	تعداد برگ در بوته	ارتفاع بوته					
84/893	0/444	8/333	0/005	0/249	2/794**	87/779**	0/044	2	نکرار				
13436/510**	26/415**	18/750	0/020	8/423**	2/145**	61/626**	0/193**	8	تیمار				
1587/255	2/449	12/500	0/047	1/187	0/395	9/853	0/022	16	اشتباه آزمایشی				
18/17	16/54	8/53	6/74	11/76	12/89	9/83	7/67	-	CV%				

** و * به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 و 5 درصد.

همچنین در کشت مخلوط افزایشی خردل و نخود نیز مقدار عملکرد دانه در بوته نخود، از طریق افزایش تعداد نیام ها به مقدار 40 درصد نسبت به کشت خالص آن افزایش یافت (مظاهری 1373).

جادوسکی و همکاران (2000) در آزمایشی بر روی تراکم‌های مختلف لوبيا اعلام کردند که با کاهش تراکم، رقابت برای نور و مواد غذایی کاهش یافته و تعداد نیام در بوته افزایش می‌یابد.

تعداد دانه در نیام

اثر تیمار کشت بر تعداد دانه در نیام لوبيا چیتی معنی دار نشد (جدول 3). یوج جینایج و همکاران (1991) و رشید و همکاران (2002) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که در حالت کشت مخلوط، تعداد دانه در نیام لوبيا تحت تاثیر واقع نشد. شفشك و همکاران (1989) نیز با کشت مخلوط سویا و آفتابگردان، اعلام کردند که تعداد دانه در نیام سویا تحت تاثیر قرار نگرفت. کاروتز و همکاران (2000) با کشت مخلوط ذرت و لوبيا اعلام کردند که تعداد دانه در نیام لوبيا تحت تاثیر واقع نمی‌شود.

تعداد نیام در بوته

اثر تیمار کشت بر تعداد نیام در بوته لوبيا چیتی در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد (جدول 3). بالاترین تعداد نیام در بوته لوبيا در تیمار S3، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 10 درصد لوبيا چیتی (چهار بوته در متر مربع) مشاهده شد (جدول 4). از آنجاییکه بیشترین تعداد انشعباب در این تیمار قرار داشت به تبع آن تعداد نیام در بوته افزایش یافت.

یوج جینایج و همکاران (1991) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا به روش افزایشی اعلام کردند که در کشت مخلوط، لوبيا از آفتابگردان به عنوان قیم استفاده کرده و عملکرد دانه لوبيا افزایش یافت و از بین اجزای عملکرد دانه لوبيا فقط تعداد نیام در بوته تحت تأثیر معنی دار قرار گرفت و افزایش یافت. سليم و همکاران (2003) طی آزمایشی اعلام کردند که با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا شرایط محیطی مناسبی برای رشد لوبيا فراهم گردید و تعداد نیام در بوته لوبيا افزایش یافت. شفشك و همکاران (1989) نیز عنوان کردند که در کشت مخلوط آفتابگردان و سویا، از بین اجزای عملکرد سویا فقط تعداد نیام در بوته، به طور معنی داری تحت تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش می‌یابد.

جدول 4- میانگین صفات مورد اندازه گیری لوبيا چیتی در کشت مخلوط و خالص

تیمار (سانتی متر)	ارتفاع بوته در بوته	تعداد برگ در بوته	تعداد انسهاب در بوته	تعداد دنیام در بوته	وزن صد دانه (گرم)	عملکرد دانه در واحد سطح (گرم در متر مربع)
S1	133/10d	31/54 bcd	4/83 bc	4/35cde	44/01 a	7/48cde
S2	214/3ab	41/46a	6/580a	7/53 a	45/67 a	12/8 a
S3	198/3abc	34/75b	5/570 ab	3/52 a	45/4 a	11/4ab
S4	179/3c	33/37bc	5/120bc	3/71 a	45/10 a	10/10 abc
S5	193/1abc	33bc	4/873bc	3/43 a	43/74 a	8/74 bcd
S6	186/7bc	30/58bcd	4/330bc	3/58 a	43/13 a	6/73def
S7	194/13abc	28/79bcd	4/287c	3/27 a	42/83 a	5/83def
S8	206/7abc	27/46cd	4/037c	3/12 a	41/98 a	4/98ef
S9	218/7a	26/4d	3/917 c	2/65e	4/12 a	4/12f
S10						

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختلاف معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد است.

بوته لوبيا چیتی در تیمار S3، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 10 درصد لوبيا چیتی (چهار بوته در متر مربع). مشاهده گردید (جدول 4). زیرا با کاهش تراکم لوبيا در این تیمار رقابت درون گونه ای کاهش یافته و در نتیجه فضای بیشتری برای رشد بوته لوبيا چیتی فراهم شده، به علاوه در حالت کشت مخلوط افزایشی لوبيا به دلیل فرم رشد رونده خود از آفتابگردان به عنوان قیم استفاده نموده و رشد خود را افزایش داده و در نتیجه آن عملکرد دانه در بوته لوبيا افزایش یافت. یوج جینایج و همکاران (1991) اعلام کردند که در کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان و لوبيا بیوماس و عملکرد دانه در بوته لوبيا افزایش می یابد. سلیم و همکاران (2003) نیز طی آزمایشی اعلام کردند که با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا شرایط محیطی مناسبی برای رشد لوبيا فراهم گردید و عملکرد دانه لوبيا در بوته افزایش یافت.

ظاهری (1373) گزارش کرد که در کشت مخلوط خردل و نخود به روش افزایشی، خردل نقش قیم را برای نخود ایفا می کند و بر اثر آن، عملکرد نخود

وزن صد دانه اثر تیمار کشت بر وزن صد دانه لوبيا چیتی معنی دار نشد (جدول 3). از آنجاییکه وزن صد دانه بیشتر تحت تاثیر ژنتیپ قرار دارد در نتیجه تحت تاثیر کشت مخلوط قرار نگرفته است. رشید و همکاران (2002) و مورالس و همکاران (2009) با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که در حالت کشت مخلوط، وزن صد دانه تحت تاثیر واقع نشد. شفشك و همکاران (1989) با انجام آزمایشی اعلام کردند که در کشت مخلوط سویا با آفتابگردان وزن صد دانه سویا تحت تأثیر واقع نگردید. گری و فرننسیس (1999) اعلام کردند که در کشت مخلوط ذرت، سورگوم و سویا وزن صد دانه سویا تحت تأثیر معنی دار قرار نگرفت. بوآرد و همکاران (1996) نیز با انجام آزمایشی روی تراکم های مختلف لوبيا اعلام کردند که وزن صد دانه به طور معنی داری تحت تأثیر تراکم قرار نگرفت.

عملکرد دانه در بوته اثر تیمار کشت بر عملکرد دانه در بوته لوبيا چیتی معنی دار شد (جدول 3). بالاترین عملکرد دانه در

نسبت برابری زمین (LER)

مقادیر LER در کلیه تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از یک گردید (جدول 5). این موضوع، نشانگر سودمند بودن کشت مخلوط می‌باشد. دلیل آن می‌تواند وجود اختلافات مرغولوژیک دو گونه و در نتیجه ایجاد اشکوبهای مختلف و بهره‌برداری بهینه از منابع باشد. نقش اختلافات مرغولوژیک در دستیابی به LER بالاتر توسط سلیم و همکاران (2003) در کشت مخلوط آفتابگردان و ماش، دوا و همکاران (2005) در کشت مخلوط سیب‌زمینی و لوبيا سبز و حسینی و همکاران (1382) در کشت مخلوط ارزن علوفه‌ای و لوبيا چشم بلبلی گزارش شده است.

بالاترین مقدار LER به میزان 1/353 در تیمار S7، کشت مخلوط 100 درصد آفتابگردان (چهار بوته در متر مربع) + 50 درصد لوبيا چیتی (20 بوته در متر مربع) مشاهده گردید (جدول 5). این امر به علت تراکم مطلوب گیاهی در این تیمار و استفاده بهتر از منابع محیطی ناشی شده است و این دو گیاه در این تراکم توانسته اند با کارایی بیشتری از منابع محیطی استفاده کنند. یوج جینایج و همکاران (1991) دریافتند که با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيای سودانی نسبت برابری زمین (LER) به 1/51 رسید و میزان سود حاصله نیز افزایش یافت. سینگ (2007) نیز اعلام کرد

حدود 40 درصد افزایش می‌یابد. هم چنین با کشت مخلوط افزایشی نخود و یولاف، نخود از یولاف به عنوان قیم استفاده می‌کند و عملکرد آن افزایش می‌یابد. قنبری و طاهری مازندرانی (1382) و جادوسکی و همکاران (2000) نیز با آزمایشی روی تراکم‌های مختلف لوبيا اعلام کردند که با کاهش تراکم به علت کاهش رقابت درون گونه‌ای، بیوماس و عملکرد دانه در بوته لوبيا افزایش می‌یابد.

عملکرد دانه لوبيا چیتی در واحد سطح کشت اثر تیمار کشت بر عملکرد دانه لوبيا چیتی در واحد سطح کشت معنی‌دار بود (جدول 3). بالاترین عملکرد دانه لوبيا چیتی در واحد سطح در تیمار S2 کشت خالص لوبيا چیتی با تراکم 40 بوته در متر مربع مشاهده گردید (جدول 4). حداقل بودن تراکم لوبيا، موجب شد که لوبيا با استفاده بیشتر از عوامل محیطی حداقل عملکرد دانه را در واحد سطح کشت تولید کند. سورالس و همکاران (2009) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که بالاترین عملکرد دانه لوبيا چیتی در واحد سطح کشت در کشت خالص لوبيا مشاهده گردید جادوسکی و همکاران (2000) و قنبری و طاهری مازندرانی (1382) با انجام آزمایشی اعلام کردند که عملکرد لوبيا با افزایش تراکم به میزان 45 بوته در متر مربع، افزایش می‌یابد.

جدول 5 – مقادیر LER در تیمارهای کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا چیتی

تیمار	عملکرد نسبی آفتابگردان	عملکرد نسبی لوبيا چیتی	نسبت برابری زمین (LER)
S3	0/955	0/173	1/128
S4	0/895	0/308	1/203
S5	0/876	0/409	1/258
S6	0/834	0/470	1/304
S7	0/810	0/543	1/353
S8	0/782	0/548	1/330
S9	0/746	0/529	1/275
S10	0/701	0/510	1/211

در حالت کشت مخلوط میزان سود مندی نسبت به کشت خالص آنها بیشتر شد. ساهو و همکاران (2003) با کشت مخلوط آفتابگردان و بادام زمینی اعلام کردند که در حالت کشت مخلوط میزان سودمندی افزایش یافت و مقدار LER به ۱/۴۵ رسید.

با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا مقدار LER به ۱/۲۵ رسید. سادی و المتولی (2009) طی آزمایشی اعلام کردند که با کشت مخلوط آفتابگردان و سویا مقدار LER به ۱/۳۷ رسید. رشید و همکاران (2002) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا اعلام کردند که

منابع مورد استفاده

توحیدی نژاد، مظاهری د و قلاوند، ۱۳۸۳. بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان . پژوهش و سازندگی ، شماره 64 صفحات: 45-39.

حسینی م ب، مظاهری د، جهانسوز م ر و یزدی صمدی ب، ۱۳۸۲. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن علوفه ای و لوبيا چشم بلبلی در کشت مخلوط. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 59. صفحات: 60 - 68.

جوانشیر ع، دباغ محمدی نسب ع، حمیدی آ و قلی پور م، ۱۳۷۹. اکولوژی کشت مخلوط (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد.

قنبی ع ا و طاهری مازندرانی م، ۱۳۸۲. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبيا چیتی. مجله نهال و بذر، جلد ۱۹، شماره 4. صفحات ۴۸ - ۵۷.

مظاهری د، ۱۳۷۳. زراعت مخلوط. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران.

Baumann DT, Bastians L, Gaudian I, Vanlar HH and Kroff MJ, 2002. Analysing crop yield and plant quality in a intercropping system using an ecophysiological model for interplant competition. Agricultural Systems 13: 173 – 203.

Board JE, Harville BG and Sayton AM, 1996. Branch dry weight in relation to yield increases in narrow-row soybean. Agronomy Journal 82: 540-544.

Carruthers K, PrithivirajB, Clouter D, Martin RC and Smith DL, 2000. Intercropping corn with soybean, lupine and forages: Yield component responses. European Journal Agronomy 12: 103-115.

Dil K and Mulder EE, 1982. Effect of associated growth on yield and nitrogen control of legume and grass. Plant Soil 16: 229-237.

Dua VK, Lal SS and Govindakrishnan PM, 2005. Production potential and competition indices in potato + french bean intercropping system in Shimla Hills. Indian Journal of Agricultural Science 75: 321-323.

Elijah M and Akunda W, 2001. Improving food production by understanding the effect of intercropping and plant population on soybean nitrogen fixing attributes. The Journal of Food Technology in African 6: 110-115.

Gary W and Frances A, 1999. Strip intercropping effects on yield and yield components of corn, grain sorghum and soybean. Agronomy Journal 91: 807 – 813.

- Haugaard-Nielsen H and Jeanson ES, 2001. Evaluating pea and barley cultivars for complementarity in intercropping at different levels of N availability. *Field Crop Research* 72: 185-196.
- Ibrar R, Ahmad S and Malik A, 2002. Sunflower summer legumes intercropping systems under rainfed conditions: yield and yield components. *Pakistan Journal. of Agricultural Research* 17: 231-236.
- Jadoski SO, Carlesso R, Wolschick D, Petry T and Frizzo Z, 2000. Plant population and row spacings for irrigated dry bean. II: Grain yield and yield components. *Brazil Ciencia Rural* 30: 567-573.
- Kandhro MN, Tunio SD, Memon HR and Ansari MA, 2007. Growth and yield of sunflower under influence of mungbean intercropping. *Pakistan Journal Agricultural Research* 23: 9-13.
- Morales REJ, Escalante EJA, Sosa CL and Volke HVH, 2009. Biomass, yield and land equivalent ratio of *Helianthus annus L* in sole crop and intercropped with *Phaseolus vulgaris L*. in high valleys of Mexico. *Tropical and Subtropical Agro ecosystems* 10 (2009): 431 – 439.
- Njoku SC, Muoneke CO, Okpara DA and Agbo FMO, 2007. Effect of intercropping varieties of sweet potato and okra in an ultisol of southeastern Nigeria. *African Journal of Biotechnology* 6: 1650-1654.
- Rashid I; Shahbaz A and Malik A; 2002. Sunflower-summer legumes intercropping systems under rain fed conditions: Economic analysis. *Pakistan Council of Scientific and Industrial Research* 45:378-390.
- Sahoo SK, Kumar DS and Reddy CR, 2003. Productivity of sunflower (*Helianthus annuus L.*) bases intercropping systems under irrigated conditions. *Journal of Oilseeds Research* 20: 284-286.
- Saleem R, Umar FM and Ahmed R, 2003. Bioeconomic assessment of different sunflower based intercropping systems at different geometric configurations. *Pakistan Journal of Biological Sciences* 6: 1187-1190.
- Saudy HS and Elmetwally IM, 2009. Weed management under different patterns of sunflower – soybean intercropping. *Journal of Central European Agriculture* 10:41-52.
- Shafshak SE, Shokr ES and Ahmar BA, 1989. Studies on soybean and sunflower intercropping, plant characteristics, yield and yield components of soybean and sunflower. *Field Crop Research* 10: 41 - 56.
- Singh JK, 2007. Response of sunflower (*Helianthus annuus*) and french bean (*Phaseolus vulgaris*) Intercropping to different row ratios and nitrogen levels under rain fed conditions of temperate Kashmir. *Indian Journal of Agronomy* 52: 36-39.
- Sullivan P, 2003. Intercropping principles and practices. Available: <http://www.attar.Ncat.org>
- Ujjinaiah US, Rajashekhar BG, Venugopal N and Seenappa K, 1991. Sunflower pigeon pea intercropping. *Journal of Oilseed Research* 8: 72-80.
- Zhang F and Li L, 2003. Using competitive and facilitative interactions in intercropping systems enhances crop productivity and nutrient use efficiency. *Plant and Soil* 248: 305-312.