

مطالعه میدانی تاثیر طول دوره خشکی بر شاخص‌های تولید مثلی پس از زایمان در گاو هاشتاین

مجید محمد صادق^{۱*}، امین ابراهیمی^۱، محمد قهری^۱، علیرضا باهنر^۲

۱- گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار- ایران.

۲- گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

* نویسنده مسئول: Dr-mmsadegh@yahoo.com

Study on the Effect of Dry Period Length on the Reproductive Indexes of Holstein Cows after Parturition

Mohammad Sadegh, M.^{1*}, Ebrahimi, A.¹, Ghahry, M.¹, Bahonar, A.R.²

¹Department of clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar-Iran.

²Department of food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.

Abstract

With regards to the importance of dry period and its negative and positive effects on livestock safety, the contingency of dry period on reproduction indices were studied. One hundred Holstein dairy cows from an industrial large dairy farm in Hamadan were selected. The length of dry period was Independent variable and reproductive indices (1. Parturition to first service interval, 2. Open days, and 3. Numbers of service to pregnancy) depended variables. Control variables were 1- Pick of milk production, 2- BCS at the breeding and 3-Numbers of lactation. It is concluded that there was no significant correlation between dry period length and reproductive indices ($p>0.05$), but inclination to recovery was observed in groups with shorter dry periods. *Vet.J.of Islamic.Azad.Univ., Garmsar Branch. 5,1:35-40,2009.*

Keywords: Dry Period Theriogenological index, Dairy carrel.

رحمی و جابجایی شیردان را به دنبال دارد(۱۰). گاوها در طول مرحله بعد از زایمان دستخوش تغییرات چشمگیر فیزیولوژیکی وابسته به زایمان و آغاز شیردهی می‌شوند(۱۸). یکی از راه‌های کاهش عوارض وابسته به دوره بعد از زایمان کوتاه شدن یا حذف طول دوره خشکی است. تغییرات مربوط به خشک کردن دام به ویژه کاهش دریافت غذا می‌تواند حجم شکمبه را کاهش داده و گاوها را نسبت به ایجاد تعادل منفی در انرژی در دوره پس از زایمان حساس کند(۱۵). اگر دوره خشکی به اندازه کافی کوتاه شده باشد، ادامه تغذیه با رژیم‌های غذایی با انرژی بالا در مرحله آبستنی- شیردهی بعدی می‌تواند خطربروز بالانس منفی انرژی پس از زایش را کاهش دهد. اضافه بر این، حذف دوره خشکی می‌تواند برخی از تغییرات فیزیولوژیکی، که وابسته به آغاز شیردهی است را

چکیده

با توجه محسن و معایب وجود دوره خشکی و آثار مثبت و منفی آن بر سلامت دام، احتمال تاثیر طول دوره خشکی بر شاخص‌های تولید مثلی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد ۱۰۰ راس دام هاشتاین اصیل ماده شیری در یکی از دامپزشکی‌های صنعتی استان همدان در نظر گرفته شد. متغیر مستقل طول دوره خشکی دام‌ها، متغیر وابسته شاخص‌های تولید مثلی پس از زایمان بود و متغیرهای کنترل عبارت بودند از مقدار شیر در اوچ تولید، وزن دام در زمان تلقیح و تعداد زایش. از این تحقیق نتیجه گیری شد، میان طول دوره خشکی و شاخص‌های تولید مثلی مطالعه شده (۱- فاصله زایمان تا اولین تلقیح، ۲- تعداد تلقیح به ازای آبستنی، ۳- روزهای باز) در شرایط این تحقیق رابطه آماری وجود ندارد ($p > 0.05$) ولی در تما می‌شاخص‌های مطالعه شده تمایل به بهبود در گروه‌های با دوره خشکی کوتاه تر مشاهده شد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۱، ۴۰-۳۵.

واژه‌های کلیدی: دوره خشکی، شاخص‌های تولید مثلی، گاو شیری.

مقدمه

گاوها شیری بیشترین حساسیت را نسبت به بیماری‌های متابولیکی و بیماری‌های عفونی، در طول اولین هفت‌های پس از زایش دارند. در طول این دوره آن‌ها نواعده‌تر تعادل منفی انرژی قرار دارند، زیرا نمی‌توانند مطابق نیازمندی‌های نگهداری و شیردهی، انرژی کافی دریافت کنند (۱۸). دو پیامد تعادل منفی انرژی، سرکوب اینمی و به ویژه افزایش موارد ورم پستان (۸) و بسیج اسیدهای چرب است (۷). گسیل بیش از اندازه اسید چرب، منجر به اختلالات متابولیکی وابسته به چربی مانند، لیپیدوزیس کبدی، کتوزیس و بالا رفتن اسید چرب غیر استریفیتی در خون، قبل از زایش می‌شود که عوارضی نظیر جفت ماندگی، عفونت‌های



جدول ۱- مقادیر میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرهای تحت مطالعه را ارائه داده است.

انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	تعداد	
۲۴/۲۱۰	۷۰/۶۴	۱۸۳	۲۵	۱۰۰	طول دوره خشکی
۳۴/۰۱۷	۸۰/۴۵	۲۰۶	۴۰	۹۵	فاصله زایمان تاولین تلقیح
۶۸/۶۴۰	۱۲۸/۷۳	۴۳۰	۴۷	۸۹	روزهای باز
۶/۴۱۳	۴۲/۱۲	۶۴	۲۳	۱۰۰	پیک تولید
۲۸/۷۸۹	۳۸۱/۴۱	۴۵۰	۲۶۵	۱۰۰	وزن گاودرزمان تلقیح
۱۰۴/۲۰۵	۲۳۹/۸۳	۴۷۱	۲۴	۱۰۰	روزهای شیردهی (Day in milk)
۱/۴۳۹	۳/۷۰	۸	۲	۱۰۰	تعداد شکم
۱/۱۵۶	۱/۹۴	۶	۱	۹۵	تعداد تلقیح بازی آبستنی
				۸۹	N (list wise) Valid

گیرد چنین کاهشی دیده نمی شود. با توجه به امکان بروز تغییرات متابولیکی، عفونت های تولید مثلی و شاخص های تولید مثلی نیز ممکن است تحت تاثیر طول دوره خشکی قرار گیرند. هدف از این مطالعه تعیین امکان تحت تاثیر قرار گرفتن شاخص های تولید مثلی پس از زایمان توسط طول دوره خشکی بود.

مواد و روش کار

تعداد ۱۰۰ راس دام هولشتاین اصیل ماده شیری در دامپروری صنعتی بنیاد جانبازان - شهدای انقلاب اسلامی شهرستان رزن استان همدان در نظر گرفته شد. در این مطالعه متغیر مستقل طول دوره خشکی در دامها و متغیر وابسته شاخص های تولید مثلی پس از زایمان (۱- فاصله زایش تا اولین تلقیح، ۲- تعداد تلقیح به ازای آبستنی، ۳- روزهای باز) بود. متغیرهای کنترل در این مطالعه (۱- مقدار شیر در اوچ تولید، ۲- وزن دام در زمان تلقیح، ۳- تعداد شکم) در نظر گرفته شد. از آزمون Fisher Exact برای بررسی ارتباط طول دوره خشکی با میزان وقوع ورم پستان در رایش بعدی، و از آزمون General Linear Model برای بررسی ارتباط طول دوره خشکی با فاصله زایمان تا اولین تلقیح، روزهای باز، روزهای شیردهی و تعداد تلقیح به ازای آبستنی استفاده شد.

کاهش دهد. متأسفانه اطلاعات اندکی از نوشه ها به منظور توصیف تغییرات فیزیولوژیکی گاو های درگیر، زمانی که دوره خشکی کوتاه یا حذف می شود، در دسترس است (۱۸). با حذف (۲۹) یا کوتاه کردن دوره خشکی (۱۳)، تولید شیر در شیردهی بعدی و بطور همزمان افت وزن بدن نیز کاهش یافت. بسیاری از محققین مدت روزهای خشکی لازم برای رسیدن به حداکثر تولید شیر در شیردهی بعدی در گاورا ۴۰تا ۴۰ روز اعلام کرده اند (۲۰، ۲۸، ۳۰، ۱۲، ۲۰) با این وجود برخی از محققین (۳۰) روزهای ابرای تداوم شیردهی کافی می دانند (۲۰، ۱۷، ۲۰). مطابق اظهارات آرنولد (۱۹۳۶) شاید قدیمی ترین اظهار نظر پیرامون طول دوره خشکی ثبت شده توسط دیکنسون در ۱۸۰۴ باشد که معتقد است برخی از دامپروران انگلیسی ۶۰ روز را کافی می دانند.

مواردی که باعث می شود کاهش دوره خشکی در گاو مناسب به نظر بیاید عبارتند از: نیاز گله به افزایش شیر قابل عرضه از طریق اضافه کردن شیر دام های نزدیک خشکی و وجود عوامل ورم پستان دوره خشکی مانند استرپتوکوکوس یوبریس، آرکانوباکتر پیوژن و مایکوپلاسما (۲۳) و مواردی که باعث می شود افزایش دوره خشکی در گاو مناسب به نظر بیاید عبارتند از: وجود ورم پستان ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گله و متضرر شدن گله از زیاد بودن تعداد سلول های سوماتیک شیر مخزن گله زیرا گاو های کهنه دوش که در آخر دوره شیردهی خود هستند دارای تعداد بسیار زیادتری از سلول های سوماتیک در شیرشان هستند (۲۳). در انتخاب مدت دوره خشکی در دام، مقدار و ویژگی های آغوز، فعالیت تولید مثلی دام در دوره پس از زایش و بیماری های متابولیکی و عفونی باید مورد توجه قرار گیرند (۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۶). طول دوره خشکی مناسب ممکن است بر حسب تعداد زایش، فاصله گوساله زایی و میزان تولید شیر انتخاب شود. با افزایش اندازه گله، امکان جدا سازی دام های خشک بر حسب طول دوره خشکی فراهم می شود. بیشتر متنون علمی که بر ۶ روز بودن دوره خشکی تاکید دارند در قبل از ۱۹۹۰ به چاپ رسیده اند (۱۶).

طول دوره خشکی عوایقی نیز می تواند داشته باشد. برخی معتقدند که کاهش روزهای خشکی سبب کاهش تولید شیر در شیردهی بعدی در دام های شکم اول می شود و چنین کاهشی در دام های چند شکم زاییده دیده نمی شود (۱). راستین و همکاران (۲۰۰۵) معتقدند تولید شیر به ازاء روز شیردهی کاهش می یابد ولی اگر تولید شیر اصلاح شده بر اساس چربی ملاک قرار



جدول ۳- مقایسه متوسط روزهای خشکی در فصول سال.

انحراف معیار	متوسط روزهای خشکی	فصل سال
(۱۶/۱۰)	۶۵/۷۷	بهار
(۱۸/۹۰)	۶۳/۰۷	تابستان
(۳۰/۷۰)	۸۰/۷۰	پاییز
(۲۷/۸۰)	۷۶/۴۰	زمستان

بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه: بهار با پاییز، تابستان با پاییز و زمستان اختلاف معنی دار دارد.

شاخص‌ها تاثیر می‌گذارد هرچند که سعی شده است اثر آن‌ها با نمونه‌گیری غیرتصادفی خنثی شود.

در مطالعه مشابهی گومن و همکاران ۲۰۰۵ گاوها هولشتاین را به طور تصادفی در یکی از سه گروه تیمار قرار گرفتند:

(۱) دوره‌های خشکی سنتی (T)، (حدود ۵۶ روز) که در آن گاوها با پایین ترین مقدار انرژی در رژیم غذایی از ۵۶ تا ۲۹ روز قبل از زایش تغذیه شدند و یک انرژی تعديل شده در رژیم غذایی را برای ۲۸ روز آخر دریافت کردند.

(۲) دوره‌های خشکی کوتاه شده (S)، (در حدود ۲۸ روز) که در آن گاوها بطور پیوسته انرژی بالایی را در رژیم غذایی دریافت کردند.

(۳) بدون دوره خشکی (N) که در آن گاوها بطور پیوسته انرژی بالایی در رژیم غذایی دریافت می‌کنند.

همه گاوها انرژی بالایی را در دوران شیردهی در رژیم غذایی بعد از زایمان دریافت کردند. تخدمان‌ها بوسیله سونوگرافی بررسی شد و سرم خون سه بار در هفتۀ از ۶ تا ۷ روز قبل از زایمان تا ۷ روز بعد از دومین تخمک گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

میانگین فاصله زایمان تا اولین تخمک گذاری در گروه N (۱۳/۲ روز) نسبت به گروه S (۲۳/۸ روز) و T (۳۱/۹ روز) کوتاه تر بود. میانگین فاصله زایمان تا اولین شناسایی یک فولیکول ۱۰ میلی میتری در گروه N (۸/۸ روز) و S (۸/۹ روز) نسبت به T (۵/۵ روز) کمتر بود. در صد بیشتری از فولیکول‌هادر اولین موج فولیکولی و تشکیل تخمک در گروه N (۶۲ درصد) نسبت به T (۴۲ درصد) و S (۶۲ درصد) مشاهده شد. تعداد تخمک گذاری مضاعف در اولین تخمک گذاری در گروه T (۱۶ درصد) بیشتر از گروه N (۱۶ درصد) و S (۳۵ درصد) بود. هیچ اختلافی در میزان کلی تخمک گذاری چند گانه در بین گروه‌ها یافت نشد. تعداد گاوها با تداوم در جسم زرد (۵ بیشتر از ۳۰ روز) هیچ اختلافی در میان گروه‌ها نداشت ولی فاز لوتئال کوتاه در گروه N (۲۸ درصد) نسبت به S (۲۰ درصد) بیشتر دیده شد. در صد آبستنی در اولین تلقیح در گروه N (۵۵ درصد) نسبت به

جدول ۴- مقایسه شاخص‌های مختلف تولید مثلی در گروه‌های مختلف از نظر دوره خشکی.

شاخص‌های تولید مثلی	گروه‌های خشکی	تعداد دام	میانگین	انحراف معیار
فاصله زایمان تا اولین تلقیح	روزهای ۵۰-۶۰ روز	۳۴	۷۹/۶۵	۲۹/۲۱۶
	>۶۰	۵۷	۸۲/۳۰	۳۷/۲۵۶
	میزان کل	۹۵	۸۰/۴۵	۳۴/۰۱۷
	۵۰ روز و کمتر	۴	۶۱/۰۰	۱۹/۵۴۵
	روزهای باز	۳۰	۱۳۹/۲۰	۸۲/۷۰۶
	>۶۰	۵۵	۱۲۴/۷۱	۶۱/۸۰۴
روزهای شیردهی	میزان کل	۸۹	۱۲۸/۷۳	۶۸/۶۴۰
	۵۰ روز و کمتر	۴	۲۰/۷۵	۱۰۷/۰۴۹
	۵۰-۶۰ روز	۳۶	۲۶۷/۱۹	۴۵/۱۹۴
	>۶۰	۶۰	۲۲۵/۶۲	۱۱۲/۲۳۰
	میزان کل	۱۰۰	۲۳۹/۸۳	۱۰۴/۲۰۵
	۵۰ روز و کمتر	۴	۱/۷۵	۰/۹۵۷
تعداد تلقیح بازی آبستنی	۵۰ روز	۳۴	۲/۰۶	۱/۲۰۵
	>۶۰	۵۷	۱/۸۸	۱/۱۵۱
	میزان کل	۹۵	۱/۹۴	۱/۱۵۶

نتایج

بین طول دوره خشکی و شاخص‌های تولید مثلی مانند تعداد تلقیح به ازای آبستنی، روزهای باز، فاصله زایمان تا اولین تلقیح، ارتباط آماری مشاهده نشد. با این وجود تمامی شاخص‌های مورد نظر در مواردی که روزهای خشکی کمتر از ۵۰ روز بود بهتر بوده است. آزمون فیشر نشان داد طول دوره خشکی در پائیز ($18/90 \pm 80/70$) و زمستان ($27/80 \pm 76/40$) بیشتر از تابستان ($139/20 \pm 60$) ($p < 0.05$). میان طول دوره خشکی و تعداد شکم زایش نیز ارتباط آماری مشاهده نشد ($p < 0.05$).

بر اساس آزمون دقیق فیشر، نسبت ورم پستان در گروه‌های مختلف روزهای خشکی، تفاوت معنی داری ندارد.

بحث و نتیجه‌گیری

همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد تما می‌شاخص‌های تولید مثلی بررسی شده (فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و روزهای باز) در دام‌های با طول دوره خشکی کمتر، بهتر بود ولی این اختلاف معنی دار نبود که علت آن می‌تواند تعداد کم دام‌ها باشد به ویژه آن که عوامل بسیار متعددی بر روی این



کاهش روزهای خشکی، افت شیر در دوره شیر دهی بعدی است(۱۹). ایشان نشان داده اند که میزان تولید شیر پس از زایمان دوم با کاهش روزهای خشکی (۴۰ تا ۴۵ روز به جای ۵۵ تا ۶۵ روز) کاهش می یابد.

در مطالعه حاضر میان تعداد شکم زایش و طول روزهای خشکی ارتباطی دیده نشد. انتظار می رود دامهای پر تولید در شکم ۳ تا ۵ دیرتر آبستن شوندواین حالت سبب افزایش طول دوره خشکی شود.

در مطالعه حاضر طول دوره خشکی در پائیز ($30/70 \pm 80/70$) روز و زمستان ($27/80 \pm 40/26$ روز) بیشتر از تابستان ($63/40 \pm 68/27$ روز) بود. یکی از دلایل افزایش طول دوره خشکی افزایش روزهای شیردهی و افزایش روزهای باز است. با توجه به زیاد بوده روزهای باز در این گله احتمال دارد گاوها یی که در زمستان یا پائیز خشک می شوند در زمانی زایمان کرده اند که خیلی دیر آبستن می شوند و به همین دلیل پس از آبستنی خیلی زود خشک می شوند.

از این مطالعه نتیجه گیری شد که دوره های کوتاه خشکی ممکن است برای بهبود شاخص های تولید مثلی پس از زایمان مناسب باشند ولی تحقیقات بیشتری در این زمینه موردنیاز است.

References

1. Annen, E.L., Collier, R.J., McGuire, M.A. Vicini, J.L., Ballam, J.M., Lormore.M.J. (2004) Effect of modified dry period lengths and bovine somatotropin on yield and composition of milk from dairy cows. *J. Dairy Sci*, **87**:3746-3761.[Abstract/Free Full Text].
2. Arnold,P.T.Dix, Becker,R.B. (1936) Influence of preceding dry period and of mineral supplement on lactation. *J. Dairy Sci*, **19**:257-266.[Abstract/Free Full Text].
3. Bachman, K.C. (2002) Milk production of dairy cows treated with estrogen at the onset of a short dry period. *J. Dairy Sci*, **85**:797-803.[Abstract/Free Full Text].
4. Beam,S.W., Butler, W.R. (1998) Energy balance, metabolic hormones, and early postpartum follicular development in dairy cows fed prilled lipid. *J. Dairy Sci*, **81**:121-131.[Abstract/Free Full Text].
5. Beam, S.W., Butler, W.R. (1999) Effects of energy balance on follicular development and first ovulation

T (۲۰ درصد) یا S (۲۶ درصد) بیشتر بود.

روزهای باز در گاوها آبستن گروه N (۸/۹۳ روز) نسبت به T (۴۵/۱۲ روز) و S (۲/۱۲ روز) کوتاه تر بود. از این روز، دوره خشکی کوتاه شده و یا حذف شده به تخمک گذاری پس از زایمان سریع تر ختم می شود این امر نیاز به مطالعه بیشتر در آینده دارد تا اثرات طول دوره خشکی را روی عملکردهای تناسلی و شیردهی روزانه گاوها مشخص نماید. فاصله تا اولین تلقیح در گروه N (۴/۶۹ روز) و S (۰/۶۸ روز) در مقایسه با T (۷۵/۷۵ روز) کوتاه تر بود. لوتان و ۱۹۷۶ گزارش کرده اند که در روزهای خشکی ۳۰ تا ۶۰ روز، روزهای باز، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و درصد آبستنی یکسان بوده است.

به اعتقاد باتلر و همکاران (۱۹۸۱) گاوها شیری پر تولید در اوایل شیردهی به دلیل ممکن نبودن دریافت ماده خشک کافی دوره ای از بالانس منفی انرژی را تجربه می کنند و در صورتی که بتوان این بالانس را به سمت مثبت پیش برد فعل اعمال شدن تخدمان ها پس از زایمان تسريع خواهد شد. بالانس انرژی در ۳ تا ۴ هفته اول پس از زایمان با فاصله زایمان تا اولین تخمک گذاری در ارتباط بوده است (۲۱, ۵, ۴). مشخص شده است که ۱۰ روز پس از اصلاح بالانس انرژی اولین تخمک گذاری پس از زایمان رخ می دهد (۹) فرگوسن (۱۹۹۶) این زمان را $3/3 \pm 2/1$ روز اعلام کرده است (۱۴).

گولای و همکاران ۲۰۰۳ با بررسی دونوع دوره خشکی ۳۰ و ۶۰ روزه در راس گاو هشتاین سعی کردند اثر طول دوره خشکی بر شاخص های مختلف تولید تولید مثلی را بررسی کنند. ایشان هیچ تاثیری از طول دوره خشکی بر میزان جذب ماده خشک، وزن بدن، و امتیاز بدنی (BCS) قبل از زایمان مشاهده نکردند. گاوها ب دوره خشکی کوتاه تر تداوم بهتری در امتیاز بدنی پس از زایمان نشان دادند.

ریموند ۱۹۹۹ گزارش کرد در گاوها یی که دوره خشکی نداشته اند در ۶۰ روز اول دوره شیردهی ۲۴ کیلو افزایش وزن داشته اند ولی در گاوها یی که ۶۰ روز دوره خشکی نداشته اند در دوره مشابه ۲۸ کیلو کاهش وزن دیده شده است (۲۷).

گومن ۲۰۰۵ معتقد است در گاوها یی که حدود ۵۶ روز در دوره خشکی باشند در مقایسه با گاوها یی که دوره خشکی نداشته باشند در بالانس منفی انرژی بیشتری در دوره پس از زایمان قرار می گیرند.

به اعتقاد کوهن و همکاران (۲۰۰۶) علت بهبود باروری متعاقب

- in postpartum dairy cows. *J. Reprod. Fertil.*, **54**(Suppl.):411-424.
6. Berry, E. A., Hillerton, J. E. (2007) Effect of an Intramammary Teat Seal and Dry Cow Antibiotic in Relation to Dry Period Length on Postpartum Mastitis. *J. Dairy Sci.*, **90**:760-765.
 7. Bertics, S.J., Grummer,R.R., Cadorniga-Valino, C., LaCount, D. W., Stoddard. E. E. (1992) Effect of prepartum dry matter intake on liver triglyceride concentration and early postpartum lactation. *J. Dairy Sci.*, **75**:1914-1922.[Abstract].
 8. Burton, J. L., S. A. Madsen, J. Yao, S. S. Sipkowsky, P. M. Coussens. (2001) An immunogenetics approach to understanding immunosuppression and mastitis susceptibility in dairy cows. *Acta Vet. Scand.* **42**:407-424. [Medline].
 9. Butler, W. R., Everett, R. W., Coppock, C. E. (1981)The relationships between energy balance, milk production and ovulation in postpartum Holstein cows. *J. Anim. Sci.*, **53**:742-748.[Medline].
 10. Cameron, R. E., Dyke, P. B. Herdt, T. H., Kaneene, J. B., Miller, R. Buckholz, H. F., Liesman, J. S., Vandehaar, M. J. and Emery. R. S. (1998) Dry cow diet, management, and energy balance as risk factors for displaced abomasum in high producing dairy herds. *J. Dairy Sci.*, **81**:132-139.[Abstract].
 11. Church,G.T.,Fox, L K.,Gaskins,C.T.,Hancock D.D., Gay, J.M. (2008)The Effect of a Shortened Dry Period on Intramammary Infections During the Subsequent Lactation. *J. Dairy Sci.*, **91**:4219-4225.. Fox@wsu.edu, © American Dairy Science Association ®.
 12. Coppock, C. E., Everett, R. W. Natzke, R. P., Ainsle. H. R. (1974) Effect of dry period length on Holstein milk production and selected disorders at parturition. *J. Dairy Sci.*, **57**:712-718.
 13. Farries, E., Hoheisel. S. (1989) The influence of reduced dry period on some performance and metabolism traits in dairy cows. *J. Dairy Sci.*, **72**(Suppl. 1):565. (Abstract).
 14. Ferguson, J. D. (1996) Diet, production and reproduction in dairy cows. *Anim. Feed Sci. Technol.*, **59**:173-184.
 15. Grant, R. J., Albright, J. L. (2001) Effect of animal grouping on feeding behavior and intake of dairy cattle. *J. Dairy Sci.*, **84**(E. Suppl.):E156-E163. [Abstract/Free Full Text].
 16. Grummer,R.R., Rastani R.R. (2004) Why Reevaluate Dry Period Length? *J. Dairy Sci.*, **87**:77-85: rgrummer@facstaff.wisc.edu.
 17. Gulay, M. S., Hayen, M. J., Bachman, K. C., Beloso, T., Liboni, M., Head, H. H. (2003) Milk production and feed intake of Holstein cows given short (30-d) or normal (60-d) dry periods. *J. Dairy Sci.*, **86**: 2030-2038.[Abstract/Free Full Text].
 18. Gümen, A., Rastani, R.R., Grummer, R.R., Wiltbank, M.C. (2005) Reduced Dry Periods and Varying Prepartum Diets Alter Postpartum Ovulation and Reproductive Measures. *J. Dairy Sci.*, **88**:2401-2411.
 19. Kuhn, M. THutchison,J. L., Norman H. D. (2006) Dry Period Length to Maximize Production Across Adjacent Lactations and Lifetime Production. *J. Dairy Sci.*, **89**:1713-1722.
 20. Lotan, E., Adler, J. H. (1976) Observations on the effect of shortening the dry period on milk yield, body weight, and circulating glucose and FFA levels in dairy cows. *Tijdschr. Diergeneeskde*, **101**:77-82. [Medline].
 21. Lucy, M. C., Staples, C. R., Michel, F. M., Thatcher. W. W. (1991) Energy balance and size and number of ovarian follicles detected by ultrasonography in early postpartum dairy cows. *J. Dairy Sci.*, **74**:473-482.[Abstract/Free Full Text].
 22. Lucy, M. C., Staples, C. R., Thatcher, W. W., Erickson, P. S., Cleale, R. M., Firkins, J. L., Clark, J. H. , Murphy, M. R., Brodie, B. O. (1992) Influence of diet composition, dry matter intake, milk production and energy balance on time of postpartum ovulation and fertility in dairy cows. *Anim. Prod.*, **54**:323-331.
 23. Radostitis O.M., Gay, C. C. Hichiff, K.W., Constable P.D. (2007) Veterinary Medicine. WB Saunders-Elsevier Edinburg, 673-762.
 24. Rastani, R. R., Grummer, R. R., Bertics, S. J. Gümen, A., Wiltbank, M. C., Mashek, D. G., Schwab, M. C. (2005) Reducing dry period length to simplify feeding transition cows: Milk production, energy balance, metabolic profiles. *J. Dairy Sci.*,



- 88:1004-1014.[Abstract/Free Full Text].
25. Remond, B., Bonnefoy, J. C. (1992) Performance of a herd of Holstein cows managed without the dry period. Ann. Zootech, **46**:3-12.
26. Remond, B., Ollier, A., Miranda, G. (1992) Milking of cows in late pregnancy: Milk production during this period and during the succeeding lactation. *J. Dairy Res*, **59**:233-241.[Medline].
27. Remond, B., Rouel, J., Pinson, N., Jabet, S. (1997) An attempt to omit the dry period over three consecutive lactations in dairy cows. Ann. Zootech, **46**:399-408.
28. Sorensen, J. T., Enevoldsen, C. (1991) Effect of dry period length on milk production in subsequent lactation. *J. Dairy Sci*, **74**:1277-1283.[Abstract/Free Full Text].
29. Swanson, E. W. (1965) Comparing continuous milking with sixty-day dry periods in successive lactations. *J. Dairy Sci*, **48**:1205-1209.