

## مطالعه بیان پروتئین BCL2 در کارسینوم تجربی کولون متعاقب تاثیر عصاره گل همیشه بهار در موش صحرائی

یوسف دوستار<sup>۱\*</sup>، داریوش مهاجری<sup>۱</sup>، فاطمه فتحی آذر<sup>۲</sup>، علی ناموران<sup>۳</sup>

۱- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز - ایران.

۲- گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

۳- دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز - ایران.

\* نویسنده مسئول: Vetdostar@yahoo.com

### Study of Bcl2 Protein Expression in Experimental Colon Carcinoma Following Effects of Calendula Officinalis in Rats

Doustar, Y.<sup>1\*</sup>, Mohajeri, D.<sup>1</sup>, Fathi Azar, F.<sup>2</sup>, Namvaran, A.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz- Iran.

<sup>2</sup>Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz- Iran.

<sup>3</sup>Graduated from, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz- Iran.

#### Abstract

Bcl-2 plays an important role in apoptosis regulation of solid tumors, such as colon and breast cancer. The purpose of this study is to determine bcl-2 expression on aberrant crypt foci epithelial following treatment with Calendula officinalis extract. In this study, 56 male wistar rats with approximate age of 12 weeks and 200-300g weight were randomly allocated into two equal groups (treatment & control). For induction of colorectal carcinoma these two groups were injected by 1, 2-dimethylhydrazine (40mg/kg) subcutaneously (2 injection/week for two weeks). Treatment group simultaneously received orally the Calendula officinalis extract (200mg/kg/day) for 10 weeks. After 10 weeks, tissue specimens were collected from distal parts of colon in both experimental groups and 3-4? m thick microscopic sections were prepared through immunohistochemistry staining method. Immunohistopathological study revealed that expression of BCL2 protein in aberrant crypt foci of colon in treatment group in comparison with control group was lesser. Mean difference between two experimental groups was significant ( $p < 0.01$ ). This in-vivo study indicated that BCL2 protein expression decreases in aberrant crypt foci epithelial cells of experimental colorectal carcinoma in rats following orally administration of Calendula officinalis extract. *et. J. of Islamic. Azad. Univ., Garmsar Branch. 5,2:109-114,2009- 2010.*

**Keywords:** BCL2, Colon Carcinoma, Colon, Calendula officinalis, Neoplasia.

### چکیده

پروتئین BCL2 نقش بسیار مهمی در تنظیم آپوپتوز در تومورهای نظیر کارسینوم کولون و پستان دارا می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی پدیداری پروتئین BCL2 در کریپت های غیر عادی کولون متعاقب درمان با عصاره گل همیشه بهار می باشد. در این مطالعه تعداد ۵۶ سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با سن ۱۲ هفته و وزن ۲۰۰-۳۰۰ گرم انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی تیمار و شاهد تقسیم گردیدند. برای القاء سرطان کولورکتال در هر دو گروه تیمار و شاهد از ماده کارسینوژن (۱، ۲-دی متیل هیدرازین به مقدار ۴۰ میلی گرم / کیلوگرم به روش تزریق زیر جلدی (۲ تزریق در هر هفته، بمدت ۲ هفته) استفاده گردید. گروه تیمار علاوه بر دریافت ماده کارسینوژن، عصاره گل همیشه بهار را به میزان ۲۰۰ میلی گرم / کیلوگرم وزن بدن را بمدت ۱۰ هفته به روش خوراکی روزانه دریافت نمودند. پس از گذشت ۱۰ هفته، از بافت کولون دیستال هر دو گروه جهت تهیه مقاطع ۳-۴ میکرونی و انجام ایمونو هیستوشیمی نمونه برداری به عمل آمد. مطالعات ایمونو هیستوشیمیایی نشان داد که بیان BCL2 در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کمتر و اختلاف میانگین بین دو گروه معنی دار ( $p < 0.01$ ) بود. مطالعه *in vivo* حاضر نشان داد که پدیداری پروتئین BCL2 در کریپت های غیر عادی کارسینوم تجربی کولون موش صحرائی با مصرف خوراکی عصاره گل همیشه بهار کاهش می یابد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۲، ۱۱۴-۱۰۹.

واژه های کلیدی: BCL2، کارسینوم کولون، کولون، گل همیشه بهار، نتوپلازی.

### مقدمه

سرطان روده بزرگ دومین دلیل مرگ و میر ناشی از سرطان در

دنیا است، طبق آمار ارائه شده سالانه این سرطان مسئول مرگ ۱۹۰۰۰ نفر در انگلستان، ۸۵۰۰۰ نفر در اروپا و ۶۱۰۰۰ نفر در ایالات متحده



## مواد و روش کار

### حیوانات:

رت‌های نر نژاد wistar خریداری و در شرایط ۵ حیوان در هر قفس و با سیکل ۱۲ ساعت تاریکی، ۱۲ ساعت روشنایی، درجه حرارت  $22 \pm 2$  سلسیوس و رطوبت  $55 \pm 5$  درصد نگهداری شدند.

### طراحی آزمایش

در این مطالعه تعداد ۵۶ سرموش صحرانی نر نژاد و یستار با سن ۱۲ هفته و وزن ۲۰۰-۳۰۰ گرم انتخاب و به دو گروه مساوی تیمار و شاهد تقسیم گردیدند. جهت ایجاد تجربی سرطان روده بزرگ در جوندگان از ماده 1,2-dimethylhydrazine (DMH) استفاده می‌شود که قابلیت کارسینوژنیک در روده بزرگ و کوچک داشته و با القای کریپتهای نابجا در روده و متعاقب آن ایجاد تومور روش استاندارد مطالعه تجربی سرطان در روده بزرگ و کوچک است (۸،۹). با این حال ارگان هدف آن روده بزرگ است (۹،۱۰). از طرف دیگر انسان‌ها با DMH و دیگر مشتقات هیدرازین از طریق محیط (۱۷) و غذا در ارتباط هستند مطالعات اخیر نشان می‌دهد که DMH از طریق استرس اکسیداتیو و القاء موتاسیون اثرات خود را بر جای می‌گذارد (۳،۵). جهت ارزیابی سرطان ایجاد شده توسط DMH کریپتهای نابجای ایجاد شده (Crypt Foci ACF) (Aberrant) مورد بررسی قرار می‌گیرد. کریپتهای نابجای ایجاد شده در روده از عوامل مستعد کننده روده برای ایجاد پولیپ و مراحل پیشرفته سرطان هستند و از طریق بررسی آن‌ها می‌توان در شناسایی زود هنگام سرطان کمک گرفت. برای القاء کارسینوم کولون ماده شیمیائی ۲،۱ دی متیل هیدرازین با دز ۴۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن و محلول در EDTA به روش زیر جلدی تزریق گردید. مدت زمان تزریق هر هفته دو تزریق با فاصله مساوی، به مدت دو هفته خواهد بود (۲،۱۴).

گروه تیمار علاوه بر دریافت ماده کارسینوژن، عصاره گل همیشه بهار را به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن به مدت ۱۰ هفته به روش خوراکی روزانه دریافت نمودند. پس از گذشت ۱۰ هفته از بافت کولون دیستال هر دو گروه جهت تهیه مقاطع ۳-۴ میکرونی و انجام ایمونوهیستوشیمی نمونه برداری به عمل آمد (۱۶). مطالعه حاضر به روش مطالعه تجربی مداخله‌گر و متغیرهای مورد ارزیابی در آن ۱- عصاره گل همیشه بهار به عنوان متغیر مستقل می‌باشد ۲- تغییرات پدیداری پروتئین BCL2 در بافت کولون به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

است (۱،۲،۳،۴،۲۴). در مورد ایران آمار قابل استنادی برای میزان وقوع سرطان وجود ندارد ولی منابع غیر رسمی اعلام کرده اند که بیشترین درصد سرطان مربوط به دستگاه گوارش و به خصوص روده بزرگ است و درصد بالایی از بدخیمی‌ها و مرگ و میر را در ایران شامل می‌شود. میزان بالای چربی (۲۵) و پروتئین جیره باعث افزایش وقوع سرطان روده بزرگ می‌شود (۵)، این در حالی است که به نظر می‌رسد تغذیه با چربی پایین، فیبر بالا، کلسیم بالا و مصرف مقدار زیاد سبزیجات در غذای روزانه باعث کم شدن میزان بروز سرطان روده بزرگ می‌شود (۶،۷،۸). مطالعات آزمایشگاهی حاکی از ارتباط بین فاکتورهای تغذیه و سرطان روده بزرگ دارد (۱۴،۱۵،۱۶). با این وجود مکانیسم حمایتی اجزای اشاره شده هنوز به درستی مشخص نشده است. به نظر می‌رسد تجمع زیاد سلول‌های جهش یافته در روده بزرگ و رکتوم باعث ایجاد تومور و بدخیمی می‌شود (۹). سرطان روده بزرگ یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در مردان و زنان به خصوص در آینده و افزایش شهرهای صنعتی خواهد بود (۱۲،۱۳). از عوامل مهارکننده سرطان روده بزرگ می‌توان به گیاهان دارویی و میوه جات اشاره کرد که به صورت روزانه مورد مصرف قرار می‌گیرند ولی باید قبل از مصرف آن‌ها اثرات محافظتی و ضد سرطانی آن‌ها شناسایی شود. مطالعات در مورد نقش گیاهان مختلف در پیشگیری از سرطان روده مدت‌هاست آغاز شده و مطالعات قبلی حاکی از اثرات مفید گیاه همیشه بهار (*calendula officinalis*) در التهابات، تسریع التیام زخم‌ها، راشهای پوستی در مصارف خارجی کوله سیستیت، کولانژییت، گاستریت، سیستیت، ضد هایپرلیپیدمی و... در مصارف داخلی اشاره کرد. بعضاً در منابع قدیمی به اثرات سیتوتوکسیک و آنتی توموری آن اشاره شده است. ولی در مطالعاتی که اخیراً انجام شده است اثرات ژنوتوکسیک و ضد ژنوتوکسیکی در رده سلول‌های کبدی و اثرات آن بصورت *In vitro* روی سرطان رده سلول‌های لوسمی، ملانوما، فیبروسارکوما، پستان، پروستات، سرویکس، پانکراس و کلورکتال مورد بررسی قرار گرفته است. پروتئین BCL2 نقش بسیار مهمی در کارسینوم کولون داشته و پدیداری آن در تنظیم آپوپتوز و به عنوان یک ایندکس تشخیصی می‌تواند حائز اهمیت باشد (۱۷،۲۲). بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی پدیداری پروتئین BCL2 در کریپتهای غیر عادی کولون متعاقب درمان با عصاره گل همیشه بهار می‌باشد.



بندی در جدول شماره یک آورده شده است.

جدول ۱- نحوه رتبه بندی میزان پدیداری پروتئین BCL2 به روش ایمنو هیستوشیمی


میزان زیاد حضور پروتئین BCL2	میزان متوسط حضور پروتئین BCL2	میزان کم حضور پروتئین BCL2	میزان بسیار کم حضور پروتئین BCL2	
۳	۲	۱	۰	میزان حضور پروتئین BCL2

### نتایج

مطالعات ایمنو هیستوشیمیائی مقاطع بافتی نشان داد که بیان پروتئین BCL2 در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کمتر و اختلاف میانگین هر دو گروه معنی دار ( $p < 0.01$ ) بود. بطوری که تراکم بروز پروتئین BCL2 در بافت اپی تلیالی کولون با تاثیر عصاره گل همیشه بهار به رنگ قهوه ای روشن در زمینه مقاطع بافتی قابل مشاهده می باشد (نگاره های ۱، ۲).

#### تجزیه و تحلیل آماری داده ها:

آنالیز آماری داده ها در هر دو گروه تیمار و شاهد، توسط نرم افزار SPSS و ویرایش ۱۳ و آزمون T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اختلاف میانگین تغییرات پروتئین BCL2 بین گروه های تیمار و شاهد معنی دار ( $p < 0.01$ ) بوده (نمودار ۱).



نمودار ۱: میانگین تغییرات پروتئین BCL2 در بافت کولون گروه تیمار و شاهد داده ها بصورت mean±SEM ارائه شده است،  $p < 0.01$ \* در مقایسه با گروه شاهد. (n=28).

#### روش تهیه عصاره گل همیشه بهار

به منظور تهیه عصاره گل همیشه بهار، ابتدا گل ها خشک و پودر شده و سپس به روش ماسراسیون (خیساندن) در سرما توسط حلال ان-هگزان چربی زدایی می شوند. جهت حصول عصاره با محتوای مواد موثره حداکثر، از حلال متانل ۷۰ درصد استفاده گردید. استخراج نمونه در سرما به روش ماسراسیون انجام و عمل استخراج تا خروج کامل مواد از پودر نمونه چندین بار تکرار گردید. عصاره های بدست آمده تحت خللا و در دمای پائین کاملاً خشک و جهت مطالعه اثر آن در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گرفت. عصاره هیدروالکلی فوق به صورت پودر به همراه سرم سالین با دوز ۲۰۰ میلی گرم / کیلوگرم وزن بدن گاواژ گردید.

#### روش انجام ایمنو هیستوشیمی:


۱- تهیه بلوک پارافینی ۲- برش به ضخامت ۳ میکرون و قرار دادن مقاطع بر روی لام سایلین ۳- پارافین زدائی ۴- قرار دادن مقاطع در مایکروویو ۵- قرار گرفتن مقاطع در دمای اتاق بمدت ۱۵ دقیقه ۶- شستشو بافت ها در آب جاری ۷- شستشو در بافر TBST ۸- پوشاندن لام ها با آب اکسیژنه ۹- شستشو با بافر TBST ۱۰- پوشاندن لام ها با منوکلونال آنتی بادی BCL2 موش به همراه آنتی سرم آنتی BCL2 خرگوش (ساخت کمپانی DAKO) ۱۱- قرار دادن مقاطع در دمای اتاق بمدت ۳۰ دقیقه ۱۲- شستشو با بافر TBST ۱۳- پوشاندن سطح لام ها با پلیمر لیبیل شده با پراکسیداز ۱۴- شستشو با بافر TBST ۱۵- پوشاندن سطح لام ها با کروموژن + سوبسترا ۱۶- شستشو با بافر TBST ۱۷- رنگ آمیزی هماتوکسیلین و مونت کردن (۱۸، ۲۰، ۲۲).

#### روش نمونه برداری و آنالیز آماری داده ها:


مطالعه حاضر به روش مطالعه تجربی مداخله گروه متغیرهای مورد ارزیابی در آن ۱- عصاره گل همیشه بهار به عنوان متغیر مستقل می باشد ۲- تغییرات پدیداری پروتئین BCL2 در بافت کولون به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و برای آنالیز نتایج حاصله از هر گروه تیمار با شاهد از آزمون تی مستقل استفاده شده است. بر اساس جدول کوهن و ضریب اثر ۰/۵ و توان آزمون (1-beta) ۹۰ درصد حداقل حجم نمونه ۲۸ مورد است. جهت بررسی میزان پدیداری پروتئین BCL2 به روش رتبه بندی میزان پدیداری پروتئینی در گروه های تیمار و شاهد استفاده گردید که الگوی رتبه



کاسپاز-۳ می‌باشد (۶، ۷). آکوئی و همکاران و دینا در سال ۲۰۰۷ بیان نمودند که ژن APC یا Adenomatous Polyposis Coli به‌عنوان یک ژن ساپرس‌کننده رشد تومور و مشوق آپوپتوز شناخته شده است، محصول ژن APC پروتئینی است به وزن ۳۱۲ کیلو دالتون که دارای دومن‌های متعددی است که از آن طریق با سایر پروتئین‌ها باند می‌شود که شامل پروتئین بتا-کاتنین، آکسین، CTBC، Asefs، IQGAP1 و میکروتوبول ه می‌باشد. نقش دیگری که برای APC بیان شده اتصال و مهاجرت سلولی، سازماندهی آکتین و شبکه میکروتوبولی سلول‌ها است و از این نظر می‌توان تغییرات آناپلاستیک مشاهده شده در مطالعه حاضر را تفسیر نمود زیرا که با نقص ایجاد شده در شکل‌گیری دوک‌های تقسیم‌سلولی و اتصال بین سلولی (موتاسیون ژن APC) شرایط برای برهم خوردن پلاریته سلولی و تشکیل سلول‌های پلی پوئیدی مساعد می‌گردد (۴، ۲۱). تاثیرات آنتی موتاسیونی عصاره گل همیشه بهار در بیان پروتئین‌های مشوق آپوپتوز نظیر پروتئین BAX، APCs و BCL2 می‌تواند یک توجیح دیگری برای نتایج معنی‌دار مطالعه حاضر مطرح باشد، البته نباید نقش پروتئین بتاکاتنین را نیز در این مورد فراموش نمود که عصاره گل همیشه بهار به شکل غیر مستقیم بر روی آن اثر گذاشته و الگوی مرگ سلول‌های نئوپلاستیک را در کارسینوم کولورکتال تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایس و همکاران در سال ۱۹۹۰، جیمز در سال ۲۰۰۶ و باراجیز در سال ۲۰۰۶ به این نتیجه رسیدند که عصاره گل همیشه بهار دارای خاصیت ضدسرطانی است که دلیل آن وجود ماده شیمیایی بنام ساپونین در آن می‌باشد، ساپونین موجود در عصاره گل همیشه بهار آنتی موتاسیون، مشوق آپوپتوز و مهارگر پروتئین BCL2 می‌باشد (۷، ۴، ۱)، مچنین موتو هیوکوک و همکاران در سال ۲۰۰۶ بیان داشتند که دو ترکیب شیمیایی موجود در عصاره گل همیشه بهار بنام تری ترپن گلیکوزیداز-۹ و ۱۰ دارای خاصیت سیتوتوکسیسیته می‌باشند که توانسته‌اند در لاین‌های سلولی موارد سرطان‌های کولون، ملانوم و لوسمی در حد ۵۰ درصد پتانسیل القاء مرگ سلولی را نشان دهند ناگفته نماند که محصول تری ترپن گلیکوزیداز-۱۰ حاصل از عصاره گل همیشه بهار در مهار فرآیندهای التهابی نیز موثر بوده است (۱۹). نتایج مطالعات سایر دانشمندان و مقایسه آن با نتایج مطالعه حاضر نشانگر آن است که عصاره گل همیشه بهار تا حدودی می‌تواند در مهار بیان پروتئین BCL2 در سلول‌های نئوپلاستیک کولون در شرایط *in vivo* موثر واقع گردد در حقیقت مهار این پروتئین می‌تواند آغازگر فعالیت پروتئین Bax و آبشار کاسپازی در مسیرهای درونزاد سلولی برای وقوع آپوپتوز باشد. بر اساس مطالعات سارکز و همکاران وی در سال ۲۰۰۱ کاهش بیان پروتئین BCL2 در کارسینوم‌های کولون می‌تواند علاوه بر بیان وقوع میزان تغییرات آپوپتوتیک به‌عنوان یک ایندکس تشخیصی در تفسیر وضعیت پیشرفت تومور حائز اهمیت باشد (۲۴، ۲۵)، (۲۲، ۲۳). به هر شکل آنچه که در این مطالعه مشخص شد این است که با تاثیر



نگاره ۱- نمای ریزبینی از بافت اپی تلیوم نئوپلاستیک کولون موش صحرانی گروه شاهد که در آن پدیداری BCL2 در کریپت‌های غیرعادی کولون یا (Aberrant Crypt Foci) به رنگ قهوه‌ای روشن (فلش‌ها) به وسعت بیشتری قابل رویت می‌باشد. (بزرگنمایی ۴۰× ایمونو هیستوشیمی پروتئین BCL2. پدیداری پروتئین BCL2 بوسیله آنتی بادی مونوکلونال آنتی BCL2 موش و آنتی سرم آنتی بتا-کاتنین خرگوش).



نگاره ۲- نمای ریزبینی از بافت اپی تلیوم نئوپلاستیک کولون موش صحرانی گروه تیمار که در آن پدیداری BCL2 در کریپت‌های غیرعادی یا (Aberrant Crypt Foci ACF) کولون به رنگ قهوه‌ای روشن (فلش‌ها) با وسعت کمتری در مقایسه با گروه شاهد قابل رویت می‌باشد. (بزرگنمایی ۴۰× ایمونو هیستوشیمی پروتئین BCL2. پدیداری پروتئین BCL2 بوسیله آنتی بادی مونوکلونال آنتی BCL2 موش و آنتی سرم آنتی BCL2 خرگوش).

## بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصله از مطالعات جیمز و همکاران وی در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که عصاره گل همیشه بهار توانسته است در محیط‌های کشت سلول‌های سرطانی متعد نظیر لوسمی، ملانوما، فیبروسارکوم، کارسینوم‌های پستان، پروستات، سرویکس، ریه، پانکراس و کولورکتال را در حد ۷۰ الی ۱۰۰ درصد از بین ببرد، آن‌ها این موضوع را چنین توجیح نمودند که عصاره گل همیشه بهار بواسطه اثر مهار بر تقسیم سلولی در فاز G0/G1 و فعال نمودن مسیر آبشار کاسپازی باعث القاء آپوپتوز و مهار BCL2 در سلول‌های سرطانی محیط کشت می‌شود، همچنین اشاره داشتند که مهمترین مسیر آنزیمی موثر، آنزیم



## References

1. Barajas-Farias, L.M., Pérez-Carreón, J.I., Arce-Popoca, E. (2006) A dual and opposite effect of *Calendula officinalis* flower extract: chemoprotector and promoter in a rat hepatocarcinogenesis model. *Planta Med.*, **72**(3):217-21.
2. Bird, R.P. (1995) Role of aberrant crypt foci in understanding the pathogenesis of colon cancer. *Cancer Letters*, **93**: 55-71.
3. Chithra, V., Leelamma, S. (2000) *Coriandrum sativum*- effect on lipid metabolism in 1, 2- dimethyl hydrazine induced colon cancer. *Journal of Ethnopharmacology*, **71**:457-463.
4. Dikavsakaya, D., Schiffmam, D., Lan, P. (2007) Loss of APC incidence polypoidy as a results of a combination of defects in mitosis and apoptosis. *Journal of Cell Biol*, **176**:183-195.
5. Fearon, E. R., Vogelstein, B. (1990) A genetic model for colorectal tumorigenesis. *Cell*, **61**: 759-767.
6. Pe´ rez-Carreo´ Na, G. Cruz-Jime´ nez, J.A. Licea-Vegab, E. (2001) Genotoxic and anti-genotoxic properties of *Calendula officinalis* extracts in rat liver cell cultures treated with diethylnitrosamine. *Toxicology in Vitro*, **16**:253-258.
7. Jimenez-Medina, E., Garcia- Lora, A., Paco, L., et al. (2006) A new extract of the plant *Calendula officinalis* produces a dual in vitro effect: cytotoxic anti-tumor activity and lymphocyte activation. *BMC Cancer*, **6**:119.
8. Kamaleeswari, M., Deeptha, K., Sengottuvelan, M., Nalini, N. (2006) Effect of dietary caraway (*Carum carvi* L.) on aberrant crypt foci development, fecal steroids, and intestinal alkaline phosphatase activities in 1, 2- dimethylhydrazine- induced colon carcinogenesis. *Toxicology and Applied Pharmacology*, **214**:290-296.
9. Mc Dias, A. L. T., Spinardi- Barbisan, M. A. (2006) Lack of chemopreventive effects of ginger on colon carcinogenesis induced by 1,2-dimethylhydrazine in rats. *Food and Chemical Toxicology*, **44**(6):877-884.
10. Manju, V., Nalini, N. (2005) Chemopreventive efficacy of ginger, a naturally occurring anticarcinogen during the initiation, post-initiation

عوامل ضد التهابی و ضدسرطانی عصاره گل همیشه بهار میزان بیان پروتئین BCL2 تغییر می یابد.

## تشکر و قدردانی

با تقدیر و تشکر از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه بودجه مورد نیاز این طرح پژوهشی.

- stages of 1, 2 dimethylhydrazine- induced colon cancer. *Clinica Chimica Acta*, **358**:60-67.
11. Mason, J.B. (2002) Nutritional chemoprevention of colon cancer. *Seminaries in Gastrointestinal Disease*, **13**:143-153.
  12. Negri, E., D'Avanzo, B., Tavani, A. (1994) The role of vegetables and fruit in cancer risk. In: Hill, M.J., Giacosa, A., Caygill, C.P. (eds.) *Epidemiology of Diet and Cancer*. Ellis Horwood, London, 327-334.
  13. Reddy, B.S. (1995) Nutritional factors and colon cancer. *Crit Rev Food Sci Nutr.*, **35**:175-90.
  14. Rodrigues, M.A.M., Silva, L.A.G., Salvadori, D.M.F., Camargo, J.L.V., Montenegro, M.R. (2002) Aberrant crypt foci and colon cancer: comparison between a short- and medium term bioassay for colon medium-term bioassay for colon carcinogenesis using dimethylhydrazine in Wistar rats. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, **35**:351-355.
  15. Shike, M., Winamer, S.J., Greenwald, P.H., Bolch, A., Hill, M., Swaroop, S.V. (1998) Primary prevention of colorectal cancer. *Bull. World Health Org*, **68**:377-385.
  16. Thurnherr, N., Deschner, E.E., Stonehill, E.H., Lipkin, M. (1973) Induction of adenocarcinomas in the colon in mice by weekly injection of 1, 2- dimethylhydrazine. *Cancer Research*, **33**:940-945.
  17. Willett, W.C., Stamfer, M.J., Colditz, G.A., Rosner, B.A., Speizer, F.E. (1990) Relation of meat, fat and fiber intake to the risk of colon cancer in a prospective study among women. *N Engl J Med*, **323**:1664- 72.
  18. Wynder, E.L. (1975) The epidemiology of large bowel cancer. *Cancer Res*, **35**:3388- 94.
  19. Motohiko, U., Toshihiro, A., Ken, Y., Harukuni, T., Takashi, S., Yumiko, K. (2006) Anti-Inflammatory,



- Anti-Tumor-Promoting, Cytotoxic Activities of Constituents of Marigold (*Calendula officinalis*) Flowers. *J. Nat. Prod.*, **69**:1692-1696.
20. Boucaud-Maitre, Y., Algernon, O., Raynaud, J. (1988) Cytotoxic and antitumoral activity of *Calendula officinalis* extracts. *Pharmazie*, **43**:220-221.
21. Aoki, K., Taketo, M. (2007) Adenomatous polyposis coli (APC): a multi-functional tumor suppressor gene. *J. Cell Sci.*, **120**: 3327-3335.
22. Sarkis, H., Meterissian, M.D., Kontogiannea, M. (2001) BScBcl-2 Is a Useful Prognostic Marker in Dukes' B Colon Cancer. *Annals of Surgical Oncology*, **8**: 533-537.
23. Boise, L.H., Gonzalez-Garcia, M., Postema, C.E., et al. (1993) Bcl-xL, a bcl-2 related gene that functions as a dominant regulator of apoptotic cell death. *Cell*, **74**:597-608.
24. Ofner, D., Riehemann, K., Maier, H., et al. (1995) Immunohistochemically detectable bcl-2 expression in colorectal carcinoma: correlation with tumor stage and patient survival. *Br J Cancer*, **77**: 981-5.
25. Baretton, G.B., Diebold, J., Christoforis, G., et al. (1996) Apoptosis and immunohistochemical bcl-2 expression in colorectal adenomas and carcinomas. Aspects of carcinogenesis and prognostic significance. *Cancer*, **77**:255-64.