

جداسازی و شناسایی مولکولی گونه‌های آسپرژیلوس خوراک دام

سمیرا رنجبر^۱، راضیه نظری^{۱*}، میترا نوری^۲

۱- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم-ایران.

۲- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک-ایران.

* نویسنده مسئول: Nazarill02002@yahoo.com

دریافت مقاله: ۲۱ بهمن ۸۹، پذیرش نهایی: ۴ خرداد ۹۰

Isolation and molecular identification of *Aspergillus* species of cattle feed

Ranjbar, S.¹, Nazari, R.^{1*}, Noori, M.²

¹Department of Microbiology, Faculty of Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom- Iran.

²Department of Biology, Faculty of Science, University of Arak, Arak- Iran.

Abstract

Some species belonging to the genus *Aspergillus* are potential producers of aflatoxin, a mycotoxin with teratogenic and carcinogenic effects. Cattle feed pollution with the species of *Aspergillus* cause production of aflatoxin and its transfusion to milk and milk products. Utilizing polluted feed disorder health domestic, milk and consumers. In this study used feed composition were examined in ten animal's farm in arak in the years 2009 and 2010. Results showed the most feed composition materials were corn, cotton and canola meal, feed supplements, barley, wheat bran, dried bread, fat powder and alfalfa. Isolation, cultivation and identification of feed *Aspergillus* on macroscopic colony characteristics and microscopic morphology were done. A PCR assay was used to identify species of *Aspergillus* from one another. DNA sequencing of the ITS1-5.8S-ITS2 region of ribosomal DNA gene complex was also conducted for the identification of species by comparative Gen Bank sequence analysis. The results indicated the presence of *Aspergillus flavus*, *Aspergillus clavatus* in cattle feed of the animal's farm. *J. Vet. Microbiol.* 7,1:11-17, 2011.

Keywords: *Aspergillus flavus*, PCR, Cattle feed.

چکیده

برخی گونه‌های جنس آسپرژیلوس مولدین بالقوه آفلاتوکسین می‌باشند که مایکوتوکسینی با اثرات کارسینوژنیک و تراژوژنیک است. آلودگی خوراک دام با گونه‌های آسپرژیلوس سبب تولید آفلاتوکسین، انتقال آن به شیر و فرآورده‌های لبنی و اختلال در سلامت دام، شیر و افراد مصرف‌کننده آن می‌گردد. در این تحقیق ترکیبات خوراک سالانه مورد استفاده در ده دامداری شهر اراک در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بررسی گردید. نتایج نشان داد بیشترین مواد تشکیل دهنده خوراک دام شامل ذرت، کنجاله پنبه دانه و کلزا، مکمل‌های غذایی، جو، سیوس گندم، نان خشک، پودر چربی و یونجه بوده است. پس از جداسازی و کشت در محیط اختصاصی، آسپرژیلوس‌های جدا شده از خوراک دام با روش میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت شناسایی مولکولی آسپرژیلوس‌های جدا شده از روش PCR استفاده شد. جهت شناسایی گونه‌ها قطعه ژنی S-ITS5.8-ITS درون کمپلکس ژنی DNA ریبوزومی تعیین توالی و در Gen Bank مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دامداری‌های شهر اراک خوراک دام با دو گونه آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس کلاواتوس آلوده بوده است. مجله میکروبیولوژی دامپزشکی ۱۳۹۰، دوره ۷، شماره ۱، ۱۷-۱۱.

واژه‌های کلیدی: خوراک دام، آسپرژیلوس فلاووس، PCR.

مقدمه

قارچ‌ها از عوامل بیولوژیک مهم آلوده کننده خوراک دام بوده و با ترشح آنزیم‌ها و متابولیت‌های مختلف می‌توانند نه تنها باعث فساد و از بین بردن غلات از جمله گندم شوند بلکه می‌توانند با تولید سموم مختلف از جمله آفلاتوکسین از عوامل



عمدتاً ناحیه ITS5.8-ITS1 می‌باشد. تکثیر این ناحیه از طریق PCR و تعیین توالی و بررسی آن در Gene bank جهت شناسایی مولکولی گونه‌های آسپرژیلوس مورد استفاده قرار می‌گیرد (۷ و ۱۱).

هدف از انجام این تحقیق بررسی خوراک دام در دامداری‌های شهر اراک از لحاظ آلودگی با گونه‌های آسپرژیلوس و شناسایی و بررسی مولکولی آسپرژیلوس‌های جدا شده جهت تعیین دقیق گونه‌های آن می‌باشد.

مواد و روش کار

۱. تهیه و نمونه برداری از خوراک دام:

تعداد ۱۰ دامداری صنعتی و سنتی به طور تصادفی در شهر اراک انتخاب شد (جدول ۱).

از پاییز سال ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۸۹ از مجموع ۱۰ دامداری، تعداد ۵۳۲ نمونه خوراک دام که شامل مواد مختلف از جمله نان خشک، کاه، یونجه، ذرت سیلو شده، آرد سبوس و خوراک مخلوط بود نمونه برداری انجام گرفت (جدول ۲ و ۳).

برای تهیه نمونه‌های خوراک دام به دامداری‌های واقع در شمال و جنوب و شرق اراک در چهار فصل سال مراجعه شد. از هر یک از ترکیبات خوراک دام‌های مورد استفاده، نمونه‌های ۲۰۰ گرمی از مکان‌های مختلف انبار خوراک دام تهیه و در کیسه‌های کاغذی، برچسب دار، استریل قرار داده و به آزمایشگاه منتقل شدند.

۲. جداسازی آسپرژیلوس‌های خوراک‌های دام:

جهت جداسازی گونه‌های آسپرژیلوس از خوراک دام، ابتدا خوراک دام‌ها را به طور جداگانه در داخل پلیت خالی ریخته و سپس به آن‌ها اندکی آب مقطر در حدی که خوراک مرطوب شود افزوده و با چرخاندن پلیت آب بطور یکنواخت در تمام سطح خوراک پخش گردید. سپس پلیت‌ها در مکان تاریک در دمای ۲۸-۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک هفته قرار گرفت.

کلنی‌های رشد یافته در هر پلیت ابتدا مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. برای این منظور با یک سیم خم شده با زاویه ۹۰ درجه بخش کوچکی از کلنی جدا و روی لام قرار داده شد. یک قطره لاکتوفنل کاتن بلو به آن افزوده و به آرامی یک لامل بر روی لام قرار داده شد. سپس لام‌ها در زیر میکروسکوپ بررسی گردید و براساس ساختار میسلیوم، اسپرانژ یوفور، اسپرانژ یوسپور، کونیدی، کونیدیوفور شناسایی اولیه گونه‌های

کبدی و عوارض تراژونیک در انسان و حیوان شود. همچنین این سم می‌تواند از راه مصرف غذا و خوراک دام‌ها از راه شیر و فرآورده‌های آن به انسان منتقل شود (۹). با توجه به اینکه شیر ماده غذایی اصلی برای رشد کودکان می‌باشد، و وجود آفلاتوکسین در شیرهای تجاری موجود، شیرمادر و فرآورده‌های شیری یکی از جدی‌ترین مشکلات بهداشت جهانی است (۳). در بین گونه‌های مولد آفلاتوکسین، قارچ آسپرژیلوس فلاووس از مهم‌ترین و شایع‌ترین قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در خوراک دام بوده است (۵). اسپوره‌های این قارچ از راه هوا منتشر و سبب آلودگی غلات، حبوبات، علوفه و خوراک دام به آفلاتوکسین می‌گردد (۸). استفاده از خوراک دام ناسالم و آلوده سبب اختلال در چرخه سلامت دام، شیر و افراد مصرف کننده شیر و فرآورده‌های لبنی می‌گردد. پژوهش‌های مختلف بر روی خوراک دام نشان داده است که آلودگی خوراک دام به کپک‌ها بویژه گونه‌های آسپرژیلوس سبب تولید آفلاتوکسین و انتقال آن به شیر و فرآورده‌های آن می‌شود. در علوفه، غلاتی مانند ذرت، جو، گندم، سویا، کپک‌ها به آسانی در حین داشت، برداشت، فرآوری، حمل و انبارداری رشد نموده و در آن‌ها آفلاتوکسین تولید می‌کنند. تا کنون گزارش‌های بسیاری در خصوص آلودگی کپکی خوراک دام، وجود آفلاتوکسین در آن‌ها و تلفات دام و طیور در اثر مصرف این خوراک‌ها گزارش شده است. Goldbatt در سال ۱۹۶۹ مرگ بیش از صد هزار بوقلمون را در انگلستان بر اثر آلودگی بادام زمینی برزیلی به کپک آسپرژیلوس و تولید آفلاتوکسین در آن‌ها گزارش نمود (۴).

شناسایی سنتی گونه‌های آسپرژیلوس معمولاً بر اساس ویژگی‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی آن‌ها بوده که گاهی اوقات شناسایی و تمایز بین گونه‌ها بر اساس این ویژگی‌ها نیز با مشکل مواجه می‌گردد. همچنین شناسایی سنتی گونه‌ها به چندین روز زمان جهت کشت نیاز دارد. لذا امروزه روش‌های سریع بر اساس اسید نوکلئیک جهت شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس توسعه یافته و جایگزین روش‌های شناسایی سنتی شده است. موفق‌ترین روش مورد استفاده در این مسیر روش PCR می‌باشد که به عنوان روش سریع، حساس و اختصاصی جهت شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس شناخته شده است. نواحی هدف DNA که معمولاً به طور گسترده جهت تشخیص و تمایز گونه‌های آسپرژیلوس در روش PCR مورد استفاده قرار می‌گیرد، قطعاتی در کمپلکس ژنی DNA ریبوزومی بوده که



جدول ۱ - کد و نام ایستگاه‌های دامداری مورد مطالعه.


code	Name
S1	Bahare
S2	Abasi
S3	Asra
S4	Azad
S5	Sosanabad
S6	Mansori
S7	Alba
S8	Eydi
S9	Gavar
S10	Mir yahya

جدول ۲ - انواع خوراک دام‌های مورد مطالعه.

علامت اختصاری	معادل انگلیسی	معادل فارسی
Me	Medicago sativa (alfalfa)	یونجه
Ze	Zea myse (corn)	ذرت
Wh	Wheat straw	کاه
Ur	Urea	اوره
Ho	Barley	جو
So	Soya	سویا
Cc	Canola meal	کنجاله کلزا
Csc	Cotton seed meal	کنجاله پنبه دانه
Wb	Wheat bran	سبوس گندم
Bp	Beet pulp	چغندر قند
Db	Dried bread	نان خشک
Co	Concentrate	کنسنتانتره
To	Toxiban	توکسی بان
AB	Acid Buf	اسید یاف
Gl	Glycolin	گلیکولین
Cu	Culin	کولین
Bi	Biotex	بیوتکس
Mo	Monocin	مونوسین
Te	Tepax	تپاکس
MgO	MgO	اکسید منیزیم
Bs	Baking soda	جوش شیرین
Fap	Fat powder	پودر چربی
Fip	Fish powder	پودر ماهی
Mfc	Mineral supplement	مکمل مواد معدنی
Vfc	Vitamin supplement	مکمل ویتامین
CaCO3	CaCO3	کربنات کلسیم
En	Enzymit	انزیمیت
Nacl	Nacl	نمک
Ro	Romifut	رومیفات
Po	Polymix	پلی میکس
Ca2po4	Ca2po4	فسفات کلسیم
Fc	Food supplement	مکمل غذایی

جدول ۳ - تعداد خوراک دام‌های مورد مطالعه در دامداری‌ها. N.F.C. Composition: Number of Feed.

N	N.F.C.
S1	۲۱
S2	۱۷
S3	۱۳
S4	۲۰
S5	۷
S6	۱۸
S7	۱۳
S8	۶
S9	۷
S10	۱۱



شکل ۱ - نتایج حاصل از PCR جهت شناسایی مولکولی گونه‌های اسپریلوس جدا شده. ستون ۱ - مارکر 1 kb (Fermentas) ستون ۲، ۳ - محصول PCR دو گونه اسپریلوس، ستون ۴ - کنترل منفی.

گرما گذاری شد. سپس کلنی‌های حاصل بررسی و جهت اطمینان از خالص بودن نمونه‌ها از روش کشت بر روی لام (Slide culture technique) استفاده شد.

۳. استخراج DNA ژنومیک از گونه‌های اسپریلوس جدا شده از خوراک دام:

اسپریلوس انجام گرفت. پس از تشخیص اسپریلوس‌ها کشت اختصاصی هر گونه روی محیط ساپرو دکستروز آگار انجام گردید و پلیت‌ها در دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت



Query	1	CCTCCACCCGTGTTTACTGTACCTTAGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCATTCATGGCCGCC	60
Sbjct	23	CCTCCACCCGTGTTTACTGTACCTTAGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCATTCATGGCCGCC	82
Query	61	GGGGGCTCTCAGCCCCGGGCCCGCCGCGGAGACACCACGAACTCTGTCTGATCTAG	120
Sbjct	83	GGGGGCTCTCAGCCCCGGGCCCGCCGCGGAGACACCACGAACTCTGTCTGATCTAG	142
Query	121	TGAAGTCTGAGTTGATTGTATCGCAATCAGTTAAAACCTTCAACAATGGATCTCTTGGTT	180
Sbjct	143	TGAAGTCTGAGTTGATTGTATCGCAATCAGTTAAAACCTTCAACAATGGATCTCTTGGTT	202
Query	181	CCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAGTGTGAATGCAGAATTCCTCGT	240
Sbjct	203	CCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAGTGTGAATGCAGAATTCCTCGT	262
Query	241	AATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCGGGGGGCATGCCTGTCC	300
Sbjct	263	AATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCGGGGGGCATGCCTGTCC	322
Query	301	GAGCGTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTCGTCGCCCTCTCC	360
Sbjct	323	GAGCGTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTCGTCGCCCTCTCCGGG	382
Query	361	ACGGGCCCAAAGGCAGCGGGCACCAGTCCGATCCTCGAGCGTATGGGGCTTT	420
Sbjct	383	GGGGACGGGCCCAAAGGCAGCGGGCACCAGTCCGATCCTCGAGCGTATGGGGCTTT	442
Query	421	GTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGCGCTTGCCGAACGCAAATCAATCTTTTCCAGGT	480
Sbjct	443	GTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGCGCTTGCCGAACGCAAATCAATCTTTTCCAGGT	502
Query	481	TGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAA	538
Sbjct	503	TGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAA	560

شکل ۲ - نتیجه حاصل از Blast توالی محصول PCR مربوط به یکی از اسپرژیلوس های جدا شده.

Aspergillus flavus strain NRRL 32354 internal transcribed spacer. 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene and internal. transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal. RNA gene, partial sequence. Length=945

Score = 994 bits (538), Expect = 0.0. Identities = 538/538 (100%), Gaps = 0/538 (0%). Strand=Plus/Plus

مدت ۴۸ ساعت گرما گذاری گردید. جهت استخراج DNA ژنومیک از کیت استخراج DNA شرکت سیناژن استفاده شد. در نهایت تیوپ حاوی DNA در دمای ۱۵- تا ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد.

۴. واکنش PCR:

جهت شناسایی مولکولی اسپرژیلوس های خوراک دام قطعه S-ITS5.8-1ITS برای طراحی پرایمر انتخاب و پرایمر Forward با توالی -G-5 -GTA-GGT-GAA-CCT-GCG -TCC و پرایمر Reverse با توالی ۳-5-C-TAT-TGA-TAT-TCC-TCC-GCT توسط شرکت سیناژن ساخته شد. در مرحله بعد واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای های Forward و Reverse، DNA ژنومیک گونه های اسپرژیلوس جدا شده به عنوان الگو و طی سیکل های حرارتی مطابق جدول ۴ انجام گردید. در نهایت محصول PCR با استفاده از ژل آگارز ۲ درصد حاوی اتیدیوم بروماید الکتروفورز و با استفاده از UV

جدول ۴ - مراحل واکنش PCR جهت شناسایی مولکولی اسپرژیلوس های جدا شده از خوراک دام.

شماره	مرحله	دما	زمان	تعداد
1	دنا تورا سیون اولیه	95	5 min	1
2	دنا تورا سیون	94	1 min	35
3	پرایمر annealing	58	1 min	35
4	تکثیر ابتدایی	72	1 min	35
5	تکثیر نهایی	72	5 min	1
6	Hold	15		1

برای استخراج DNA ژنومیک ابتدا اسپرژیلوس های جدا شده از خوراک دام در محیط سابرو دکستروز برات کشت داده شد. برای این منظور تعداد ۱۰۷ اسپور به ۵۰ میلی لیتر محیط سابرو دکستروز برات درون ارلن های ۲۵۰ میلی لیتر تلقیح گردید. ارلن ها روی شیکرانکو با توردار در دمای ۲۸ درجه بادور ۲۰۰rpm به

Query	1	CGTGTTTATCGTACCTTGTGCTT	60
Sbjct	214	CGTGTTTATCGTACCTTGTGCTTCGGCGGGCCCGCCGCTTCGGACGGCCCGGGGAG	273
Query	61	AAGACCACAACATGAACTCTGTTCTGAAGT	120
Sbjct	274	GCCTCCGCGCCCCGGGCCCGCGCCCGCAAGACCACAACATGAACTCTGTTCTGAAGT	333
Query	121	TTTGAGTCTGAGTTGATTATCATAATCAGTTAAAACTTCAACAACGGATCTCTTGGTT	180
Sbjct	334	TTTGAGTCTGAGTTGATTATCATAATCAGTTAAAACTTCAACAACGGATCTCTTGGTT	393
Query	181	CCGGCATCGATGAAGAACGACGCGAAATGCGATAACTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTG	240
Sbjct	394	CCGGCATCGATGAAGAACGACGCGAAATGCGATAACTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTG	453
Query	241	AATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCGGGGGGCATGCCTGTCC	300
Sbjct	454	AATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCGGGGGGCATGCCTGTCC	513
Query	301	GAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCAGGCTTGTGTGTTGGGCCCCCGTCCC CGGTTTCCCG	360
Sbjct	514	GAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCAGGCTTGTGTGTTGGGCCCCCGTCCC CGGTTTCCCG	573
Query	361	GGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGGGCACCGCTCCGGTCTCGAGCGTATGGGGCTTTG	420
Sbjct	574	GGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGGGCACCGCTCCGGTCTCGAGCGTATGGGGCTTTG	633
Query	421	TCACCCGCTCTTGTAGGGCCGGCCGGCGCCTGTCGACACCAACCAATTTTCTAAGGTT	480
Sbjct	634	TCACCCGCTCTTGTAGGGCCGGCCGGCGCCTGTCGACACCAACCAATTTTCTAAGGTT	693
Query	481	GACCTCGGATCAGGTAGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAA	537
Sbjct	694	GACCTCGGATCAGGTAGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAA	750

شکل ۳ - نتیجه حاصل از Blast توالی محصول PCR مربوط به یکی از اسپریژیلوس های جدا شده.

Aspergillus clavatus strain ATCC 1007 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. Length=877

Score = 992 bits (537), Expect = 0.0. Identities = 537/537 (100%), Gaps = 0/537 (0%). Strand=Plus/Plus.

بر اساس ویژگی‌های کلنی و نیز ساختار میسلیم، اسپرانژیوفور، اسپرانژیوسپور، کونیدی، کونیدیوفور دو گونه به عنوان اسپریژیلوس معرفی گردید.

شناسایی و بررسی مولکولی گونه‌های اسپریژیلوس جدا شده

با روش PCR:

پس از شناسایی اولیه گونه‌های اسپریژیلوس های جدا شده، از روش PCR جهت شناسایی مولکولی استفاده شد. نتایج واکنش PCR ایجاد باند ۶۰۰ جفت بازی را نشان داد و مشخص نمود که هر دو نمونه مورد بررسی متعلق به جنس اسپریژیلوس می باشند (شکل ۱). در مرحله بعد محصول PCR مربوط به هر نمونه به طور جداگانه در یخ جهت تعیین توالی به شرکت SeqLab آلمان ارسال گردید. توالی نوکلئوتیدی خوانده شده مربوط به هر محصول PCR به طور جداگانه در سایت (NCBI Center for Biotechnology and Information National) تحت آنالیز Blast قرار گرفت. نتایج حاصل از

مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

بررسی آلودگی خوراک دام با گونه‌های اسپریژیلوس:

تمامی ۵۳۲ نمونه خوراک دام جمع آوری شده از دامداری‌های مختلف در فصول متعدد از لحاظ آلودگی با گونه‌های اسپریژیلوس مورد بررسی و کشت قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان مواد تشکیل دهنده خوراک دام، ذرت و سبوس گندم بیشترین آلودگی با گونه‌های اسپریژیلوس را دارند.

در ضمن بررسی خوراک دام در ۱۰ ایستگاه مورد نظر نشان داد که دو گونه از اسپریژیلوس به طور مشترک در همه فصول در دامداری‌های مورد مطالعه مشاهده گردید.

در مرحله بعد دو گونه اسپریژیلوس جدا شده با روش میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت.



مولکولی آسپرژیلوس های جدا شده از خوراک دام استفاده شد. قطعه ژنی S-ITS5.8-1ITS درون کمپلکس ژنی DNA ریبوزومی برای این منظور انتخاب و پرایمرهای مورد استفاده در واکنش PCR بر اساس این قطعه ژنی طراحی گردید (۶). در صورتی که قارچ جدا شده به دسته آسپرژیلوس ها تعلق داشته باشد در اثر واکنش PCR با استفاده از این پرایمرها باند ۶۰۰bp ایجاد می گردد. نتایج واکنش PCR هر دو گونه آسپرژیلوس جدا شده از خوراک دام باند ۶۰۰bp را نشان داد که تائیدی بر شناسایی صحیح اولیه آسپرژیلوس با استفاده از تست های میکروسکوپی و ماکروسکوپی می باشد (شکل ۱). این نتایج با نتایج Magnani در سال ۲۰۰۵ مطابقت دارد (۱۱). از آنجائیکه در مطالعات مختلف از قطعه ژنی فوق جهت شناسایی گونه های مختلف آسپرژیلوس استفاده شده است، در این تحقیق نیز به منظور تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده، محصولات PCR تعیین توالی گردید (۱۱ و ۷). نتایج تعیین توالی محصولات PCR پس از بررسی با استفاده از سایت NCBI و آنالیز Blast نشان داد که یکی از گونه های آسپرژیلوس جدا شده ۱۰۰ درصد با آسپرژیلوس فلاووس شباهت دارد (شکل ۲) و بنابراین به عنوان آسپرژیلوس فلاووس معرفی گردید. نتایج Blast توالی محصول PCR مربوط به گونه دیگر آسپرژیلوس جدا شده ۱۰۰ درصد تشابه با آسپرژیلوس کلاواتوس را نشان داد (شکل ۳) و بنابراین نمونه جدا شده به عنوان آسپرژیلوس کلاواتوس معرفی گردید.

با توجه به اینکه آسپرژیلوس های جدا شده از خوراک دام خصوصا آسپرژیلوس فلاووس یکی از مولدین اصلی آفلاتوکسین های کارسینوژنیک می باشد، بنابراین توصیه می شود تا شرایط استاندارد جهت انبار خوراک دام در دامداری ها رعایت گردد و به دامداران نیز آموزش های صحیح جهت نگهداری و انبار مناسب خوراک دام داده شود تا آلودگی قارچی خوراک دام جلوگیری و سلامت دام و افراد مصرف کننده از محصولات دامی تامین گردد.

منابع

1. Andrew, M., Borman, E., et al. (2008) Molecular identification of pathogenic fungi. *Journal of Antimicrobial chemotherapy*, **61(4)**: 7-12.
2. Berghofer, L. K., Hocking, A. D. (2003) Miskelly D.

نشان داد که یکی از گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک دام ۱۰۰ درصد با آسپرژیلوس فلاووس (شکل ۲) و دیگری ۱۰۰ درصد با آسپرژیلوس کلاواتوس (شکل ۳) تشابه دارد و در نتیجه این دو گونه به عنوان آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس کلاواتوس معرفی و مورد تائید مولکولی قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری

بررسی بر روی خوراک دام های نمونه برداری شده از نقاط مختلف انبار خوراک دام ده دامداری سنتی و صنعتی در شهر اراک نشان داد که ترکیب خوراک دام مورد استفاده در دامداری های مورد مطالعه متشکل از یونجه، ذرت، جو، کنجاله (کلزا، پنبه دانه)، سبوس گندم، نان خشک، پودر ماهی و چربی، مکمل های غذایی، خوراک دام مخلوط، آنتی بیوتیک، چغندر خشک، کاه، آرد (جو، گندم) می باشد (جدول ۲). مطالعات میکروسکوپی ترکیبات خوراک دام نشان داد که دو گونه از آسپرژیلوس بر روی این مواد رشد نموده و آن ها را آلوده می سازند زیرا این مواد به علت دارا بودن فاکتورهای لازم جهت رشد قارچ ها مانند pH، کربوهیدرات ها، چربی، املاح و نمک برای رشد این کپک ها مناسبند. آب و هوای گرم و مرطوب، انبارداری نامناسب، عدم اطلاع کافی دامداران در نگه داری صحیح خوراک دام شرایط مناسبی را برای رشد کپک ها فراهم می کند. دو گونه از آسپرژیلوس به طور مشترک در همه دامداری های مورد مطالعه در این تحقیق بر روی خوراک های دام در تمام فصول مشاهده شد. سالس و یوشیزاوا در سال ۲۰۰۵ با مطالعه بر روی ۷۸ نمونه خوراک دام از کشورهای تایلند و ویتنام، آلودگی ۹۴ درصد از نمونه ها را به گونه های آسپرژیلوس پرازیتیکوس و آسپرژیلوس فلاووس گزارش نمودند (۱۲). همچنین Bergofer و همکاران در سال ۲۰۰۳ در استرالیا گندم و آرد گندم مورد استفاده در خوراک دام دامداری ها را مورد مطالعه قرار دادند و کپک های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و کلادوسپوریوم را جداسازی و شناسایی نمودند (۲). Halt نیز دانه های گندم، جو و ذرت مورد استفاده در دامداری های کشور کرواسی را مورد بررسی قرار داده و گونه آسپرژیلوس فلاووس را به عنوان عامل اصلی آلوده کننده معرفی نمودند (۵) که نتایج تحقیق کنونی با نتایج فوق مطابقت دارد.

در مرحله بعد در این تحقیق از واکنش PCR جهت شناسایی



- Microbiology of wheat and flourmilling in Australia. *International Journal Food Microbiology*, **85(1-2)**: 137-49.
3. Galvano, F., Pietri, A., et al. (1996) Reduction of carry over of aflatoxin from cow feed to milk by addition of activated carbon. *Journal of Food Protection*, **59**: 551-554.
 4. Goldbatt, L. A. (1969) Aflatoxin. Academic Press, New York, 1-40.
 5. Halt, M. (1994) *Aspergillus flavous* and aflatoxin B1 in flour production. *Europian Journal Epidemiology*, **10(5)**: 555-8.
 6. Henry, J., Whitaker, H., et al. (2002) Aflatoxin M1 the codex committee. *Food Additives and contaminants*, 135-139.
 7. HinRikson, H. P., Hurst, S. F., et al. (2005) Molecular Methods for the identification of *aspergillus* species. *Medical Mycology Supplement*, **43**: 5129-5137.
 8. Hwang, J. H., Lee, K. G. (2006) Reduction of aflatoxin B1 contamination in wheat by various cooking treatments. *Food Chemistry*, **98(1)**: 71-75.
 9. Kang'ethe, E. K., M'Ibui, G. M. et al. (2007) Prevalence of aflatoxin M1 and B1 in milk and animal feeds from urban smallholder dairy production in Dagoretti Division, Nairobi, Kenya. *Eastern African Medical Journal*, **84(11)**: 83-6.
 10. Khanafari, A., Soudi, H. et al. (2007) Biocontrol of *Aspergillus flavus* and aflatoxin B1 production in corn. *Iranian Journal Environ Mental Health Sciences and Enginring*, **4(3)**: 163-168.
 11. Magnani, M., Fernandes, T., et al. (2005) Molecular identification of *Aspergillus* spp. isolated from coffee beans. *Science Agriculture*, **62**: 45-49.
 12. Sales, A. C., Yoshizawa, T. (2005) Updated profile of aflatoxin and *Aspergillus* section *flavi* contamination in rice and its byproducts from the Philippines. *Journal of Toxicology*, **22**: 429-439.
 13. Tayebi, J., Miraboualfathi, M. (2002) Aflatoxins B1, B2 and *Aspergillus flavus* contamination of several maize hybrids in field. *Applied Entomology Phytopathology*, **69(2)**: 79-84.

