



اثر عصاره هیدروالکلی زنجیل (*Zingiber officinal*) بر اسپرماتوژن و محور هورمونی

هیپوفیز - گنادی در موش‌های سوری بالغ

فاطمه رحمانیان^۱، وحید حمایت خواه جهرمی^{۲*}، امیراشرکان مهجور^۲، حسین کارگر^۳

چکیده

که هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و هورمون تستوسترون در گروه‌های تجربی با دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی-گرم بر کیلوگرم افزایش معنی دار ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه کنترل و شم دارد. همچنین نتایج نشان داد که در تعداد سلول‌های اسپرماتید، اسپرماتوژنید و لیدیگ در گروه‌های تجربی با دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به افزایش تعداد سلول‌های لیدیگ و افزایش غلظت تستوسترون می‌توان نتیجه‌گیری کرد که زنجیل ممکن است باعث تکثیر سلول‌های جنسی در موش‌های نر بالغ گردد.

کلمات کلیدی: زنجیل، یضه، تستوسترون، اسپرماتوژن، موش

کوچک آزمایشگاهی

مقدمه

ناباروری و مشکلات مربوط به آن به عنوان یکی از مسائل مهم در زندگی زوجین شناخته شده است. بر اساس آمارهای موجود ۳۵٪ موارد ناباروری زوجین مربوط به مردان می‌باشد که شایع ترین علت ناباروری مردان، عدم توانایی آنان در تولید کافی اسپرم‌های سالم و فعال است. نقش گیاهان دارویی و از جمله زنجیل در باروری مردان در طب سنتی مناطق مختلف دنیا ذکر گردیده است. مهمترین ترکیبات زنجیل شامل: جینجرول، شوگائول و سرکوئی ترپن‌ها است. در مورد اثرات زنجیل کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است که می-

توان به موارد زیر اشاره نمود:

زنجلیل یکی از گیاهان دارویی بسیار با ارزش است. این گیاه دارای بیشترین آنتی‌اکسیدانت‌ها از قبیل ویتامین‌های C، E و B می‌باشد. هم‌چنین این گیاه در تقویت قوه باء نیز مؤثر است. در این تحقیق، تأثیر عصاره زنجیل بر محور هورمونی هیپوفیز- گنادی و فرایند اسپرماتوژن در موش‌های سوری بالغ نزد Balb/C مورد بررسی قرار گرفته است. ۲۶ حیوانات مورد استفاده ۲۸ سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی ۳۱ گرم و محدوده سنی ۱۰ هفتگی بود. نمونه‌ها به طور تصادفی به ۷ گروه تابی شامل گروه‌های کنترل، شم و تجربی ۱ و ۲ تقسیم شدند. گروه‌های تجربی ۱ و ۲ هر کدام به مدت دو هفته دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم از عصاره مذکور به صورت تزریق درون صفاقی (IP) دریافت نمودند. در مدت زمان ذکر شده گروه شم، آب مقطر به صورت (IP) دریافت کرد. گروه کنترل از آب و غذای استاندارد آزمایشگاهی در طی دوره آزمایش استفاده کرد. بعد از تزریقات موش‌ها تشریح شد. پارامترهای مورد بررسی شامل اندازه-گیری غلظت هورمون های تستوسترون، LH و FSH بود. همچنین تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم، لیدیگ و سرتولی شمارش گردید. نتایج حاصله نشان داد که مقادیر سرمی هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و هورمون FSH نیز در هر دو گروه تجربی کاهش معنی- داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم دارد. در صورتی

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

۲*- استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

Hemayatkhahr@jia.ac.ir

۳- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم



(۱۵) و ضد سرطان عمل می‌کنند که سلول‌های سرطانی از جمله سلول‌های سرطانی تخمدان را مهار می‌کنند (۹). اخیراً معلوم شده است که زنجیل باعث افزایش قدرت تحرک وزیست اسپرم‌ها می‌شود (۵).

حاصل به مدت ۷۲ ساعت در پرکولاتور در دمای اتاق نگهداری شد. سپس عصاره گیری به وسیله قیف، انجام گردید. جهت خشک شدن عصاره، ماده تهیه شده به مدت ۲۴ ساعت در دیسیکاتور قرار داده تا به وسیله پمپ خلا، آب، الکل و مواد اضافی دیگر تبخیر شود. برای تهیه دارو، با دوز های ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم مقدار ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم از عصاره در ظرف جداگانه، در یک سی سی آب مقطر حل گردید. جهت جلوگیری از آلودگی، عصاره در یخچال نگهداری می‌شد. پس از اتمام تزریقات از قلب جانور خونگیری انجام شد. خون ۵۰۰۰ گرفته شده، در دستگاه ساتریفیوژ به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت دور در دقیقه قرار گرفت. سپس سرم آن جدا و به لوله های آزمایش دیگری متقل گردید. لوله ها درون فریزر با دمای -20°C درجه سانتی گراد قرار گرفتند. غلظت هورمون های FSH و LH به وسیله کیت مخصوص خریداری شده از شرکت پیشتاز طب و تستوسترون به وسیله کیت هورمونی ساخت DRG کشور آلمان به روش ELISA اندازه گیری شد. در مرحله بعد بیضه ها خارج، در پتری دیش حاوی سرم فیزیولوژیک قرار داده تا تمامی بافت‌های اضافی و خونی که به بافت چسبیده است جدا شود. سپس بیضه ها را در ظرف هایی حاوی فیکساتیو فرمالین قرار داده تا جهت تهیه بافت و مقاطع گیری آماده شوند. بعد از تهیه ی بلوک های پارافینی، برش گیری و رنگ آمیزی (هما توکسیلین - اوزرین)، برش‌های بافتی به ضخامت ۵ میکرون با دستگاه میکروتوم تهیه شد و نمونه‌ها جهت مطالعات میکروسکوپی نوری آماده شدند. در مطالعات میکروسکوپی تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرماتوزوئیل، سرتولی و بینایینی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده بر اساس برنامه آماری SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

از زنجیل در جلوگیری از حالت تهوع (۷ و ۱۳)، درمان نفخ و سوء هاضمه و زخم معده (۲)، حذف کلسترول از بدن (۱۲) و کاهش فشار

خون (۱۴) استفاده می‌شود. همچنین ریشه زنجیل و ترکیبات اصلی پلی فینیلیک که مواد آنتی اکسیدان دارند به عنوان ضد التهاب (۱، ۸ و ۹) در مورد اثرات این گیاه بر سیستم تولیدمثلی نر تحقیقات اندکی انجام شده است؛ بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی اثر عصاره زنجیل بر غلظت سرمی هورمون های تستوسترون و گنادوتropین ها و همچنین روند اسپرماتوژن در موش کوچک آزمایشگاهی بالغ می‌باشد.


مواد و روش کار

این یک مطالعه تحریکی می‌باشد. در این تحقیق از تعداد ۲۸ سر موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C با وزن تقریبی ۲۶ تا ۳۱ گرم و محلوده سنی ۱۰ هفتگی که از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز خریداری شد، استفاده گردید. حیوانات به مدت دو هفته جهت سازش با محیط جدید درخانه‌ی حیوانات دانشگاه علوم پزشکی جهرم نگهداری شد. درجه حرارت محیط $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ و دوره تاریکی روشناجی برای حیوانات به صورت ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشناجی انتخاب گردید. غذای مورد استفاده در طول آزمایش، غذای استاندارد حیوان (pellet) و آب آشامیدنی آنها، آب لوله کشی شهر بود. کف قفس‌ها از خاک اره و تراشه چوب پوشیده می‌شد و هفته‌ای دو بار شستشو و ضد عفنونی می‌گردید. نمونه‌ها به طور تصادفی به ۴ گروه ۷ تایی شامل گروه های کترل، شم و تحریکی او ۲ تقسیم شدند. گروه‌های تحریکی او ۲ هر کدام به مدت دو هفته دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی زنجیل به صورت تزریق درون صفاقی (IP) دریافت نمود. در مدت زمان ذکر شده گروه شم آب مقطر به صورت (IP) دریافت کرد. گروه کترل از آب و غذای استاندارد آزمایشگاهی در طی دوره آزمایش استفاده کرد. عمل تزریق با سرنگ های انسولینی انجام شد که از حساسیت نسبتاً قوی برخوردار است. طرز تهیه عصاره زنجیل به این صورت بود که بعد از تهیه ی یک کیلو گرم ریزوم زنجیل تازه از یکی از فروشگاه های معتبر بندر عباس و خشک کردن ریزوم، آن را به وسیله آسیاب برقی به صورت پودر در آورده، سپس مقدار ۱۰۰ گرم پودر در ۸۰۰ میلی لیتر الکل ۷۰٪ حل شد. محلول


نتایج

نتایج حاصله نشان داد که مقادیر سرمی هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش و گروه تجربی با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه های کنترل و شم دارد (نمودار۱). هورمون FSH در هر دو گروه تجربی کاهش معنی داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه های کنترل و شم دارد (نمودار۲). نتایج هورمون تستوسترون در گروه های تجربی در مقایسه با گروه های کنترل و شم افزایش معنی داری ($P \leq 0.05$) را نشان داد (نمودار۳).


همچنین نتایج حاصل از تعداد سلول های اسپرماتید، اسپرماتوزوئید و لیدیگ افزایش معنی داری ($P \leq 0.05$) در گروه های تجربی در مقایسه با گروه های کنترل و شم نشان داد (نمودارهای ۶ و ۷). نتایج حاصل از تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه های تجربی در مقایسه با گروه های کنترل و شم اختلاف معنی داری را نشان نداد (نمودارهای ۴، ۵ و ۸). همانطور که در تصاویر ۱ و ۲ دیده می شود تعداد سلول های جنسی در گروه تجربی افزایش پیدا کرده است.




نمودار ۱ - اثر عصاره زنجیل بر غلظت LH سرم خون در گروه های تجربی، کنترل و شم.




نمودار ۴ - اثر عصاره زنجیل بر تعداد سلول های اسپرماتوگونی در گروه های تجربی، کنترل و شم.




نمودار ۲ - اثر عصاره زنجیل بر غلظت FSH سرم خون در گروه های تجربی، کنترل و شم.




نمودار ۸ - اثر عصاره زنجیل بر تعداد سلولهای سرتولی در گروههای تجربی، کنترل و شم.




نمودار ۵ - اثر عصاره زنجیل بر تعداد سلولهای اسپرماتوцит در گروههای تجربی، کنترل و شم.



نمودار ۹ - اثر عصاره زنجیل بر تعداد سلولهای بینیانی در گروههای تجربی، کنترل و شم.




نمودار ۶ - اثر عصاره زنجیل بر تعداد سلولهای اسپرماتید در گروههای تجربی، کنترل و شم.



تصویر ۱- برش عرضی لولهای منی ساز در گروه کنترل


بزرگنمایی: $\times 400$ ، رنگ آمیزی: هماتوکسیلین- ائوزین

بزرگنمایی: $\times 400$ ، رنگ آمیزی: هماتوکسیلین- ائوزین



نمودار ۷ - اثر عصاره زنجیل بر تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در گروههای تجربی، کنترل و شم.

باشد. مطالعات نشان می‌دهد، با افزایش سروتوینین، غلظت گادوتروپین‌ها کاهش می‌یابد^(۳). از آن جایی که جینجیروف موجود در زنجیل آنتی سروتوبرزیک است و می‌توانند گیرنده ۳ سرتوین را مهار کند^(۱۱). پس به نظر می‌رسد جینجیروف با کم کردن سرتوینین، موجب افزایش غلظت گادوتروپین‌ها می‌شود و این دلیلی بر افزایش هورمون LH در گروه تجربی ۱ می‌باشد. همچنین جینجیروف‌ها و شوگائول‌ها تحریک کننده آندروروژن‌ها می‌باشند و می‌توانند هورمون تستوسترون را افزایش دهند^(۵). مطالعات نشان می‌دهد که جینجیروف-ها و سزکوئیترین‌ها با مهار مسیرهای لیپوکسیژناز و سیکلواکسیژناز از تولید آراشیدونیک اسید جلوگیری می‌کنند و مهار تولید آراشیدونیک اسید به نوبه خود تولید پروستاگلاندین‌ها را مهار می‌کند و با توجه به نقش پروستاگلاندین‌ها در تولید گادوتروپین‌ها، این ترکیبات موجود در زنجیل از اثر خود تنظیمی منفی گادوتروپین‌ها بر ترشح هورمون تستوسترون جلوگیری می‌کنند. پس با افزایش دوز زنجیل در گروه-های تجربی افزایش هورمون تستوسترون مشاهده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد عصاره زنجیل باعث افزایش تستوسترون می‌گردد^(۸) و^(۱۶). طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق، افزایش سلول‌های بینایی‌منی می‌تواند عاملی برای افزایش ترشح هورمون تستوسترون باشد. بنابراین در گروه‌های تجربی با افزایش دوز زنجیل غلظت هورمون تستوسترون افزایش می‌یابد. افزایش تستوسترون، بر روی سلول‌های تولید کننده LH و FSH واقع در هیپوفیز پیشین با اثر فیدک منفی، باعث پایین آمدن سطح سرمی هورمون‌های LH و FSH می‌شود که این تغییرات بر هیپوتالاموس و سلول‌های تولید کننده GnRH اثر می‌کند و میزان هورمون تولید شده GnRH نیز کاهش می‌یابد که کاهش GnRH نیز به نوبه‌ی خود باعث کاهش هورمون‌های LH و FSH می‌شود^(۱۰). گزارش‌های موجود، حاکی از این است که روند اسپرماتوژن به یک سری تداخل‌های سلول به سلول بستگی دارد. در این میان می‌توان به تداخل عمل سلول‌های لایدیگ و سرتولی اشاره نمود. تحقیقات نشان می‌دهد که لوله‌های منی ساز عملکرد ترشحی تعداد و تمایز سلول‌های لایدیگ را کنترل می‌کنند. همچنین پیشنهاد شده است که سلول‌های جنسی در مراحلی از روند اسپرماتوژن، حساسیت سلول‌های دور لوله‌ای به هورمون‌های اندروروژنیک را تعیین می‌کنند. طبق تحقیقات به عمل آمده تزریق



تصویر ۲- برش عرضی لوله‌های منی ساز در گروه تجربی بزرگنمایی: ۴۰۰[×]، رنگ آمیزی: هماتوکسیلین-ائزین بزرگنمایی: ۴۰۰[×]، رنگ آمیزی: هماتوکسیلین-ائزین

بحث

گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کثار هم، با بدن سازگاری داشته و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته هستند، بنابراین در موارد مصرف طولانی بسیار مناسب می-باشند. زنجیل جزء گیاهان دارویی با ارزش بوده و دارای خواص متعددی از جمله ضد تهوع، مقوی قلب، محرك سیستم ایمنی و محرك هضم غذاست. زنجیل گیاهی است که محتوی بیشترین آنتی اکسیدانت‌ها از قبیل جینجیروف‌ها و شوگائول‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه در ارتباط با اثر زنجیل بر فرایند اسپرماتوژن و سیستم تولید مثلی تحقیقات اندکی انجام شده است. بنابراین در این تحقیق، تأثیر عصاره زنجیل بر محور هورمونی هیپوفیز - گناد و فرایند اسپرماتوژن در موش کوچک آزمایشگاهی بالغ نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر سرمی هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون FSH نیز در هر دو گروه تجربی کاهش معنی داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم دارد. در صورتی که هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون تستوسترون در گروه‌های تجربی با دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم دارد. همچنین نتایج نشان داد که در تعداد سلول‌های اسپرماتید، اسپرماتوزوئید و لیدیگ در گروه‌های تجربی با دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری ($P \leq 0.05$) در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم وجود دارد. این مسئله می‌تواند به علت اثر ترکیبات زنجیل بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد و فرایند اسپرماتوژن



- 2- Al-Yahya, M.A., Rafatullah, S., Morsa, J.S., Ageel, A.M., Parmar, N.S. and. Tariq, M. (1989). Gastroprotective activity of ginger, Zingiber officinale Roscoe in albino rats. Am J Chinese Med 17: 51.
- 3- Anderson, Y.H., Wong, O.L. and John, P. (2002). Serotonin interferes with Ca and PKC signaling to reduce gonadotropin-releasing hormone-stimulated GH serotonin in goldfish pituitary cells, General and Comparative Endocrinology, 159: 58-66.
- 4- Bernard, A.J. Damber, E. and Widmark, A.(2005) Hormonal control of testicular blood flow. Mol.Cellu. Endocrinology. Vol(50). pp: 123-133.
- 5- Khaki, A. ,Fathiazad, F., Nouri, M.,and. Khaki, A. A., (2009). *The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat*. Iranian Journal of Reproductive Medicine. Vol(7): 7-12.
- 6- Krishna, P., Polasa, K., Kota, N. (2007). Alteration in antioxidant status of rats following intake of ginger through diet, Science Direct, 106:991-996.
- 7-Mowrey, D.B. and Clayson, D.E. (1982). Motion sickness, ginger and Psychophysics, The Lancet, 20,655-657.
- 8- Murakami, A., Takahashi, D., Kinoshita, T., Koshmizu, K., Kim, H.W., Yoshihiro, A., Nakamura, Y., Jiwajinda, S., Terao, J. and Ohigashi, H. (2002). Zerumbone a southeast Asian ginger sesquiterpene, markedly suppresses free radical generation, proinflammatory protein

هرمونهای hCG و LH باعث تغیر گردش خون بیضه می شود. پاسخ به هورمون hCG به حضور سلولهای لایدیگ که کنترل جریان خون بیضه را شدیداً کنترل می کنند وابسته است (۴). در تحقیق حاضر در گروه تجربی در تعداد سلولهای لایدیگ در مقایسه با گروههای کنترل و شم افزایش معنی داری مشاهده می شود. همچنین تعداد سلول های اسپرماتید و اسپرم افزایش معنی داری در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. با توجه به تحقیقات انجام شده که نشان دهنده ارتباط بسیار نزدیک بین عملکرد سلولهای لایدیگ و سلولهای جنسی در لولههای منیساز می باشد و همچنین با توجه به این که تمایز و ترشحات سلولهای لایدیگ توسط لوله های منی ساز کنترل می شود، باید پذیرفت که افزایش سلول های لایدیگ باعث افزایش پیشرفت روند اسپرمatoژن شده است. جینجرولها و شوگائولها و سزکوئی ترپین های موجود در زنجیل خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و موجب حذف رادیکالهای آزاد و حذف متابولیت های فعال در بدن می گردد. این مسئله موجب ترمیم DNA های شکسته شده و آسیب دیده می شود. این ترکیبات موجب می شوند که سلولهای ژرمینال به تقسیمات میوزی و میتوزی خود ادامه دهدن (۶). علاوه بر این، آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان یک آنتی اکسیدانت در حفاظت اسپرم ها در بافت بیضه و اپیدیدیم نقش ویژه ای یافا می کند و کاهش این آنزیم در بدن سبب نازابی می گردد. این آنزیم با قرار گرفتن در غشای پلاسمایی اسپرم، هسته اسپرم و مایع اپیدیدیم را از گزند رادیکالهای آزاد حفظ می کند و سبب بلوغ نهایی و تکامل اسپرمها می شود (۵). مطالعات نشان می دهد، مصرف زنجیل به مقدار قابل توجهی میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش می دهد و با تکثیر و تمایز اسپرم ها باعث افزایش باروری می گردد (۶). بنابراین طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق، می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنجیل قادر است از طریق افزایش تعداد سلولهای لایدیگ و افزایش هورمون تستوسترون باعث تکثیر سلولهای زاینده و جنسی در موش های کوچک آزمایشگاهی گردد.

منابع

- 1- Altman, R.D. and Marcussen, K.C. (2001). Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis-rheum. 44(11):2531-8.



sickness susceptibility and gastric function. Pharmacology 42: 111.

14- Tanabe, M., Chen, Y.D., Saits, K. and Kano, Y. (1993). Cholesterol biosynthesis inhibitory component from *Zingiber officinale Roscoe*. Chem Pharm Bull, 41: 710.

15- Thomson, M., Al-Qattan, K.K., Al-Sawan, S.M. , Alnaqeeb, M.A., Khan, I. and Ali, M.(2002). The use of ginger (*Zingiber officinale Rosc.*) as a potential anti-inflammatory and antithrombotic agent. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 67(6): 475-478.

16- Yogeshwer, S.H., Sahdeo, P. , Chitra, T., Madhulika, S. , Jasmine, G. and Neetu, K.(2007). In vitro and in vivo modulation of testosterone mediated alterations in apoptosis related proteins by [6]-gingerol, Science Direct. (168):1492-1502.

production, and cancer cell proliferation accompanied by apoptosis: the alpha, beta-unsaturated carbonyl group is a prerequisite, Carcinogenesis, 23950:795-802.

9- Ness, R.B., Grisso, J.A., Cottreau, C. Klapper, J., Vergona, R. , Wheeler, J.E., Morgan, M. and Chlesselman, J.J.(2000). Factors related to inflammation of the ovarian epithelium and risk of ovarian cancer. Epidemiology. 11:111–117.

10- Norman, J.F., and .way, J.M., (1998). Some ecological observation on the use of dat pollen in hypothalamic hormons. Endocrinology. 2: 532-548.

11- Sharma, S.S. and Gupta, Y.k. (1998). Reversal of cis platin induced delay in gastric emptying in rats by ginger, Ethonopharmacology, 62:19-55.

12- Srinivasan, K. and Sambaiah, K. (1999). The effect of spicies on cholesterol 7alpha-hydroxylase, activity and on serum and hepatic cholesterol levels in the rat. Int J Vitamin Nure Res, 67:363-369.

13- Stewart, J., Wood, M.J., Wood, C.D. and Mims, M.E. (1991). Effects of ginger on motion