



بررسی تأثیر درجه حرارت در تغییر جنسیت ماهی دم شمشیری گونه *Xiphophorus helleri* تحت

شرایط آکواریوم

زهرا نیله چی ۱ و شبینم فراهانی ۲*

۱- دانشگاه گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران

۲- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

مسئول مکاتبات: Shabi.farahani@yahoo.com

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نوسانات دمایی بر نر سازی ماهی دم شمشیری نژاد قرمز پرچی *Xiphophorus helleri* در محیط آکواریوم در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۷ انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد ۱۲۰ عدد ماهی ۱۰ روزه دم شمشیری (که هنوز جنسیتشان معلوم نشده بود) در ۴ تیمار با دماهای ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد در ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گذشت ۶ هفته جنسیت آن‌ها بر اساس شکل ظاهریشان تعیین شد (طول شدن شعاع‌های پایینی باله دم در نرها که اسم معمول ماهی یعنی "دم شمشیری" نیز از آن گرفته شده است). آنالیز آماری داده‌ها توسط نرم افزار Spss، تست Tukey و آزمون One way ANOVA و ضریب معناداری $P < 0.05$ انجام شد. بر این اساس در اندازه گیری طول و وزن نهایی اختلاف معنی داری ($P < 0.05$) مشاهده نشد. کم‌ترین و بیشترین رشد طولی و وزنی به ترتیب در تیمار ۱ (21°C ، ۸۴ سانتی‌متر و ۰٫۳۰ گرم)، تیمار ۳ (27°C ، ۲٫۹۸ سانتی‌متر و ۰٫۳۴ گرم)، تیمار ۲ (24°C ، ۳٫۰۵ سانتی‌متر و ۰٫۳۳ گرم) و تیمار ۴ (30°C ، ۳٫۰۴ سانتی‌متر و ۰٫۳۶ گرم) مشاهده شد. در بررسی تیمارها از نظر تعیین جنسیت CF، BWI و SGR تیمار ۱ با دمای 21°C با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد. بیشترین نر سازی در تیمار ۴ با دمای 30°C (۷۰٪) و کم‌ترین نر سازی در تیمار ۱ با دمای 21°C (۴۶٪) مشاهده شد.

کلمات کلیدی: ماهی دم شمشیری، دما، نر سازی، شاخص رشد ویژه ماهی (SGR)، درصد افزایش وزن (BWI) و فاکتور وضعیت (CF)

مقدمه

دمی بصورت شمشیر مانند است و در ماده‌ها بدن پهن تر است و باله‌ها گرد هستند و باله دم هم به صورت دو شاخه و هوموسرک است که از این راه نر و ماده‌ها از هم باز شناخته شدند [۴].

همه ماهی‌های نر این خانواده دارای باله مخرجی تغییر شکل یافته به نام گونوپودیوم هستند که در فرایند جفتگیری درانتقال اسپرم به درون بدن ماهی ماده به کار می‌رود. ماهی‌های ماده بالغ این خانواده در ناحیه‌ای جلوتر از باله مخرجی منطقه تیره‌ای به نام لکه بارداری دارند. دم شمشیری با طول ۳۰-۲۵ mm یا سن ۱۰-۶ هفتگی به بلوغ

این مطالعه با هدف تولید جمعیت تک جنس نر به دلیل زیبایی و بازارپسندی این جنس انجام شد. از فرآیند نر سازی می‌توان در اصلاح نژاد دورگه گیری در صنعت ماهیان زینتی و ذخایره ماهیان نیز استفاده کرد. محدوده جغرافیایی دم شمشیری معمولی از شمال مکزیک تا قسمت‌های مرکزی و غربی گواتمالا و هندوراس در امریکای مرکزی است. این گونه در جنوب فلوریدا، کالیفرنیا، مناطقی از آریزونا و نوادا، هاوایی و کانادا، افریقا، سریلانکا، استرالیا، فیجی و انگلستان معرفی شده است. در ماهی دم شمشیری نر بدن به صورت کشیده و باله‌ها همه تیز و کشیده‌اند و در بالغین انتهای باله



جنسی می‌رسند. دم شمشیری‌ها بعد از رسیدن به بلوغ جنسی جفت دائمی اختیار نمی‌کنند و کاملاً چندموسمی هستند [۳]. از طرف دیگر دوره‌گیری با گونه‌ها سبب به وجود آمدن هزاران نژاد جدید می‌شود. در دم شمشیری تعیین جنسیت پیچیده‌تر و بصورت چندزنی و دارای اثر متقابل بر یکدیگر است. این ماهی در یک بار جفت‌گیری می‌تواند اسپرم زنده مورد نیاز تا دو سال را تأمین کرده و یک ماده با یک بار جفت‌گیری ۵ تا ۹ سری نوزاد به دنیا می‌آورد. رشد و نمو جنینی از ۲۶ تا ۶۳ روز متفاوت است درجه حرارت عامل اصلی میزان رشد است و در عین حال دوره نوری نقش مختصری دارد. بهترین درجه حرارت برای تولید مثل همه ماهیان زنده از بین ۲۲-۲۶^oC گزارش شده است. رشد ماهی از قبل از تولد تا قبل از رسیدن به دوره بلوغ جنسی با توجه به محیطی با پارامترهای مناسب و تغذیه کافی، سریع و مثبت خواهد بود اما بعد از دوره بلوغ جنسی از سرعت رشد آن‌ها کاسته می‌شود. همه گونه‌های دم شمشیری همه چیزخوار هستند و حشرات خشکی زی و آبی همراه با فیتوپلانکتون و برخی جلبک‌های بزرگ غذای مورد علاقه آن‌ها محسوب می‌شود [۲]. دم شمشیری عموماً شرایط کمی قلیایی با سختی ۶۰-۸۰ میلی‌گرم CaCO_3 در لیتر را ترجیح می‌دهد. مقدار اکسیژن باید بالای ۳ mg/lit نگه داشته شود. میزان آمونیاک کل باید زیر ۱/۰ ppm و PH نزدیک خشی حفظ شود. بهترین درجه حرارت برای تولید بین ۲۹^o-۲۲^o C است. عوامل محیطی نیز نظیر دما، نور، PH و اشعه نیز می‌تواند بر تغییر جنسیت موثر باشد. همچنین فاکتورهای اجتماعی می‌توانند در تغییر جنسیت مؤثر باشند نظیر تراکم جمعیت، تاثیر فرومون‌ها، بینایی، شنوایی، محرک‌های لمسی و مرگ و میر طبیعی.

از مطالعات و تحقیقات انجام شده بر تغییر جنسیت می‌توان فعالیت‌های تغییر جنسیت در کپور معمولی *Cyprinus carpio* [۱، ۶، ۷ و ۸]، در قزل‌آلای رنگین‌کمان، جنسی می‌رسند. دم شمشیری‌ها بعد از رسیدن به بلوغ جنسی جفت دائمی اختیار نمی‌کنند و کاملاً چندموسمی هستند [۳]. از طرف دیگر دوره‌گیری با گونه‌ها سبب به وجود آمدن هزاران نژاد جدید می‌شود. در دم شمشیری تعیین جنسیت پیچیده‌تر و بصورت چندزنی و دارای اثر متقابل بر یکدیگر است. این ماهی در یک بار جفت‌گیری می‌تواند اسپرم زنده مورد نیاز تا دو سال را تأمین کرده و یک ماده با یک بار جفت‌گیری ۵ تا ۹ سری نوزاد به دنیا می‌آورد. رشد و نمو جنینی از ۲۶ تا ۶۳ روز متفاوت است درجه حرارت عامل اصلی میزان رشد است و در عین حال دوره نوری نقش مختصری دارد. بهترین درجه حرارت برای تولید مثل همه ماهیان زنده از بین ۲۲-۲۶^oC گزارش شده است. رشد ماهی از قبل از تولد تا قبل از رسیدن به دوره بلوغ جنسی با توجه به محیطی با پارامترهای مناسب و تغذیه کافی، سریع و مثبت خواهد بود اما بعد از دوره بلوغ جنسی از سرعت رشد آن‌ها کاسته می‌شود. همه گونه‌های دم شمشیری همه چیزخوار هستند و حشرات خشکی زی و آبی همراه با فیتوپلانکتون و برخی جلبک‌های بزرگ غذای مورد علاقه آن‌ها محسوب می‌شود [۲]. دم شمشیری عموماً شرایط کمی قلیایی با سختی ۶۰-۸۰ میلی‌گرم CaCO_3 در لیتر را ترجیح می‌دهد. مقدار اکسیژن باید بالای ۳ mg/lit نگه داشته شود. میزان آمونیاک کل باید زیر ۱/۰ ppm و PH نزدیک خشی حفظ شود. بهترین درجه حرارت برای تولید بین ۲۹^o-۲۲^o C است. عوامل محیطی نیز نظیر دما، نور، PH و اشعه نیز می‌تواند بر تغییر جنسیت موثر باشد. همچنین فاکتورهای اجتماعی می‌توانند در تغییر جنسیت مؤثر باشند نظیر تراکم جمعیت، تاثیر فرومون‌ها، بینایی، شنوایی، محرک‌های لمسی و مرگ و میر طبیعی.

مواد و روش کار

در ابتدا هر آکواریوم با ۳ قاب توری به ۳ قسمت مساوی تقسیم شد (از قاب توری به این دلیل استفاده شد که قابلیت عبور را داشت و شرایط در هر طرف یکسان نگه می‌داشت) سپس آکواریوم‌ها به تمامی تجهیزات لازم نظیر سنگ هوا، پمپ هوا و... مجهز شد. بچه ماهی ۱۰ روزهی دم شمشیری با کیسه‌های پلاستیکی که حاوی هوا بود در آکواریوم تیمار مورد نظر قرار گرفت تا با دمای آب سازگاری پیدا کند و بعد از ۲ ساعت، به تعداد ۱۰ عدد در هر تکرار تقسیم شدند. تعداد ۴ آکواریوم تیمار با دماهای ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد با ۳ تکرار در نظر گرفته شده. قبل از سازگاری با دما وزن و طول بچه ماهی‌ها توسط خط کش و ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری شد که میانگین طول $1 \pm 0 \text{ cm}$ و میانگین وزن $0.05 \pm \text{g}$ بود. غذا دهی روزانه ۳ وعده در ساعت‌های ۹، ۱۴، ۱۹ انجام می‌شد. بچه ماهیان در ۲۰ روز اول به دلیل کوچک بودن اندازه‌ی دهانشان با کرم توبی فکس و غذای پولکی هم تغذیه شدند. دوره‌ی نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی در نظر گرفته شد. آب نیز هر ۲ روز یکبار به روش پمپاژ از کف تعویض شد. ۶ هفته بعد از قرار گرفتن بچه ماهی‌ها در آکواریوم‌ها جنسیتشان



نتایج

بر اساس نتایج حاصل از آنالیز آماری در ۴ تیمار (هر کدام ۳ تکرار) در بررسی طول و وزن نهایی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. کم‌ترین و بیشترین رشد طولی و وزنی به ترتیب در تیمار ۱ (۲۱°C) و تیمار ۴ (۳۰°C) مشاهده شد. بیشترین درصد ماهیان نر (۷۰٪) در تیمار ۴ (۳۰°C) و کم‌ترین نر سازی (۶۶/۶٪) در تیمار ۱ (۲۱°C) مشاهده شد. در بررسی تیمارها از نظر تعیین جنسیت CF، BWI و SGR تیمار ۱ (۲۱°C) با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد.

مشخص شد و سپس در کیسه پلاستیکی جداگانه که حاوی هوا بود به آزمایشگاه جهت سنجش طول و وزن و تعیین کردن جنسیت انتقال یافتند. در آزمایشگاه طول توسط خط کش و وزن توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد و جنسیت نیز با توجه به فنوتیپ ماهی‌ها تشخیص داده شد. میزان رشد ویژه ماهی (SGR)، درصد افزایش وزن (BWI) و فاکتور وضعیت (CF) نیز اندازه گیری شد. فرمول‌های مورد استفاده برای به دست آوردن SGR، BWI، CF، به قرار زیر است:

$$SGR = \ln w_2 - \ln w_1 \times 100$$

مدت زمان غذا دهی به روز

$$BWI = \frac{w_2 - w_1}{w_1} \times 100$$

$$CF = \frac{W \times 100}{L^3}$$

آنالیز آماری داده‌ها توسط نرم افزار spss، تست Tukey و تحلیل واریانس One way ANOVA با ضریب معناداری $P < 0.05$ انجام شد.




جدول ۱: داده‌های حاصل از بیومتری و محاسبه SGR، BWI، CF در تیمارها و تکرارها

تیمار	تکرار	وزن اولیه	طول اولیه	وزن نهایی	طول نهایی	SGR	BWI	CF
1	1	0.05	1	0.28	2.72	3.32	390.3	1.25
1	2	0.05	1	0.35	3.02	4.04	512.9	1.23
1	3	0.05	1	0.29	2.78	3.43	444.8	1.21
2	1	0.05	1	0.37	3.50	4.08	547.9	0.79
2	2	0.05	1	0.29	2.87	3.63	407.8	1.22
2	3	0.05	1	0.34	2.77	4.25	495.4	1.04
3	1	0.05	1	0.3	2.55	4.08	425.3	1.2
3	2	0.05	1	0.44	3.49	4.67	670.5	1.03
3	3	0.05	1	0.29	2.91	3.98	407.8	0.76
4	1	0.05	1	0.28	2.77	3.56	390.3	1.25
4	2	0.05	1	0.4	3.23	4.33	600.5	1.11
4	3	0.05	1	0.42	3.14	4.33	635.5	1.22
میانگین		0.05±2.11	1±0	0.3±0.05	2.9±0.30	3.9±0.41	494±99.6	1.1±0.17


جدول ۲: درصد تغییرات جنسیت ماهی در شرایط دمایی مختلف

دما (°C)	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰
نر (%)	۴۶,۶ ± ۵,۷	۶۸,۱ ± ۱۱,۸	۶۷,۷ ± ۱,۹	۷۰,۰ ± ۰,۰
ماده (%)	۵۳,۳ ± ۵,۷	۳۴,۸ ± ۸,۳	۳۲,۲ ± ۱,۹	۳۰,۰ ± ۰,۰




نمودار ۱ - طول در هر تیمار در پایان پروژه

با توجه به نمودار ۱ در چهار دمای موردنظر تیمارها تقریباً از طول‌های برابر برخوردار بودند.




نمودار ۲ - وزن در هر تیمار در پایان پروژه


در نمودار ۲ وزن ماهیان در دمای ۳۰ درجه و ۲۱ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را دارا بود.




در این نمودار رشد ماهیان در دماهای ۲۷، ۳۰، ۲۴ و ۲۱ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را داشت.



با توجه به این نمودار با افزایش دما، درصد وزن ماهیان نیز افزایش پیدا کرده است و در دمای ۳۰ و ۲۱ درجه بیشترین و کمترین درصد وزن مشاهده شده است.



بیشترین و کمترین میزان فاکتور وضعیت به ترتیب در دماهای ۲۱، ۲۴، ۳۰ و ۲۷ درجه دیده شد



در نهایت درصد ماهیان نر در دماهای ۳۰، ۲۷، ۲۴ و ۲۱ به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان را دارا بودند.

همانطور که گفته شد بیشترین درصد نرسازی در ماهیان دم شمشیری ۱۰ روزه پس از طی ۶ هفته نگهداری و پرورش

بحث



افزایش یافت. Kazeto و همکاران (۲۰۰۵) با بررسی ماهی *bonariensis* با افزایش دما و هورمون درصد نرسازی گلدفیش در دمای 30°C ، ۱۲ روز بعد از لقاح ۳،۹۲٪ نرسازی دیده شد که در مقایسه با دم شمشیری در دمای 30°C درصد بالاتری را نشان دادند.

بر اساس مطالعات امینی (۱۳۸۵) تغییرات دمایی در کنترل ترشح هورمون‌ها در ماهی‌ها نقش مهمی دارند و احتمالاً یکی از دلایل بروز نرسازی در دمای 30°C در تحقیق حاضر همین مورد بوده است. گونه‌های آبزیانی که جنسیت کروموزومی مجزا و واضحی ندارند تحت تأثیر دمای بالا جهت تغییر و تمایز جنسی قرار می‌گیرند. دم شمشیری نیز جنسیت کروموزومی واضحی ندارد و دستگاه کروموزومی آن (autosomal) است، یعنی جنسیت به طریقه اتوزومی کنترل می‌شود که در این حالت جنسیت به وسیله تعدادی ژن نر کننده و یا ماده کننده مستقر بر روی کروموزوم‌ها اتوزوم تعیین می‌شود که احتمالاً دمای بالا بر آن مؤثر بوده است. از طرفی دما بر تمایز گنادها مؤثر است و دمای پایین باعث تمایز دیرتر گنادها می‌شود. سن شروع تیمار دمایی نیز احتمالاً بر نسبت جنسی بی تأثیر نبوده است.

به طور خلاصه می‌توان اذعان داشت که سن ماهیان، دامنه دمایی، pH، شوری، شرایط محیط پرورش، عوامل محیطی و ژنتیکی در تولید جمعیت‌های نر یا ماده بسیار تأثیر گذار است. چنانچه در چهار دمای موردنظر تیمارها تقریباً از طول‌های برابر برخوردار بودند. وزن ماهیان در دمای 30°C و 21°C درجه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را دارا بود. میزان رشد ماهیان در دماهای 27°C ، 30°C ، 24°C و 21°C درجه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را داشت. با افزایش دما، درصد وزن ماهیان نیز افزایش پیدا کرد و در دمای 30°C و 21°C درجه بیشترین و کمترین درصد وزن مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان فاکتور وضعیت به ترتیب در دماهای 21°C ، 30°C و 27°C درجه

در آکواریوم در تیمار ۴، با دمای 30°C با ۷۰٪ نرسازی انجام گرفت. طبق مطالعات مشابه انجام شده توسط Lindsey (۱۹۶۲) ماهی *Gasterosteus aculeatus* در دمای 21°C – 16°C ، ۴۴،۱٪ نرسازی داشته است [۱۵] که در مقایسه با نرسازی ماهی دم شمشیری در تحقیق حاضر در دمای 21°C ، $5,7 \pm 46,6$ ٪ مقدار کمتری داشته است. بر اساس یافته‌های Sullivan و Schultz (۱۹۸۶) در ماهی *Peociliopsis lucida* در دمای 30°C ، ۹۲٪ نرسازی گزارش شده است [۲۲] که این درصد نرسازی بالاتر از نرسازی دم شمشیری‌های (۷۰٪) موجود در این تحقیق بوده است. بر طبق نتایج بدست آمده از Oshiro و همکاران (۱۹۸۸) ماهی *Carassius auratus* در دمای 30°C ، ۸۰–۱۰۰٪ نرسازی داشته است [۱۹] که در مقایسه با تحقیق حاضر بیشتر بود. Maier و همکاران (۱۹۹۰) با تحقیق بر ماهی *Oreochromis mossambicus* دریافتند که در دمای 20°C ، ۷۸،۰٪ نرسازی صورت گرفت [۱۶] که در تحقیق حاضر در دمای 21°C ($5,7 \pm 46,6$ ٪) نرسازی کمتر بوده است. Yamamoto و Masutani (۱۹۹۰) نشان دادند که نرسازی در ماهی *Pradichthys olivaceus* در دمای 25°C ، ۹۰٪ بوده است [۲۳] و در دمای تقریباً مشابه 24°C در دم شمشیری $11,8 \pm 68,1$ ٪ نرسازی صورت گرفته است. بر اساس دستاورد Fujioka (۱۹۹۳) ماهی *Carassius carassius* در دمای ۲۸ تا 30°C درجه، ۷۸،۶٪ نرسازی داشته است [۱۱] که در دم شمشیری درصد ماهیان نردر دمای ۲۷ و 30°C درجه سانتی-گراد به ترتیب $1,9 \pm 67,7$ ٪ و $0,0 \pm 70,0$ ٪ و تقریباً نزدیک به یافته Fujioka بوده است. Azuma و همکاران (۲۰۰۳) دریافتند که در *Oncorhynchus nerka* در دمای 18°C بعد از گذشت ۵۷ روز از لقاح، ۸۵،۷٪ نرسازی انجام شده است. بر اساس تحقیقات Strüssmann و Minamitani (۲۰۰۳) در ماهی *Odontheistes*



10- Azuma, T., Takeda, k., Doi, T., Muto, k., Akutsu, M., Sawada, M., Adachi, Sh., 2003. The influence of temperature on sex determination in Sockeye salmon *Oncorhynchus nerka*. *Aquaculture*, 34(2): 461-473. USA.

11- Fujioka, Y., 1993. Sex reversal in *Honmorko Gnathopogoncaurulesecens* by immersion in 17_methyl testosterone and an attempt to produced all female progeny. *Suisan Zoshoku* 41(3): 342-350.

12- Fujioka, Y., 1995. Production and some properties of gynogenetic diploids in *Nigrobuna Carassius carassius grandoculis*. 42(4): 253-262. Japan.

13- Goto_Kazeto, R., Abe, Y., Masai, K., Yamaha, E., Adachi, Sh., Yamauchi, K., 2005. Temperature_dependent sex differantiation in Goldfish. *Aquaculture* 254: 617-624.

14- Landau, M., 1992. Introduction to Aquaculture (2). Kluwer Academic publishers. 440pp. USA.

15- Lindsey, C.C., 1962., Expermental study of meristic variation in a population of three spine stickle back *Gasterosteus aculatus*. *Can.J.Zool.* 40: 271-312.

16- Maier, G.C., Beardmore, J.A., Skibinski, D.O.F., 1990. Expermental evidence for environmental sex determination in *Oreochromis* species. Tokyo. 43:555_558pp.

17- Minamitani, M., Strüssmann, C.A., 2003. Effect of temperature on the efficiency of feminization of Medaka (*Oryzias latipes*) by hormonal (estradiol) manipulation. *Fish Physiology and Biochemistry* 28: 163_164. USA.

18- Oshiro, T., Zhang, F., Takaslima, F. Presented at the Annual Meeting of the Japanese Society of Scientific Fisheries, spring 1994. Tokyo.

20- Stickney, R., 2000. Encyclopedia of Aquaculture. 30(2). 1063 pp. USA.

دیده شد و در نهایت درصد ماهیان نر در دماهی ۳۰، ۲۷، ۲۴ و ۲۱ به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان را دارا بودند.

منابع

۱- آذری تاکمی، ق. امینی، ف. فرحمند، ح. ۱۳۷۵. بررسی ایجاد تغییر جنسیت و عقیمی در ماهی کپور معمولی به وسیله هورمون ۱۷_آلفا- متیل تستوسترون، مجله منابع طبیعی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

۲- ارجینی، م. ۱۳۸۲. مقدمه‌ای بر بهداشت و بیماری ماهیان آکواریومی. انتشارات نقش مهر. ۸۸ صفحه.

۳- ارجینی، م. ۱۳۸۱. آکواریوم. انتشارات نقش مهر. ۱۵۰ صفحه.

۴- امینی، م. ۱۳۸۵. تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، انتشارات نقش مهر، ۲۱۴ صفحه.

۵- حسین زاده صحافی، ه. ۱۳۸۰. بیولوژی تولیدمثل ماهی، جلد اول، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، ۲۷۲ صفحه.

۶- حسینی، ح. ۱۳۸۰. القا تغییر جنسیت در ماهی کپور به وسیله هورمون در سطح صنعتی، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی. ۳-۱.

۷- علیشاهی، م. ۱۳۷۷. القای تغییر جنسیت در ماهی کپور معمولی به وسیله هورمون ۱۷_آلفا- متیل تستوسترون خوراکی در سطح صنعتی، پایان نامه دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. ۵۰-۳۰.

۸- فرحمند، ح. ۱۳۷۲. ایجاد تغییر جنسیت در کپور معمولی با استفاده از هورمون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی نور. ۳۵-۲۲.

۹- ویلکی، س. ۱۳۷۶. ایجاد تغییر جنسیت در ماهی قزل آلابی رنگین کمان و تولید بچه ماهیان تک جنس (تمام ماده)، مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر کلاردشت.



sex ratios in laboratory strains of
Poeciliopsis lucida.
Evaluation 40(1):152_158. USA.
23- Yamamoto, T., Hoar, W., Randall,
D., 1962. Sex differentiation in: Fish
physiology, Academic press, New
York, vol 3, 117-175pp

21- Strussmann, C.A., Takashima,
F., Toda, K., 1995. Sex differentiation and
hormonal feminization in pejerrey
Odontheistes bonariensis Aquaculture (in
press). 40(3). 1023pp. Tokyo.
22- Sullivan, J.A., Schultz, R.J., 1986.
Genetic and environmental basis of variable

Archive of SID