

اثر شش هفته تمرین هوازی و عصاره دارچین بر بیان ژن اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه‌ی موش‌های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

حسین باخدا، نعمت‌اله نعمتی*، طاهره باقرپور

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

*مسئول مکاتبات: nnemati258@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

چکیده

در افراد چاق، سطح بیان اینترلوکین یک بتا بالاتر است، به طوری که میزان بیان اینترلوکین یک بتا با سطح شاخص توده بدنی و توده چربی ارتباط مثبت مستقیمی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات اجرای شش هفته تمرین هوازی، مصرف عصاره دارچین و غذای پرچرب بر بیان ژن اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه موش‌های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب با استفاده از موش‌های صحرایی نر دو ماهه نژاد ویستار انجام شد تعداد ۵۰ سر موش صحرایی نر دو ماهه پس از دو هفته نگهداری در شرایط کنترل شده به پنج گروه کنترل، رژیم پرچرب، عصاره دارچین و رژیم پرچرب، تمرین هوازی و رژیم پرچرب و تمرین هوازی و عصاره دارچین و رژیم پرچرب تقسیم شدند. عصاره دارچین به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و امولسیون غذای پرچرب مازاد بر آب و غذای معمولی جوندگان روزانه به مقدار ۱/۵ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن به مدت شش هفته به صورت گاوآژ داده شد. گروه تمرین برای پنج روز در هفته و به مدت شش هفته در برنامه تمرین هوازی روی نوارگردان شرکت کردند. میانگین متغیرهای پژوهش در بین گروه‌ها (بجز گروه کنترل) با هدف تعیین تفاوت‌های بین گروهی، با آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه و بونفرونی مقایسه شدند. میانگین متغیرهای پژوهش در بین هر گروه با گروه کنترل با هدف تعیین تفاوت‌های درون گروهی، با آزمون آماری تی تک نمونه در سطح معنی‌داری $p \leq 0/05$ مقایسه شدند. تفاوت متغیر وزن بدن در پس آزمون در بین تمامی گروه‌ها معنی‌دار بود. تفاوت میانگین‌های متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه موش‌های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب پس از شش هفته تمرین هوازی، مصرف عصاره دارچین و غذای پرچرب معنی‌دار بود.

کلمات کلیدی: ورزش، دارچین، چاقی، رژیم پرچرب، اینترلوکین یک بتا، چاقی.

مقدمه

برسد که به سلامت فرد آسیب جدی بزند. چاقی یا افزایش چربی بدن، به علت عدم تعادل در دریافت و مصرف انرژی بوده که می‌تواند علت ژنتیکی داشته یا به علت عوامل محیطی نظیر بیماری‌های مختلف، دریافت زیاد انرژی، کاهش سطح فعالیت بدنی، عدم

یکی از مشکلات مربوط به سلامتی که ارتباط تنگاتنگی با شیوه زندگی دارد، معضل چاقی است. چاقی نوعی اختلال متابولیکی است که توسط عوامل محیطی و ژنتیکی ایجاد می‌شود. چاقی وضعیتی است که در آن ذخایر چربی بدن افزایش یافته و به حدی



شدت با کاهش وزن در هر دو جنس و در هر سنی ارتباط دارد. در مطالعه‌ای ده ساله، خطر افزایش وزن قابل توجه در افراد غیرفعال ۳/۱ تا ۳/۸ برابر نسبت به افراد فعال بیشتر بود. به همین دلیل است که اجرای تمرینات ورزشی و فعالیت‌های بدنی یکی از راهکارهای مهم در مقابله با چاقی و کاهش وزن چربی بدن و کاهش عوارض مرتبط با آن معرفی شده است (۵، ۹).

از جمله درمان‌های مکمل و جایگزین در کاهش و کنترل وزن، استفاده از گیاهان دارویی یا مواد موثر آنها است. از جمله این گیاهان می‌توان به دارچین اشاره کرد. ترکیبات موجود در دارچین ممکن است با تاثیر بر میزان بیان ژن‌های مختلف باعث کنترل و کاهش چاقی بشود. دارچین به دلیل داشتن پلی‌فنل‌ها دارای اثرات مفید شبه انسولینی در کنترل قند و چربی‌های خون است و می‌تواند اشتها را تنظیم کند. به علاوه، با افزایش متابولیسم بدن می‌تواند باعث تجزیه چربی‌ها و مصرف انرژی مازاد بافت چربی بشود. دارچین به دلیل داشتن فلاونوئیدها دارای فعالیت آنتی-اکسیدانی بالا، اثرات ضدسرطانی، اثرات ضد میکروبی و باکتریایی و به دلیل داشتن مواد موثر سینام آلدئید به میزان ۶۵ تا ۸۰ درصد و اوژنول ۵ تا ۱۰ درصد و اثرات مهاری آن بر تولید نیتریک اکسید دارای اثرات ضدالتهابی و محافظ در برابر ایسکمی میوکارد و بیماری‌های قلبی عروقی است. پژوهش‌های داروشناسی و سم‌شناسی خطر به خصوصی را برای مصرف دارچین در انسان نشان نمی‌دهد (۱، ۱۸، ۲۵، ۲۶).

ابراهیمی و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که دریافت چربی به صورت خالص موجب افزایش معنی‌دار سطوح پلاسمایی اینترلوکین یک بتا و لیپوپلی-ساکاریدها در افراد سالم می‌شود (۷). سطوح افزایش یافته اینترلوکین یک بتا در دراز مدت باعث افزایش

تعادل هورمون‌ها و فاکتورهای فیزیولوژیک و دیگر عوامل روی دهد (۲، ۱۰، ۱۶، ۲۳).

چربی اضافی موجود در بافت چربی، نشان دهنده یک بافت ملتهب و ناکارآمد است که با تغییر در الگوی بیان آدیپوکاین‌ها، باعث گسترش اختلالات مرتبط با چاقی می‌شود (۸، ۲۴، ۲۹).

سارکوپنی فرایند تحلیل عضلانی با افزایش چربی است که این افزایش وزن چربی با تولید و آزادسازی شاخص‌های پیش‌التهابی نظیر اینترلوکین یک بتا و دیگر سایتوکاین‌ها از بافت چربی همراه است که این روند یک مسأله مهم در موضوع سلامتی است (۶، ۲۲). اینترلوکین یک بتا یک سایتوکاین التهابی قوی و یک واسطه مهم پاسخ‌های التهابی است که در انواع فعالیت‌های سلولی نقش داشته و در پاسخ دفاعی میزبان به عفونت و آسیب بسیار مهم است. اینترلوکین یک بتا باعث القاء مقاومت به انسولین در بافت کبد و چربی شده و نقش مهمی نیز در تنظیم اشتها دارد. این هورمون نقش مهمی در تنظیم هومئوستاز انرژی و متابولیسم ایفاء می‌کند. همچنین، دارای اثرات پیش‌التهابی بوده و با بروز بیماری‌های عروق قلبی نیز مرتبط است (۳، ۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۱، ۲۸).

تعادل منفی انرژی ناشی از کاهش انرژی دریافتی و افزایش انرژی مصرفی و در نتیجه استفاده از ذخیره انرژی بافت‌های چربی، مهم‌ترین راه کار مقابله با چاقی و کاهش وزن و عوارض ناشی از آن است. انرژی مصرفی دارای سه بخش است. حدود هفتاد درصد انرژی مصرفی را متابولیسم استراحتی شامل می‌شود. ده درصد انرژی گرمایی غذایی است و بخش نهایی و مهم انرژی مصرفی به میزان تقریبی بیست درصد مربوط به اجرای فعالیت‌های روزانه و انجام فعالیت‌ها و تمرینات ورزشی است (۱۱ و ۲۰).

با این توصیف تغییر سبک زندگی از کم‌تحرک به پرتحرک و فعال و افزایش سطح انرژی مصرفی، به

ممانعت کننده تولید سایتوکین‌ها است افزایش معنی-داری مشاهده شد (۱).

رنجبر و همکاران (۲۰۰۹) بیان کردند که عصاره‌های مختلف دارچین دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی می‌باشند و دارچین بدون عوارض جانبی خاصی باعث کاهش قابل توجهی در وزن بدن می‌شود (۱۳).

شلبی و همکاران (۲۰۱۴) در طی گاوآژ شش هفته‌ای عصاره دارچین در موش‌های صحرایی دیابتی چاق به این نتیجه رسیدند که دوزهای ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم عصاره دارچین موجب کاهش وزن، کاهش چربی‌های خون و کاهش قندخون می‌شود (۲۷).

چائو (۲۰۰۵) بیان کرد که اسانس برگ دارچین به دلیل فعالیت ضدالتهابی خود مانع بیان ژن‌های اینترلوکین شش و اینترلوکین یک بتا در ماکروفاژ موش‌ها می‌شود (۴).

با توجه به تاثیر مطلوب تمرینات ورزشی هوازی بر بیان آدیپوکاین‌ها، تاثیر رژیم‌های پرچرب در بوجود آمدن بیماری‌ها و اثرات مکمل گیاهی دارچین در جلوگیری از التهاب و همچنین عدم وجود مطالعه‌ای که توانسته باشد تاثیر این سه متغیر را بر بیان ژن اینترلوکین یک بتا به طور همزمان بسنجد و نتایج متناقضی که در مطالعه روی گروه‌های مختلف انسانی و حیوانی بدست آمده است، این پرسش مطرح است که آیا اجرای شش هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دارچین بر بیان ژن اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه‌ای موش‌های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب اثر دارد؟

مواد و روش‌ها

پژوهش تجربی حاضر با هدف تعیین اثرات اجرای شش هفته تمرین هوازی، مصرف عصاره دارچین و غذای پرچرب بر بیان ژن اینترلوکین یک بتا در بافت

مقاومت به انسولین در موش و نیز سلول‌های چربی انسانی شده و انتقال گلوکز ناشی از انسولین و نیز لیپوژنیز را سرکوب می‌کند. از سوی دیگر، کاهش فعالیت یا کاهش سطوح اینترلوکین یک بتا، تولید انسولین و اتصال انسولین به گیرنده در سلول‌های چربی انسان را بهبود بخشیده و برای بهبود مقاومت به انسولین مرتبط با چاقی هم در سطح بافت و هم در سطح سیستمیک مفید است (۲۸).

ویرا (۲۰۰۹) نشان داد که اجرای تمرینات ورزشی، التهاب بلندمدت در چاقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب را کاهش می‌دهد (۳۰).

سیندا و همکاران (۲۰۱۵)، میزان خستگی و سطح فعالیت بدنی در زنان تحت درمان با اینترلوکین یک بتا را مطالعه کردند و نشان دادند که خستگی یک واکنش مشترک به یک چالش سیستمیک به واسطه پاسخ از طریق عملکرد سایتوکاین پیش‌التهابی اینترلوکین یک بتا است که با کاهش میزان فعالیت بدنی افزایش یافته است (۲۸).

در پژوهشی اثرات ضد التهابی تمرینات ورزشی بر عضلات اسکلتی بیماران با ناتوانی قلبی مزمن مطالعه شد و نتایج نشان داد که بیست دقیقه تمرین دوچرخه سواری با ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب و ۶۰ دقیقه ورزش‌های سوئدی هفته‌ای یک بار به مدت شش ماه مقادیر خونی اینترلوکین یک بتا و فاکتور نکروز توموری الفا و اینترلوکین شش را تغییری نداد، اما سبب کاهش معنی‌دار این متغیرها در عضلات اسکلتی بیماران گردید (۶).

اثرات تمرین ورزشی هوازی بر فعالیت سایتوکین‌ها در بیماران عروق کرونری کهن سال مطالعه شد. نتایج حاکی است تمرینات ورزشی هوازی باعث کاهش معنی‌دار اینترلوکین یک بتا و فاکتور نکروز توموری الفا و اینترلوکین شش و پروتئین واکنشگر سی شده است. در حالی که در اینترلوکین ده که یک عامل



حیوانات به مرور زمان به میزان غذای آنها افزوده شد. بطری آب ۵۰۰ میلی‌لیتری برای تامین آب مورد نیاز هر کدام از قفس‌ها به طور روزانه تعویض و پر شد. به تمامی گروه‌های دریافت‌کننده غذای پرچرب، روزانه به مقدار ۱/۵ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن به مدت شش هفته از امولسیون غذای پرچرب به صورت گاواژ داده شد.

گروه تمرین برای پنج روز در هفته (یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه) و به مدت شش هفته در برنامه تمرین هوازی روی نوارگردان الکترونیکی هوشمند حیوانی شرکت کردند.

پروتکل تمرینی پژوهش حاضر، بر اساس مطالعه نشیو و همکاران (۲۰۰۱) طراحی گردید. لذا، شدت نسبی کار در سرتاسر برنامه تمرین معادل ۷۵-۷۰ درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بود. شیب نوارگردان در سرتاسر دوره تمرین، ۱۵ درصد بود. سرعت نوارگردان نیز از ۲۵ متر بر دقیقه در هفته اول شروع و به ۳۰ متر بر دقیقه در هفته ششم رسید. مدت زمان تمرین از ۱۰ دقیقه در روز در هفته اول شروع و به ۵۰ دقیقه در روز در هفته ششم رسید. هر یک از آزمودنی‌ها در ابتدای جلسه تمرین، ۵ دقیقه با سرعت ۱۵-۱۰ متر در دقیقه و شیب صفر درجه، جهت گرم کردن دویند. سپس برای رسیدن به شدت تمرین مورد نظر، سرعت و شیب نوارگردان طی ۱۰-۵ دقیقه به شکل پلکانی افزوده می‌شد. در انتهای برنامه تمرینی، برای سرد کردن آزمودنی‌ها، شیب دستگاه به صفر درجه برگشته و سرعت نیز به آرامی به ۱۵-۱۰ متر در دقیقه می‌رسید. مدت مرحله سرد کردن در هفته‌های ابتدایی حدود ۵ دقیقه و در هفته‌های پایانی حدود ۱۰ دقیقه طول می‌کشید.

همه حیوانات ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از ۱۲ ساعت ناشتایی، طبق برنامه از پیش تعیین شده و با استفاده از شیوه مناسب در دستگاه دسیکاتور

ماهیهیچه موش‌های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب با استفاده از یک مدل حیوانی (۵۰ سر موش صحرایی نر دو ماهه نژاد ویستار ۱۴۸۴۸) در قالب یک طرح پژوهشی چند گروهی با گروه کنترل انجام شد. متغیرهای مستقل پژوهش حاضر شامل اجرای شش هفته تمرین هوازی، مصرف شش هفته عصاره دارچین و مصرف شش هفته رژیم غذایی پرچرب که به عنوان متغیر زمینه ای منظور می‌شود. متغیر وابسته نیز میزان بیان ژن اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیهیچه بود.

در پایان دوره دو هفته ای نگهداری در شرایط کنترل شده با هدف آشنایی و سازگاری با محیط زندگی، شرایط تغذیه‌ای و تمرینی، موش‌ها پس از مطابقت وزنی به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند. هر گروه شامل ده سر موش بود. گروه کنترل؛ که در برنامه تمرین هوازی، گاواژ عصاره دارچین و غذای پرچرب مشارکت نداشته و جهت تعیین مقادیر پایه متغیرهای پژوهش از آنها نمونه‌گیری شد. گروه رژیم پرچرب که میزان تغییرات متغیرهای پژوهش پس از شش هفته گاواژ غذای پرچرب را نشان می‌دهد، گروه عصاره دارچین و رژیم پرچرب که میزان تغییرات متغیرهای پژوهش پس از شش هفته گاواژ عصاره دارچین را نشان می‌دهد، گروه تمرین هوازی و رژیم پرچرب که میزان تغییرات متغیرهای پژوهش پس از شش هفته اجرای تمرین هوازی را نشان می‌دهد و گروه تمرین هوازی و عصاره دارچین و رژیم پرچرب که میزان تغییرات متغیرهای پژوهش پس از شش هفته اجرای تمرین هوازی و گاواژ عصاره دارچین را نشان می‌دهد.

به ازای هر ۱۰۰ گرم وزن بدن موش‌ها، در حدود ۱۰ گرم در روز پلت در اختیار هر موش موجود در هر قفس قرار داده شد. با این حال، مقدار غذای مصرفی آنها روزانه به طور دقیق اندازه‌گیری و با افزایش وزن

آماري شاپيرو - ويلك و لوين نشان داد كه متغيرهاي پژوهش داراي شرط طبيعي بودن توزيع و برابري واريانس‌ها هستند. نتايج آزمون آماري آناليز واريانس يك راهه نشان داد كه تفاوت متغير وزن بدن در پيش آزمون در بين گروه‌هاي مختلف معني‌دار نبود ($p = 0/118$ و $F(4, 45) = 0/118$)؛ در حالي كه تفاوت متغير وزن بدن در پس آزمون در بين تمامي گروه‌ها با يكدیگر معني‌دار بود ($p \leq 0/001$ و $F(4, 45) = 3322/78$) و نتايج آزمون آماري تي زوج نيز نشان داد كه تغييرات وزن بدن در درون گروه‌هاي كنترل [$p \leq 0/001$] و $p = 111/38$ ، رژيم غذايي پرچرب [$p \leq 0/001$] و $p = 250/46$ ، رژيم غذايي پرچرب و تمرين [$p \leq 0/001$] و $p = 124/48$ ، رژيم غذايي پرچرب و دارچين [$p \leq 0/001$] و $p = 119/40$ ، رژيم غذايي پرچرب و تمرين و دارچين [$p \leq 0/001$] و $p = 133/99$ معني‌دار بود (شكل ۱).

تفاوت ميانگين‌هاي متغير ايترلوکين يك بتا در بافت ماهيچه موش‌هاي نر تغذيه شده با رژيم غذايي پرچرب پس از شش هفته تمرين هوازي، مصرف عصاره دارچين و غذايي پرچرب معني‌دار است [$p \leq 0/001$] و $F(3, 36) = 3948/251$. نتايج آزمون تکميلي بونفروني نشان داد كه اين تفاوت بين گروه‌هاي رژيم غذايي پرچرب با رژيم غذايي پرچرب و تمرين، رژيم غذايي پرچرب با رژيم غذايي پرچرب و دارچين، رژيم غذايي پرچرب با رژيم غذايي پرچرب و تمرين و دارچين معني‌دار است ($p \leq 0/001$). تفاوت بين گروه‌هاي رژيم غذايي پرچرب و تمرين با رژيم غذايي پرچرب و دارچين نيز معني‌دار است ($p \leq 0/001$). تفاوت بين گروه‌هاي رژيم غذايي پرچرب و تمرين با رژيم غذايي پرچرب و تمرين و دارچين ($p \leq 0/001$) و رژيم غذايي پرچرب و دارچين با رژيم غذايي پرچرب و تمرين و دارچين ($p \leq 0/001$) نيز معني‌دار است (جدول ۲). از سوي

بيهوش، كشته و جراحي شدند. ابتدا موش‌ها با تزريق درون‌صفاقي كتامين (۹۰ ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم) و زايلازين (۱۰ ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم) بي‌هوش شدند. سپس موش‌ها بلافاصله توسط متخصصين كارآزموده كشته و جراحي شدند و توسط ترازوي ديجيتال وزن موش‌ها و وزن بافت‌هاي مورد نظر اندازه‌گيري و ثبت شد. با توجه به هدف مطالعه‌ي حاضر، بافت‌هاي مورد نظر برداشته شده و سپس بافت‌ها در درون ميكروتيوب‌هاي ۱/۵ يا ۲ ميكروليتری حاوي RNA Later در دماي ۷۰- درجه قرار داده شدند. براي بررسي ميزان بيان ژن يا mRNA پروتئين‌هاي مورد نظر از روش Real Time-PCR استفاده شد. براي تهيه ماستر ميكس PCR جهت تهيه cDNA از كيت شركت تاكارا ويراژن استفاده شد. پس از انجام واكنش PCR، سيكل‌هاي آستانه به دست آمده از نمونه‌هاي گروه‌ها در يك صفحه نرم‌افزار اكسل جمع‌آوري و با قرار دادن آن‌ها در فرمول‌هاي $2^{-Ct\Delta\Delta}$ و $2^{-Ct\Delta\Delta}$ نسبت ميزان بيان ژن‌هاي هدف و مرجع با يكدیگر مقايسه شد.

براي آزمون طبيعي بودن توزيع متغيرها از آزمون شاپيرو- ويلك و براي آزمون تجانس واريانس متغيرها از آزمون لوين استفاده شد. ميانگين متغيرهاي پژوهش در بين گروه‌ها (بجز گروه كنترل) با هدف تعيين تفاوت‌هاي بين گروه‌ي، با استفاده از آزمون-هاي آناليز واريانس يك طرفه و بونفروني مقايسه شدند. ميانگين متغيرهاي پژوهش در بين هر گروه با گروه كنترل با هدف تعيين تفاوت‌هاي درون گروه‌ي، با استفاده از آزمون آماري تي تك نمونه مقايسه شد. سطح معني‌داري در كلييه آزمون‌ها $p \leq 0/05$ بود.

نتايج

در جدول ۱ مشخصات توصيفي متغيرهاي پژوهش به تفكيك گروه‌ها ارائه شده است. نتايج آزمون‌هاي



کنترل ($p \leq 0/001$)، رژیم غذایی پرچرب و تمرین با کنترل ($p \leq 0/001$)، رژیم غذایی پرچرب و دارچین با کنترل ($p \leq 0/001$) و رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین با کنترل ($p \leq 0/001$) معنی دار است (جدول ۳).

دیگر در شکل ۲ مقایسه گروه‌های مختلف با گروه کنترل نیز نشان‌دهنده اثر متغیرهای رژیم غذایی پرچرب، تمرین هوازی و دارچین و تعامل آنها در تغییرات متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه است. تفاوت میانگین متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه بین گروه‌های رژیم غذایی پرچرب با

جدول ۱- مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه‌های مختلف.


گروه‌ها	وزن بدن (پیش آزمون)		وزن بدن (پس آزمون)		اینترلوکین یک بتا	
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
کنترل	۲۰۸/۰۰	۱/۴۹	۲۵۸/۵۰	۱/۲۷	۱/۰۰	مرجع
رژیم غذایی پرچرب	۲۰۷/۸۰	۱/۳۱	۲۸۹/۶۰	۰/۹۶	۱/۹۰۰	۰/۰۳۶
رژیم غذایی پرچرب و تمرین	۲۰۷/۹۰	۱/۴۵	۲۴۹/۶۰	۱/۰۷	۰/۵۵۳	۰/۰۲۹
رژیم غذایی پرچرب و دارچین	۲۰۷/۹۰	۱/۲۸	۲۸۷/۱۰	۱/۱۹	۱/۶۶۵	۰/۰۲۶
رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین	۲۰۷/۶۰	۱/۴۳	۲۴۴/۷۰	۱/۲۵	۰/۳۵۰	۰/۰۲۶

جدول ۲- نتایج آزمون آماری تفاوت میانگین‌های متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه.


متغیر	منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F	معنی داری
اینترلوکین یک	بین گروهی	۱۸/۱۹۸	۳	۶/۰۶۶	۶۷۲۷/۴۶۰	$p \leq 0/001$
بتا در بافت	درون گروهی	۰/۰۳۲	۳۶	۰/۰۰۱		
ماهیچه	کل	۱۸/۲۳۰	۳۹			

جدول ۳. نتایج آزمون تی تک نمونه در مقایسه اینترلوکین یک بتا بافت ماهیچه گروه‌ها با گروه کنترل.

گروه‌ها	میانگین	انحراف امعیار	تفاوت میانگین‌ها	مقدار t	درجه آزادی	معنی داری
رژیم غذایی پرچرب	۱/۹۰۰	۰/۰۳۶	۰/۹۰۰	۷۷/۹۴	۹	$p \leq 0/001$
رژیم غذایی پرچرب و تمرین	۰/۵۵۳	۰/۰۲۹	-۰/۴۴۷	-۴۷/۹۸	۹	$p \leq 0/001$
رژیم غذایی پرچرب و دارچین	۱/۶۶۵	۰/۰۲۶	۰/۶۶۵	۷۹/۸۰	۹	$p \leq 0/001$
رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین	۰/۳۵۰	۰/۰۲۶	-۰/۶۵۰	-۷۷/۰۸	۹	$p \leq 0/001$



شکل ۱- تغییرات وزن بدن در گروه‌های مختلف (۱: کنترل، ۲: رژیم غذایی پرچرب، ۳: رژیم غذایی پرچرب و تمرین، ۴: رژیم غذایی پرچرب و دارچین، ۵: رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین).



شکل ۲- تفاوت میانگین‌های متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه موش‌های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب پس از شش هفته تمرین هوازی، مصرف عصاره دارچین و غذای پرچرب (۱: کنترل، ۲: رژیم غذایی پرچرب، ۳: رژیم غذایی پرچرب و تمرین، ۴: رژیم غذایی پرچرب و دارچین، ۵: رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین).



بحث

چشمگیری و معنی دار تمرین هوازی و دارچین بر تغییرات متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه (است) معنی دار است. در نهایت این که تفاوت میانگین‌های متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه بین گروه‌های رژیم غذایی پرچرب و تمرین با رژیم غذایی پرچرب و دارچین که نشان دهنده تفاوت اثر تمرین و دارچین بر تغییرات متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه است نیز معنی دار می‌باشد. تفاوت بین گروه‌های رژیم غذایی پرچرب و تمرین با رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین و رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین نیز معنی دار است. از سوی دیگر مقایسه گروه‌های مختلف با گروه کنترل نیز نشان‌دهنده اثر متغیرهای رژیم غذایی پرچرب، تمرین هوازی و دارچین و تعامل آنها در تغییرات متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه است. تفاوت میانگین متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه بین همه گروه‌های با گروه کنترل معنی دار است.

نتیجه‌گیری

بنابر این به نظر می‌رسد که اثرات رژیم غذایی پرچرب، ترکیب رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی، ترکیب رژیم غذایی پرچرب و دارچین و ترکیب رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی و دارچین بر متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه چشمگیری و معنی دار باشد.

منابع

1. Badalzadeh, R., Shaghghi, M., Mohammadi, M., Dehghan, G., Mohammadi, Z. 2014. The effect of cinnamon extract and long-term aerobic training on heart function, biochemical alterations and lipid profile following exhaustive exercise in male rats. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, 4(2): 515-520.

تغییرات وزن بدن نشان‌دهنده افزایش وزن بدن به میزان ۲۴/۲۷ درصد در گروه کنترل، ۳۹/۳۶ درصد در گروه رژیم غذایی پرچرب، ۲۰/۰۵ درصد در گروه رژیم غذایی پرچرب و تمرین، ۳۰/۱۰ درصد در گروه رژیم غذایی پرچرب و دارچین و ۱۷/۸۷ درصد در گروه رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین بود. افزایش طبیعی وزن بدن ناشی از افزایش سن که در گروه کنترل محاسبه شده نشان‌دهنده آن است که رژیم غذایی پرچرب، افزایش وزن بیشتری را در مدت شش هفته باعث شده است؛ در حالی که در گروه رژیم غذایی پرچرب و تمرین و گروه رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین افزایش وزن محاسبه شده کمتر از گروه کنترل و گروه رژیم غذایی پرچرب بوده است که این تفاوت معنی دار احتمالاً ناشی از اثرات اجرای تمرین هوازی در این دو گروه بوده است. در گروه رژیم غذایی پرچرب و دارچین نیز افزایش وزن بدن مابین گروه کنترل و رژیم غذایی پرچرب بوده که نشان‌دهنده آن است که مصرف دارچین مانع از افزایش بسیار زیاد وزن بدن ناشی از مصرف غذای پرچرب می‌شود. در نهایت این که اجرای تمرین هوازی و مصرف دارچین به صورت ترکیبی اثرات بهتری را در پی داشته و مانع افزایش وزن بیش از حد ناشی از رژیم غذایی پرچرب شده است.

تفاوت میانگین‌های متغیر اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه بین گروه‌های رژیم غذایی پرچرب با رژیم غذایی پرچرب و تمرین (که نشان‌دهنده اثر تمرین هوازی بر تغییرات اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه است)، بین گروه‌های رژیم غذایی پرچرب با رژیم غذایی پرچرب و دارچین (که نشان‌دهنده اثر دارچین بر تغییرات اینترلوکین یک بتا در بافت ماهیچه است) و بین گروه‌های رژیم غذایی پرچرب با رژیم غذایی پرچرب و تمرین و دارچین (که نشان‌دهنده اثر تعاملی

- and Obesity: A comprehensive handbook. 2: 171-177.
11. Flegal, K.M., Graubard, B.I. 2009. Estimates of excess deaths associated with body mass index and other anthropometric variables. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 89(4): 1213-1219.
 12. Gadina, M., Hilton, D., Johnston, J.A., Morinobu, A., Lighvani, A., Zhou, Y.-J. 2001. signaling by type I and II cytokine receptors: ten years after. *Current Opinion in Immunology*, 13(3): 363-373.
 13. Hasani-Ranjbar, S., Nayebe, N., Larijani, B., Abdollahi, M. 2009. A systematic review of the efficacy and safety herbal medicine used in the treatment of obesity. *World Journal of Gastroenterology*, 15(25): 3073.
 14. Kumanogoh, A., Ogata, M. 2010. The study of cytokines by Japanese researchers: a historical perspective. *International Immunology*, 22(5): 341-345.
 15. Liuzzi, J.P., Lichten, L.A., Rivera, S., Blanchard, R.K., Aydemir, T.B., Knutson, M.D. 2005. Interleukin-6 regulates the zinc transporter Zip14 in liver and contributes to the hypozincemia of the acute-phase response. *Proceeding of the National Academy of Sciences of the United State of America*, 102(19): 6843-6848.
 16. Loos, R.J. 2012. Genetic determinant of common obesity and their value in prediction. *Best Practice and Research Clinical Endocrinology and Metabolism*, 26(2): 211-226.
 17. Lukaszewicz, M., Mroczko, B., Szmitkowski, M. 2007. Clinical significance of interleukin-6 (IL-6) as a prognostic factor of cancer disease. *Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej*, 117(5-6): 247-251.
 18. Mathew, S., Abraham, T.E. 2006. Studies on the antioxidant activities of cinnamon (*Cinnamomum verum*) bark extract, through various in vitro models. *Food Chemistry*, 94(4): 520-528.
 2. Bray, G.A. 1998. Contemporary diagnosis and management of obesity: Handbooks in Health Care.
 3. Carey, A.L., Steinberg, G.R., Macaulay, S.L., Thomas, W.G., Holmes, A.G., Ramm, G., 2006. Interleukin-6 increases insulin-stimulated glucose disposal in humans and glucose uptake and fatty acid oxidation in vitro via AMP-activated protein kinase. *Diabetes*, 55(10): 2688-2697.
 4. Chao, L.K., Hua, K.F., Hsu, H.Y., Cheng, S.S., Liu, J.Y., Chang, S.T. 2005. Study on the anti-inflammatory activity of essential oil from leaves of *Cinnamomum osmophloeum*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53(18): 7274-7278.
 5. Church, T.S., Thomas, D.M., Tudor-Locke, C., Katzmarzyk, P.T., Earnest, C.P., Rodarte, R.Q. 2011. Trends over 5 decades in US occupation-related physical activity and their association with obesity. *PloS one*, 6(5): e19657.
 6. Da Cunha Nascimento, D., de Sousa, N.M.F., de Sousa Neto, I.V., Tibana, R.A., de Souza, V.C., Vieira, D.C.L., 2015. Classification of pro-inflammatory status for interleukin-6 affects relative muscle strength in obese elderly women. *Aging Clinical and Experimental Research*, 27(6): 791-797.
 7. Ebrahimi, M., Khenar Sanami, S. 2015. Effects of high fat diet and high intensity aerobic training on interleukin 6 plasma levels in rats. *Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology*, 18(3): 110-116.
 8. Eckel, R.H., Grundy, S.M., Zimmet, P.Z., 2005. The metabolic syndrome. *The Lancet*, 365(9468): 1415-1428.
 9. Eftekhari, E., Zafari, A., Gholami, M., 2016. Physical activity, lipid profiles and leptin. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 56(4): 465-469.
 10. Fairburn, C.G., Walsh, B.T., 2002. Atypical eating disorders (eating disorder not otherwise specified). *Eating Disorders*



25. Roussel, A.M., Hininger, I., Benaraba, R., Ziegenfuss, T.N., Anderson, R.A. 2009. Antioxidant effects of a cinnamon extract in people with impaired fasting glucose that are overweight or obese. *Journal of the American College of Nutrition*, 28(1): 16-21.
26. Sartorius, T., Peter, A., Schulz, N., Drescher, A., Berghelm, I., Machann, J. 2014. Cinnamon extract improves insulin sensitivity in the brain and lowers liver fat in mouse models of obesity, *PLoS one*, 9(3): e92358.
27. Shalaby, M.A., Saifan, H.A. 2014. Some pharmacological effects of cinnamon and ginger herbs in obese diabetic rats. *Journal of Intercultural Ethnopharmacology*, 3(4): 144.
28. Sindhu, S., Thomas, R., Shihab, P., Sriraman, D., Behbahani, K., Ahmad, R. 2015. Obesity is a positive modulator of IL-6R and IL-6 expression in the subcutaneous adipose tissue: significance for metabolic inflammation. *PLoS one*, 10(7): e0133494.
29. Tanaka, T., Narazaki, M., Kishimoto, T. 2014. IL-6 in inflammation, immunity, and disease. *Cold Spring Harbor Perspective in Biology*, 6(10): a016295.
30. Vieira, V.J., Valentine, R.J., Wilund, K.R., Antao, N., Baynard, T., Woods, J.A. 2009. Effects of exercise and low-fat diet on adipose tissue inflammation and metabolic complications in obese mice. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, 296(5): E1164-1171.
19. Na, Y.K., Hong, H.S., Lee, W.K., Kim, D.S. 2015. Increased methylation of interleukin 6 gene is associated with obesity in Korean women. *Molecules and Cells*, 38(5): 452-456.
20. Nasery, L., Zafari, A., Banaeifar, A. A., 2015. The response of leptin and lipid parameters related to an aerobic exercise among young athlete and non-athlete women. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*, (S3): 788-798.
21. Nemeth, E., Rivera, S., Gabayan, V., Keller, C., Taudorf, S., Pederson, B.K. 2004. IL-6 mediates hypoferrremia of inflammation by inducing the synthesis of the iron regulatory hormone hepcidin. *The Journal of Clinical Investigation*, 113(9): 1271-1276.
22. Nguyen, N.T., Magno, C.P., Lane, K.t., Hinojosa, M.W., Lane, J.S. 2008. Association of hypertension, diabetes, dyslipidemia, and metabolic syndrome with obesity: finding from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2004. *Journal of the American College of Surgeon*, 207(6): 928-9234.
23. Ossanloo, P., Najari, L., Zafari, A. 2012. The effects of combined training (Aerobic dance, step exercise and resistance training) on body fat percent and lipid profiles in sedentary females of Alzahra University. *European Journal of Experimental Biology*, 2(5): 1598-1602.
24. Ouchi, N., Parker, J.L., Lugus, J.J., Walsh, K. 2011. Adipokines in inflammation and metabolic disease. *Nature Reviews Immunology*, 11(2): 85-97.