

# تأثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی

بنفسه آقامحمدی<sup>۱</sup>، بابک غیاثی طرزی<sup>۲\*</sup>، مسعود هنرور<sup>۲</sup>، بابک دلخوش<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup>دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

<sup>۲</sup>استادیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

<sup>۳</sup>استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۵      تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۱/۲۳

## چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده از ترکیبات مختلف به منظور افزایش کیفیت و خواص تغذیه‌ای کیک، مورد توجه فراوان قرار گرفته است. تاکنون تأثیر استفاده از برخی شیرین کننده‌ها به جای شکر در فرمولاسیون کیک و بسیاری نان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته اما مطالعات گستره‌های در زمینه‌ی استفاده از محصولات فرعی کارخانجات قند مانند ملاس در فرمولاسیون کیک، انجام نشده است. در این تحقیق، اثرات جایگزینی ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد از شکر با ملاس بر برخی ویژگی‌های مهم کیک مانند افت وزن، بافت، بیاتی، رنگ بافت و پوسته، فعالیت آبی، رطوبت و ارزیابی حسی کیک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون‌ها نشان داد که در سطح معنی‌داری  $P < 0.05$ ، با افزایش درصد جایگزینی ملاس به جای شکر، بافت کیک‌ها سفت‌تر و میزان بیاتی آن‌ها بیشتر شده است. در مقابل، افت وزن، میزان رطوبت و فعالیت آبی کیک‌ها یک روند نزولی داشته‌اند. ارزیابی رنگ نیز نشان داد که رنگ پوسته و بافت تمامی تیمارها نسبت به شاهد به طور معنی‌داری تیره‌تر شده‌اند. با توجه به نتایج ذکر شده، با استفاده از ملاس در فرمولاسیون کیک، می‌توان علاوه بر صرفه‌ی اقتصادی تا حدودی کیفیت محصول نهایی، مدت ماندگاری و ارزش غذایی آن را نیز افزایش داد.

واژه‌های کلیدی: ملاس، کیک، آزمون‌های کیفی، ارزیابی حسی.

\* مسؤول مکاتبه: b.aghamohammadi@yahoo.com

**1- مقدمه**

تیمار شاهد (حاوی شکر گرانولی) طبق فرمولاسیون جدول 4 و 100٪ 25، 50، 75٪ 100٪ شکر به روش مخلوط کردن دو مرحله‌ای تهیه و 125g از آن‌ها در قالب‌های 4/5×5/2×12/5 cm 4 ریخته و در فر با دمای 180، به مدت 30 دقیقه پخته شدند. نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های مربوطه، بسته بندی و نگه داری شدند. ملاس نیز از کارخانه‌ی قند همدان تهیه شد و از نظر میزان ساکارز، خاکستر، بریکس، pH، رنگ و درجه‌ی خلوص مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب از پلاریمتر، کنداکтомتر (هدایت سنج)، رفراکтомتر، pH‌متر و فوتومتر استفاده شد (جدول 3).

**2- مواد و روش‌ها****2-1- آزمایش‌های مواد اولیه و پخت کیک**

مواد اولیه‌ی به کار رفته در فرمولاسیون کیک عبارت بودند از: آرد نول، شکر گرانولی، تخم مرغ، آب، پودر پخت، روغن، امولسیفایر، و قند اینسورت. آزمایش‌های شیمیایی آرد از قبیل رطوبت، گلوتن مرطوب، پروتئین و خاکستر به ترتیب با استفاده از ترازوی رطوبت سنج، روش‌های AACC شماره‌های 38-11، 12-46 و 01-8 انجام شد (جدول 2).

**2-2- آزمون‌های کیک**

افت وزن کیک‌ها از طریق توزین آن‌ها پس از 20-15 دقیقه سرد شدن محاسبه گردید. بافت کیک در دو روز متفاوت یعنی یک روز و دو هفته پس از تولید و با استفاده از دستگاه بافت سنج اینستران (7) (مدل Testometric M350-10CT) ساخت کشور انگلستان) مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط آزمون تراکمی<sup>۱</sup> به کار رفته بدین صورت بود که ابتدانمونه‌ها به شکل قطعات مکعب با ابعاد 2/5 سانتی‌متر برش داده شدند و سپس توسط یک پروب صفحه‌ای با سرعت 1 میلی‌متر در ثانیه و به میزان 50٪ فشرده گردیدند. مقدار عددی پارامتر سفتی بر حسب واحد نیوتن به صورت پیک بر روی صفحه‌ی نمایشگر دستگاه ثبت و به عنوان شاخصی از سفتی گزارش شد.

در تهیه‌ی کیک‌ها، شکر یک ترکیب کلیدی است چون هم نقش شیرین کنندگی دارد و هم عملکردهای فیزیکی و شیمیایی مهمی را انجام می‌دهد (8). اغلب در کنار شکر از شیرین کننده‌های مفید دیگری در محصولات استفاده می‌شود؛ مانند شربت گلوكز، شکر قهوه‌ای، دکستروز، شربت ذرت، قند اینسورت و عصاره‌ی مالت (10). به عنوان مثال Bakr (1997) برای غنی کردن نان با آهن، برای کاهش کمبود آهن در کشور مصر از مواد طبیعی غنی از آهن استفاده کرد که یکی از آن‌ها ملاس بود. این مواد به طور جداگانه و در مقادیر مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی‌های انجام شده روی خصوصیات خمیر و نان نشان دادند که نان‌های مطلوبی با ارزش غذایی بالا، رنگ و پوسته‌ی عالی، بافت مناسب تولید شده‌اند (11). Sidhu و همکاران (2007) برای تولید نان، شربت خرما را در مقادیر 50 و 100٪ جایگزین شکر کردن و کیفیت نان تولید شده را مورد بررسی قرار دادند. نمونه‌هایی که در آن‌ها سیروپ خرما به طور کامل جایگزین شکر شده بود از کیفیت پخت، بافت، عطر و طعم بهتری برخوردار بودند (20). Filipčev و Simurina (2006) برای بالا بردن ارزش غذایی و بهبود خواص فیزیکی و حسی کیک (کلوچه) از ملاس استفاده کردند. مقادیر مختلفی از ملاس بدین منظور به خمیر کیک اضافه شد. با افزایش مقدار ملاس، رنگ تیره‌تر شد و محصولات تولید شده بافت مطلوب و ساختار مناسبی داشتند (21). ملاس یکی از ارزان‌ترین منابع کربوهیدرات است که مقدار زیادی قند دارد. مقداری از آن برای مصرف انسانی اما بخش اعظم آن در خوراک دام، تولید مخمر، صنعت تخمیر مثلاً تولید اسید سیتریک، الكل و مصارف دارویی استفاده می‌شود (16). این ماده، شامل آب، قند، ویتامین‌های نیاسین، اسید پنتوئنیک و پیرودوکسین، اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی و فلزات سنگین از جمله: آهن، روی، مس، منگنز، منیزیم و کلسیم و پتاسیم و آنتی اکسیدان می‌باشد (18 و 19).

با توجه به جنبه‌ی جدید بودن تولید کیک از طریق جایگزینی شکر با سیروپ‌های مختلف ساکارزی کارخانجات قند، هدف اصلی این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ملاس در فرمولاسیون و تولید کیک روغنی و اثرات جایگزینی 25، 50، 75 و 100٪ از شکر با ملاس بر برخی ویژگی‌های کیک در نظر گرفته شده است. خمیر

جدول 1- درصد ترکیبات شیمیایی ملاس چند قند (شیخ الاسلامی 1382) (۵)

آب	ساکارز	پتاسم	سدیم	کلسیم	منیزیم	کلر	سولفات	نیترات و نیتریت	کربن ازت	بدون ازت	تیامین	کربن	کربن	سایر ترکیبات آلی
7	3	5	3/07	6/97	0/09	0/27	0/9	0/02	0/25	0/53	3/9	51	18	

جدول 2 - مشخصات شیمیایی آرد مصرفی


پروتئین (%)	خاکستر (%)	گلوتن مرطوب (%)	رطوبت (%)
8/5	0/50	28/5	13/87

جدول 3 - مشخصات ملاس


نام سiroپ/آزمون	pH	بریکس	میزان ساکارز	خاکستر (%)	رنگ (پوشن)	1410/10
ملاس	7/3	72	41/8	6/17		

جدول 4 - فرمولاسیون کیک شاهد


درصد	درصد	مرغ	اینورت	گلیسرین	قد	مونو و دی	بیکینگ	آرد	شکر	آب	تخم	روغن	خاکستر (%)	رنگ (پوشن)	بریکس	میزان ساکارز	خاکستر (%)	رنگ (پوشن)	پودر	گلیسرید هیدراته
36	20	17/5	11	8	3	2	1/5	1												



شکل 1- نتایج حاصل از اندازه گیری افت وزن کیک



شکل 2- نتایج حاصل از اندازه گیری رطوبت کیک



شکل 3- نتایج حاصل از اندازه گیری فعالیت آبی کیک

قابلیت نگه داری آب بالای این ترکیبات و کاهش میزان از دست رفتن آب در طی پخت می‌تواند دلیل دیگر باشد(2).

### 3-2- رطوبت کیک

همان طور که از نتایج نشان داده شده در شکل 2 مشخص است با افزایش میزان جایگزینی با ملاس، یک روند کاهشی معنی دار در رطوبت مشاهده شد. تیمارهای حاوی ملاس نسبت به شاهد کاهش رطوبت داشتند که علت آن ممکن است درجهٔ خلوص پائین این شربت و زیاد بودن مادهٔ خشک فرمولاسیون این تیمارها باشد. البته کاهش محتوای رطوبتی بافت، موجب ایجاد بافتی سفت تر و خشک تر می‌شود (12).

### 3-3- فعالیت آبی

همان طور که از شکل 3 مشخص است،  $a_w$  تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش معنی داری داشت که علت اصلی می‌تواند کاهش معنی دار رطوبت آنها نسبت به تیمار شاهد باشد. ضمن این که وجود قند اینورت و ترکیبات معدنی که باعث جذب آب بیشتر می‌شوند می‌تواند کاهش آب آزاد در دسترس را سبب شوند. با افزایش درصد جایگزینی نیز، تیمارها در دو سطح 25 و 50٪ کاهش غیرمعنی دار و در دو سطح دیگر کاهش معنی دار داشتند. باید یاد آور شد هنگامی که فعالیت آبی پائین می‌آید، احتمال رشد میکروبی کاهش پیدا می‌کند (17).

### 3-4- بافت کیک

آزمون بافت روز 14 بیانگر بیاتی محصول است. محصولات صنایع پخت پس از طی فرآیند پخت، دستخوش تغییرات فیزیکوشیمیایی می‌شوند که در مفهوم کلی، آن را بیاتی می‌نامند. واژه‌ی بیاتی دلالت بر کاهش میزان پذیرش محصولات نانوایی به وسیله‌ی مصرف کننده دارد و علت آن تغییرات رخ داده در مفرز محصول است. بیاتی توسط بسیاری از پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی از قبیل تغییرات در بافت، انتقال آب، کریستالیزاسیون نشاسته (رتروگراداسیون) و برهمنکش‌های میان اجزای متخلکه قابل تشخیص می‌باشد. به عبارتی این فرآیند با ایجاد تغییر در ویژگی‌های ظاهری و باطنی مانند طعم، مزه، عطر و قابلیت جویدن، منجر به کهنه شدن این محصولات می‌شود (6).

برای رنگ سنجی نمونه‌های کیک، هم پوسته و هم بافت آنها توسط سیستم رنگ سنجی هانترلب (مدل Color Flex) مورد بررسی قرار گرفت و فاکتورهای  $a^*$ ,  $b^*$  و  $L^*$  پوسته و بافت نمونه‌ها به طور جداگانه اندازه گیری شد و در نهایت فاکتورهای  $\Delta E$  (اختلاف رنگ) و  $L^*$  (میزان روشنایی<sup>1</sup>) پوسته و بافت هر یک از نمونه‌ها به طور جداگانه، گزارش شد (13).

رطوبت کیک‌ها با دستگاه رطوبت سنج مادون قرمز اتوماتیک (2) (مدل OHAUS MB45 ساخت سوئیس) و فعالیت آبی آنها با استفاده از استاندارد ملی ایران به شماره‌ی 2553 و با کمک دستگاه Lab Master  $a_w$  (مدل novasina) اندازه گیری شد.

ویژگی‌های حسی نمونه‌های کیک، شامل بافت، طعم، رنگ، بو و میزان شیرینی، مورد بررسی قرار گرفت و از 5 ارزیاب آموزش دیده خواسته شد که نظرات خود را از 1 تا 5 به پارامترهای مورد نظر بدیند (5. عالی، 4. خوب، 3. متوسط، 2. ضعیف و 1. بد). در این روش، آزمون‌های حسی ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به امتیازاتی که 5 ارزیاب به کیک‌ها داده بودند، در تحلیل آنها از طرح‌های آماری بلوک‌های کاملاً تصادفی استفاده و برای مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد (14).


## 3-2- تجزیه و تحلیل آماری

این آزمایش‌ها در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار و ارزیابی حسی در 5 تکرار انجام شد. به منظور ارزیابی داده‌ها از نرم افزار MSTAT-C استفاده شد به این ترتیب که برای تعیین وجود اختلاف معنی دار بین داده‌ها از آنالیز واریانس یک طرفة و برای مقایسه‌ی میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال 5٪ استفاده شد.


## 3- نتایج و بحث

### 3-1- افت وزن کیک


همان طور که از نتایج نشان داده شده در شکل 1 مشخص است با افزایش جایگزینی ملاس، شاهد کاهش در افت وزن بودیم که در برخی تیمارها معنی دار و در برخی دیگر غیرمعنی دار بود که علت ممکن است افزایش میزان قند اینورت و ترکیبات معدنی در فرمولاسیون و تاثیر آنها در حفظ رطوبت باشد. همچنین با توجه به این که ملاس مقداری ترکیبات کلولئیدی دارد، قدرت جذب و




شکل 4- نتایج حاصل از اندازه گیری بافت کیک در روزهای 1 و 14



شکل 5- نتایج حاصل از اندازه گیری رنگ پوسته کیک



شکل 6- نتایج حاصل از اندازه گیری رنگ بافت کیک



شکل 7- نتایج حاصل از ارزیابی حسی کیک

اینورت در آن باشد که با افزایش مقدار ملاس و تراکم این ترکیبات رنگی، کاهش این فاکتور نیز بیشتر می‌شود(1).

### 3-6- ارزیابی حسی

همان طور که در شکل 7 مشخص است بافت هیچ یک از تیمارها از نظر ارزیابی‌های حسی با نمونه‌ی شاهد و با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشته است. البته تیمار حاوی 25 ملاس به طرز غیرمعنی داری بهتر از نمونه‌ی شاهد و بهترین نمونه، ارزیابی شد. رنگ هیچ یک از تیمارهای حاوی ملاس با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند اما با نمونه‌ی شاهد تفاوت معنی دار داشتند. طعم تیمارهای حاوی 25 و 50 ملاس با یکدیگر و با نمونه‌ی شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. تیمارهای حاوی 75 و 100 ملاس نیز اگرچه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند اما نسبت به شاهد به طرز معنی داری متفاوت بودند. در حقیقت، تیمارهای حاوی ملاس به خاطر وجود رنگدانه‌های موجود در ملاس و رنگ قهوه‌ای بافت از نظر رنگ و به خاطر کمی تلحی از نظر طعم، نمره کمتری گرفته بودند. البته با توجه به طعم کاراملی، این تیمارها می‌توانند در فرمولاسیون کیک‌های شکلاتی مصرف شوند. بو در تیمارهای حاوی 25 و 50 ملاس با یکدیگر و با نمونه‌ی شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. تیمارهای حاوی 75 و 100 ملاس نیز اگرچه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند اما نسبت به شاهد، نمره‌ی کمتری گرفته بودند که علت آن ممکن است بتوی خود ملاس باشد. میزان شیرینی تیمار حاوی 25% ملاس نسبت به نمونه‌ی شاهد، تفاوت معنی داری نداشت. نمونه‌های حاوی 50 و 75 و 100% ملاس نیز نسبت به یکدیگر تفاوت معنی داری نشان ندادند.

### 4- نتیجه گیری

به طور کلی در محصولات صنعتی، قدهای مایع در مقایسه با شکر گرانولی، فواید زیادی دارند. کار با آن‌ها راحت است و آمده‌ی مصرف مستقیم در فرآیند تولید هستند. بنابراین، زمان و تعداد مراحل فرآیند تولید را کاهش می‌دهند، علاوه بر آن، بیشتر می‌توانند تحت مراحل اتوماتیک، فرآیند شوند. همچنین، ملاس به دلیل داشتن ترکیبات رنگی مانند ملانین‌ها و ملانوئیدین‌ها در ایجاد رنگ مورد نیاز در بافت و پوسته‌ی کیک تاثیر دارد. از طرف دیگر، با استفاده آن در فرمولاسیون کیک، گام موثری در زمینه‌ی کاهش قیمت تمام شده‌ی این فرآورده برداشته می‌شود

همان طور که از شکل 4 مشخص است با افزایش سطح جایگزینی ملاس، تیمارها در هر دو روز 1 و 14 نسبت به یکدیگر سفت‌تر شده‌اند به طوری که تیمارهای حاوی 25 و 50% ملاس در هر دو روز نسبت به شاهد نرمنترند که علت آن را می‌توان به وجود قند

اینورت، ترکیبات معدنی بالا، فیبر و صمغ موجود در ملاس نسبت داد. تیمارهای حاوی 75 و 100% ملاس نیز در هر دو روز 1 و 14 نسبت به شاهد سفت‌ترند که علت آن می‌تواند مقدار پروتئین بیشتر در فرمولاسیون آن‌ها باشد که باعث سفت‌تر شدن بافت می‌شود(1). همچنین دانسته‌ی بیشتر خمیر و حجم کمتر آن‌ها نسبت به شاهد که باعث ایجاد بافتی سفت و متراکم شده‌اند. البته همان طور که قبل از اشاره شد کاهش محتوای رطوبتی بافت نیز موجب ایجاد بافتی سفت تر و خشک تر می‌شود(12). لازم به ذکر است که با افزایش سطح جایگزینی ملاس، تیمارها به طور معنی داری نسبت به یکدیگر سفت‌تر شوند به طوری که در هر دو روز 1 و 14، تیمار 100% ملاس سفت‌ترین و تیمار 25% آن نرم‌ترین کیک بوده‌اند.

### 5-3- رنگ پوسته و بافت کیک

از نتایج نشان داده شده در شکل‌های 5 و 6 مشخص است که اختلاف رنگ پوسته‌ی تمام تیمارها نسبت به شاهد اختلاف معنی‌داری دارند و با توجه به میزان<sup>\*</sup> L اندازه‌گیری شده آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که این اختلاف رنگ به دلیل تیره‌تر شدن پوسته است به طوری که با افزایش مقدار ملاس، کاهش این فاکتور نیز بیشتر می‌شود که علت آن می‌تواند میزان رنگ بسیار زیاد ملاس باشد (1). علت دیگر ممکن است واکنش میلارد باشد چون ملاس حاوی مقدار زیادی پروتئین، اسید‌آmine و قند اینورت (قندهای ساده) است که باعث افزایش میزان واکنش میلارد و تیره‌تر شدن رنگ پوسته و ایجاد اختلاف رنگ معنی‌دار نسبت به شاهد می‌شود (15)؛ به طوری که تیمار حاوی 100% ملاس بیشترین تفاوت رنگ را بین تیمارها دارد. اختلاف رنگ بافت تمام تیمارها نیز نسبت به یکدیگر و همچنین نمونه شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند که با توجه به میزان<sup>\*</sup> L اندازه‌گیری شده آن‌ها نیز می‌توان نتیجه گرفت که رنگ بافت تیره‌تر و با افزایش مقدار ملاس، تیرگی بیشتر شده است. علت این تیرگی نیز مانند پوسته می‌تواند ترکیبات رنگی زیاد موجود در ملاس و تیرگی آن وجود قند

- 10- Asghar,Ali, Anjum Faqir Muhammad, Butt Masood Sadiq and Hussain Shahzad. 2006. Functionality of Different Surfactants and Ingredients in Frozen Dough. *Turk J Biol.* 30: 243-250.
- 11- Bakr,A.A.,1997. Production of iron-fortified bread employing some selected natural iron sources, *Nahrung*, 41: 293-298.
- 12- Cauvain,S. , Young,L. , 2000, *Bakery Food Manufacture and quality*, Blackwell Science.
- 13- Celik,I. Yýlmaz,Y. Isýk,F and Ustun,O. 2006. Effect of soapwort extract on physical and sensory properties of sponge cakes and rheological properties of sponge cake batters. *Food Chemistry*.
- 14- Ghazizadeh, M. & Razegh, S. A. 1998. Sensory Evaluation Food National and Food Technology Research Institute, Tehran, Iran.
- 15- Go'mez, Manuel. Oliete, Bonastre. Rosell,M, Cristina. Pando, Valentý'n and Ferna'ndez, Encarnacio'n. 2008. Studies on cake quality made of wheatechickpea flour blends. *LWT - Food Science and Technology* 41, 1701-1709.
- 16- Jackson,E.B.,1995. *Sugar Confectionary Manufacture*. Second edition. Blackie Academic and Professional, an imprint of Chapman and Hall, pp 4,6.
- 17- Jay James M. 2000. *Modern Food Microbiology*. Aspen Publishers.
- 18- Malbas'a, R., Lonc'ar, E., Djuric, M., and Dos'enovic, I., 2008, Effect of sucrose concentration on the products of Kombucha fermentation on molasses, *Food Chemistry*, 108: 926-932.
- 19- Phillips, K. M., Carlsen, M. H., and Blomhoff, R., 2009, Total antioxidant content of alternatives to refined sugar, *Journal of the American Dietetic Association*, 109. 64-71.
- 20- Sidhu, J.S., Al-safer, J.M., Al-hooti, S. and Al-othman, A., 2003, Quality of pan bread made by replacing sucrose with datesyrup produced by using pectinase/cellulase enzymes, *Plant Foods for Human Nutrition*,58: 1-8.
- 21- Simurina, O. and Filip'ev, B., 2006, Sugar beet molasses as an ingredient in tea-cookie formulations, *PTEP (Serbia and Montenegro)*, 10: 16-21.

ضمن این که ملاس دارای ترکیبات معدنی است و با به کارگیری آن در فرمولاسیون کیک، ترکیبات معدنی هرچند به مقدار کم، بدون این که هزینه‌ی اضافی پرداخت شود، به کیک افزوده می‌شوند.

## 5- سپاس گزاری

نگارنده‌گان مقاله، مراتب تشكرو سپاس خود را از تمام پرسنل کارخانه‌ی قند همدان و کارخانه‌ی کیک درنا جهت تهیه‌ی مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی برای انجام بخشی از آزمون‌های این پژوهش، اعلام می‌دارند.

## 6- منابع

- آقامحمدی، بنفشه. هنرور، مسعود. غیاثی طرزی، بابک و دلخوش، بابک. 1390. بررسی امکان استفاده از شربت‌های قندی کارخانجات قند به عنوان جایگزین شکر در فرمولاسیون کیک روغنی. مجموعه مقالات سی و سومین دوره‌ی سمینار سالانه‌ی کارخانه‌های قند و شکر ایران.
- ایوبی، اعظم. حبیبی نجفی، محمدباقر و کریمی، مهدی. 1387. تاثیر افزودن کسانتره‌ی پروتئین آب پنیر و صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوшیمیایی کیک روغنی. مجله‌ی پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران. صفحات 33-46
- بی نام. کیک-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، استاندارد ملی شماره‌ی 2553 ایران، تجدید نظر سوم. موسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- بی نام، 1349، ملاس- ویژگی‌ها، استاندارد شماره‌ی 319 ایران.
- شیخ الاسلامی، رضا. 1382. تکنولوژی قند. مؤلف. 318
- ناصحی، بهزاد. عزیزی، محمدحسین و هادیان، زهرا. 1388. روش‌های مختلف اندازه گیری بیاتی نان. فصلنامه‌ی علوم و صنایع غذایی. دوره‌ی 6، شماره‌ی 1، صفحات 53-63
- AACC,1983. Approved methods of the American Association of CerealChemists. St. Paul, MN: American Association of CerealChemists.
- Anonymous. *A Hand Book of Sugar's Functional Roles in Cooking & Food Preparation*. The Sugar Association, Inc.
- Asadi, D., 2006, *Handbook sugar beet technology*. John Wiley & Sons, Inc.