

بررسی ویژگی‌های فیزیکی دانه و مغز بادام درختی پوست سنگی و پوست کاغذی ایرانی به عنوان تابعی از رطوبت (ضریب اصطکاک و ریپوز پری)

ابوالفضل الیاسی ایرانی¹، علی معتمد زادگان^{2*}، سید احمد شهیدی یاساقی³

¹ دانش آموخته‌ی رشته علوم و صنایع غذایی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا... آملی، آمل، ایران
² استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا... آملی، آمل، ایران
³ مربی گروه علوم صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا... آملی، آمل، ایران

تاریخ دریافت: 1391/2/12 تاریخ پذیرش: 1391/6/10

چکیده

در پژوهش حاضر، خواص فیزیکی دانه‌ها و مغز بادام درختی (پوست سنگی و پوست کاغذی) به عنوان تابعی از رطوبت در محدوده‌ی رطوبتی ۴/۸۹٪ الی ۲۶/۱۷٪ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل، نشان می‌دهد که ضریب اصطکاک برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست کاغذی از همه بیش تر و این مقدار برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی از همه کم تر بوده است ($p < 0/05$). ضریب اصطکاک هم برای دانه و هم برای مغزها بر روی هر چهار نوع سطح آزمایشی با افزایش رطوبت افزایش یافته است. بالاترین مقدار ضریب اصطکاک در مغز بادام درختی پوست سنگی و معادل ۰/۶۸۲۷۳۳ بر روی تخته سه لا به دست آمده که بالاترین مقدار در برای کلیه‌ی گونه‌های بادام مورد مطالعه، هم برای مغز و هم برای دانه کامل بوده است. کم‌ترین مقدار ضریب اصطکاک برای دانه‌ی کامل، برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی بر روی ورق آهن گالوانیزه و معادل ۰/۲۸۶ و برای مغز بر روی شیشه برای مغز بادام درختی پوست سنگی و معادل ۰/۳۲۴۴ به دست آمده است. زاویه‌ی ریپوز پری در مغز بادام درختی پوست سنگی بیش تر از همه و معادل ۶۰/۵۸۰۹۲۴۷۷ درجه بوده است ($p < 0/05$).

واژه‌های کلیدی: بادام درختی، ویژگی‌های فیزیکی، رطوبت.

1- مقدمه

نمود. او میانگین طول، عرض رقم مام را ۲۲ و ۳۵ میلی متر تعیین کرد (۲۲).

همچنین، برخی ویژگی‌های فیزیکی دانه‌های بادام از قبیل ترک خوردگی و کرویت توسط کالیونکا (۱۷) گزارش شده است. در هر صورت، علی رقم گزارش‌های پراکنده‌ای که در خصوص خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی وجود دارد تا کنون در این زمینه، تحقیقات کافی انجام نشده است.

هدف از این مقاله، بررسی برخی از خواص فیزیکی وابسته به رطوبت دانه و مغز بادام‌های پوست‌کاغذی و پوست‌سنگی شامل بررسی ضریب اصطکاک بر روی چهار سطح ساختاری و اندازه‌گیری زاویه ریپوزبری می‌باشد. پژوهش‌های زیادی بر روی مواد مختلف انجام شده است اما در این گزارش، هم نوع وارته تغییر کرده است و هم نتایج جدیدی در این رابطه به دست آمده و از این لحاظ دارای نوآوری است.

۲- مواد و روش‌ها**۲-۱- مواد**

در این تحقیق، دو گونه بادام درختی خشک (پوست‌کاغذی و پوست‌سنگی) مورد استفاده قرار گرفتند. محصول بادام پوست‌سنگی از خراسان جنوبی و بادام پوست‌کاغذی از استان اصفهان (بادام محب) به میزان هر یک ۵۰ کیلوگرم، تهیه شد. برای مطالعه‌ی ویژگی‌های مغز بادام، مقداری از نمونه به روش دستی در آزمایشگاه پوست‌گیری شده و مغز کامل و سالم به دست آمده برای آزمون مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۲- روش‌ها

مقدار رطوبت اولیه‌ی بادام با استفاده از آون در دمای 2 ± 103 درجه‌ی سانتیگراد اندازه‌گیری شد (۱۹). برای تغییر مقدار رطوبت دانه و یا مغز بادام، رطوبت دهی با محاسبه تقریبی آب لازم از طریق معادله‌ی (۱) و پاشش آب به صوت اسپری بر روی بادام‌ها انجام شد. یکنواخت‌سازی رطوبت طی نگه‌داری نمونه‌ی مرطوب دو کیسه پلی اتیلنی در دمای (۶-۴ درجه‌ی سانتی‌گراد) به مدت حداقل ۱۰ روز انجام گرفت. نمونه‌ها چند بار برای یکنواخت‌سازی بهتر طی نگه‌داری بهم زده شدند (۷، ۹، ۲۳، ۲۷). مقدار رطوبت اولیه‌ی دانه‌ها به عنوان اولین رطوبت در نظر گرفته

بادام، یکی از مهم‌ترین خشکبار در سراسر جهان است که ارزش تجاری زیادی دارد. مغز دانه، منبع مهمی از پروتئین برای تغذیه‌ی انسان را تشکیل می‌دهد. طبق آمار ایران با تولید ۱۲۸۴۶۴ تن بادام در سال چهارمین تولیدکننده‌ی بزرگ بادام در جهان می‌باشد (۱۲). با توجه به شرایط اقلیمی و دارا بودن انواعی از وارته‌های مهم وحشی و اهلی بادام، ایران، مکان مناسبی برای پرورش بادام می‌باشد (۱۱). شناخت ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی فرآورده‌های کشاورزی برای محققان این رشته، بسیار مهم می‌باشد. این مساله در طراحی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در طی برداشت، انتقال، سورتینگ و پروسه‌ی عمل‌آوری فرآورده‌های کشاورزی، اهمیت زیادی دارد. زاویه‌ی ریپوز نیز در محاسبه‌ی سطح انبار لازم برای نگه‌داری محصولات کشاورزی و ارتفاع توده به کار می‌رود. بادام دانه‌ای خوراکی است که میوه‌های دانه‌ای شکل درختی، پرانوس آمیگوالوس از خانواده رز و گونه‌ی شیرین است که به مقدار زیاد در دسرها، شیرینی و آشپزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مغز بادام، منبع مهمی از انرژی (۶ کیلوکالری)، پروتئین (۱۵/۶۴ کیلوکالری) را تشکیل می‌دهد و مقدار روغن آن از ۳۷/۲۷٪ به ۴۰٪ متغیر است. روغن مغز بادام، منبع مهمی از اسید اولئیک (۴۰٪) می‌باشد (۱).

محمدی و همکاران (۲۰۱۰) ویژگی‌های فیزیکی نظیر ابعاد، جرم، حجم، میزان کرویت و میانگین هندسی دو رقم بادام درختی مام و شاهرود ۱۲ را بررسی کردند. دو رقم مذکور در ویژگی‌هایی نظیر میزان کرویت و میانگین هندسی تفاوت معنی‌داری داشتند (۲۰). آیدین در سال ۲۰۰۳ برخی خواص فیزیکی و مکانیکی نوعی بادام بومی که در منطقه مارمارای ترکیه رشد می‌کند را بررسی کرد. مطالعات انجام شده، نشان داد که با افزایش رطوبت برای دانه‌ی کامل بادام، ضریب اصطکاک افزایش یافته (۰/۲۸ به ۰/۸۳) و برای مغز بادام، این میزان کاهش یافته است (۰/۷۸ به ۰/۵۳) (۳). ترکان و همکاران (۲۰۰۷)، مقدار متوسط طول، عرض و ضخامت رقم بادام گلکان را $19/36, 24/6$ و $11/47$ میلی‌متر و متوسط طول، عرض و ضخامت رقم نانپاریل را $18/31, 11/04$ و $31/10$ گزارش کردند (۳۱). مرادی روی بعضی از ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام شاهرود ۱۲ و مام تحقیق

از معادله‌ی ۳ برای محاسبه‌ی زاویه ریزش ریپوزی استفاده شد (۲۳، ۳، ۲۶، ۲۷). که در آن H ارتفاع کوبه در نقطه وسط و D قطر دایره تشکیل شده توسط کوبه در کف ظرف می‌باشد.

$$\theta_f = \tan^{-1}\left(\frac{2H}{D}\right) \quad (3)$$

۲-۵- تجزیه و تحلیل آماری

طرح آزمایشی مورد استفاده برای هر سطح مورد آزمایش، کاملاً تصادفی با آزمایش‌های فاکتوریل و سه تکرار (۳×۴×۴) بود. تیمارها شامل چهار نوع ماده‌ی اولیه در چهار سطح رطوبتی بودند. آنالیز آماری با نرم افزار MSTATC، و رسم نمودارها به همراه تعیین معادلات رگرسیونی با نرم افزار Excel در سطح معنی داری ۵ درصد انجام شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی ضریب اصطکاک

ضرایب اصطکاک مغز و دانه‌های کامل بادام بر روی سطوح تخته سه‌لا، شیشه، ورق آهن گالوانیزه و ورق آهن سیاه به صورت تابعی از رطوبت برآزش شدند. با توجه به شکل ۱ ضریب اصطکاک ارقام بادام درختی مورد بررسی بر روی تخته سه‌لا اختلاف معنی دار ($p < 0.05$) داشته‌اند.

مغز بادام درختی پوست سنگی با محدوده تغییرات (۰/۶۴۶۳۳-۰/۶۸۲۷۳۳) و دانه کامل بادام درختی پوست سنگی با محدوده تغییرات (۰/۵۳۹۲۳۳-۰/۶۲۰۲۶۷) به ترتیب بیشترین مقدار و کمترین مقدار ضریب اصطکاک بر روی تخته سه‌لا را دارا بودند.

این ضرایب از نتایج تحقیقات رضوی و همکاران که ضریب اصطکاک بر روی چنین سطح ساختاری را برای پسته‌ی کله قوچی، پسته‌ی بادامی، پسته‌ی اکبری و پسته‌ی ممتاز بررسی کرده بودند کم تر و نیز با نتایج تحقیقات کاشانی نژاد و همکاران بر روی پسته‌ی رقم اوحدی و تحقیقات کالیسیر بر روی دانه‌ی آلوی وحشی، دورسان بر روی دانه‌ی کبر و بارت بر روی کاکائو نوع B نزدیک هستند (۴، ۶، ۱۰، ۱۹ و ۲۷) که با توجه به متفاوت بودن ارقام و سطوح رطوبت دانه‌ها امری طبیعی است. احتمالاً سطح

شده و برای تنظیم به سایر سطوح رطوبتی از روش مذکور استفاده گردید که در آن Q حجم آب اضافه شده به گرم، W حجم اولیه دانه به گرم M_i ، M_f به ترتیب رطوبت اولیه و رطوبت ثانویه‌ی دانه مورد مطالعه می‌باشند.

$$Q = \frac{W(M_f - M_i)}{100 - M_f} \quad (1)$$

کلیه‌ی خواص فیزیکی بادام در سطوح رطوبتی از ۴/۸۹، ۱۰/۰۸، ۲۰/۷۴ و ۲۶/۸۹ درصد برای بادام سنگی و ۴/۵۷، ۱۰/۵۸، ۱۹/۰۳ و ۲۶/۱۷ درصد برای بادام پوست کاغذی با سه تکرار در هر سطح انجام شد.

۲-۳- ویژگی‌های اصطکاک

ضریب اصطکاک بادام و مغز آن در چهار سطح رطوبتی برای چهار سطح اصطکاک تخته سه‌لا، شیشه، ورق آهن گالوانیزه و ورق آهن سیاه اندازه‌گیری شد. ضریب اصطکاک از طریق پر کردن یک استوانه‌ی تو خالی پلاستیکی با ضخامت کم از جنس پلی‌وینیل کلراید (قطر ۱۰۰ و ارتفاع ۵۰ میلی‌متر) با نمونه و قرار دادن آن روی سطح اصطکاک مورد نظر به دست آمد. در ابتدا استوانه تا حد کمی (تقریباً ۳ میلی‌متر) از روی سطح مورد نظر بلند شد تا از هرگونه تماس بین استوانه و سطح اجتناب گردد. دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک دارای سطحی مفصل داراست. با بلند شدن تدریجی سطح بر روی مفصل، اولین زاویه α که نمونه‌ی روی سطح شروع به لغزش کرد، به عنوان زاویه‌ی اصطکاک استاتیکی بین نمونه و سطح اصطکاک مورد استفاده ثبت گردید. برای اندازه‌گیری زاویه‌ی اصطکاک استاتیکی (α) از معادله‌ی ۲ استفاده گردید (۲۱، ۲۳، ۲۷).

$$\mu_s = \tan \alpha \quad (2)$$


۲-۴- زاویه ریزش

اندازه‌گیری ریزش با استفاده از یک صفحه‌ی دایره‌ای شکل چوبی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر انجام شد (۲۷). بدین ترتیب که ماده‌ی غذایی مورد نظر از ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متری، روی صفحه ریخته شده و ارتفاع کوبه تشکیل شده اندازه‌گیری گردید.

احتمالاً به دلیل زبری سطوح مورد مطالعه بوده که در مورد ورق آهن گالوانیزه صاف بودن و صیقلی بودن سطح آن حداقل میزان اصطکاک و برای تخته سه لا زبری آن بیشترین مقدار اصطکاک را به دنبال داشته است.

معادلات برگشتی و ضریب همبستگی که از طریق تکمیل داده های آزمایشگاهی ضریب اصطکاک به دست آمده به عنوان تابعی از رطوبت در جدول ۱، نشان داده شده است.

با توجه به این داده ها می توان دریافت که ارتباط ضریب اصطکاک دانه‌ی بادام با مقدار رطوبت برای کلیه‌ی سطوح اصطکاکی و گونه های آن تا حد زیادی خطی بوده است. این رویه خطی بر طبق مقاله های گزارش شده مشابه با تحقیقات کاشانی نژاد بر روی مغز پسته، سینگ برای دانه های زیره، گوپتا برای دانه‌ی آفتابگردان، اوگت برای لوبیا سفید، ویس وانتن برای دانه‌ی قهوه می باشد و برعکس ارتباط غیر خطی طبق نتایج تحقیقات کونکا برای نخود ریز و آیدین برای دانه‌ی فندق بوده است (۴، ۸، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۹).



شکل ۱- ضریب اصطکاک دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی (○) و پوست کاغذی (■) و نیز مغز بادام درختی پوست سنگی (○) و پوست کاغذی (▲) بر روی تخته سه لا در سطوح رطوبتی متفاوت

صاف تر بادام درختی پوست سنگی باعث ایجاد مقادیر پایین تر ضریب اصطکاک بر روی سطح تخته سه لا شده است.


با توجه به شکل شماره ۲، ارقام بادام درختی مورد مطالعه بر روی شیشه، اختلاف معنی دار ($p < 0.05$) نداشتند. مغز رقم بادام درختی پوست کاغذی با محدوده‌ی تغییرات (۰/۴۵۰۶۵-۰/۵۲۰۵۶۷) و دانه‌ی کامل رقم بادام درختی پوست سنگی با محدوده‌ی تغییرات (۰/۴۱۲۱-۰/۳۰۵) به ترتیب بیشترین مقدار و کمترین مقدار ضریب اصطکاک بر روی شیشه را دارا بودند. ضرایب به دست آمده با توجه به سطح ساختاری شیشه از نتایج رضوی که بر روی پسته‌ی بادامی، اوحدی، ممتاز و اکبری کار کرده بود و نیز نتایج تحقیقات اوجی بر روی دانه‌ی لوبیا بیش تر بوده و نزدیک به نتایج به دست آمده توسط امین بر روی عدس و اوموای بر روی دانه‌ی افاقا بوده است (۲، ۲۴، ۲۵، ۲۷).

به نظر می رسد سطح صاف تر و صیقلی تر و جذب رطوبت کم تر توسط بادام درختی پوست سنگی علت کم تر شدن ضریب اصطکاک آن بر روی شیشه باشد.


با توجه به شکل شماره ۳، ارقام بادام درختی مورد مطالعه، اختلاف معنی داری باهم ($p < 0.05$) نداشتند. مغز رقم بادام درختی پوست کاغذی با محدوده‌ی تغییرات (۰/۳۴۴۳۲-۰/۵۸۷۷) و دانه‌ی کامل رقم بادام درختی پوست سنگی با محدوده‌ی تغییرات (۰/۲۸۶-۰/۴۳۶۷) به ترتیب بیشترین مقدار و کمترین مقدار ضریب اصطکاک بر روی ورق گالوانیزه را دارا بودند. این مقادیر از نتایج تحقیقات جین روی ارزن صدفی، فراسر بر روی دانه‌ی باقلا کم تر بوده و به نتایج رضوی بر روی پسته‌ی کله قوچی، اوحدی، اکبری و بادامی نزدیک می باشد (۱۳، ۱۵، ۲۷).

با توجه به شکل شماره ۴، ارقام بادام درختی مورد مطالعه، اختلاف معنی داری باهم ($p < 0.05$) نداشتند. مغز رقم بادام درختی پوست کاغذی با محدوده‌ی تغییرات (۰/۴۵۳۸۹-۰/۶۳۱۷) و مغز رقم بادام درختی پوست سنگی با محدوده‌ی تغییرات (۰/۴۴۵۲-۰/۵۲۴۳) به ترتیب، بیشترین مقدار و کمترین مقدار ضریب اصطکاک بر روی ورق سیاه را دارا بودند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشاهده می شود که ضریب اصطکاک برای همه وارپته های بادام مورد مطالعه بر روی هر چهار نوع سطح ساختاری با افزایش سطح رطوبت، افزایش می یابد. بیشترین ضریب اصطکاک برای تخته سه لا و به دنبال آن برای ورق آهن سیاه، شیشه و ورق آهن گالوانیزه بوده است. این روند،




شکل ۲- ضریب اصطکاک دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی (◇) و پوست کاغذی (■) و نیز مغز بادام درختی پوست سنگی (○) و پوست کاغذی (▲) بر روی شیشه در سطوح رطوبتی متفاوت



شکل ۳- ضریب اصطکاک دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی (◇) و پوست کاغذی (■) و نیز مغز بادام درختی پوست سنگی (○) و پوست کاغذی (▲) بر روی ورق گالوانیزه در سطوح رطوبتی متفاوت

جدول ۱- معادلات رگرسیونی ضرایب اصطکاک و رطوبت به همراه ضرایب همبستگی مربوطه

مغز			دانه			سطح	نوع بادام
R^2	معادله	(% w.b.)	R^2	معادله	(% w.b.)		
۰.۹۷۸۲	$= 0.0015X + 0.6416 \mu S$	۴/۲۶-۲۶/۶۸	۰.۹۴۱۷	$= 0.0033X + 0.5333 \mu S$	-۲۶/۸۹ ۴/۸۹	تخته سه لا	پوست سنگی
۰.۹۹۰۶	$= 0.0054X + 0.3043 \mu S$		۰.۹۲۹۸	$= 0.0045X + 0.2985 \mu S$		شیشه	
۰.۹۳۲۵	$= 0.0054X + 0.3256 \mu S$		۰.۹۹۰۶	$= 0.0064X + 0.2648 \mu S$		ورق	
۰.۹۵۸۸	$= 0.0044X + 0.4287 \mu S$		۰.۹۸۱۳	$= 0.0051X + 0.3722 \mu S$		گالوانیزه	
۰.۹۸۲۱	$= 0.0022X + 0.6141 \mu S$	۴/۱۷-۲۶/۳۷	۰.۹۸۳۲	$= 0.0037X + 0.5609 \mu S$	-۲۶/۱۷ ۴/۵۷	ورق سیاه	پوست کاغذی
۰.۹۴۳۲	$= 0.0051X + 0.4414 \mu S$		۰.۹۷۵۴	$= 0.0046X + 0.4279 \mu S$		شیشه	
۰.۹۸۲۶	$= 0.0101X + 0.3113 \mu S$		۰.۹۹۶۹	$= 0.0064X + 0.3395 \mu S$		ورق	
۰.۹۸۱۵	$= 0.0075X + 0.4317 \mu S$		۰.۹۹۱۶	$= 0.0085X + 0.3722 \mu S$		گالوانیزه	
						ورق سیاه	



شکل ۴- ضریب اصطکاک دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی (◊) و پوست کاغذی (■) و نیز مغز بادام درختی پوست سنگی (○) و پوست کاغذی (▲) بر روی ورق سیاه در سطوح رطوبتی متفاوت

پوست کاغذی و کم‌ترین مقدار (۰/۹۲۹۸) مربوط به دانه‌ی کامل واریته‌ی بادام درختی پوست سنگی بود. در هر صورت، بالا بودن ضریب همبستگی در تمام نمونه‌ها دلالت بر دقت بالای مدل‌های برازش شده دارد.

همان‌طور که در شکل ۶، مشاهده می‌شود با افزایش سطح رطوبت زاویه‌ی ریپوزپری در مغز بادام درختی سنگی و مغز بادام درختی پوست کاغذی به ترتیب از $57/99^\circ$ به $60/58^\circ$ و از $43/41^\circ$ به $52/55^\circ$ تغییر کرد. مقادیر گزارش شده برای مغز نخل هندی به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از مغز بادام درختی می‌باشد که احتمالاً به دلیل کرویت بالای نخل هندی در مقابل بادام درختی است (۱۶).

میزان ریپوزپری برای مغز بادام درختی پوست کاغذی، بیش‌تر از بادام درختی پوست سنگی بوده است. اگرچه بر خلاف دانه‌ی کامل دو نمونه‌ی بادام، مغز آن‌ها ظاهری شبیه به هم دارد، ولی مغز بادام پوست سنگی چروکیدگی کم‌تری نسبت به نمونه‌ی دیگر داشت. احتمالاً تفاوت در نوع سطح و میزان چروکیدگی که قطعاً بر ضریب اصطکاک داخلی بین دانه‌ها با هم تأثیر گذار است علت اصلی اختلاف در زاویه‌ی ریپوزپری آن‌ها می‌باشد.

در مغزها نیز مانند دانه‌های کامل رابطه‌ی بین افزایش زاویه‌ی ریپوزپری و افزایش رطوبت (درصد) مثبت بوده است. البته شیب خطوط در معادلات مربوط به مغزها به طور محسوسی کم‌تر از دانه‌های کامل می‌باشد (جدول ۲).

بزرگ‌ترین مقدار زاویه‌ی ریپوزپری به ترتیب برای مغز بادام درختی پوست سنگی، دانه‌ی کامل بادام درختی پوست کاغذی، مغز بادام درختی پوست کاغذی و کم‌ترین مقدار آن برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی به دست آمده است. تأثیر رطوبت بر زاویه‌ی ریپوزپری نشان داد که با افزایش مقدار رطوبت دانه‌ها و مغز بادام، زاویه‌ی ریپوزپری افزایش یافت.

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله، ویژگی‌های اصطکاک‌ی دانه و مغز دو نوع بادام از جمله ضریب اصطکاک و زاویه‌ی ریپوزپری به عنوان توابعی از رطوبت مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ویژگی‌ها برای طراحی تجهیزات، پوست‌کنند، جداسازی، بسته‌بندی، خشک‌کردن و ذخیره دانه‌های بادام ضروری هستند.


۳-۲- ریپوزپری

زاویه ریپوزپری برای دانه‌های کامل و مغز بادام درختی پوست سنگی و پوست کاغذی به صورت تابعی از رطوبت در شکل‌های ۵ و ۶ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزایش رطوبت زاویه‌ی ریپوزپری برای دانه‌ی کامل بادام پوست سنگی و دانه‌ی کامل بادام پوست کاغذی به ترتیب از 45° به $52/52^\circ$ و از $45/19^\circ$ به $53/13^\circ$ تغییر کرد. مقادیر گزارش شده برای دانه‌های پسته‌ی کله قوچی، اوحدی، ممتاز و اکبری همگی کوچک‌تر از دانه‌های بادام درختی می‌باشد (۲۷). احتمالاً این امر به دلیل تفاوت در ترکیب شیمیایی، نوع سطح این مواد، نیز تفاوت جزیی در محتوای رطوبت و شکل ظاهری آن‌ها می‌باشد. میزان ریپوزپری برای دانه‌ی بادام درختی پوست سنگی، بیش‌تر از بادام درختی پوست کاغذی برآورد شد. احتمالاً علت آن کرویت بیش‌تر و سطح صاف‌تر و سیقلی‌تر دانه‌ی بادام پوست سنگی نسبت به بادام درختی پوست کاغذی باشد. این حالت به آن‌ها این امکان را می‌دهد که راحت‌تر روی هم بلغزند. رابطه‌ی بین افزایش زاویه‌ی ریپوزپری و افزایش رطوبت در این آزمایش خطی، مثبت بوده است. رابطه‌ی خطی نشان می‌دهد با افزایش میزان رطوبت، زاویه‌ی ریپوزپری افزایش یافته و امکان انباشته‌سازی حجم بیش‌تری از محصول در واحد سطح افزایش می‌یابد.


با توجه به جدول ۱، ضریب همبستگی (R^2) برای ارتباط بین رطوبت و ضریب اصطکاک در تمامی سطوح ساختاری، مورد بررسی بین (۰/۹۲۹۸-۰/۹۹۶۹) حاصل شد که بالاترین مقدار (۰/۹۹۶۹) مربوط به دانه‌ی کامل واریته‌ی بادام درختی

مغز دانه روی سطوح مختلف آزمایش مورد مطالعه فرق می‌کند ولی روند مشابه در تمام حالات دیده می‌شود.

نتایج ارزیابی ضرایب اصطکاک و زاویه‌ی ریپوزری به صورت تابعی از رطوبت برای دو وارسته‌ی پوست کاغذی محب اصفهان و پوست سنگی خراسان جنوبی نشان داد که نوع وارسته، پوسته و رطوبت می‌تواند بر صفات مذکور تاثیر گذار باشد. این رابطه در تمام موارد به صورت خطی بوده است و در اغلب آزمایش‌ها با افزایش رطوبت ضرایب اصطکاک افزایش یافتند. اگرچه شیب منحنی در وارسته‌های مختلف و نیز در دانه‌ی کامل و



شکل ۵- زاویه‌ی ریپوزری برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی (△) و پوست کاغذی (□) در سطوح رطوبتی متفاوت.



شکل ۶- زاویه‌ی ریزش پری برای مغز بادام درختی پوست سنگی (Δ) و پوست کاغذی (\square) در سطوح رطوبتی متفاوت.

جدول ۲- معادلات رگرسیونی و ضریب همبستگی برای ریزش پری

مغز		دانه		نوع بادام	
R^2	معادله	(% w.b.)	R^2	معادله	(% w.b.)
۰.۹۶۲۹	$= 0.115mc + 57.307 \theta f$	۴/۲۶-۲۶/۶۸	۰.۹۹۰۵	$= 0.3178mc + 43.886 \theta f$	۴/۸۹-۲۶/۸۹
۰.۹۷۴۶	$= 0.4099mc + 42.179 \theta f$	۴/۱۷-۲۶/۳۷	۰.۹۹۵۳	$= 0.3433mc + 43.99 \theta f$	۴/۵۷-۲۶/۱۷

مالی و همچنین مرکز رشد واحد های فن آوری طبرستان وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و موسسه‌ی آموزش عالی تعجن که محیط های آزمایشگاهی خود را با تمام امکانات در اختیار این تحقیق قرار دادند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.

۶- منابع

- ۱- درویشان، م. ۱۳۷۹. بادام، کشت و تولید، انتشارات فنی ایران.
- 2- Amin, M. N., Hossain, M. A., and Roy, K. C. 2004. Effects of moisture content on some physical properties of lentil seeds. *Journal of Food*

نتایج حاضر می‌تواند در محاسبات مختلف از جمله طراحی تجهیزات فرآوری به کار رود.

۵- سپاس‌گزاری

پژوهش حاضر از طرح پژوهشی شماره‌ی ۸۸۸۴۴ با عنوان «بررسی خواص ثقلی، هندسی و آترودینامیکی دو واریته‌ی بادام درختی ایرانی (پوست سنگی و کاغذی)» باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی استخراج شده است. نگارندگان بر خود لازم می‌دانند که از باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی به دلیل حمایت های

- and its Kernel Mass Based on Geometric Properties (*Shahrud 12 and Mama'e Varieties*). *Journal of American Science*, 6 (11), 59-64.
- 21- Mohsenin, N. N. 1978. Physical properties of plant and animal materials.
- 22- Moradi H. 2002. Evaluating quantitative and qualitative traits of almond cultivars (*phase 2, Imamiye Almond Garden*). Study report of research plan. Agricultural research center of Chahar Mahal and Bakhtiari. P12.
- 23- Motamedzadegan, A., Milani, J. 2010. Moisture Dependent Physical Properties of Grape Seeds. 10.2202/1556-3758.1822.
- 24- Oje, K., and Ugbor, E. C. 1991. Some physical properties of oil bean seed. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 50, 305-313.
- 25- Olajide, J. O., and Ade-Omowaye, B. I. O. 1999. Some physical properties of Locust bean seed. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 74, 213-215.
- 26- Ozguven, F., and Kubilay, V. 2004. Some physical, mechanical and aerodynamic properties of pine (*Pinus pinea*) nuts. *Journal of Food Engineering*, 68, 191-196.
- 27- Razavi, S. M. A., Mohamad Amini, A., Rafe, A., Emadzadeh, B. 2007. The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part III: Frictional properties. *Journal of Food Engineering*, 81, 226-235.
- 28- Sacilink, K., Ozturk, R. and Kesikin R. 2003. Some physical properties of hemp seeds. *Biosystems Engineering*. 86, 191-198.
- 29- Singh, K. K., and Goswami, T. K. 1996. Physical properties of Cumin seed. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 64, 93-98.
- 30- Suthar, S. H., and Das, S. K. 1996. Some physical properties of karingda (*Citrullus lanatus* (Thumb) Mansf) seeds. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 65(1), 15-22.
- 31- Turkan A. Polat R. Atay U. 2007. Comparison of Mechanical Properties of Some Selected Almond Cultivars with Hard and Soft Shell under Compression Lading. *Journal of Food Engineering*. 30, 773-789.
- Engineering*, 65, 83-87.
- 3- Aydin, C. 2003. Physical properties of Almond nut and kernel. *Journal of Food Engineering*, 60, 315-320.
- 4- Aydin, C. 2002. Physical properties of Hazel nuts. *Biosystems Engineering*, 82(3), 297-303.
- 5- Bart-Plange, A., and Baryeh, E. A. 2003. The physical properties of Category B cocoa beans. *Journal of Food Engineering*, 60, 219-227.
- 6- Calisir, S., Hacisferogullari, H., Ozcan, M., & Arslan, D. 2004. Some nutritional and technological properties of wild plum (*Prunus* spp.) fruits in Turkey. *Journal of Food Engineering*, 66, 233-237.
- 7- Carman, K. 1996. Some physical properties of lentil seeds. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 63, 87-92.
- 8- Chandrasekar, V., and Viswanathan, R. 1999. Physical and thermal properties of Coffee. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 73, 227-234.
- 9- Dehspande, S. D., BAL, S., and Ojha, T. P. 1993. Physical properties of soybean. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 56, 89-98.
- 10- Dursun, E., and Durson, I. 2005. Some physical properties of Caper seed. *Biosystems Engineering*, 92(2), 237-245.
- 11-FAO, 2007. FAOSTAT database. <http://faostat.fao.org/faostat/>(accessed: feb., 2010).
- 12- FAO, Faostate Agriculture Data, Available at: <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>, 2009.
- 13- Fraser, B. M., Verma, S. S., & Muir, W. E. 1978. Some physical properties of fababeans. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 23(1), 53-57.
- 14- Gupta, R. K., and Das, S. K. 1997. Physical properties of Sunflower seeds. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 66, 1-8.
- 15- Jain, R. K., and BAL, S. 1997. Physical properties of Pearl millet. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 66, 85-91.
- 16- Kalimullah, S., and Gunasekar, J. J. 2002. Moisture-dependent physical properties of Arecanut kernels. *Biosystems Engineering*., 82(3), 331-338.
- 17- Kalyoncu, I. H. 1990. A selection study on determining important characteristics of almond trees in Turkey, Master thesis, University of Ondokuz Mays, Samsun, Turkey.
- 18- Konak, M., Carman, K., and Aydin, C. 2002. Physical properties of Chick pea seeds. *Biosystems Engineering*, 82(1), 73-78.
- 19- Kashaninejad, M., Mortazavi, A., Safekordi, A., and Tabil, L. G. 2005. Some physical properties of Pistachio (*Pistachia vera* L.) nuts and its kernel. *Journal of Food Engineering*, 72, 30-38.
- 20- Mohamadi, A. Ghazavi, M.A. Hosseinzadeh, B. 2010. Determining Regression Models of Almond