

محاسبه اولتراسونوگرافیکی کوتاهی نسبی قلب در سگ

غلامرضا اسدنساب^۱، غفور موسوی^۱، امید بلورانی^۲

چکیده

اولتراسونوگرافی قلب به عنوان یکی از روش‌های تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی مطرح است. یکی از موارد استفاده از اکوکاردیوگرافی، محاسبه کوتاهی نسبی قلب است که در دامپزشکی نیز کاربرد دارد و الگوی استانداردی برای تخمین آن وجود دارد. مطالعه حاضر نیز یکی از کاربردهای مهم اکوکاردیوگرافی و شاخص کوتاهی نسبی رادر سگ نشان می‌دهد. در این مطالعه شش قلاده سگ نژاد مخلوط تحت عملیات استاندارد اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند و کوتاهی نسبی قلب آنها در نمای کوتاه و طولی در هر دو حالت پایان دیاستول و پایان سیستول با استفاده از فرمول خاص محاسبه گشت که در این مطالعه بین میانگین کوتاهی نسبی قلب در نماهای کوتاه و طولی در حالت‌های پایان دیاستول و پایان سیستول اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان سیستول و پایان دیاستول در هر دونمای کوتاه و طولی اندازه گیری شد که اختلاف معنی داری بین میانگین آنها مشاهده نگردید.

واژگان کلیدی: کوتاهی نسبی، اولتراسونوگرافی، سگ

اکوکاردیوگرافی می‌گویند که کاربرد آن از اوخر سال ۱۹۶۰ میلادی به صورت اکوکاردیوگرافی یک و دو بعدی در پزشکی و در دامپزشکی از اوخر ۱۹۷۰ میلادی شروع شد. (۱۰ و ۵) و در سالهای بعد کاربرد آن به سرعت گسترش پیدا کرد و با پدید آمدن دستگاه‌های مدرن قدم بزرگی در پیشرفت این تکنیک برداشته شد (۵). اولتراسونوگرافی قلب به عنوان یکی از مسائل تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی مطرح است (۱، ۵، ۷ و ۱۴). و از سونوگرافی جهت درک عملکرد سیستم قلبی عروقی و تشخیص بیماری‌های آن استفاده به عمل می‌آید (۲، ۳، ۱۶ و ۸). از سیستم‌های اکوکاردیوگرافی در تشخیص ساختار قلب و بیماری‌های آن در انسان

مقدمه

سونوگرافی به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی دقیق و مطلوب در تصویربرداری تشخیصی به حساب می‌آید که کاربردهای بسیاری در پزشکی و دامپزشکی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین روش‌های تصویربرداری، اولتراسونوگرافی قلب است که با استفاده از امواج اولتراسونوگرافی قابل مشاهده و بررسی است (۶، ۷، ۱۰ و ۱۷).

به مطالعه اولتراسونوگرافی قلب اصطلاحاً

۱- استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
۲- دانش آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی
ghassadnassab@yahoo.com *-نوبنده مسئول

البته این درصد تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله جثه و وزن حیوان قرار می‌گیرد و برای سگ اعدادی از ۲۸ تا ۴۵ درصد نیز ذکر شده است.^(۷)

جهت تخمین کوتاهی نسبی از الگوی نمایشی اکوکاردیوگرافی M-mode استفاده می‌کنند. برای محاسبه کوتاهی نسبی قلب قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان سیستول (left ventricular internal dimension at end-systole) (کمترین قطر در حفره بطن چپ) و نیز قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان دیاستول (بیشترین قطر حفره بطن چپ) اندازه گیری می‌شوند. این اندازه‌های بدست آمده در فرمول شناخته شده و معتبر شماره ۱ جاگذاری شده و با استفاده از این فرمول کوتاهی نسبی محاسبه می‌گردد^(۵، ۷، ۱۱ و ۱۶).

فرمول شماره ۱:

$$100 \times \frac{\text{قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان سیستول} - \text{قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان دیاستول}}{\text{قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان دیاستول}} = \text{کوتاهی نسبی}$$

مواد و روش‌کار

شش قلاده سگ نژاد مخلوط متوسط جثه با حدود وزنی حدود ۲۰-۲۵ کیلوگرم انتخاب شدند. بعد از مقید سازی فیزیکی، یک سوم میانی و تحتانی سطح جانبی سینه مابین فضای بین دندنه‌ای سوم تا هفتم سمت راست و چپ بدن حیوانات مورد مطالعه تراشیده شده و سپس با شستن نواحی مزبور ناحیه فوق تمیز گردید. از مقید کننده‌های شیمیایی به علت اثر گذاری روی شاخص‌های قلبی استفاده به عمل نیامد.

حیوان تحت مطالعه به سمت راست بر روی میز مخصوص سوراخ دار موجود در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز حالت گماری داده شدند. سپس با تنظیم و آماده سازی محل کار با دستگاه اولتراسونوگرافی پایی مدلیکال (Pie Medical) آکویلا (Aquila) ساخت کشور هلند عملیات B-mode (مد روشنایی) در فضای بین دندنه‌ای سوم تا هفتم سمت راست بدن انجام گردید. تصاویر لازم ضبط

استفاده می‌شود (۲، ۹، ۱۲ و ۱۸). در دامپزشکی نیز از تکنیک‌های اکوکاردیوگرافی در این زمینه استفاده می‌شود (۵، ۶، ۱۰ و ۱۳)، یکی از موارد استفاده از اکوکاردیوگرافی، محاسبه کوتاهی نسبی قلب است که در دامپزشکی نیز کاربرد دارد و الگوی استانداردی برای تخمین آن وجود دارد (۵، ۱۰ و ۱۴).

امروزه از این تکنیک جهت ارزیابی آناتومیکی و عملکردی سیستم قلبی عروقی استفاده می‌کنند (۱، ۴ و ۵). اکوکاردیوگرافی بعنوان یک تکنیک غیر تهاجمی در ارزیابی عملکرد کمی، کیفی قلب، انقلابی در علم کاردیولوژی بوجود آورده است که جانشین تکنیک‌های تشخیصی تهاجمی همانند کاتتریزاسیون قلبی و آنژیوکاردیوگرافی در تشخیص بیماری‌های مادرزادی و اکتسابی قلب شده است. در اولتراسونوگرافی قلب حفرات خون دار همانند بطن‌ها به صورت یک ناحیه هیپوکوئیک (کم اکو و تیره) دیده می‌شوند که اکثرًا توسط نواحی معلوم هیپرکوئیک (اکودار و روشن‌تر) احاطه شده‌اند مثلاً در مورد بطن‌ها که توسط دیواره‌ای هیپرکوئیک از همدیگر جدا شده‌اند.^(۵)

در تصویربرداری دو بعدی، دو سطح مطرح است یکی سطح محور طولی (Long Axis) می‌باشد که این سطح موازی محور طولی قلب که سطح پشتی-شکمی بدن را دربرمی‌گیرد را شامل می‌گردد و دیگری سطح محور کوتاه (Short Axis) است که عمود بر محور طولی قلب و یا عمود بر سطح پشتی-شکمی بدن فرار می‌گیرد. یکی از مشخصه‌های مهم و کاربردی در عملکرد قلب کوتاهی نسبی است که از روش‌های اولتراسونوگرافی است می‌توان به استفاده از روش‌های اولتراسونوگرافی است که در سگ نیز قابل محاسبه می‌باشد (۱، ۶ و ۷). اعدادی از این کوتاهی نسبی را در حالات سالم و در اوزان مختلف و حتی در برخی موارد بدون ذکر نژاد خاص، سن و جنس مطرح نموده اند و در سگ کسر کوتاهی نسبی بالای ۳۰ درصد را طبیعی به حساب می‌آورند.^(۱)

تهیه گردیدند. در نهایت اندازه‌گیری‌های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۱۱/۵ مورد آنالیز آماری با آزمون T-test قرار گرفتند.

نتایج

داده‌های بدست آمده در نواحی مورد مطالعه اکوکاردیوگرام M-mode به شرح ذیل در حیوانات مورد مطالعه در جدول های شماره ۱ و ۲ نمایش داده می‌شود.

جدول شماره ۱ - نتایج به دست آمده از اکوکاردیوگرافی - M-mode
قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت دیاستول در نماهای کوتاه و طولی بر حسب سانتی متر

قطر حفره داخلی بطن چپ در نمای طولی	قطر حفره داخلی بطن چپ در نما کوتاه	شماره حیوان
۳/۹	۳/۷	۱
۳/۵	۳/۵	۲
۳/۷	۳/۸	۳
۴/۰	۴/۰	۴
۳/۹	۳/۸	۵
۳/۸	۳/۹	۶

جدول شماره ۲ - نتایج به دست آمده از اکوکاردیوگرافی - M-mode
قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت دیاستول در نماهای کوتاه و طولی بر حسب میلی متر

قطر حفره داخلی بطن چپ در نمای طولی	قطر حفره داخلی بطن چپ در نما کوتاه	شماره حیوان
۲/۴	۲/۴	۱
۲/۴	۲/۳	۲
۲/۵	۲/۵	۳
۲/۸	۲/۷	۴
۲/۵	۲/۵	۵
۲/۷	۲/۶	۶

در این مطالعه میانگین قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت دیاستول در نما کوتاه $۰/۱۷ \pm ۰/۷۸$ سانتی

گردیدند و برخی از آنها نیز با چاپگر چاپ شدند. در نمای استاندارد مناسب سمت راست محور کوتاه و طولی (از نماهای مطرح در عملیات اکوکاردیوگرافی) با کسب تصاویر مناسب با بکار گیری مکان نمای مدد حركت (M-mode)، این الگوی نمایشی را در محل انتخابی تنظیم نمودیم و با استفاده از ثابت نمودن تصاویر مناسب، اندازه گیری های لازم با استفاده از ابزار های اندازه گیری انجام گرفت.

پراب ۵-۷/۵ MHz Curved array را در محل رهیافت های اکوکاردیوگرافی قلب با ژل سونوگرافی تماس داده و با حرکات لغزشی آن نمای کلی از قلب و نواحی مورد مطالعه را با سیستم بی درنگ شناسایی نمودیم.

زمانی که نمای محور طولی یا کوتاه در تصویر ظاهر می شد با حرکات چرخشی پراب، امکان تبدیل مناظر محور طولی به کوتاه و یا بالعکس فراهم و برش های طولی و عرضی نواحی مورد نظر در نمایشگر نمایش داده می شد.

در موقعیت مناسب سیستم M-mode دستگاه را فعال نموده یعنی زمانی که نمای استاندارد دیده می شد دکمه M-mode توأم با B-mode را فشار داده تا دو تصویر درکنار هم دیگر ایجاد گردد. شاخص M-mode بایستی حتماً در موقعیت مناسب قرار می یافتد تا اندازه گیری ها صحیح باشند.

در این مطالعه قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان دیاستول (کمترین قطر در حفره بطن چپ) و نیز قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان دیاستول (بیشترین قطر حفره بطن چپ) اندازه گیری شدند.


اندازه های بدست آمده در فرمول شناخته شده و معتبر شماره ۱ جاگذاری شده و با استفاده از آن کوتاهی نسبی محاسبه می گردید.

Xing player با برنامه عکسبرداری لازم صورت گرفته و با برنامه Scion image نسخه چهار اندازه گیری ها و آنالیز های مربوط به این زمان به دقت

جدول شماره ۳- کوتاهی نسبی در نماهای کوتاه و طولی بر حسب درصد

کوتاهی نسبی محاسبه شده در نماهای طولی	کوتاهی نسبی محاسبه شده در نماهای کوتاه	شماره حیوان
۳۸/۴۶	۳۵/۱۳	۱
۳۱/۴۲	۳۴/۲۸	۲
۳۲/۴۳	۳۴/۲۱	۳
۳۰	۳۲/۵	۴
۳۵/۸۹	۳۴/۲۱	۵
۲۸/۹۵	۳۳/۳۳	۶

میانگین کوتاهی نسبی قلب سگ ها در نمای کوتاه $۳۳/۹۴ \pm ۰/۹$ درصد و در نمای طولی $\pm ۳/۶۴$ $۳۲/۸۵$ درصد محاسبه شدند. نمودار شماره ۳، مقایسه کوتاهی نسبی را در حالات مختلف نشان می دهد.




بحث
اولتراسونوگرافی قلب به عنوان یکی از روش های مهم تصویر برداری تشخیصی جهت بررسی عملکرد سیستم قلبی عروقی و تشخیص بیماری های آن در دامپزشکی مطرح است(۱، ۳، ۱۶). و مطالعه حاضر یکی از کاربردهای مهم اکوکاردیوگرافی و شاخص کوتاهی نسبی رادر سگ نشان می دهد.

متر و در نمای طولی $۰/۱۷ \pm ۰/۸۰$ سانتی متر بدست آمد. میانگین قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت سیستول در نمای کوتاه $۰/۱۴ \pm ۰/۰۵$ سانتی متر و میانگین قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت سیستول در نمای طولی $۰/۱۶ \pm ۰/۰۵$ سانتی متر اندازه گیری شد. توزیع اطلاعات داده های استحصالی با نمایشگر خط میانگین برای هر کدام از حیوانات مورد مطالعه در وضعیت های پایان دیاستولی و پایان سیستولی در نماهای کوتاه و طولی در نمودار های شماره ۱ و ۲ نشان داده می شوند.



نمودار شماره ۱ - توزیع اطلاعات مربوط به قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت پایان دیاستولی در نماهای کوتاه و طولی با نمایشگر خط میانگین برای هر کدام از آنها



نمودار شماره ۲ - توزیع اطلاعات مربوط به قطر حفره داخلی بطن چپ در حالت پایان سیستولی در نماهای کوتاه و طولی با نمایشگر خط میانگین برای هر کدام از آنها

کوتاهی نسبی با توجه به داده های بدست آمده محاسبه شده و در جدول شماره ۳ نشان داده می شود.

وجود داشته باشد. به علت وجود همبستگی بین اندازه‌های قلبی با وزن در سگ بایستی سعی گردد که سگ‌های تقریباً هم وزن جهت مطالعه انتخاب گردند.^(۱)

در نمای محور کوتاه سمت راست، حفرات قلب درروش دو بعدی به صورت گرد مشخص می‌گردد که با آنچه دیگر محققان گزارش نموده‌اند همخوانی دارد.^(۱۴، ۵، ۳)

میانگین کوتاهی نسبی قلب سگ‌ها در نمای کوتاه $32/85 \pm 3/64$ درصد و در نمای طولی $32/94 \pm 0/9$ درصد بود که اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نگردید($p > 0/05$). نکته اخیر بیانگر کاربردی بودن هر دو نما در تخمین کوتاهی نسبی در سگ می‌باشد.

با توجه به داده‌ها و نمودارهای ترسیم شده به نظر می‌آید که می‌توان از هر دو نما برای محاسبه کوتاهی نسبی استفاده نمود. البته به علیه مثل دسترسی به شکل دقیق و مناسب حفرات قلب در نمای کوتاه بیشتر کاربران توصیه به انجام این محاسبه در این نما دارند همچنین یافته‌های حاصله از این مطالعه نیز با گزارشات سایر محققین که انجام عملیات اکوکاردیوگرافی را برای محاسبه کوتاهی نسبی در نمای کوتاه توصیه نموده‌اند همخوانی دارد ($5, 6, 11$).^(۱)

اندازه کوتاهی نسبی اطلاعاتی را در زمینه عملکرد قلب می‌دهد در دامپزشکی نیز از این مشخصه استفاده به عمل می‌آید ($1, 8, 13, 14$) که تغییرات موجود در آن می‌تواند در تشخیص برخی از انواعی آریتمی‌ها مفید واقع گردد.

اعداد محاسبه شده طبیعی کوتاهی نسبی در این مطالعه با آنچه در منابع موجود ذکر شده و کوتاهی نسبی را بالای 30 درصد گزارش نموده‌اند همخوانی دارد ($1, 7$). البته تنها در یک مورد از مطالعه اخیر در نمای طولی با توجه به وزن حیوان، این رقم کمتر از 30 درصد، محاسبه شده که این امر می‌تواند مربوط به نواقص مطرح شده در نمای طولی باشد. در نهایت با

در این بررسی امکان اخذ تصاویر M-mode, B-mode از تمامی سگ‌ها از طرف سمت راست با تغییر مختصر زاویه و چرخش ترانسدیوسر به روش‌های متداول اکوکاردیوگرافی امکان پذیر بود. همچنین قرارگیری پراب در حالت خوابیده در فضای مایین جناغ و اتصالات غضروفی-دنده‌ای بهترین امکان را برای ارزیابی حفرات قلبی فراهم می‌سازد که علت آن می‌تواند نزدیکی و تماس بیشتر قلب با قفسه صدری باشد که این یافته‌ها با گزارشات سایر محققان همخوانی دارد ($6, 5, 10$).^(۱)

در این مطالعه میانگین قطر حفره داخلی بطن چپ در پایان دیاستول در نمای کوتاه در سگ‌ها $0/17 \pm 0/78$ سانتی متر و در نمای طولی $0/17 \pm 0/80$ سانتی متر بدست آمد که اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نگردید($p > 0/05$) و این عدم اختلاف می‌تواند بیانگر توان اندازه‌گیری این پارامتر در هر دو نمای ذکر شده باشد.

در تمامی سگ‌های مورد مطالعه استفاده از یک ترانسدیوسر MHz Curved array ۵-۷/۵ بررسی اکوکاردیوگرافیکی و امکان اخذ تصاویر، با کیفیت عالی از سمت راست قفسه صدری امکان پذیر بود که با سایر کارهای انجام شده در این زمینه مطابقت دارد ($7, 3, 10$).^(۱)

در بکارگیری روش M-mode بایستی دقت نمود تا حتماً اشعه در نمای دو بعدی هدایت‌کننده، عمود بر دیواره بین بطی قرار گیرد تا تصویری افقی نه بزرگتر نه کوچکتر مشاهده گردد. همچنین در صورت عدم قرار گیری ترانسدیوسر در محل زاویه صحیح خود در هنگام تصویربرداری، احتمال اشتباہ در تصویربرداری وجود خواهد داشت که این یافته‌ها مرتبط با گزارشات مشابه می‌باشد ($6, 11$).^(۱)

بایستی توجه داشت که اختلاف ابعاد اکوکاردیوگرافی در نژادهای مختلف در سگ وجود دارد و ممکن است تغییراتی نیز در میزان کوتاهی نسبی

- 9- Labovits, A.J., Williams, G.A., (1992):Doppler Echocardiography, 3th, Lea and Febiger, Philadelphia, pp: 61-78.
- 10- Lburk, R., Afeency, D., (2003): Small animal Radiology and-ultrasound, 3th, Saunders, pp: 45-55.
- 11- Long,K.J., Bonagura, J.D., Darke, P.G.,(1992):Standardised imaging technique for guided M-mode and Doppler echocardiography in the horse, Equine Vet J.,(24):226-235.
- 12- Lusiani ,L., Ronisvalle ,G., Bonanome, A., Visona' ,A., Castellani ,V., Macchia, C., Pagnan, A., (1986):Echocardiographic evaluation of the dimensions and systolic properties of the left ventricle in freshman athletes during physical training, Eur Heart J.,7(3):196-203.
- 13- Martin ,B.B., Reef,V.B., Parente ,E.J., Sage ,A.D.,(2000): Causes of poor performance of horses during training, racing, or showing: 348 cases (1992-1996), J Am Vet Med Assoc. , (4):554-8.
- 14- Nyland, T., Mattoon, J., (2002): veterinary Diagnostic ultrasound, Saunders Philadelphia, pp: 198-230.
- 15- Otto, C., (1999): Valvular heart Disease, Saunders Philadelphia, pp: 218,229,296,320.
- 16- Perez, J.E., Lany, R., (1997): Echocardiography and Cardiovascular Function, Kluwer academic Publishers, London, pp: 345-352.
- 17- Reef, V.B., (1991): Advance in Echocardiography, vet. Clinics of North America, Equ practice,(4):126-140.
- 18- Sehelbert, H.R., Shorton, D.J., Wolf, G.L.,(1991): Cardiac Imaging A Companion to Braunwald's Heart Disease, W.B. Saunders Company, Philadelphia, pp: 419-442.

توجه به مطالب وارقام بدست آمده پیشنهاد می گردد همانند سایر گزارشات کوتاهی نسبی از نمای کوتاه سمت راست بدست آید.

در سگ مشابه این بررسی در سگ های نژاد مخلوط منطقه گزارش نشده است و این بررسی می تواند به عنوان یک مطالعه در کاربردی نمودن و حتی امور تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد .

منابع

- 1- Cartee, R.B., (2000): an Atlas and Textbook of Diagnostic Ultrasonography of the Dog and Cat, First edition, Manson publishing, pp: 68-112.
- 2- Drobinski ,G, Kin, G, Botreau-Roussel, P, Evans JI, Borel P. Grosgogeat Y, Facquet J., (1977):Echocardiographic study of the left ventricle in aortic insufficiency Comparison with the data of clinical development and hemodynamic results, Arch Mal Coeur Vaiss.,70(7):733-40
- 3- Ettinger, S.J, (1995): Text book of veterinary Internal Medicine, W. B. Saunders.pp:190-220.
- 4- Fox, P.R.,Sisson,D., Moise,N.S., (1999): Text book of Canine and Feline Cardiology, principle and clinical practice, W. B. Saunders Company, London,pp:42-61.
- 5- Gooldar, P.J., (1995): Veterinary ultrasonography, CAB international, pp:1-12,102-150.
- 6- Green, R.W., (1996): Small Animal ultrasonnd, lipincott- Ravin, Philadelphia, pp:1-249 , 320-400.
- 7- Kealy, M.A., Allister,M.C., (2000): Diagnostic radiology and ultrasonography of the Dog and Cat, Mosby year book, Philadelphia, pp:1-17, 211-224.
- 8- Kriz, N.G., Hodgson, D.R., Rose, R.J., (2000): Changes in cardiac dimensions and indices of cardiac function during deconditioning in horses, Am J Vet Res.,61(12):1553-60.