

جداسازی باکتری‌ها از سگ‌های بیمار مبتلا به آنتریت هموراژیک و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی

ابراهیم پورمیربلوک جلالی^۱، محمد داداش بیگی^{*۱}، لیلا اسدپور^۱

چکیده

هدف از این تحقیق جداسازی عوامل مولد آنتریت هموراژیک در سگ‌ها و تعیین مقاومت یا حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک‌های رایج (جنتامایسین، تتراسیکلین، نالیدیکسیک اسید، سفکسیم، سفتریاکسون، پنی سیلین، کلرامفینیکل، کوتربیومکسازول) بود. در این تحقیق از تعداد ۸۰ قلاده سگ در سنین بین شش ماهگی تا دوسالگی مبتلا به آنتریت هموراژیک که آنتی بیوتیک دریافت نکرده بودند نمونه مدفع اخذ شد و روی محیط کشت مختلف جهت تشخیص عوامل باکتریال مولده برده شد، که پس از بررسی باکریولوژیک چهار باکتری اشريشیاکلی و کلستریدیوم و کمپلوباکتر و سالمونلا از نمونه‌ها جدا گردید که از مجموع ۸۰ قلاده سگ ۲۱/۲۵ درصد مبتلا به سالمونلا و ۸/۷۵ درصد مبتلا به کلستریدیوم و ۲۶/۲۵ درصد مبتلا به کمپلوباکتر و ۴۳/۷۵ درصد مبتلا به اشريشیاکلی بودند. نقش بیماریزایی اشريشیاکلی در بروز آنتریت هموراژیک از سایر باکتری‌ها بیشتر نشان داده شده و نتایج آنتی بیوگرام نیز بیانگر مقاومت این باکتری نسبت به اکثر گروه‌های آنتی بیوتیکی مورد آزمایش بود. ولی این باکتری‌ها نسبت به آنتی بیوتیک‌های سفتریاکسون و سفکسیم حساسیت خوبی نشان داد. سایر باکتری‌ها نیز در نمونه‌های بعدی نسبت به این دو دارو حساسیت خوبی را نشان دادند.

واژگان کلیدی:

سگ، باکتری، آنتی بیوتیک، آنتریت هموراژیک

درمان بیماری‌های عفونی استفاده می‌شود و در این زمینه موقیت‌های زیادی به دست آمده است (۶ و ۸). ولی امروزه استفاده زیاد و نامناسب از داروهای ضد باکتریایی در پزشکی و دامپزشکی منجر به افزایش جداسازی سویه‌های مقاوم در برابر یک یا چند آنتی بیوتیک شده است و این مقاومت‌ها دائماً در حال افزایش است (۱۱ و ۱۷). در واقع باکتری‌ها علی رغم

مقدمه

آنتی بیوتیک‌ها بواسطه نقشی که در پیشگیری و درمان بیماریها دارند، همواره به عنوان تکیه گاهی ارزشمند در تامین سلامت جامعه بشری بوده‌اند. سال‌هاست که از آنتی بیوتیک‌ها در جهت کنترل و

۱- گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

*- نویسنده مسئول dadashbeigi@iaurasht.ac.ir

نئومایسین ۳۸/۸ درصد، جنتامایسین ۹ درصد گزارش شد و تمامی جدایه‌ها به آمپیسیلین، نورفلوکساسین، کلرامفینیکل و سولفامتوکسازول، تری متوفیریم حساس بودند (۱۰ و ۱۸).

در این تحقیق هم عوامل باکتریایی آنتریت هموراژیک سگ‌های ارجاعی به درمانگاه‌های دامپزشکی شهرستان رشت جداسازی و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها بررسی گردید. همچنین رابطه بین سن و جنس دام‌های بیمار با شیوع بیماری و میزان مقاومت دارویی مطالعه شدند.

مواد و روش‌ها

این آزمایش با استفاده از ۶۸۰ نمونه ارجاعی به درمانگاه‌های دامپزشکی شهرستان رشت در طی ۹ ماه از مهر ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۸ انجام شد. در این بررسی از مخاط و مدفوع ۸۰ قلاوه سگ مبتلا به آنتریت هموراژیک ارجاعی به درمانگاه‌های دامپزشکی شهرستان رشت (از مجموع ۶۸۰ سگ ارجاعی مورد بررسی اولیه) که از دو جنس نر و ماده و در سنین ۲ ماه الی ۶ سال بودند، با استفاده از سوآپ استریل نمونه گیری به عمل آمد. نمونه‌ها بلافاصله بر روی محیط آکار خوندار، آکار مک کانکی، سلینیت F، کری بلر کشت داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در گرمخانه ۳۷ درجه سانتیگراد قرار گرفت. پس از آن نمونه از محیط سلینیت F به آکار سالمونلا - شیلا و از محیط کری بلر به محیط اسکایرو آکار و آکار خوندار انتقال داده شد. محیط کشت اسکایرو آکار در گرمخانه ۳۷ درجه و شرایط میکروائثرفیل به مدت ۶ روز قرار داده شد و کشت آکار خوندار در جار بی هوایی و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفت. همزمان کلنی‌های خالص رشد یافته برای شناسایی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس ابتدا از دو کلنی خالص گسترش تهیه شد و به روش گرم رنگ رنگ آمیزی گردید و نتیجه آن همراه با مورفولوژی باکتری مشخص گردید.

ساختار ساده‌ای که دارند، قادر به ایجاد سویه‌های مقاوم و انتقال و گسترش مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌های متداول هستند (۷).

حیوانات خانگی مثل سگ و گربه، به دلیل تماس نزدیک با صاحبان خود نقش مهمی در انتقال مقاومت دارویی به انسان دارا هستند. لذا آگاهی از بروز مقاومت‌های دارویی در این حیوانات می‌تواند در کاهش مقاومت‌ها نقش بسزایی داشته باشد (۲۱). به علاوه بسیاری از عوامل باکتریایی جدا شده از مدفوع سگ‌ها مثل گونه‌های مختلف سالمونلا، اشرشیاکلی، کلستریدیوم و کمپیلوباکتر از عوامل متداول آنتریت و انترتوکسمی در انسان نیز هستند و می‌توانند برای بهداشت انسان مخاطره آمیز باشند (۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۹). لذا جداسازی عوامل باکتریایی اسهال سگ‌ها و تعیین میزان مقاومت آنها نسبت به آنتی بیوتیک‌های متداول در درمان آنتریت هموراژیک سگ‌ها، امکان شناسایی داروهایی که باکتری‌ها مقاومت بیشتری نسبت به آنها کسب کرده‌اند و جایگزین کردن داروهای موثر نقش مهمی در درمان موثر بیماری دام، و نیز حفظ بهداشت و سلامت جوامع انسانی دارد.

پیش از این محققین عوامل باکتریایی جدا شده از ۶۵ قلاوه سگ مبتلا به اسهال را بررسی کردند که در ۲۵ مورد عامل اسهال در توله‌های زیر ۶ ماه باکتری اشرشیاکلی مهاجم روده ای بوده است (۳). همچنین دانشمندان مدفوع ۱۳۰ قلاوه سگ سالم و مبتلا به اسهال را از نظر آلدگی به کمپیلوباکتر بررسی کردند که در ۴۶/۹ درصد موارد نتیجه مثبت بود (۱۹). در بررسی‌ها از مدفوع ۵۱/۱ درصد سگ‌ها و ۷۵ درصد گربه‌های مورد مطالعه، باکتری کمپیلوباکتر جدا گردید (۲). هم مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مدفوع سگ‌های غیر اسهالی را بررسی کردند. در این بررسی ۸۵/۱ درصد از سالمونلاهای جدا شده به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاوم بودند. مقاومت به استرپتومایسین ۸۰/۶ درصد، سفالوتین ۳۷/۳ درصد،

سفتریاکسون، ۹۰ درصد به سفکسیم، ۵۰ درصد به نالیدیکسیک اسید و ۵۲/۵ درصد به کوتیریموکسازول حساس بودند (جدول شماره ۲). همچنین حساسیت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های جدا شده از دام‌های جوانتر بیشتر از باکتری‌های جدا شده از دام‌های مسن تر بوده است (جدول شماره ۳).

جدول شماره ۱- میزان و درصد عوامل باکتریایی جدا شده از آنتریت هموراژیک سگ‌ها

نوع باکتری	درصد	تعداد
اشریشیاکلی	۴۳/۷۵	۳۵
کمپیلوباکتر	۲۶/۲۵	۲۱
سالمونولا	۲۱/۲۵	۱۷
کلستریدیم	۸/۷۵	۷

جدول شماره ۲- تاثیر آنتی‌بیوتیک‌ها بر باکتری‌های جدا شده از آنتریت هموراژیک سگ‌ها

نوع آنتی‌بیوتیک	درصد R	تعداد درصد R	تعداد درصد S	تعداد درصد Im
جنتامایسین	۱۶/۲۵	۱۶/۲۵	۶۷/۵۰	۱۳/۲۵
پنی‌سیلین	۶۷/۵۰	۲۵/۰۲	۷/۵۰	۱۲/۱۵
کلرامفینیکل	۲۰/۰۱	۶۵/۰۵	۶۷/۵۰	۹/۲۵
ترراسایکلین	۶۷/۵۰	۲۱/۲۵	۱۷/۲۵	۹/۱۱
سفتراتاکسون	۲/۵۰	۹۵/۰۷	۹۰/۰۲	۰/۵۰
سفکسین	۵/۰۰	۹۰/۰۷	۹۰/۰۴	۰/۵
نالیدیکسیک اسید	۲۷/۵۰	۵۰/۰۴	۵۰/۰۴	۱۸/۰۵
کوتیریموکسازول	۲۷/۵۰	۵۲/۰۴	۵۲/۰۴	۱۶/۰۲

R: باکتری‌های جدا شده مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها

S: باکتری‌های جدا شده حساس به آنتی‌بیوتیک‌ها

Im: تاثیر متوسط آنتی‌بیوتیک‌های انتخابی بر باکتری‌های جدا شده

جدول شماره ۳- درصد و تعداد باکتری‌های جدا شده حساس به آنتی‌بیوتیک‌های مورد آزمایش بر حسب سن

سن	تا شش ماه	از شش ماه تا دو سال	از دو سال به بالا	تعداد درصد
نوغ باکتری	۶۲/۸۵	۲۲		۴۳/۷۵
اشریشیاکلی	۶۷/۵	۷	۲۰	۱۷/۱۵
کمپیلوباکتر	۵۸/۸۲	۱۰	۶	۵/۸۸
سالمونولا	۴۸/۶۱	۱۰	۸	۳۸/۰۹
کلستریدیم	۰	۰	۷	۱۰۰

سپس کلنجی‌های خالص هر محیط توسط واکنش‌های بیوشیمیایی استاندارد مورد تشخیص نهایی قرار گرفت (طباطبایی و فیراوزی، ۱۳۸۶)

سپس از باکتری‌ها سوسپانسیون استاندارد تهیه شد. بدین ترتیب که باکتری مورد آزمایش از روی محیط آگار مغذی توسط سوآپ استریل برداشته شده و در محیط آبگوشت مولر هیتون کشت داده شده و در گرمخانه ۳۷ درجه سانتیگراد قرار گرفت تا زمانی که کدورت محیط کشت باکتری با کدورت استاندارد مک فارلندر یکسان گردد (۱۵). پس از آن آزمایش آنتی‌بیوگرام به روش انتشار از دیسک برای تعیین وجود یا عدم وجود مقاومت در باکتری‌های مورد مطالعه انجام شد. بدین ترتیب که با استفاده از سوآپ استریل باکتری مورد نظر از سوسپانسیون استاندارد تهیه شده بر روی محیط آگار مولر هیتون به طور یکنواخت کشت داده شده و دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی مورد نظر در سطح محیط گذاشته شد. پس از گذشت مدت زمان انکوباسیون براساس رشد یا عدم رشد باکتری در اطراف دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی، حساسیت یا مقاومت باکتری مشخص گردید. در صورت عدم رشد باکتری در اطراف دیسک آنتی‌بیوتیکی قطر هاله عدم رشد با خطکش اندازه‌گیری شد و قطر هاله بر حسب میلی‌متر به عنوان نتیجه آزمایش آنتی‌بیوگرام یادداشت گردید (۱۵).

نتایج

خلاصه‌ی از نتایج آزمایش در جداول شماره ۱ و ۲ ارائه شده است. در این بررسی از مجموع ۸۰ نمونه گرفته شده از اسهال هموراژیک سگها، در ۲۱/۲۵ درصد موارد باکتری سالمونولا، ۲۶/۲۵ درصد کمپیلوباکتر و ۴۳/۷۵ درصد اشریشیاکلی جدا گردید. از مجموع ۸۰ نمونه، ۶۷/۵ درصد نسبت به آنتی‌بیوتیک جنتامایسین، ۲۰ درصد به پنی‌سیلین، ۵۲ درصد به کلرامفینیکل، ۱۷ درصد به تراسایکلین، ۹۵ درصد به

از کلستریدیوم پرفرازننس انجام شده در ۲۱ درصد موارد مقاومت به تتراسیکلین و سایر موارد های متداول در درمان اسهال سگ ها مشاهده گردید که در ۱۳ درصد موارد مقاومت به تتراسیکلین در بین باکتریها قابل انتقال بوده است (۱۲).

بررسی ها نشان داده است که اگر درمان اسهال باکتریایی سگ ها از پری بیوتیک ها استفاده شود دوره اسهال در مقایسه با استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان به نصف کاهش می یابد (۴). دامپزشکان و کارشناسان بهداشت عمومی معتقدند دفع سالمونلا به وسیله سگ های آلدود یک منع آلدودگی بر روی صاحبان این دام ها می باشد ۱۶ قلاده سگ را با غذای خام آلدود به سالمونلا تعذیه نمودند که از این تعداد ۷ قلاده سگ به مدت ۱-۷ روز پس از دریافت آلدودگی باکتری سالمونلا در مدفوع دفع کردند (۱۶).

با جدا کردن ۲۴ باکتری اشریش کلی سویه همولایتیک از موارد اسهال سگ ها، بیان کردند که سویه های جدا شده از اسهال سگ ها به سویه های جدا شده از انسان، خوک و گاو های مبتلا به اسهال بسیار مطابقت داشته اند (۱۳).

در طی چند دهه گذشته گونه های کمپیلو باکتر به عنوان یک عامل متداول آنتریت در انسان و حیوانات مورد توجه قرار گرفته است. کمپیلو باکریوز روده ای یک بیماری زئونوز شایع در کشورهای پیشرفته می باشد. درمان آنتی بیوتیکی سگ های مبتلا به کمپیلو باکتریوز بالینی، سبب کاهش دوره بیماری و تخفیف مدت آن می گردد زمان رفع میکروارگانیسم از حیوان کاهش نیافته و در نتیجه خطر تماس انسان به این باکتری کاهش خواهد یافت (۶) محققین حساسیت آنتی بیوتیکی ۵۱ سویه کمپیلو باکتر که از ۲۹ قلاده سگ مبتلا به اسهال و ۲۲ قلاده سگ به ظاهر سالم جدا شده بودند را نسبت به آنتی بیوتیک های سفالکسین، اریترومایسین، ج بتامایسین، انروفلوکسالین، کلرامفنیکل و اکسی تتراسیکلین بررسی نمودند. نتایج نشان داد

چنانچه در جداول نتایج مشاهده می شود میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از اسهال هموراژیک سگ ها نسبت به هشت نوع آنتی بیوتیک مورد مطالعه در سنین مختلف فراوانی های متعددی دارد که با توجه به نتایج تست حساسیت آنتی بیوتیکی که در جدول ۲ منعکس شده، باکتری های جدا شده بیشترین مقاومت را نسبت به پنی سیلین و تتراسیکلین داشته اند. علت این امر می تواند ناشی از مصرف بی رویه این آنتی بیوتیک ها در پزشکی و دامپزشکی باشد.

همچنین در بررسی آماری با سطح اطمینان نود و پنج درصد، مقاومت آنتی بیوتیک باکتری های جدا شده از گروه های سنی مختلف، تفاوت معنی داری داشت. علت این امر می تواند دریافت آنتی بیوتیک و همچنین کسب میکروب های مقاوم در طول زندگی این دام ها باشد. در گزارش سایر محققان نیز رابطه مستقیمی بین مصرف طولانی مدت روزهای غیر درمانی آنتی بیوتیک و افزایش مقاومت باکتری های بیماری زا و فلور روده ای آنها منتشر شده است (۱۹).

بحث

مقاومت آنتی بیوتیک باکتریهای جدا شده از گروه های سنی مختلف، تفاوت معنی داری داشته است که علت این امر می تواند ناشی از بیشتر بودن تعداد موارد دریافت آنتی بیوتیک و همچنین کسب میکروب های مقاوم در طول زندگی این دامها باشد بطوریکه در گزارش سایر محققین نیز رابطه مستقیم بین مصرف طولانی مدت روزهای غیر درمانی آنتی بیوتیک و افزایش مقاومت باکتریهای بیماری زا و فلور روده ای به آنها دیده شده است (۱۵).

کلستریدیوم پرفرازننس یک عامل شناخته شده اسهال خفیف خود محدود شونده و همچنین عامل سندروم اسهال هموراژیک یک کشنده در سگ است. در مطالعه ای که بر روی سگ های مبتلا به اسهال ناشی

منابع

- ۱- طباطبایی، ع، فیروزی، ر. (۱۳۸۶): بیماری‌های باکتریایی دام. انتشارات دانشگاه تهران
- ۲- Acke, E., (2006): Prevalence of thermophylic Campylobacter species in cats and dogs, Veterinary Record.151-158
- ۳- Adsesiym, A.A., Compell M., Kamingologs., (1992): prevalence of bacterial entropathogense in pet dogs in Trinidad. Veterinary Medicin.44(1):19.
- ۴- Alvah C, Bihner, P.H.D, CPE and JM. Smith, (2008): Department of environmental work , university of Washington. vitality Science.
- ۵- Black, D.P., Itillman K., Fenlon D. R., Low J. C., (2003): Transfer of antibiotic Resistance between Commen Sal and [athogenic members of the entero bacteraceae under ideal conditions. Applied Microbiology. 95(3):428-436.
- ۶- Boosinger T.R, and Dillon A.R, (1992): Campylobacter Jejuni infections in dogs and the effect of erythromycin and tetracycline therapy on fecal shedding j.Am. Anim. Hos. Assoc. 28: 33-38
- ۷- Brock, T.D., (1991): Biology of micro organisms.6th ed. Prentice Hall.Inc London , 251-252,261-269
- ۸- Brooks, G.F., Butel J.S., Jawets,Melnick Adelbergs, (1998): Medical Microbiology, 21st ed. 90-109 and 145-176.
- ۹- Empn,J.S., (2004): Tetracycline in veterinary medicine and bacterial resistance to them. Veterinary medicine.3:79-100.
- ۱۰- Gebreyes, W. A., Thankur, S., (2005): Multidrug-Resistant Salmonella enttrica serovar muenchen from pigs and humans and potential inter server transfer of antimicrobial resistance.Autimicrobial Agent Chemotherapy.49(2):503-511.
- ۱۱- Jasir, A., and Schalen ,C., (1997): Erytromycin resistance phenotypes in swedish clinical isolates of group A streptococci. Cited by Horaud.T,Bouret.A.Leclereq.R.Sicardm.Stre

اریترومایسین، اتروفلوکسالین و جنتامایسین را می توان جهت درمان کمپیلوباکتریوزیس پیشنهاد نمودند (۱۳) و (۱۴).

نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که در این آزمایش اثر آنتی بیوتیک‌ها بر درمان اسهال هموراژیک سگها بررسی و گزارش شد.اما بهتر است در پژوهش‌های آتی، مقاومت و حساسیت به جای اسهال، نسبت به هر باکتری به طور جداگانه تعیین شود.

بطور کلی مصرف بی رویه آنتی بیوتیک‌ها، ارائه داروهای تقلیلی و در نتیجه پایین بودن دز مصرفی دارو و تداوم آن و مصرف نادرست آنتی بیوتیک‌ها را می‌توان اصلی ترین دلایل بروز مقاومت آنتی بیوتیکی برشمرد. گسترش این مقاومت‌ها در دهه‌های اخیر، لزوم استفاده محتاطانه از عوامل ضد میکروبی در دامپزشکی و پزشکی جهت متوقف کردن روند افزایشی مقاومت‌های آنتی بیوتیکی، قبل از آنکه از کنترل خارج گردد را ایجاب می‌کند.

- ptococi and the host.418-445.
- 12- Khater EJ , Marks SL , Foley JE. (2006): Determination of the Prevalence of antimicrobial resistance genes in canine Clostridium Perfringence isolates. *Vet Microbiology*. 10:113(1-2): 97-101.
- 13- Marjancastar, J., R. Johnson, Adam L., S. Tell, J. Vandergoot, HM Hendriks, C. Vanvorstenbosch, L. van Dijk, and W. Gaastra. (2002): Haemolytic Escherichia coli isolated from dogs with diarrhea have characteristics of both uropathogenic and necrotoxigenic strains. *Vet. Microbiol.* 85: 361-377.
- 14- Modulo, J.R., R. Giuffrida, C.A. de M. Lopes. (2003): Antimicrobial susceptibility of 51 Campylobacter strains isolated from diarrheic and diarrhea- free dogs. *Inst Biology*. 70: 283-286.
- 15- Quinn, P.J., Carter M.E., Mawkey Band G.R., (2001): Clinical Veterinary Microbiology. Philadelphia.220-221.
- 16- Rita, F, C. Ribble , J. Aramini , M. Vander Meer, M. Popa, M. litman , and R. Reid-Smith. (2007): The risk of Salmonellae shedding by dogs fed Salmonellae Contaminated commercial raw Food diets. *Can. Vet. J.* 48 (1): 69-75.
- 17- Schear., A., Micheal, S., (2003): Clinical Medicine of the Dog and Cat.300-302.
- 18- Seepersad,S.,Singh,N.,Adesivum,A.A.,Seebara msingh,R.,(2004). Prevalence and antimicrobial resistance of *Salmonella* spp. In non diarrhoeas goes in Trinidad. *J. vet med B infect Dis* *vet med B infect Dis* *vet public Health Seo.*51(7): 337-420.
- 19- Suzanne, N., et al., (2005): Pet dog and chicken meat as reservoirs of campylobacter spp in barbados. *Journal of clinical microbiology*,43(6):2642-2650.
- 20- Vanderwaaiy, D., Nord, C.E, (2005): Development and persistence of multi-resistance to antibiotics in bacteria an analysis and a new approach to this argent problem. *International Journal of Antimicrobial Agents*.16:191-97.
- 21- Water, R., (2005): Antimicrobial resistance

in zoonotic bacteria isolated from animals in different countries. British Society for Antimicrobial Chemotherapy Press.