

اثر سطوح متفاوت ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی بر تولید و کیفیت تخم مرغ

محمد امیری‌اندی^{۱*}، مجید افشار^۲، محمود شیوازاد^۳

چکیده

در این تحقیق اثر سطوح مختلف ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی آرین بر تولید تخم مرغ و کیفیت درونی تخم مرغ قابل جوجه کشی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۲۸۰ قطعه مرغ مادر گوشتی آرین و ۲۸ خروس به صورت تصادفی در ۲۸ واحد آزمایشی توزیع شدند. هفت سطح ویتامین E (۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ واحد بین‌المللی در کیلوگرم جیره مرغ مادر گوشتی آرین) به عنوان هفت تیمار آزمایشی از هفته ۲۷ تا ۳۵ در نظر گرفته شد. جیره‌های آزمایشی تأثیر معنی داری ($P \leq 0.05$) بر تولید تخم مرغ در کل دوره نداشتند، ولی تولید تخم مرغ گروه شاهد از بقیه گروه‌ها کمتر بود. سطوح مختلف ویتامین E در جیره مرغ مادر بر واحد هاو (هفته ۳۱)، pH سفیده، ضخامت پوسته و رنگ زرد (فقط هفته ۳۵) اثر نداشت، اما در هفته ۳۵، مرغ‌هایی که سطوح ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره را دریافت کردند، واحد هاو بیشتری ($P \leq 0.05$) نسبت به گروه شاهد داشتند (به ترتیب ۲۱/۹۲، ۲۵/۹۳، ۸۹/۹۳، ۶۱/۹۴ و ۰/۹۳). در مقابله ۰/۸۷ هاو نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح بالای ویتامین E در جیره‌ی مرغ‌های مادر گوشتی می‌تواند موجب بهبود نسبی کیفیت درونی تخم مرغ‌های قابل جوجه کشی شود.

واژگان کلیدی: ویتامین E، مرغ مادر گوشتی، تولید تخم مرغ و کیفیت تخم مرغ.

مقدمه

بیشتر است. عوامل متعددی چون باروری، شرایط دستگاه جوجه کشی، بیماری گله مادر، توارث، تغذیه و کیفیت تخم مرغ در جوجه درآوری موثرند(۱). ضخامت پوسته تخم مرغ، واحد هاو، pH سفیده و نسبت سفیده، زرد و پوسته شاخص‌هایی از کیفیت آن هستند. در مورد اثر سطح ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی بر ضخامت پوسته و واحد هاو که معیار کیفیت داخلی تخم مرغ می‌باشد، اطلاعاتی وجود ندارد. اما در مرغ تخم‌گذار خوراکی ویتامین E جیره به مقدار ۶۵ واحد بین‌المللی در کیلوگرم جیره موجب بهبود واحد

در صنعت پرورش مرغ مادر گوشتی، تولید تخم مرغ و جوجه درآوری از صفات مهم می‌باشند، چرا که محصول نهایی این صنعت جوجه یکروزه گوشتی است. هر چه تولید تخم مرغ بیشتر و جوجه درآوری آن بالاتر باشد، در نتیجه تعداد جوجه قابل فروش نیز

۱- گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنترج.

۲- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.

۳- گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

*-نویسنده مسئول m_amiri@iausanandaj.ac.ir

ساعت در شبانه روز رسید و تا پایان آزمایش ثابت ماند. همه پرندگان در انتهای آزمایش توزین شدند.

تیمارها: تعداد ۲۸۰ قطعه مرغ مادر گوشتی سویه تجاری آرین به طور کاملاً تصادفی به هفت گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه ۱ (شاهد) ویتامین E مکمل را دریافت نکرد. گروه ۲ (۲۰ واحد بین‌المللی ویتامین E)، گروه ۳ (۴۰ واحد بین‌المللی ویتامین E)، گروه ۴ (۶۰ واحد بین‌المللی ویتامین E)، گروه ۵ (۸۰ واحد بین‌المللی ویتامین E) و گروه ۶ (۱۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین E) را دریافت کردند. جیره‌های آزمایشی (جدول ۱) از سن ۲۶ تا ۳۵ هفتگی در اختیار پرندگان قرار گرفت. جیره‌های آزمایشی بر پایه ذرت و سویا بودند. این جیره‌ها حاوی ۱۶۵ گرم پروتئین خام و ۲۷۰۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلوگرم جیره بودند. هر کدام از این جیره‌ها بطور تصادفی به ۴ واحد آزمایشی اختصاص یافت. از ۲۰ هفتگی همه خروس‌ها جیره‌ای یکسان مصرف کردند که حاوی ۱۳۰ گرم پروتئین خام و ۲۸۰۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم جیره بود. محدودیت غذایی مرغ‌های مادر بر اساس تولید تخم مرغ و وزن بدن صورت می‌گرفت در صورتی که محدودیت غذایی خروس‌ها فقط بر اساس وزن بدن انجام می‌شد. محتوای آلفا-توکوفرول جیره‌های آزمایشی با روش HPLC اندازه گیری شد.

تولید تخم مرغ: از هفته ۲۷ تا پایان هفته ۳۵ هر هفته به صورت روزانه تعداد تخم مرغ تولیدی هر واحد آزمایشی جمع‌آوری، شماره‌گذاری و ثبت می‌شد. درصد تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود روزانه محاسبه و ثبت شد.

واحد هاو: در هفته‌های ۳۱ و ۳۵ تعداد دو عدد تخم مرغ از هر واحد آزمایشی به تصادف انتخاب شدند. پس از تعیین شدن وزن تخم مرغ‌ها به صورت انفرادی شکسته می‌شدند و محتویات هر تخم مرغ بر

ها در مقایسه با سطوح ۲۵ و ۴۵ واحد بین‌المللی در کیلوگرم جیره شد (۹). اثر ویتامین E بر واحد هاو بواسطه خاصیت آنتی اکسیدانتی آن و مراقبت از پروتئین و چربی تخم مرغ در مقابل اکسیداسیون می‌باشد (۹). این مطالعه بخشی از یک پژوهه بود که جهت بررسی اثرات سطوح متفاوت ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی آرین بر جوجه درآوری، کیفیت تخم مرغ، ایمنی مرغ مادر و نتاج و عملکرد نتاج طراحی شده بود. اهداف مطالعه در این بخش شامل بررسی اثر سطوح متفاوت ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی بر تولید و کیفیت تخم مرغ بود.

مواد و روش کار

پرورش و مدیریت مرغ‌های مادر: این تحقیق در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ایستگاه تحقیقاتی خجیر) انجام شد. پانصد جوجه ماده یکروزه مادر آرین و پنجاه جوجه یکروزه نر که از مرکز مرغ لاین بابل کنار تهیه شده بودند، بصورت تصادفی در یکی از ۲۸ واحد آزمایشی یا پن (۲/۲×۲/۰ متر) توزیع شدند. جوجه مرغ‌ها و جوجه خروس‌ها در دسته‌های ۳۰ و ۲۵ قطعه‌ای و بصورت جداگانه پرورش داده شدند. پرندگان طبق برنامه محدودیت غذایی توصیه شده توسط راهنمای مدیریت پرورش مرغ مادر گوشتی آرین تغذیه و نگهداری شدند (۲). در ۲۰ هفتگی همه پرندگان وزن کشی شدند و ۲۸۰ مرغ و ۲۸ خروس در محدوده وزنی 40 ± 4 گرم از میانگین وزن بدن هر جنس انتخاب شدند. هر ۱۰ مرغ با یک خروس بصورت تصادفی در هر واحد آزمایشی قرار گرفتند. در هر پن تغذیه مرغ‌ها و تغذیه خروس جداگانه صورت می‌گرفت. خروس به غذای مرغ‌ها و مرغ‌ها به غذای خروس دسترسی نداشتند. در هر واحد آزمایشی به ازای هر ۵ مرغ مادر یک لانه تخم‌گذاری قرار داده شد. تحریک نوری در هفته ۲۱ با ۹ ساعت نور در شبانه روز آغاز شد و تا هفته ۲۷ با افزایش تدریجی به ۱۶

واحد بین المللی در کیلوگرم جیره برای خروس‌ها)، بقیه ویتامین‌ها که بصورت مقدار در کیلوگرم جیره بیان شدند شامل: ویتامین A ۹۵۰۰، واحد بین المللی؛ ویتامین D3 ۲۰۰۰ واحد بین المللی؛ ویتامین K3 ۷/۵ میلی گرم؛ تیامین، ۱/۹۷ میلی گرم؛ ریبوفلافوئین، ۶ میلی گرم؛ نیاسین، ۲۵ میلی گرم؛ اسید پانتوتئنیک، ۱۲ میلی گرم؛ بیوتین، ۱/۰ میلی گرم؛ اسید فولیک، ۰/۸ میلی گرم؛ ویتامین E ۱۴ میکرو گرم و اتوکسی کوئین ۱۰۰ میلی گرم، ویتامین E (دی‌ال-آلfa- توکوفرول استات) بر اساس تیمارهای آزمایشی به جیره پایه اضافه شد. **مکمل مواد معدنی شامل املاح زیر می‌باشد که در کیلوگرم جیره بیان شدند: منگنز، ۹۹/۲ میلی گرم؛ روی، ۶۰ میلی گرم؛ آهن، ۸۰ میلی گرم؛ مس، ۶ میلی گرم؛ ید، ۰/۸۶۸ میلی گرم و سلنیم ۰/۰ میلی گرم. ***بر اساس آنالیز مواد خوارکی انجمن تحقيقات ملی (۱۹۹۴).

$$\begin{aligned} HU &= \text{واحد هاو} \\ H &= \text{ارتفاع سفیده (میلی متر)} \\ ۳۲/۲ &= G \\ W &= \text{وزن تخم مرغ (گرم)} \end{aligned}$$

از تخم مرغ‌هایی که جهت اندازه گیری واحد هاو استفاده شده بودند، برای اندازه گیری صفات زیر استفاده شد.

مقیاس رنگ زرد: با اندازه گیری ارتفاع سفیده، رنگ زرد نیز با استفاده از مقیاس رنگ زرد (Sistem ROCHE) تعیین گردید. در این مقیاس تعیین رنگ زرد، رنگ‌های زرد کمرنگ تا نارنجی از یک تا ۱۵ شماره گذاری شده‌اند (تعیین رنگ زرد به دلیل عدم دسترسی به مقیاس رنگ زرد در هفته ۳۱، فقط در هفته ۳۵ انجام شد).

وزن و ضخامت پوسته: پوسته‌های تخم مرغ‌ها با آب شسته می‌شدند. پس از خشک شدن در دمای اتاق، وزن پوسته با ترازوی با دقت ۰/۰۱ اندازه گیری می‌شد. با استفاده از میکرومتر مخصوص اندازه گیری ضخامت پوسته، ضخامت پوسته تخم مرغ‌ها اندازه گیری می‌شدند OSK-13496, OGAWA SEIKI CO., LTD.) .(JAPAN

وزن زرد و سفیده: پس از اندازه گیری ارتفاع سفیده، محتویات هر تخم مرغ به داخل ظرف مجزا

روی شیشه دستگاه اندازه گیری ارتفاع سفیده (OSK-13471, OGAWA SEIKI CO., LTD. JAPAN می‌گرفت. با اندازه گیری ارتفاع سفیده، جهت محاسبه واحد هاو از رابطه زیر استفاده شد (۳).

$$HU = 100 \log \left[H - \frac{\sqrt{G} (30W^{0.37} - 100)}{100} + 1/9 \right]$$

اجزای فرمول به قرار زیر می‌باشند:

جدول ۱- ترکیب جیره‌های آزمایشی

اجزای خوارک	% جیره	قبل از تخمگذاری	تخمگذاری	خرس
ذرت	۵۱/۰۴	۵۸/۸۵	۵۷/۷۳	
کنجاله سویا	۲۲/۱۶	۲۴/۲۹	۱۱/۲۴	
سبوس گندم	۱/۲۴	-	۶/۷۰	
جو	۲۰/۰۰	۶/۹۸	۲۰/۰۰	
صفد	۳/۰۲	۷/۲۵	۲/۱۲	
دی‌کلسیم فسفات	۱/۶۳	۱/۷۲	۱/۳۵	
نمک	۰/۳۵	۰/۲۴	۰/۳۴	
دی‌ال-متیونین	۰/۰۶۴	۰/۰۵۹	۰/۰۱۹	
مکمل ویتامینی *	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	
مکمل مواد معدنی **	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	
ترکیبات محاسبه شده ***				
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)	۲۷۵۰	۲۷۰۰	۲۸۰۰	
پروتئین خام	۱۶/۵۰	۱۶/۵۰	۱۳/۰۰	
اسید لینولئیک	۱/۳۹	۱/۴۵	۱/۵۰	
الیاف خام	۳/۹۷	۳/۴۵	۳/۹۳	
کلسیم	۱/۲۰	۳/۰۰	۰/۹۵	
فسفر قابل دسترس	۰/۴۰	۰/۴۰	۰/۳۵	
سدیم	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۶	
لیزین	۰/۸۱	۰/۸۳	۰/۵۷	
متیونین+سیستین	۰/۶۱	۰/۶۲	۰/۴۸	
(ویتامین E) (واحد بین المللی در کیلوگرم)	-	۱۴/۸۰	-	-
ترکیبات آنالیز شده	۱۶/۷۰	۱۶/۴۰	۱۳/۲۰	
پروتئین خام	۱/۴۸	۳/۰۱	۱/۰۰	
کلسیم	۰/۵۶	۰/۵۸	۰/۴۶	
فسفر کل	۰/۵۶	-	-	
(آلفا-توکوفرول) (میلی گرم در کیلوگرم)	۴/۶۴	-	-	-

* مکمل ویتامینی جهت مرغان مادر گوشتی فاقد ویتامین E بود

مادری که سطوح ۴۰ و ۸۰ واحد بین‌المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره دریافت کردند، داشتند. همچنین در هفته‌ی ۳۴ پرندگانی که ۱۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین E را دریافت کردند، تولید تخم مرغ کمتری ($P \leq 0.05$) را نسبت به گروه ۸۰ واحد بین‌المللی ویتامین E داشتند (۷۳/۶٪ در مقابل ۸۴/۴٪). در بقیه هفته‌ها تفاوت بین تیمارها معنی‌دار نبود. اگرچه تولید تخم مرغ در کل دوره در گروه شاهد کمتر از بقیه تیمارها بود، اما این تفاوت معنی‌دار نبود.

در جدول ۳ مشاهدات مربوط به کیفیت تخم مرغ شامل واحد هاو، pH سفیده و رنگ زرده و ضخامت پوسته تخم مرغ نشان داده شده است. چهار هفته پس از مصرف جیره‌های با سطوح متفاوت ویتامین E در مرغ‌های مادر گوشتی آرین، تیمارهای آزمایشی اثر معنی‌داری بر واحد هاو نداشتند، ولی تیمار شاهد کمترین میزان واحد هاو (۵۶/۰۴) و گروه ۸۰ واحد بین‌المللی ویتامین E بیشترین مقدار واحد هاو (۹۹/۸۵) را داشتند. در هفته‌ی ۳۵ یعنی حدود ۹ هفته پس از مصرف جیره‌های آزمایشی، مکمل ویتامین E بر واحد هاو و آلبومن تخم مرغ اثر گذاشت، به طوری که اختلاف واحد هاو در گروه‌های ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و

ریخته شده و زرده آن از سفیده جدا می‌شد. وزن زرده به صورت مجزا با ترازو (دقت ۰/۰۱) اندازه‌گیری می‌شد. وزن سفیده با کم کردن وزن پوسته و زرده از وزن کل تخم مرغ به دست آمد.

pH سفیده: با جداسازی زرده از سفیده، سفیده مربوط به هر تخم مرغ در ظرف مجزایی ریخته شده و pH آن در دمای اتاق (۲۰°C) با یک pH متر (pH/ISE Meter, HACH COMPANY, USA اندازه‌گیری شد.

تجزیه آماری: این طرح بصورت یک طرح کاملاً تصادفی با ۷ تیمار و ۴ تکرار اجرا شد. مشاهدات این طرح با استفاده از روش ANOVA یک طرفه و رویه GLM نرم‌افزار SAS تجزیه آماری شدند (۱۰). مقایسه میانگین‌های تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت.

نتایج

در جدول ۲ تولید تخم مرغ مرغ‌های مادر گوشتی در هفته‌های آزمایشی، مکمل ویتامین E بر واحد هاو و آلبومن تخم مرغ اثر گذاشت، به طوری که همان‌طور که نشان داده شده، در هفته‌ی ۲۹ مرغ‌های مادری که جیره‌ی شاهد را مصرف کردند تولید تخم مرغ کمتری ($P \leq 0.05$) را نسبت به مرغ‌های

جدول شماره ۲- اثر سطوح متفاوت ویتامین E در جیره‌ی مرغ مادر گوشتی آرین بر تولید تخم مرغ در هفته‌های مختلف و کل ۱

کل	هفته										ویتامین E (کیلوگرم جیوه) (IU)
	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷		
۷۹/۹ ± ۱/۶	۷۶/۶ ± ۲/۹	۷۶/۸ ^{ab} ± ۴/۰	۷۸/۲ ± ۵/۸	۷۵/۷ ± ۷/۵	۷۵/۰ ± ۷/۸	۷۹/۳ ± ۶/۴	۷۸/۹ ^c ± ۵/۰	۸۴/۳ ± ۳/۱	۷۷/۹ ± ۲/۰	.	
۸۳/۸ ± ۱/۲	۷۸/۲ ± ۲/۳	۸۴/۷ ^{abc} ± ۲/۵	۸۳/۹ ± ۵/۴	۸۱/۱ ± ۴/۲	۸۵/۱ ± ۲/۱	۸۷/۶ ± ۵/۰	۸۵/۷ ^{abc} ± ۷/۵	۸۹/۶ ± ۷/۳	۸۱/۵ ± ۲/۷	۴۰	
۸۶/۱ ± ۰/۹	۷۷/۵ ± ۱/۳	۸۲/۵ ^{ab} ± ۲/۰	۸۵/۷ ± ۲/۳	۸۶/۱ ± ۲/۸	۸۷/۲ ± ۱/۸	۸۶/۱ ± ۳/۲	۹۷/۴ ^a ± ۰/۵۸	۹۰/۴ ± ۲/۵	۸۶/۷ ± ۱/۱	۴۰	
۸۳/۲ ± ۱/۰	۷۷/۹ ± ۱/۵	۸۲/۹ ^{ab} ± ۱/۸	۸۲/۹ ± ۲/۴	۸۷/۲ ± ۲/۷	۸۷/۸ ± ۲/۷	۸۵/۷ ± ۱/۲	۸۵/۴ ^{abc} ± ۲/۸	۸۹/۳ ± ۲/۸	۸۰/۲ ± ۴/۵	۶۰	
۸۶/۵ ± ۱/۳	۷۸/۹ ± ۴/۷	۸۴/۴ ^{ab} ± ۴/۴	۸۸/۲ ± ۴/۴	۸۸/۶ ± ۲/۵	۸۴/۳ ± ۵/۱	۸۹/۳ ± ۲/۶	۹۰/۰ ^{abc} ± ۱/۶	۸۸/۹ ± ۱/۲	۸۶/۰ ± ۴/۶	۸۰	
۷۹/۰ ± ۱/۳۴	۷۳/۹ ± ۴/۵	۷۷/۵ ^b ± ۴/۷۲	۷۸/۲ ± ۳/۴	۷۹/۶ ± ۴/۴	۷۹/۳ ± ۵/۶	۷۷/۸ ^a ± ۱/۲	۸۶/۷ ^{abc} ± ۴/۰	۸۴/۶ ± ۱/۴	۷۷/۶ ± ۴/۷	۱۰۰	
۸۳/۸ ± ۱/۱	۷۸/۲ ± ۲/۳	۸۲/۵ ^{ab} ± ۰/۹	۸۱/۸ ± ۳/۹	۸۵/۷ ± ۱/۹	۸۹/۴ ± ۱/۷	۸۷/۵ ± ۰/۹	۸۰/۱ ^{abc} ± ۵/۰	۸۶/۸ ± ۲/۹	۷۷/۹ ± ۳/۹	۱۲۰	

در هر ستون مقادیری (\pm میانگین) که حروف مشابه ندارند، اختلاف معنی‌دار ($P \leq 0.05$) دارند.

جدول شماره ۳ - اثر سطوح متفاوت ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی آرین بر واحد هاو، pH سفیده، ضخامت پوسته و رنگ زرده در هفتاهای ۳۱ و ۳۵^۱

رنگ زرده		ضخامت پوسته (میکرومتر)		pH سفیده		واحد هاو		ویتامین E (کیلوگرم جیره / IU)
۳۵ هفته	۳۱ هفته	۳۵ هفته	۳۱ هفته	۳۵ هفته	۳۱ هفته	۳۵ هفته	۳۱ هفته	
۷/۵ ± ۰/۲۸	-	۳۲۶/۳ ± ۸/۶	۳۳۵/۰ ± ۸/۵	۸/۳۴ ± ۰/۰۴	۸/۳۰ ± ۰/۰۶	۸/۷۶ ± ۰/۵	۹/۶۵/۴ ± ۷/۳	.
۸/۱۳ ± ۰/۲۰	-	۳۲۸/۰ ± ۶/۸	۳۲۰/۰ ± ۷/۸	۸/۳۶ ± ۰/۰۵	۸/۳۶ ± ۰/۰۵	۹/۷۷۷ab ± ۲/۳۵	۹/۷/۴۱ ± ۲/۹۱	۲۰
۸/۳۸ ± ۰/۲۶	-	۳۲۲/۵ ± ۶/۵	۳۲۴/۵ ± ۵/۳	۸/۴۱ ± ۰/۰۵	۸/۳۵ ± ۰/۰۵	۹/۷۲۱a ± ۱/۲۱	۹/۷/۳۳ ± ۲/۲۹	۴۰
۸/۰۰ ± ۰/۲۳	-	۳۲۷/۸ ± ۶/۵	۳۲۷/۸ ± ۶/۴	۸/۳۶ ± ۰/۰۷	۸/۲۹ ± ۰/۰۷	۹/۷۸۹a ± ۱/۳۴	۹/۹/۱۹ ± ۷/۱۲	۶۰
۷/۸۶ ± ۰/۲۶	-	۳۲۴/۴ ± ۱۷/۵	۳۲۰/۰ ± ۵/۳	۸/۳۸ ± ۰/۰۶	۸/۳۲ ± ۰/۰۵	۹/۷۲۵a ± ۲/۱۴	۹/۹/۸۵ ± ۷/۶۲	۸۰
۸/۰۰ ± ۰/۲۳	-	۳۲۱/۰ ± ۹/۰	۳۲۷/۸ ± ۵/۳	۸/۳۴ ± ۰/۰۵	۸/۳۴ ± ۰/۰۶	۹/۶۶۱a ± ۲/۰۰	۹/۶/۶۹ ± ۷/۷۹	۱۰۰
۸/۱۳ ± ۰/۲۵	-	۳۲۷/۵ ± ۴/۱	۳۲۷/۸ ± ۱۰/۱	۸/۴۸ ± ۰/۰۴	۸/۲۶ ± ۰/۰۷	۹/۷۰۹a ± ۴/۶	۹/۷/۴۶ ± ۷/۱۵	۱۲۰

۱- در هر ستون مقادیری (\pm SE) میانگین) که حروف مشابه ندارند، اختلاف معنی دار ($P \leq 0/05$) دارد.

اکسیداتیو حفاظت می کند و موجب افزایش رهاسازی ویتلوزین از کبد می شود که این ماده در اووسیت به پروتئین های پیش ساز زرده تبدیل می گردد (۹). با توجه به این مطلب، انجمن تحقیقات ملی (۱۹۹۴) حداقل نیاز ویتامین E جهت عدم کاهش تولید تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی را مشخص نکرد، ولی در مورد مرغان مادر تخمگذار خوراکی که روزانه ۱۰۰ گرم غذا مصرف می کنند، سطح ۱۰ میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم جیره را پیشنهاد داده است که این مقدار جهت جلوگیری از کاهش تولید تخم مرغ می باشد (۷). در این تحقیق، سطوح متفاوت ویتامین E در جیره های مرغ های مادر گوشتی تاثیر معنی داری ($P \geq 0/05$) بر تولید تخم مرغ نداشتند، ولی تیمار شاهد تولید تخم مرغ کمتری نسبت به بقیه گروه ها در کل دوره داشت. این نتیجه با نتیجه تنها پژوهشی که در سال ۱۹۹۸، توسط Hossain و همکاران در این موضوع صورت گرفته است، و با مطالعه ای که بر روی مرغ تخمگذار خوراکی انجام گرفته است (۵)، همانگ می باشد، ولی با پژوهش Scheideler و Froning (۱۹۹۶) بر روی مرغ تخمگذار متناقض است. در تحقیق اخیر، استفاده از ۵۰ میلی گرم ویتامین E در جیره های مرغ تخمگذار بابکوک در مقایسه با سطح ۲۷ میلی گرم از ویتامین E موجب بهبود ۲ درصد در تولید تخم مرغ در زمان اوج

۱۲۰ واحد بین المللی با گروه شاهد معنی دار ($P \leq 0/05$) بود (۹/۲/۲۱، ۹/۳/۸۹، ۹/۳/۲۵، ۹/۳/۶۱ و ۹/۳/۰۹ در مقابل ۶/۸۷). سطوح متفاوت ویتامین E در جیره های مرغ مادر گوشتی تأثیری بر pH سفیده تخم مرغ نداشت. همچنین تیمارهای غذایی تأثیری بر رنگ زرده تخم مرغ ها نداشتند، ولی مرغ های مادری که جیره های شاهد را مصرف کردند، دارای مقیاس رنگ زرده ای کمتری بودند (فقط در هفته ۳۵). سطوح متفاوت مکمل ویتامین E در جیره های مرغ مادر گوشتی آرین تأثیری بر ضخامت پوسته تخم مرغ در ۳۱ و ۳۵ هفتگی نداشت. تیمارهای غذایی تأثیری بر وزن تخم مرغ، زرده، سفیده و پوسته نداشتند (مشاهدات نشان داده نشدند).

بحث

ویتامین E بر تولید تخم مرغ موثر است (۱۱ و ۱۲). نشان داده شده است که پس از یک هفته از مصرف جیره های فاقد ویتامین E، تولید تخم مرغ در مرغان مادر تخمگذار خوراکی به شدت کاهش می یابد (۱۲). به نظر می رسد که تأثیر ویتامین E بر تولید تخم مرغ از طریق اثر آن بر پروتئین های پیش ساز زرده (لیپوویتین، فسوویتین و لا یوتین) صورت می گیرد. ویتامین E غشاء سلول های کبد را در مقابل تخریب

چند باند دوگانه (PUFA) است و اکسیداسیون چربی‌ها و پروتئین‌ها را به دنبال خواهد داشت که این عمل موجب کاهش واحد هاو می‌شود. ویتامین E اثر این اسید چرب را کاهش می‌دهد.

سن و مرحله تولید تخم مرغ ساختمان پوسته را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تغییر ساختمان پوسته موجب از دست رفتن رطوبت و دی‌اسید کربن از تخم مرغ می‌شود که این مورد اخیر موجب افزایش pH سفیده‌ی تخم مرغ می‌شود. این تغییرات ممکن است جوجه درآوری را تحت تأثیر قرار دهند (۹). پرندگان جوان در سفیده‌ی تخم‌هایشان اووموسین بیشتری دارند که این پروتئین موجب بهبود واحد هاو می‌شود (۸). ویتامین E در جیره‌ی مرغ مادر گوشتی آرین تأثیری بر ضخامت پوسته نداشت. همچنین ویتامین E در جیره‌ی مرغ مادر گوشتی تأثیری بر رنگ زرد نداشت ولی تیمار شاهد رنگ زرد کمتری نسبت به بقیه تیمارها داشت. Frigg و همکاران در سال ۱۹۹۲ اثر مشابهی را گزارش کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح بالای ویتامین E در جیره‌ی مرغ‌های مادر گوشتی می‌تواند موجب بهبود نسبی کیفیت درونی تخم مرغ‌های قابل جوجه‌کشی شود.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران که امکانات مالی، مکانی و تجهیزاتی طرح را فراهم نمود، تشکر می‌کنند.

منابع

- پوررضا، ج. (۱۳۷۴): اصول علمی و عملی پرورش طیور، چاپ دوم. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره ۵۹-۲، صفحه: ۱۴۰-۱۲۲.
- راهنمای مدیریت پرورش مرغ مادر آرین. (۱۳۸۱): مرکز پشتیبانی طیور کشور (وزارت جهاد کشاورزی).

تولید شد (۱۱). به نظر می‌رسد که جهت جلوگیری از کاهش تولید تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی آرین سطح ۲۰ واحد بین‌المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره کافی باشد. نویسنده‌گان این مقاله پیشنهاد می‌کنند که جهت گرفتن نتیجه دقیق‌تر، این موضوع در مدت زمانی بیشتری مورد تحقیق قرار بگیرد.

اثر ویتامین E در جیره‌ی مرغ مادر گوشتی بر واحد هاو (کیفیت درونی تخم مرغ قابل جوجه کشی) تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما در مورد مرغ تخم‌گذار خوراکی تحقیقاتی انجام شده است. بررسی واحد هاو تخم مرغ از دو جهت دارای اهمیت می‌باشد. از نظر بازارپسندی تخم مرغ خوراکی در مورد مرغ‌های تخم‌گذار که مربوط به کار ما نمی‌شود، و نکته دوم این که سن پرنده بر کیفیت تخم مرغ تأثیر می‌گذارد. در نتیجه بر جوجه‌درآوری تخم مرغ‌هایی که برای جوجه‌کشی انتخاب می‌شوند مؤثر است (۸). بنابراین ارایه راهکاری جهت کاهش اثرات سن بر کیفیت تخم مرغ سودمند خواهد بود.

استفاده از ۶۵ واحد بین‌المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره‌ی مرغ تخم‌گذار موجب افزایش معنی‌دار واحد هاو آلبومن تخم مرغ نسبت به مرغ‌هایی شد که ۴۵ و ۴ واحد بین‌المللی ویتامین E را در کیلوگرم جیره دریافت کردند (۹). ویتامین E با حذف رادیکال‌های آزاد موجب پایداری چربی‌ها و پروتئین‌ها می‌شود، درنتیجه به بهبود واحد هاو کمک می‌کند (۹). در تحقیق حاضر تخم مرغ‌های مادر گوشتی در سن ۳۵ هفتگی واحد هاو کمتری نسبت به تخم مرغ‌های مادر در ۳۱ هفتگی داشتند، اما مرغ‌های مادری که مکمل ویتامین E در جیره دریافت کردند، واحد هاو تخم مرغ‌هایشان بیشتر بود، طوری که در اکثر تیمارها (به غیر از گروه ۲۰ واحد بین‌المللی) این تفاوت نسبت به گروه شاهد معنی‌دار بود. در زمان اوج تولید تخم مرغ و پس از آن مقدار اسید چرب C۲۰:۵ در زرد تخم مرغ به طور طبیعی زیاد می‌شود (۸). این اسید چرب دارای

- 3- Eisen, E. J., Bohren, B. B., and McKean, H. E., (1962): The haugh unit as a measure of egg albumen quality. *Poult. Sci.* 41:1461-1468.
- 4- Frigg, M., Whitehead, C. C., and Weber, S., (1992): Absence of effects of dietary α -tocopherol on egg pigmentation. *Br. Poult. Sci.* 33:247-353.
- 5- Grobas, S., Mendez, J., De Blas, C., and Mateos, G. G., (1997): Influence of dietary vitamins E and A on performance, egg quality and α -tocopherol content of yolks. *Poult. Sci.* 76 (Suppl. 1): 371 (abstract).
- 6- Hossain, S. M., Barreto, S. L., Bertechini, A. G., Rios, A. M., and Silva, C. G., (1998): Influence of dietary vitamin E level on egg production of broiler breeders, and on the growth and immune response of progeny in comparison with the progeny from eggs injected with vitamin E. *Anim. Feed Sci. Tech.* 73:307-317.
- 7- National Research Council., (1994): Nutrient requirement of poultry. 9th rev. ed., National Academy Press, Washington, DC.
- 8- Pappas, A. C., Acamovic, T., Sparks, N. H. C., Surai, P. F., and McDevitt, R. M., (2005): Effects of supplementing broiler breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty acids on egg quality during storage. *Poult. Sci.* 84: 865-874.
- 9- Puthpongsiriporn, U., Scheideler, S. E., Sell, J. L., and Beck, M. M., (2001): Effects of vitamin E and C supplementation on performance, *in vitro* lymphocyte proliferation, and antioxidant status of laying hens during heat stress. *Poult. Sci.* 80:1190-1200.
- 10- SAS Institute., (1996): The SAS system for windows, version 6.12. SAS Institute Inc., Cary, NC.
- 11- Scheideler, S. E., and Froning, G. W., (1996): The combined influence of dietary flaxseed variety, level, form, and storage conditions on egg production and composition among vitamin E-supplemented hens. *Poult. Sci.* 75: 1221-1226.
- 12- Tengerdy, R. P., and Nockels. C. F., (1973): The effect of vitamin E on egg production, hatchability and humoral immune response of chickens. *Poult. Sci.* 52:778-783.