

مطالعه مقایسه‌ای تاثیر دزوجرم 2A، سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم در ضربیب تبدیل غذایی، طول دوره پرورش و میزان تلفات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

علی نکوئی فرد^{*}، داریوش آزادیخواه^۱، سهراب رسولی تازه‌کند^۲

تاریخ پذیرش: ۹۰/۵/۶ تاریخ دریافت: ۹۰/۱/۲۱

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر کاربری سه ماده شیمیایی، سولفات مس، پرمنگنات پتاسیم و یک ماده ضد عفونی کننده جدید بنام دزوجرم 2A بر میزان تلفات، طول دوره پرورش و ضربیب تبدیل غذایی در طول مدت پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شد. در این بررسی تعداد ۱۰۰۰۰ عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 21 ± 2 گرم در ۴ گروه تا وزن بازاری دردمای آب با دامنه دمایی $13/5 \pm 0/5$ درجه سانتیگراد هر ۱۵ روز یکبار در تماس با مواد ضد عفونی کننده دزوجرم 2A، سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم به ترتیب با غلظتها ۲، ۲۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت یک ساعت به روش حمام کوتاه مدت قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشانگر کمترین میزان FCR و طول دوره پرورش بر حسب روزیتریب با مقادیر عددی $1/3/1$ ، 160 ، 160 روز و میزان درصد تلفات با میانگین عددی $(0/036 \pm 0/023)$ مربوط به گروه آزمون ۱ بود. مقادیر بدست آمده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمایش دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه نتایج مربوط به نرخ تبدیل غذایی نشان دهنده کاهش کاملاً معنی دار ($p < 0/05$) این پارامتر در گروه آزمون ۱ نسبت به سایر گروهها بود. همچنین نتایج مقایسه طول دوره پرورش در گروههای آزمون، کاهش کاملاً معنی داری ($p < 0/05$) نسبت به گروه شاهد را نشان داد. مقادیر این پارامتر نیز در گروههای آزمون از اختلاف کاملاً معنی داری ($p < 0/05$) برخوردار بود. در مقایسه میزان درصد تلفات گروه آزمون ۱ (دزوجرم 2A) نسبت به سایر گروهها اختلاف کاملاً معنی داری ($p < 0/05$) را نشان داد.

واژگان کلیدی: قزل آلای رنگین کمان، دزوجرم 2A، سولفات مس، پرمنگنات پتاسیم، تلفات، نرخ

تبدیل غذایی، طول دوره پرورش

مقدمه

رعایت اصول مدیریت بهداشتی مزارع پرورش

ماهی گامی موثر و اساسی در سودمند کردن این صنعت می‌باشد. لذابکارگیری مواد شیمیایی ضد عفونی ماهیان جهت پیشگیری و کاهش اثرات زیان بار عوامل بیماریزایی که بواسطه ایجاد استرس‌های مختلف نمود

- ۱- استادیار، موسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه - ایران
- ۲- استادیار، گروه بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه - ایران
- ۳- استادیار، گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه - ایران
- *- پست الکترونیکی نویسنده مسئول: anekui@gmail.com

آنها به عنوان یک ماده ضدغونی کننده خارجی مورد آزمایش علمی قرار گرفته باشد(۱). از جمله این مواد پرمنگنات پتاسیم است که علاوه بر خاصیت موثر ضدانگلی، اثر کشنده بروی باکتریهای قارچها دارد (۶) و از آن در درمان بیماری باکتریایی آبشنش (BGD) و سایر بیماریهای باکتریایی از جمله قرحهای جلدی (Skin Ulcer) استفاده می‌گردد (۱۹و۲۳). پرمنگنات پتاسیم در اسیدیته بالا بسیار سمی بوده و در محیط‌های قلیایی با تشکیل رسوب جامد از دی اکسید منگنز (MnO₂) در آبشنشها موجب پرخونی و تورم و آسیب به آنها می‌شود (۱۱). استفاده از حمام سولفات مس معمولاً عنوان یک روش درمانی برای مبارزه با بیماریهای عفونی جلدی و برخی انگلهای تک یاخته ماهیان می‌باشد. این ماده برای ماهیان بسیار سمی بوده و غلظت LC50 کشنده آن به سختی آب بستگی دارد (۱۴). غلظت 50 حاد سولفات مس برای ماهی آبشنش آبی (Lepomis macrochirus) در ۴۸ ساعت، بین ۳/۱ میلی گرم در لیتر در آبهایی که میزان کربنات کم است، تا ۴ میلی گرم در لیتر در آبهایی با کربنات زیاد، تغییر می‌کند. مشخص شده است این ترکیب سبب نکروز کلیه، تخریب بافت خونساز، افزایش چربی کبد و مهار برخی از آنزیمهای گوارشی می‌شود (۴). آبشنشها معمولاً به دلیل تماس مداوم با آب و سطح وسیع اشان در معرض آسیبهای ناشی از داروها و مواد شیمیایی محلول در آب هستند (۲۰). ترکیبات ضدغونی کننده فرآراز دیگر ضدغونی کننده‌هایی هستند که برای ضدغونی نمودن آب (همانند کلر) مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این گروه ترکیبات، دزو جرم ۲A و ۳A در پیشگیری و درمان بیماری‌های آبزیان به عنوان یک ضدغونی کننده خارجی وسیع الطیف چند مولکولی ترکیبی (ترکیبات آمونیوم چهارتایی، فرمالدئید، گلوتارآلدئید، متیلن بلو) مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت دزو جرم ۲A و ۳A در میزان کشنندگی این ترکیبات می‌باشد. شرکت تولیدکننده این ترکیبات، LC50 دزو جرم ۳A را به میزان

می‌یابند، امری مهم و ضروری بوده تا با رعایت سایر ضوابط مدیریتی نتیجه مطلوب پرورشی بدست آید. یکی از این روش‌های معمول و رایج در مزارع پرورشی استفاده از ضدغونی کننده‌های بیرونی برای کنترل عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم‌های سطح خارجی بدن ماهیان و ریشه کن کردن عوامل بیماریزا در کارگاههای پرورش ماهی وابزار آلات مربوطه می‌باشد (۲۵). ترکیباتی که برای کنترل میکروارگانیسم‌های زنده سطح بیرونی بدن ماهی استفاده می‌شوند باید با آب مخلوط شده و در غلظت‌های مناسب در آب به حالت تعلیق در آیند. علاوه براین، باید اینگونه ترکیبات رشد میکروارگانیسم‌ها را کنترل و یا آنها را از بین بینند و این امر، در غلظتی صورت گیرد که برای ماهیان کشنده نباشد. اینگونه ترکیبات نباید جذب بدن ماهی شوند، همچنین بتوان آنها را برای درمان چندین موجود زنده بکار برد و از نظر اقتصادی، برای کارگاههای پرورش ماهی مقرون به صرفه باشد. تاثیر یک ماده ضدغونی کننده بستگی به نسبت زمان و غلظت آن ماده دارد. در این حالت باید ماهی را در آبی بانسبت مشخص (زمان- غلظت) قرارداد تا بدون اینکه به آن آسیب وارد شود میکروارگانیسم‌های زنده عفونت زا را از بین ببرد (۴). مواد و فرآورده‌های مورد استفاده برای درمان دارویی درازمدت ماهی در استخراج‌های پرورشی باید فاصله مطمئن و قابل ملاحظه‌ای میان غلظت کشنده (LC Lethal Concentration) برای عامل بیماری و غلظت کشنده برای ماهی داشته باشند. ضریب دارویی برای ماهی چند برابر بیش از غلظت کشنندگی برای عامل ایجادکننده بیماری باشد. آنها باید دست کم ۴ و یا بالای ۴ وحداکثر ۱۰ بوده و این داروها بایستی به آسانی در آب حل شده و به آسانی تجزیه شوند (۲). تاکنون ضدغونی کننده‌های زیادی تولید شده‌اند که جهت استفاده در کارگاههای پرورش ماهی بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، بدون اینکه کارآیی

۱۳ درجه سانتیگراد ثابت بودولیکن دامنه دمایی ثبت شده مربوط به تاثیر دمای محیط برآب استخر می باشد) اجرا گردید. در ابتدای انجام طرح فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مزرعه مورد تجزیه قرار گرفت و پس از تعییه یک دستگاه هواده و یک برج هواده در استخر آب پخش قبل از ورود به استخرهای مورد نظر کیفیت لازم طبق جدول(۱) برای پرورش به آب ورودی آنها داده شد (۲۴ و ۲۲). ظرفیت بیومس استخرها براساس استانداردهای لازم حداقل ۲۵۰۰ قطعه محاسبه گردید و در طول دوره پرورش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بطور روزانه توسط دستگاه فتو متر مدل PF11 در هر استخراندازه گیری و کنترل شد (۱۷ و ۱۳ و ۸). جهت تغذیه ماهیان از خوراک کنسانتره پلت تولید شده دریکی از کارخانجات تولید خوراک کشوربا نرخ تبدیل غذایی ($FCR = 1/3/1$) استفاده گردید. اندازه پلت، میزان خوراک مصرفی و تعداد و عده های غذایی طبق استانداردهای تغذیه ای قزل آلای رنگین کمان با شرایط آب و وزن ماهی محاسبه شد (۲۱ و ۷).

برای جلوگیری از آلودگی استخرها جمع آوری تلفات ماهیان حداقل سه بار در روز و شستشوی استخرها هر ۱۵ روز یکبار صورت گرفت (۵). استفاده از ضد عفونی کننده ها پس از شستشوی استخرها به طریق غوطه وری Flowing) با روش معالجه در جریان آب (Immersion) (۱۰ و ۱۱). اطلاعات مربوط به گروههای آزمون و شاهد، استخرها، نوع و میزان ماده ضد عفونی مصرفی و ماهیان در چدول(۱) آمده است.

۶۵۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن زنده ماهی تعیین وارائه نموده است. غلظت کشنده گی این ترکیب برای بچه ماهیان دارای کیسه زرده، ۹ میلی گرم و برای ضد عفونی خارجی نیز ۷-۵ میلی گرم در لیتر به ازای هر کیلو گرم وزن بدن اعلام شده است. این ترکیبات می توانند به عنوان یک ضد عفونی کننده وسیع الطیف بر علیه قارچها، باکتریها، ویروسها و جلبکها در مزارع پرورش ماهی بکار برد شوند ولی بر انگلهای خارجی آبزیان بی تاثیر می باشند (۹). هدف از این تحقیق دستیابی به اطلاعات کاربردی پیرامون تاثیر ترکیبات ضد عفونی کننده خارجی رایج مانند سولفات مس، پرمنگنات پتاسیم و یک ترکیب ضد عفونی کننده فرار دیگر مانند دزوجرم ۲A در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان و مقایسه تاثیر استفاده از این سه گروه با یکدیگر بر طول دوره پرورش (روز)، میزان ضریب تبدیل غذایی Food Conversation Rate (FCR) و درصد تلفات در دوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بودتا بهترین گزینه در موارد یادشده شناسایی شود (۱۶).

مواد و روش کار

این مطالعه در مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان شرکت برکه طلایی (واقع در کیلومتر ۱۷ جاده ارومیه - مهاباد در استان آذربایجان غربی) در استخر بتی به ابعاد $2 \times 20 \times 1$ مترو حجم آب 28 ± 4 متر مکعب و منبع آبی مشترک (چاه عمیق) با دبی آب برابر ۱۰ لیتر در ثانیه با ورودی مجزا برای هر استخر و دمای آب بادامنه دمایی $5 \pm 0/5$ (دما می ۱۳/۵) آب چاه

جدول ۱- اطلاعات مربوط به گروههای آزمون، شاهد

گروه	در هر استخر (عدد)	وزن ماهی (گرم)	وزن ماهی (گرم) اولیه	تعداد ماهی	نام ماده ضد عفونی مصرفی نهایی	دوز مصرفی (ppm/h)	روش ضد عفونی و مدت زمان آن
شاهد	۲۵۰۰	$21 \pm 1/5$	250 ± 5	بدون ماده ضد عفونی			
آزمون ۱	۲۵۰۰	$20 \pm 0/5$	260 ± 5	دزوجرم ۲A	۲۰	۲۰	معالجه در جریان آب ۱ ساعته
آزمون ۲	۲۵۰۰	22 ± 1	255 ± 5	سولفات مس	۲	۲۷۰ ppm	معالجه در جریان آب ۱ ساعته
آزمون ۳	۲۵۰۰	$23 \pm 0/7$	250 ± 5	پرمنگنات پتاسیم	۲	۲۷۰ آب مزرعه	معالجه در جریان آب ۱ ساعته

ازدسته موادی هستند که درآمریکا جهت مصرف ماهیان خوراکی مورد تایید قرار نگرفته و دارای حق تقدم کم نیز نیستند، داروهای بدون حق تقدم کم داروهایی هستند که FDA نگرانی و توجه خاصی به مصرف آنها دارد زیرا اطلاعاتی دربارهٔ تاثیر ویا بی خطر بودن آنها وجود ندارد. از طرفی اذعان به استفاده از این ضدغوفونی کننده‌ها به عنوان یک ماده قابل دسترس برای پرورش دهنده‌گان که از مدهای طولانی آنها را در دستورکار مدیریت بهداشتی مزرعه خود قرارداده اند و چه بسا در توصیه‌های متخصصین امر آبزی پروری هم در زمرة تجویزهای متداول قرار گرفته‌اند، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. لذا بررسی اثرات مختلف این مواد بر روی ماهی می‌تواند سبب نگرشی تازه برپایه استدلال علمی دراستفاده مناسب ترین آنها توسط متخصصین امر گردد.

نتایج این مطالعه کمترین مدت زمان پرورش، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و میزان درصد تلفات دوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان مربوط به استفاده از دزوجرم ۲A و بیشترین این پارامترها مربوط به گروه شاهد بود. در تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده در میزان طول دوره پرورش و ضریب تبدیل غذایی، اختلاف کاملاً معنی داری در استفاده از دزوجرم ۲A با دو ماده مطرح شده فوق بدست آمد ($p < 0.05$).^(p)

Ebel و همکاران⁽¹⁹⁹⁰⁾ ضایعات آبیشی رادر ماهی کلاریس (*Clarias gariepinus*) متعاقب درمان با سولفات مس گزارش کردند. همچنین ضایعات پاتولوژیک در آبشش‌های ماهی کپور علفخوار (*Ctenopharyngodon idella*) پس از حمام ماهیها با دوزهای درمانی سولفات مس نشانگر بیشترین ضایعات بصورت نکروز سلولهای پوششی برانش ۵۸/۶۴ در حمام کوتاه مدت (یک ساعته) با دوزهای ۲۱، ۲۵، ۵، ۲۰ میلی‌گرم در لیتر و در حمام طولانی مدت (۲۴ ساعته) با دوزهای ۱، ۲۰، ۵، ۳۰ میلی‌گرم در لیتر، ۷/۸۵٪ نکروز سلولهای پوششی برانش بوده است. نتایج

با استفاده ازنرم افزار SPSS 17 مقایسه میانگین فاکتورهای مورد بررسی بین گروهها با آزمون واریانس یکطرفه (One-Way ANOVA) و تست Duncan با در نظر گرفتن سطح معنی داربودن ($p < 0.05$) مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

نتایج حاصل از مقایسه تاثیر استفاده از سه ماده شیمیایی بررسی شده براساس جدول ۲ بدست آمد. مقایسه انجام شده درخصوص طول دوره پرورش، نشانگر اختلاف کاملاً معنی دارین گروه آزمون ۱ با سه گروه دیگر بود. همچنین اختلاف کاملاً معنی داری بین گروه آزمون ۲ با گروه آزمون ۳ و شاهد، و گروه آزمون ۳ با شاهد مشاهده شد ($p < 0.05$).^(p)

مقایسه نتایج حاصل از ضریب تبدیل غذایی (FCR) اختلاف کاملاً معنی داری را بین گروه آزمون ۱ با سایر گروهها و همچنین بین گروهها آزمون ۲ و ۳ با شاهدنشان داد ($p < 0.05$). همچنین در میزان درصد تلفات دوره رشد ماهیان گروه آزمون ۱ نسبت به سه گروه دیگر تفاوت کاملاً معنی داری مشاهده شد ($p < 0.05$). مقایسه میانگین های میزان درصد تلفات میان تفاوت کاملاً معنی دار گروه آزمون ۱ نسبت به سه گروه دیگر بود ($p < 0.05$).^(p)

جدول ۲ - میانگین ضریب تبدیل غذایی (FCR/1)، طول دوره پرورش و درصد تلفات گروههای شاهد و آزمون

گروه	ضریب تبدیل غذایی (%)	میزان تلفات	طول مدت پرورش (روز)
شاهد	۱/۵±۰/۰۱	۱/۱۴۵±۰/۱۷۷	۱۷۷
آزمون ۱	۱/۳±۰/۰۲	۰/۷۲۳±۰/۰۳۶	۱۶۰
آزمون ۲	۱/۴±۰/۰۱	۱/۰۳±۰/۰۷۴	۱۷۳
آزمون ۳	۱/۴±۰/۰۱	۱/۱۷۸±۰/۰۳۴	۱۷۵

بحث

ضدغوفونی کننده‌های مورد ارزیابی در این تحقیق

فعالیتهای فیزیولوژیک ماهی، دستیابی به این مهم نیازمند پیگیری های تحقیقاتی تکمیلی می باشد.

تشکر و قدردانی

از مساعدتهای آقای مهندس فخری مدیر کل محترم شیلات استان آذربایجان غربی و آقای دکتر صید گروه همچنین آقای مهندس ابراهیمی مدیر مزرعه پرورش ماهی شرکت برکه طلایی که در اجرای این تحقیق ما را یاری نموده اند تشکر و قدردانی بعمل می آید.

منابع

- ۱- آذری تاکامی، ق. (۱۳۷۶): مدیریت بهداشتی و روش های پیشگیری و درمان بیماری های ماهی انتشارات پریور . صفحات ۱۶ تا ۳۹.
- ۲- اسویودوا، ز. ویسکوسودا، ب. (۱۹۹۱): تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها و مسمومیت های ماهی ترجمه شریف روحانی، م.، ۱۳۷۴ . انتشارات معاونت تکنیک و پرورش آبزیان، اداره آموزش و ترویج . صفحات ۱۲۰ تا ۱۳۰.
- ۳- پیغان، ر. (۱۳۸۱): تغییرات پاتولوژیک آبشنش های ماهی کپور پس از حمام ماهیها با دوز های درمانی سولفات مس. مجموعه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالیی ایران مشهد. صفحه ۴۰.
- ۴- پست، ج. (۱۹۹۹): بهداشت ماهی با تجدید نظر و اصلاحات. ترجمه: ستاری، م و میار، م.، ۱۳۷۸.
- ۵- سدویک، ا. (۱۹۸۹): راهنمای پرورش و تکثیر ماهی قزل الای. ترجمه مشائی، ع.، ۱۳۷۹. انتشارات نوربخش. صفحات ۸۲ تا ۵۷.

این بررسی نشان داد که در تمامی غلظتهاي درمانی سولفات مس ضایعات آبشنشی به طور کم و بیش وجود دارد لذا در هنگام درمان بایستی حداقل استرس به ماهیها وارد شده و اکسیژن دهی به آب افزایش یابد زیرا سولفات مس به دلیل آسیب آبشنشی کارآیی آبشنش ها را کاهش می دهد (۳). آثار تغییرات پاتولوژیک در آبشنش ماهی قزل الای رنگین کمان متعاقب حمام دادن با دوز های درمانی پرمنگنات پتاسیم نشان دهنده ایجاد ضایعات حاد پیشرونده و برگشت پذیر در بافت برانش این ماهی بود (۱۵).

Danayadol و همکاران (۱۹۹۹) نشان دادند که استفاده از غلظتهاي ۱۰ میلی گرم در لیتر (ppm) از سولفات مس در شوری ۳۰ گرم در لیتر (ppt) بمدت ۳۰ دقیقه و ۲-۳ میلی گرم در لیتر پرمنگنات پتاسیم بمدت ۱۰ دقیقه در شوری ۱۵ گرم در لیتر می تواند برای کنترل فلکسی باکتر ماریتیموس (*Flexibacter maritimus*) و بیماری های فلکسی باکتریایی در ماهی گروپر (Grouper) بطور موققیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرد. برایه مطالعات آسیب شناسی اشاره شده ای فوق یکسری آسیب های برگشت پذیر و چه بسا برگشت ناپذیر بافتی در استفاده از دوز های مختلف برخی از این مواد در ماهیان مختلف مشاهده شده است که برایه آن می توان آثار سوء این مواد راروی فاکتور های رشد ماهیان توجیه نمود. بنابراین با استناد به مطالعات مذکور و دستاوردهای این تحقیق، پیشنهاد اولویت استفاده از ترکیبات فوق الا شاره از نظر مدیریت بهداشتی به ترتیب: ۱- دزوجرم ۲A - ۲- سولفات مس، ۳- پرمنگنات پتاسیم، می باشد که در برنامه ریزی کنترل و پیشگیری از عوامل بیماریزا در مزارع پرورش ماهی قزل الای رنگین کمان باید به آن توجه شود. یادآور می شود دزوجرم ترکیبی از آمونیوم چهارتایی، فرمالین غیرقابل ترسیب و متیلن بلو است لذا با توجه به نبود اطلاعات کافی مکانیسم اثر تحریکی یا تحلیلی ماده ضد عفونی کننده یادشده بر عملکرد

- آبشنش‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان متعاقب حمام دادن با دوزهای درمانی پرمنگنات پتاسیم. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه. ۸۹ صفحه.
- ۱۶- نیو، ا. (۱۹۸۷): غذا و تغذیه ماهی و میگو. ترجمه: متین فرع و دادگر، ش. ۱۳۷۹. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران، مدیریت اطلاعات علمی و روابط بین الملل. ۳۳۷ صفحه.
- ۱۷- ودمیر، ج. (۱۹۹۶): فیزیولوژی ماهی در سیستمهای پرورش متراکم. ترجمه: مشایی، ع. ۱۳۷۹. انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات ۱۳۹۷ تا ۹۷.
- 18- Danayadol, Y., Krajaiwong; V., Ruangpan, L., (1999): Effects of Potassium Permanganate and Copper Sulfate for Control Flexibacter maritimus. P.175-179.
- 19- Duncan, T.O., (1978): The use of potassium permanganate in fisheries: A literature review. Available from the National Technical Information Service, Fish and Wildlife Service, Division of Fishery Research, Report No. FWS-LR-74-14 (Revised) 54
- 20- -Francis, R; R.E.Klinger,. (2002): Use of the potassium permanganate to control external infections of Ornamental fish.
- 21- Klontz, G.W., (1979): Fish for the future: Concepts and methods of intensive aquaculture. Pub: University of Idaho, January 1, 1991. 192p.
- 22- Lenove, S.C., Greenberg, A. E., Trussell, R., (1989): Standard methods for the examination of water and wastewater, American Public Health Association, Washington, D.C. pp.462-469.
- 23- Levine, G., Meade, T. L., (1976): The effects of disease treatment on nitrification in closed system aquaculture. Proceedings from the 7th Annual Meeting of the World Mariculture Society, J.W. Avault Jr. (editor), p. 483-493.

- ۶- سلطانی، م. (۱۳۸۰): بیماریهای آزاد ماهیان انتشارات دانشگاه تهران. صفحات ۵۴ تا ۵۵.
- ۷- سالک، بی. (۱۳۷۹): تغذیه آبزیان پرورشی (ماهیان سرد آبی، ماهیان گرم آبی و میگو). انتشارات اسلامی. صفحات ۱۲۷ تا ۱۲۵.
- ۸- شفرد، ج. برمیچ، ا. (۱۹۹۲): پرورش متراکم ماهی (جلد یک). ترجمه: ستاری، م و معتمد، م. ۱۳۸۱. انتشارات دانشگاه گیلان. صفحات ۶۴ تا ۷۱.
- ۹- شرکت سانت (۱۳۸۱): استفاده از ترکیبات دزو جرم در آبزی پروری. سمینار علمی و ترویجی، انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات ۱ تا ۶.
- ۱۰- رابرت، آ. شفرد، س. (۱۹۹۷): بیماریهای آزاد ماهیان و قزل آلای. ترجمه: جلالی، ب. میار، م. ۱۳۷۸. انتشارات نوربخش. صفحات ۴ تا ۲۰.
- ۱۱- عبدالی، ک. (۱۳۸۵): اطلاعات داروهای کاربردی در بیماریهای آبزیان. انتشارات نیکخواه. ۴۵۰ صفحه.
- ۱۲- کرمی، ع. اسد زاده، ع. مشایی، ع. (۱۳۷۷): پرورش ماهیان سرد آبی (عمومی). انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات ۹۷ تا ۱۰۵.
- ۱۳- گادرد، ا. (۱۹۹۵): مدیریت تغذیه در پرورش متراکم آبزیان. ترجمه: علیزاده، م و دادگر، ش. ۱۳۸۰. انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات ۷۷ تا ۵۷.
- ۱۴- مخیر، ب. (۱۳۸۵): بیماری ماهیان پرورشی. انتشارات دانشگاه تهران. صفحه ۴۴۷.
- ۱۵- مهران، ا. (۱۳۸۲): بررسی تغییرات پاتولوژیک

- 24- Svobodova, A.R.; lloyd, J., Machova, J., (1993): Water quality and fish Health. FAO. pp.27-32
- 25- Terry, D., Bills, F., Leif, M.G., Howe, E., (1993): Sensitivity of Juvenile Striped Bass Chemicals Used in Aquaculture. Publisher: U.S. Fish and Wildlife Service, 2004:9150440

Archive of SID