

مقایسه فاکتور انباشتگی زیستی فلزات سنگین در دو گونه ماهی کپورچه (*Carassius gibelio*) و اردک ماهی (*Esox lucius*) تالاب انزلی

چکیده

امروزه مطالعه در مورد جذب فلزات سنگین در موجودات آبی به دلیل افزایش این فلزات در اثر فعالیت‌های انسانی و سرازیر شدن آن به محیط‌های آبی تشدید شده است. درک اثرات سمی فلزات بر ماهیان مشکل است به این دلیل که ماهیان مهاجرت طولانی دارند، بنابراین غلظت و طول دوره در معرض قرار گرفتن به فلزات، در سیکل زندگی ماهیان متفاوت می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه فاکتور انباشتگی زیستی فلزات (کادمیوم، مس، روی، سرب و کروم) در بافت‌های دو گونه ماهی تالاب انزلی در دو ترازهای مختلف غذایی بوده است. بدین منظور نمونه‌برداری از تالاب انزلی در تابستان ۱۳۸۸ صورت پذیرفت. با توجه به مقایسه فاکتور تجمع زیستی کمترین BAF در کپور چه بزرگ با تراز غذای همه‌چیزخواری مربوط به بافت ماهیچه (Cr=۲۹۱, Cu=۵۵۴, Pb=۱۹۰, Cd=۱۴۱) به استثناء فلز روی در بافت ماهیچه کپور چه (*Carassius gibelio*) کوچک با BAF=۱۰۲۲ و در اردک ماهی (*Esox lucius*) با تراز گوشت‌خواری کمترین BAF (Bioaccumulation factor) در بافت ماهیچه سایز بزرگ (Cr=۳۰۵, Cu=۶۸۶, Zn=۱۰۷۰, Cd=۱۳۴) به استثناء فلز سرب با BAF=۱۵۵ که در بافت ماهیچه سایز کوچک اردک ماهی مشاهده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده به‌طور کلی استنباط می‌شود که تراز غذایی گوشت‌خواری دارای BAF نسبت به تراز غذایی همه‌چیزخواری کمتر می‌باشد.

واژگان کلیدی: فاکتور انباشتگی زیستی، ترازهای غذایی، فلزات سنگین، ماهی، تالاب انزلی،

اردک ماهی، کپور چه.

مقدمه

ترکیب اکوسیستم‌های خشکی و دریایی موجب پدیدار شدن زیستگاه‌هایی می‌شوند که به آنان تالاب یا مرداب می‌گویند (سرتاج و همکاران، ۱۳۸۳). تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی کشور به‌مثابه سرمایه‌های گران‌قدرند که در تنظیم سطح آب‌های زیرزمینی در محیط اطراف، تعدیل اقلیم، بهره‌مندی‌های چندگانه اهالی اعم از شکار و صید پرندگان آبی و ماهیان، استفاده از گیاهان آبی و به‌عنوان راه‌های آبی تنها بخشی از ویژگی‌های آن‌ها است (رحیمی و رئیس، ۱۳۸۷). ایران دارای حدود ۴۰ تالاب با ارزش است که در گردهمایی سال ۱۳۴۹ کنوانسیون رامسر تالاب انزلی به‌عنوان یک تالاب بین‌المللی معرفی شد.

فلزات سنگین یکی از خطرناک‌ترین موادی هستند، که توانایی تجمع در بیوتا را دارد (Caggiano et al., 2005; Linde et al., 1998). ارگانسیم‌های آبی به‌طور طبیعی در معرض فلزات سنگین در محیط زندگی‌شان قرار می‌گیرند (Kalas et al., 2000). توسعه صنایع و افزایش بی‌رویه جمعیت شهرها و روستاها و در پی آن توسعه مناطق کشاورزی و استفاده از کودها و سموم دفع آفات موجب می‌گردد تا مقادیر زیادی

رحیمه برامکی یزدی^۱

محمد رضا رضایی^۲

محمد ابراهیم پور کاسمانی^۳

هادی بابایی^۴

علیرضا پورخباز^۵

۱. کارشناس ارشد آلودگی‌های محیط‌زیست،

دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

۲. گروه محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

بیرجند، بیرجند، ایران

۳. موسسه تحقیقات ملی آب و آبی‌پروری، انزلی،

ایران

*مسئول مکاتبات

r_baramakiyazdi@yahoo.com

کد مقاله: ۱۳۹۴۰۱۰۰۷۴

تاریخ دریافت:

تاریخ پذیرش:

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه است.

فاضلاب‌های صنعتی و شهری و پساب‌های کشاورزی که دارای ترکیبات شیمیایی مختلف خصوصاً عناصر سنگین هستند، وارد اکوسیستم‌های آبی شوند. این آلودگی‌ها از جمله عناصر سنگین پس از ورود به اکوسیستم‌های آبی، در بافت‌ها و اندام‌های آبزیان تجمع یافته و نهایتاً وارد زنجیره غذایی می‌شوند، میزان تجمع عناصر سنگین در آبزیان به‌ویژه در ماهیان تابعی از شرایط اکولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب، نوع عنصر و نوع گونه و فیزیولوژیکی بدن جاندار می‌باشند (فاضلی و همکاران، ۱۳۸۴).


در حال حاضر محصولات دریایی نقش قابل توجهی در تأمین غذای مردم جهان دارند و با شناسایی مطلوبیت و برتری غذایی این فرآورده‌ها بر دیگر مواد پروتئینی روزبه‌روز بر مصرف آن‌ها افزوده می‌شود. افزایش تقاضا برای محصولات دریایی به‌عنوان یک منبع ارزشمند غذایی به‌ویژه در سالیان اخیر موجب رشد و توسعه همه‌جانبه صنعت ماهیگیری، عمل‌آوری و استحصال محصولات دریایی کشورهای واقع در حاشیه دریاها، خلیج‌ها و آب‌های آزاد شده است (ناصری و همکاران، ۱۳۸۴). عناصر سنگین تغییرات قابل ملاحظه‌ای در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی ایجاد کرده و هر یک دارای آثار خاصی در بدن موجودات اند (صباغ کاشانی، ۱۳۸۰). این ترکیبات به علت آثار سمی و توان تجمع زیستی در گونه‌های مختلف آبزیان و نیز به دلیل وارد شدن به زنجیره غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اغلب ماهی‌ها در زنجیره‌های غذایی در تراز بالا قرار می‌گیرند و غلظت بالایی از فلزات سنگین را از آب جذب می‌کنند. برای متابولیسم نرمال در ماهی ضروری است که فلزاتی شبیه مس و روی که باید از آب، غذا و رسوب باشند را جذب کنند. هدف از این تحقیق بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (کادمیوم، مس، روی، سرب و کروم) در بافت عضله گونه‌های مورد مطالعه در تراز مختلف غذایی می‌باشد.

ماهیان مورد بررسی در این تحقیق از منبع مهم پروتئین برای تغذیه ساکنان اطراف تالاب انزلی به شمار می‌روند از این رو فلزات سنگین مورد مطالعه، تهدیدی برای سلامتی ساکنان محسوب می‌شود. گونه‌های ماهی به‌عنوان شاخص بیولوژیک جهت بررسی تغییرات زیست‌محیطی ایجاد شده توسط آلاینده‌های انسانی به‌طور گسترده‌ای استفاده شده‌اند (Tekin -Ozan and Kir *et al.*, 2008). در این تحقیق ماهیان انتخاب شده شامل کپورچه (کاراس) (*Carassius gibelio*)، با تراز غذای همه‌چیزخوار، اردک‌ماهی (*Esox Lucius*) با تراز غذایی گوشت‌خواری می‌باشند (عبدلی، ۱۳۷۸). دلایل انتخاب این گونه ماهی‌ها مقایسه از نظر انباشتگی فلزات سنگین در ترازهای غذایی (همه‌چیزخواری و گوشت‌خواری)، وفور این ماهی‌ها در تالاب و استفاده زیاد از آن‌ها در سبد غذایی مردم می‌باشد. در این تحقیق، علت انتخاب بافت‌های ماهیچه، آب‌شش، کبد، کلیه و روده بر اساس تفاوتشان در فرایندهای انباشتگی زیستی در آنالیزهاست. ماهیچه بافت نهایی در ذخیره فلزات است و به‌عنوان مرجع بکار برده می‌شود با علاوه قسمت عمده‌ی خوراکی ماهی را به خود اختصاص می‌دهد و مطالعه بر روی آن می‌تواند ابزاری در سلامت عمومی باشد، آب‌شش‌ها می‌توانند فلزات سنگین را به‌طور مستقیم از آب و به‌طور غیرمستقیم از مواد غذایی جذب نمایند و محل اولیه جذب فلزات از محیط می‌باشند، چراکه در تماس مستقیم با آب می‌باشند (Ebrahimipour and Mushrifah, 2010; Catsiki and Stroglyoudi, 1999). کلیه در دفع مواد زائد و کبد در فعل‌وانفعالات نقش بسزایی دارد. روده اندامی فعال در انباشتگی سنگین محسوب می‌شود، با وجود اینکه روده ماهی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی شاخص زیستی خوبی برای فلزات حاضر در محیط اطراف ماهی محسوب می‌گردد (Zhang *et al.*, 2007).

مواد و روش‌ها

تالاب انزلی در شمال ایران واقع شده است، مساحت این تالاب ۲۰۰ کیلومترمربع که بین ۲۸' ۳۷° عرض شمالی و ۲۵' ۴۹° طول شرقی قرار گرفته است. این تالاب در جنوب شرقی ساحل دریای خزر نزدیک به شهر انزلی قرار گرفته است و تنوع بالایی از فون و فلور تالابی در آن مستقر شده است. این سیستم آبی از حوزه آب شیرین، آبیگرهای کم‌عمق، باتلاق‌ها و علفزارهای غوطه‌ور فصلی تشکیل شده است (Ramezanpour, 2004). طول متوسط این تالاب ۳۰ کیلومتر، عرض متوسط ۳ کیلومتر و عمق تالاب انزلی متغیر می‌باشد. عمق متوسط آن

حدود ۳ متر می‌باشد. این تالاب از طریق کانالی با عرض ۴۲۶ متر به دریا متصل می‌شود (Jafari, 2009; Asadullayeva and Alekperov, 2007). شکل ۱ موقعیت منطقه مورد مطالعه (تالاب انزلی) را نشان می‌دهد.



شکل ۱: موقعیت منطقه مورد مطالعه (تالاب انزلی).

نمونه‌گیری از کل تالاب انزلی در سال ۱۳۸۸ از طریق تورگوش گیر صورت گرفت. در این تحقیق ماهیان انتخاب شده شامل کپور چه (کاراس) (*Carassius gibelio*), با تراز غذای همه چیزخوار، اردک ماهی (*Esox lucius*) با تراز غذایی گوشت‌خواری می‌باشند (عبدلی، ۱۳۷۸). بعد از نمونه‌گیری زیست‌سنجی (وزن و طول استاندارد) هر نمونه و تعیین سن ماهی کپور چه با استفاده از فلس ماهی و توسط لوپ مدل SMZ2X2B ساخت شرکت نیکون با بزرگنمایی دو برابر (2x) و گونه اردک‌ماهی توسط اندازه‌گیری طول کل و مقایسه با طبقات تعریف شده (عبدلی و نادری، ۱۳۸۷) به‌طور اختصاصی انجام شد. در مرحله بعدی ماهی کالبدشکافی شد و بافت‌های عضله، آب‌شش، کبد، کلیه و روده توسط چاقوی استیلی و بدون آلودگی خارج گردید.

در آزمایشگاه اندام‌های استخراج شده ابتدا وزن گردید، سپس در آون در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۲ ساعت قرار داده شد تا کاملاً خشک گردند. بعد از خارج کردن نمونه‌ها از آون وزن شد و درصد رطوبت نسبی بافت‌های مورد نظر محاسبه گردید.

برای هضم شیمیایی نمونه‌ها، مخلوطی از اسید نیتریک (HNO_3) و اسید پرکلریک ($HClO_4$) استفاده شد. برای هضم هر نمونه، ابتدا یک گرم از هر بافت خشک به‌دقت وزن شد و در ارلن مایر ۱۰۰ میلی‌لیتر قرار داده شد و ۱۰ میلی‌لیتر اسید نیتریک به هر نمونه اضافه گردید. نمونه‌ها در طول شب در آزمایشگاه قرار گرفتند (بدون حرارت دادن) تا به آهستگی هضم گردند (Nussey et al., 2000; Ebrahimpour and Mushrifahet, 2010; Watanabe et al., 1996). روز بعد ۵ میلی‌لیتر اسید پرکلریک (۷۰ درصد) به نمونه‌ها اضافه گردید. سپس نمونه‌ها بر روی حمام شن (Sand bath) در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶ ساعت قرار داده شد تا کاملاً هضم گردند. پس از هضم، نمونه‌ها در هوای محیط قرار داده شدند تا سرد شوند. در پایان ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر به نمونه‌ها اضافه شد (Bahnasawy et al., 2009) و سپس نمونه‌ها فیلتر شدند (فیلتر ۰/۴۵ میکرومتر). در خاتمه پس از آماده‌سازی، میزان فلزات سنگین بافت‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله‌ای اندازه‌گیری شدند. در پایان داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار Minitab (version 15) تجزیه و تحلیل شدند.

نمونه‌برداری از آب در تابستان ۱۳۸۸ در ۱۵ ایستگاه از کل تالاب انجام گرفت. نمونه‌برداری توسط قوطی‌های پلاستیکی استریل شده ۲۵۰ میلی‌لیتری از عمق تقریباً ۵۰ سانتی‌متری از سطح آب صورت پذیرفت. بعد از کدگذاری و اضافه نمودن ۲ سی‌سی اسید نیتریک و رساندن pH

آب به زیر ۲، نمونه‌ها به آزمایشگاه انتقال داده شدند. نمونه‌های آب توسط فیلتر ۰/۴۵ میکرومتر (Cellulose Acetate membrane filter) (MCA grade)، فیلتر شدند. فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، مس، روی و کروم) توسط دستگاه جذب اتمی گرافیتی (۳۰۳۰) تعیین شدند. فرآیند مهمی که توسط مواد شیمیایی بر روی ارگانوسم‌های زنده اثر می‌گذارد انباشتگی زیستی می‌باشد. انباشتگی یک ماده شیمیایی به‌طور مستقیم از محیط معمولاً آب (غلظت زیستی) یا از مصرف مواد غذایی حاوی آن مواد شیمیایی (بزرگ‌نمایی زیستی) در بافت‌های ارگانوسم را انباشتگی زیستی می‌گویند (EPA, 2003). بنابراین، تجمع زیستی به معنای افزایش غلظت مواد شیمیایی باگذشت زمان در ارگانوسم‌های زنده در مقایسه با غلظت مواد شیمیایی در محیط می‌باشد. فاکتور انباشتگی زیستی (The bioaccumulation factor (BAF)) از نسبت فلزات سنگین در بافت ماهی ($\mu\text{g g}^{-1}$) به غلظت فلزات در آب (mg L^{-1}) تعیین می‌شود. در این مطالعه فاکتور زیستی از تقسیم میانگین فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان به غلظت فلزات در آب تعیین شده است (Harrad and Smith *et al.*, 1997).

از آنجایی که تمام استانداردهای جهانی در تعیین حداکثر غلظت مجاز برای سلامت انسان از وزن تر استفاده می‌کنند لذا برای تبدیل وزن خشک به وزن تر (میکروگرم در گرم) از رابطه ۱ استفاده شده است.

$$\text{رابطه ۱: } \text{وزن تر} = \text{وزن خشک} \times (1 - \text{درصد رطوبت})$$

نتایج

نتایج حاصل از زیست‌سنجی ماهیان صیدشده در جدول ۱ ارائه شده است. گونه اردک‌ماهی و کپورچه در دو سایز کوچک و بزرگ تفکیک شدند که نتایج حاصل از بیومتری آن‌ها در جدول ۱ آورده شده است. بیش‌ترین طول کل مربوط به گونه اردک‌ماهی سایز بزرگ ($296/5 \pm 18/3$ میلی‌متر) و بیش‌ترین وزن مربوط به کپورچه سایز بزرگ ($314/2 \pm 150/3$ گرم) می‌باشد و کمترین طول و وزن مربوط به گونه کپورچه سایز کوچک با $200/8 \pm 6/6$ میلی‌متر و $134/17 \pm 11/60$ گرم بوده است. ماهیان مورد مطالعه در دامنه سنی یکسانی انتخاب گردید که مدت‌زمان در معرض قرارگیری با فلزات سنگین در دامنه زمانی یکسانی باشد. تعیین سن ماهی با استفاده از فلس گونه کپورچه و برای گونه اردک‌ماهی با توجه به طول کل صورت پذیرفت.

مختصات جغرافیایی ۱۵ ایستگاه نمونه‌برداری آب در جدول ۲ ارائه گردیده است. میانگین غلظت کادمیوم در آب $1/49$ میکروگرم بر لیتر، میانگین غلظت روی در آب $18/96$ میکروگرم بر لیتر، میانگین غلظت مس در آب 13 میکروگرم بر لیتر، میانگین غلظت سرب در آب $5/68$ میکروگرم بر لیتر و میانگین غلظت کروم در آب برابر $2/23$ میکروگرم بر لیتر بود. غلظت فلزات سنگین در ایستگاه‌های مختلف به‌صورت روی < مس < سرب < کروم < کادمیوم بود.

جدول ۱: نتایج حاصل از زیست‌سنجی ماهیان (کپورچه (*Carassius gibelio*) و اردک‌ماهی (*Esox lucius*)) در تالاب

انزلی (۱۳۸۸).

اردک‌ماهی		کپورچه		مشخصات
سایز کوچک (n=۱۵)	سایز بزرگ (n=۱۵)	سایز کوچک (n=۲۱)	سایز بزرگ (n=۲۱)	
$176 \pm 30/71$	$290 \pm 33/8$	$134/17 \pm 11/60$	$314/2 \pm 150/3$	وزن (گرم)
$271/5 \pm 29/1$	$309/5 \pm 1/5$	$164/2 \pm 7/1$	$212/3 \pm 33$	طول استاندارد (میلی‌متر)
$283/5 \pm 17/7$	523 ± 81	$186/3 \pm 6$	$240/5 \pm 24/3$	طول چنگالی (میلی‌متر)
$296/5 \pm 318$	355 ± 186	$200/8 \pm 66$	$262/9 \pm 35/5$	طول کل (میلی‌متر)
< 3	> 3	< 3	> 3	سن (سال)

جدول ۲: میانگین، انحراف معیار و دامنه غلظت فلزات سنگین (میکروگرم در لیتر) در ایستگاه‌های نمونه‌برداری آب در تالاب انزلی (۱۳۸۸) انزلی (۱۳۸۸).

فلزات	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر
کادمیوم	۱/۴۹	۱/۳۶	۰/۳	۴/۴
مس	۱۳	۹/۰۸	۶	۴۲
روی	۱۸/۹۶	۱۲/۵۶	۵/۷	۴۵/۷۲
سرب	۵/۶۸	۵/۵۹	۰/۶۷	۱۸/۴۵
کروم	۲/۲۳	۱/۴۳	۰/۸	۵/۷

میانگین میزان کادمیوم در بافت‌های مختلف ماهیان تالاب انزلی در جدول ۳ و ۴ نشان داده شده است. نتایج حاصله مبین حداکثر میزان جذب و انباشتگی کادمیوم در کبد اردک‌ماهی با میانگین ۱/۹۶ میکروگرم در گرم و حداقل میزان جذب و انباشتگی آن در عضله اردک‌ماهی بزرگ (۰/۲۰) میکروگرم در گرم) بوده است و روند تغییرات به صورت کبد < روده < کلیه < آب‌شش < ماهیچه به جز در کپور چه کوچک < کبد < کلیه < روده < آب‌شش < ماهیچه می‌باشد.

میانگین میزان مس در بافت‌های مختلف ماهیان تالاب انزلی در جدول ۳ و ۴ نشان داده شده است. نتایج حاصله مبین حداکثر میزان جذب و انباشتگی مس در کبد در گونه اردک‌ماهی کوچک و کپور چه بزرگ ترتیب میانگین ۲۴/۲ میکروگرم در گرم و حداقل میزان جذب و انباشتگی آن در عضله کپور چه بزرگ (۷/۲ میکروگرم بر گرم) ماهیان بوده است و روند تغییرات در گونه‌های کپور چه بزرگ و اردک‌ماهی کوچک به صورت کبد < روده < کلیه < آب‌شش < عضله می‌باشد و این روند در گونه کپور چه کوچک و اردک‌ماهی بزرگ به صورت کبد < کلیه < روده < آب‌شش < عضله می‌باشد.

میانگین میزان روی در بافت‌های مختلف ماهیان تالاب انزلی در جدول ۳ و ۴ نشان داده شده است. نتایج حاصله مبین حداکثر میزان جذب و تجمع مس در کبد اردک‌ماهی سبزه بزرگ با میانگین ۴۹/۶۴ میکروگرم در گرم و حداقل میزان جذب و تجمع آن در عضله گونه کپور چه کوچک با میانگین ۱۹/۳۷ میکروگرم در گرم بوده است و روند تغییرات در چهار گونه متفاوت و به صورت ذیل می‌باشد: کپور چه بزرگ < آب‌شش < کبد < کلیه < روده < ماهیچه و در گونه کپور چه کوچک به صورت آب‌شش < کلیه < روده < ماهیچه می‌باشد.

میانگین میزان سرب در بافت‌های مختلف ماهیان تالاب انزلی در ۳ و ۴ نشان داده شده است. حداکثر میزان جذب و انباشتگی سرب در کلیه و کبد اردک‌ماهی بزرگ (۵/۴ میکروگرم در گرم) و حداقل میزان جذب و انباشتگی آن در ماهیچه کپور چه بزرگ با میانگین ۱/۰۸ میکروگرم در گرم ماهیان بوده است و روند تغییرات در چهار گونه متفاوت بود، کپور چه بزرگ < کلیه < آب‌شش < روده < ماهیچه و در گونه کپور چه کوچک به صورت آب‌شش < کبد < روده < کلیه < ماهیچه و در اردک‌ماهی سبزه بزرگ و کوچک < کلیه < آب‌شش < روده < ماهیچه مشاهده شد.

میانگین میزان کروم در بافت‌های مختلف ماهیان تالاب انزلی در ۳ و ۴ نشان داده شده است. حداکثر میزان جذب و تجمع کروم در کبد اردک‌ماهی سبزه بزرگ با میانگین ۴/۶۸ میکروگرم در گرم و حداقل میزان جذب و انباشتگی آن در ماهیچه اردک‌ماهی بزرگ (۰/۶۱ میکروگرم در گرم وزن خشک ماهیان بوده است و روند تغییرات این فلز در گونه کپور چه بزرگ و اردک‌ماهی بزرگ به صورت کبد < کلیه < آب‌شش < روده < ماهیچه می‌باشد و در گونه کپور چه کوچک و اردک‌ماهی کوچک به صورت کبد < کلیه < آب‌شش < ماهیچه مشاهده گردید.

فاکتور انباشتگی زیستی در ترازهای غذای مختلف در جدول ۳ و ۴ نشان داده شده است. بالاترین فاکتور انباشتگی زیستی برای فلز کادمیوم در کبد گوشت‌خوار بالارزش ۱۳۵۰ و کمترین ارزش متعلق به ماهیچه گوشت‌خوار سبزه بزرگ ۱۳۴ تعیین شد. بالاترین فاکتور انباشتگی زیستی

برای فلز مس در کبد (۱۸۶۳) گوشت خوار سایز بزرگ و همچنین کمترین فاکتور انباشتگی زیستی مس در ماهیچه همه چیز خوار سایز بزرگ (۵۵۴) مشاهده گردید. بالاترین فاکتور انباشتگی زیستی روی در کبد (۲۵۳۰) گوشت خوار سایز بزرگ و کمترین انباشتگی در ماهیچه (۱۰۲۲) همه چیز خوار سایز کوچک و همچنین بالاترین انباشتگی زیستی سرب در کلیه (۹۵۱) گوشت خوار سایز بزرگ و کمترین در ماهیچه گوشت خوار سایز کوچک (۱۷۵) و بیشترین فاکتور انباشتگی فلز کروم در کبد گوشت خوار سایز بزرگ (۲۳۴۰) و کمترین انباشتگی در ماهیچه گوشت خوار سایز بزرگ (۳۰۵) مشاهده گردید.

جدول ۳: میانگین فلزات سنگین (میکروگرم بر گرم وزن خشک) و فاکتور تجمع زیستی (BAF) کادمیوم، روی، سرب، مس و کروم در بافت‌های مختلف ماهی کپورچه (*Carassius gibelio*) (با تراز غذایی همه چیز خواری) در تالاب انزلی (۱۳۸۸).

فلزات	کپورچه کوچک					کپورچه بزرگ				
	ماهیچه	آب شش	کلیه	کبد	روده	ماهیچه	آب شش	کلیه	کبد	روده
کادمیوم	میانگین	۰/۲۹	۰/۴۲	۰/۶۵	۱/۰۵	۰/۷	۰/۲۱	۰/۴۴	۰/۹	۰/۸
	BAF	۱۹۵	۲۸۲	۴۳۶	۷۵۰	۴۷۰	۱۴۱	۲۹۵	۶۰۴	۵۳۷
سرب	میانگین	۱/۳۳	۳/۱۲	۱/۹۵	۳/۱	۲/۳۳	۱/۰۸	۲/۶۷	۳/۹۲	۲/۸۳
	BAF	۲۳۴	۵۴۹	۳۴۳	۵۴۶	۴۱۰	۱۹۰	۴۷۰	۶۹۰	۴۹۰
مس	میانگین	۷/۴۴	۱۱/۹۳	۱۷/۰۵	۲۰/۵	۱۲/۲	۷/۲	۱۴/۰۲	۱۶/۹۲	۱۷/۲
	BAF	۵۷۳	۹۱۸	۱۳۱۲	۱۵۷۷	۹۳۸	۵۵۴	۱۰۷۹	۱۳۰۲	۱۳۲۳
روی	میانگین	۱۹/۳۷	۳۱/۰۳	۲۸	۲۷/۳۵	۲۵/۸۸	۲۲/۲۴	۲۷/۲۹	۲۳/۹۲	۲۳/۱۸
	BAF	۱۰۲۲	۱۶۳۷	۱۴۷۷	۱۴۴۳	۱۳۶۵	۱۱۷۳	۱۴۳۹	۱۲۶۲	۱۲۲۳
کروم	میانگین	۰/۷۸	۰/۹۶	۲/۵	۲/۷	۱/۱۳	۰/۶۵	۱/۴۴	۲/۶	۱/۰۵
	BAF	۳۵۰	۴۳۰	۱۱۲۱	۱۲۱۱	۵۰۷	۲۹۱	۶۴۶	۱۱۶۶	۴۷۱

در تحقیق حاضر همبستگی بین غلظت فلزات سنگین در بافت‌های مختلف و سایزهای مختلف ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج در جداول ۵ و ۶ آورده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی‌داری ($P < 0/05$) را بین میانگین غلظت فلزات سنگین و سایز ماهی در دو گونه (فقط در چند مورد استثناء) نشان نمی‌دهد.

جدول ۴: میانگین فلزات سنگین (میکروگرم بر گرم وزن خشک) و فاکتور تجمع زیستی (BAF) کادمیوم، روی، سرب، مس و کروم در بافت‌های مختلف اردک‌ماهی (*Esox lucius*) (با تراز غذایی گوشت‌خواری) در تالاب انزلی (۱۳۸۸).

فلزات	اردک‌ماهی کوچک				اردک‌ماهی بزرگ			
	ماه‌یچه	آب‌شش	کلیه	کبد	ماه‌یچه	آب‌شش	کلیه	کبد
کادمیوم	۰/۲۵	۰/۶۵	۰/۹۲	۱/۹۶	۱/۲۸	۰/۲	۰/۶۳	۱
	۱۶۸	۴۳۶	۶۱۷	۱۳۱۵	۸۵۹	۱۳۴	۶۷۱	۱۳۱۵
سرب	۰/۸۸	۳/۱	۳/۷۲	۳/۳	۲/۹۶	۱/۲۲	۳/۷۳	۵/۴
	۱۵۵	۵۴۶	۶۵۵	۵۸۱	۵۲۱	۲۱۵	۶۵۷	۹۵۱
مس	۹/۳۲	۱۲/۸۹	۱۹/۸۴	۲۲/۸۸	۱۸/۴۵	۸/۹۱	۱۲/۸۹	۲۰/۸
	۷۱۷	۹۹۲	۱۵۲۶	۱۷۶۰	۱۱۰۰	۶۸۶	۹۵۸	۱۶۰۰
روی	۲۸/۴	۳۳/۵۲	۴۱/۶۴	۴۶/۵	۲۱/۹۵	۲۰/۲۹	۲۹/۱۷	۳۶/۹۲
	۱۴۹۸	۱۷۹۰	۲۱۹۶	۲۴۵۳	۱۱۵۸	۱۰۷۰	۱۵۳۹	۱۹۴۷
کروم	۰/۷۳	۱/۴۵	۳/۹۶	۴/۳۸	۱/۶۷	۰/۶۱	۱/۷۴	۲/۰۸
	۳۶۵	۷۲۵	۱۹۸۰	۲۱۹۰	۸۳۵	۳۰۵	۸۷۰	۱۰۴۰

جدول ۵: تفاوت‌های آماری بین فلزات کادمیوم، مس، روی، سرب و کروم در ماه‌یچه، آب‌شش، کلیه، کبد و روده دو سایز ماهی کپور چه (*Carassius gibelio*) در تالاب انزلی (۱۳۸۸).

	کادمیوم		مس		روی		سرب		کروم	
	P-value	T-value	P-value	T-value	P-value	T-value	P-value	T-value	P-value	T-value
ماه‌یچه	ns	۳۲	ns	-۱/۵۲	ns	۱/۰۳	ns	۰/۶۹	ns	-۰/۱۸
آب‌شش	ns	-۱/۹۳	ns	-۱/۱۲	ns	-۰/۷۶	ns	۰/۶۳	ns	-۱/۶۶
کبد	ns	۰/۷۹	ns	-۰/۸۷	ns	-۰/۲۷	ns	۲/۴۳	ns	-۲/۰۰
کلیه	ns	۰/۰۶	ns	-۰/۰۷	ns	۱/۵۹	ns	-۵/۵۷	ns	-۰/۲۳
روده	ns	-۰/۷۳	ns	-۳/۹۴	ns	۱/۶۸	ns	-۱/۲۶	ns	۰/۳۰

جدول ۶: تفاوت‌های آماری بین فلزات کادمیوم، مس، روی، سرب و کروم در ماه‌یچه، آب‌شش، کلیه، کبد و روده دو سایز متفاوت اردک‌ماهی (*Esox lucius*) در تالاب انزلی (۱۳۸۸).

	کادمیوم		مس		روی		سرب	
	P-value	T-value	P-value	T-value	P-value	T-value	P-value	T-value
ماه‌یچه	ns	۱/۹۵	ns	۱/۱۹	ns	۱/۰۵	ns	۱/۷۹
آب‌شش	ns	۰	ns	۰	ns	۰	ns	۰
کبد	ns	۰	ns	۰	ns	۰	ns	۰
کلیه	ns	۰	ns	۰	ns	۰	ns	۰
روده	ns	۰	ns	۰	ns	۰	ns	۰

	۱۵۱	ns	۱۰۶	ns	۴۷	n	۴۳	n	۱۶	آبش
	-۱		-۱		۱	s	.	s	.	ش
ns	۳۸	۱۰۱	۱۸۱	ns	۵۰	n	۴۴	n	۱۰۰	کبد
	-۰	.	-۳		-۰	s	-۰	s	.	
۱۰۵	۹۷	۱۰۱	۱۶۳	ns	۱۸۹	n	۳۹	n	۴۶	کلیه
	.	۲	-۳		.	s	-۰	s	-۰	
ns	۳۸	۱۰۱	۱۸۱	ns	۵۰	n	۴۴	n	۱۰۰	روده
	-۰	.	-۳		-۰	s	-۰	s	.	

جدول ۷: مقایسه حداکثر غلظت مجاز (میکروگرم در گرم وزن تر) فلزات سنگین کادمیوم، مس، روی و سرب و کروم در غذاهای دریایی جهت مصرف انسان.

منبع	کروم	مس	کادمیوم	سرب	روی	استاندارد/ گونه ماهی
Ikem <i>et al.</i> , 2003	-	۳۰	۰/۵	۰/۵	۳۰	FAO
Pourang <i>et al.</i> , 2005A. 2005.B	-	۱۰	۰/۲	-	۱۰۰۰	WHO
Pourang <i>et al.</i> , 2005	-		۰/۲	۲		Germany
Pourang <i>et al.</i> , 2005	-		۰/۱	۱		Switzerland
Viana <i>et al.</i> , 2005	-	۳۰				BMH
Al-Yousuf <i>et al.</i> , 2000	-	۱۰	۰/۲			ANHMC
Alam <i>et al.</i> , 2002	-	۱۰		۱		AFSC
Roméo <i>et al.</i> , 1999	-		۰/۵			CSHPF
Pourang <i>et al.</i> , 2005.B	-	۲۰	۰/۲		۵۰	U.K (MAFF)
Pourang <i>et al.</i> , 2005.B	-		۱-۰/۰۵			Netherlands
Pourang <i>et al.</i> , 2005.B	-	۳۰	۱		۴۰	Newzeoland
Pourang <i>et al.</i> , 2005.B	-	۱۰-۷۰	۵/۵-۰/۲		-۱۰۰۰	Australia
Pourang <i>et al.</i> , 2005.B	-		۰/۲		۴۰	Hong Kong
در مطالعه حاضر	۰/۱۷	۱/۷۴	۰/۰۷	۰/۳۱	۴/۵۴	کپور چه کوچک
در مطالعه حاضر	۰/۱۵	۱/۶۹	۰/۰۵	۰/۲۵	۵/۲۱	کپور چه بزرگ
در مطالعه حاضر	۰/۱۴	۱/۸۶	۰/۰۴	۰/۱۸	۵/۸۴	اردک ماهی کوچک
در مطالعه حاضر	۰/۱۲	۱/۷۷	۰/۰۴	۰/۲۳	۴/۳۴	اردک ماهی بزرگ

بحث و نتیجه‌گیری

فلزات سنگین در محیط‌های آبی به صورت محلول باقی می‌مانند یا متوقف شده، و به سرعت توسط ارگانسیم جذب می‌شوند. آنالیز غلظت فلزات سنگین در نمونه‌های بیوتا در مکان‌های یکسان نشان داده است که انتقال فلزات را در ترازهای مختلف غذایی صورت می‌گیرد (Turkmen et al., 2005). در بین ارگانسیم‌های مختلف آبزی، ماهیان دارای بیشترین تحرک هستند و توانایی مهاجرت به مسافت‌های طولانی را دارند. باین‌حال ماهیان انتخابی در این مطالعه عمدتاً در مناطق تالابی می‌باشند و کمتر به مسافت‌های طولانی مهاجرت می‌کنند. مطالعات فلزات سنگین در ماهی می‌تواند مدرکی دال بر آلودگی در محیط‌های آبی باشد. در بررسی حاضر میزان کادمیوم، روی، مس، سرب و کروم در بافت‌های اردک‌ماهی و کپور چه از تالاب انزلی برآورد شده است.

الگوی تجمع فلزات سنگین در بافت‌های هر دو گونه ماهی انتخابی از تالاب انزلی به ترتیب نزولی صورت ذیل می‌باشد: $\text{مس} < \text{سرب} < \text{کروم} < \text{کادمیوم}$. یک مورد استثناء الگوی پراکنش فلزات در کبد کپور چه سایز بزرگ و اردک‌ماهی سایز کوچک به صورت ذیل بوده است: $\text{روی} < \text{مس} < \text{کروم} < \text{سرب} < \text{کادمیوم}$ که میزان جذب و انباشتگی فلزات با توجه به الگوی ارائه شده توسط دیگر محققین از جمله Yilmaz و همکاران (۲۰۰۹)، و Dalma (۲۰۰۶) و همکاران (۲۰۰۹) منطبق می‌باشد.

میزان فاکتور انباشتگی زیستی توصیفی از میزان غلظت شیمیایی در داخل بدن ارگانسیم به غلظت در محیط اطراف دربرگیرنده آن می‌باشد. میزان فاکتور تجمع زیستی در بافت‌های مختلف دو گونه در دو سایز مختلف گویای این است که کبد در تراز غذایی گوشت‌خواری در سایز بزرگ توانایی بیشتری در تجمع نسبت به سایر بافت‌های ماهیان مورد مطالعه دارد و ماهیچه کمترین توان انباشتگی زیستی را دارد.

توان انباشتگی زیستی کادمیوم، مس، روی و کروم به ترتیب گوشت‌خوار سایز کوچک < گوشت‌خوار سایز بزرگ < همه‌چیزخوار سایز کوچک < همه‌چیزخوار سایز بزرگ و توان انباشتگی فلز سرب به صورت گوشت‌خوار سایز بزرگ < گوشت‌خوار سایز کوچک < همه‌چیزخوار سایز بزرگ < همه‌چیزخوار سایز کوچک. نتیجه تحقیق نشان‌دهنده این است که سایز کوچک توان انباشتگی بیشتری فلزات سنگین نسبت به سایز کوچک دارند. اما در مطالعه حاضر تفاوت معنی‌داری ($p > 0.05$) بین میانگین غلظت فلزات سنگین و سایز ماهی بین دو گونه فقط در چند مورد استثناء مشاهده نشد، تفاوت معنی‌داری بین غلظت سرب و سایز ماهی در کلیه ($p < 0.01$) و بین غلظت مس و سایز ماهی در روده ($p < 0.05$) گونه کپور چه مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین غلظت روی و سایز ماهی در ماهیچه ($p < 0.05$)، بین غلظت سرب و سایز ماهی در کلیه ($p < 0.01$)، بین غلظت کروم و سایز ماهی در کلیه ($p < 0.05$) و بین غلظت سرب و سایز ماهی در کبد ($p < 0.01$) در گونه اردک‌ماهی مشاهده گردید. نتایج این مطالعه برخلاف نتایج به‌دست‌آمده با Klavins و همکاران (۲۰۰۹) و Kojadinovic و همکاران (۲۰۰۷) بوده است. از دلایل نتایج به‌دست‌آمده نقص فرضیه و نتیجه بعضی از محققین می‌توان به دلیل تأثیرگذاری عواملی چون نوع گونه، خصوصیات فیزیولوژیکی و اکولوژیکی، الگوهای تغذیه‌ای متفاوت و زمان رشد ماهی اشاره نمود.

غالب نظرات بر آن است که کبد ذخیره‌گاه عناصر بوده و بیشترین میزان عناصر سنگین در کبد انباشتگی می‌یابند (Yilmaz et al., 2009) و کمترین میزان در بافت ماهیچه یافت می‌شود (فاضلی و همکاران، ۱۳۸۴؛ Ebrahimpour and Mushrifah, 2010). تفاوت غلظت فلزات سنگین در بافت‌های گوناگون ماهیان می‌تواند ناشی از متغیر بودن توان فلزات سنگین در زمینه غلبه بر پیوندهای فلزی پروتئین‌ها نظیر متالوتیونین‌ها (گروه وسیعی از پروتئین‌ها با وزن مولکولی پایین هستند که در تنظیم کاتیون‌های دو بار مثبت نقش دارند. در این راستا هرگاه موجود آبزی، مانند ماهی در معرض فلزات کمیاب ضروری و غیرضروری قرار گیرد، تولید متالوتیونین افزایش می‌یابد، که این پروتئین به‌عنوان مارکرهای زیستی محسوب می‌شوند) باشد. همچنین تفاوت نیازهای اکولوژیکی و فعالیت‌های متابولیک ماهیان می‌تواند به‌عنوان عامل‌های مهم دیگری تلقی شود (Canli and Atli, 2003؛ امینی رنجبر و ستوده نیا، ۱۳۸۴). فلزات سنگین اندام هدف خود را بر اساس میزان فعالیت متابولیک آن انتخاب

می‌کنند، علت انباشتگی بیشتر فلزات در بافت‌هایی نظیر کبد، کلیه و آبشش‌ها را در مقایسه با بافت ماهیچه (با فعالیت متابولیک کمتر) و همچنین میزان چربی بافت‌ها نیز می‌تواند عامل مهمی در انباشتگی آلاینده‌ها در اندام‌های مختلف تفسیر می‌نماید (امینی رنجبر و ستوده نیا، ۱۳۸۴).

در این مطالعه غلظت کادمیوم، مس، روی و سرب در ماهیچه دو گونه ماهی تالاب انزلی برای بررسی امکان انتقال این فلزات به جمعیت‌های انسانی از طریق مصرف انسانی مورد بررسی قرار گرفت. برای هدف این مقایسه وزن تر محاسبه گردید. که با توجه به محاسبات انجام شده، انباشتگی فلزات سنگین در بافت ماهیچه دو گونه ماهیان مورد مطالعه از تالاب انزلی پایین‌تر از سطح نگرانی بین‌المللی می‌باشد و ظاهراً در حدی نیست که خطرات بالقوه‌ای برای مصرف‌کنندگان داشته باشد، و یا در حدی نیست که آسیب جدی به سیستم‌های بیولوژیکی ماهیان وارد نماید. غلظت پایین و قابل توجه مس و روی در مقایسه با استانداردهای جهانی احتمالاً می‌تواند به سبب جذب شیمیایی فلز مس و روی با ترکیب‌های موجود در بافت عضله ماهیان در پایین‌ترین سطح باشد. کروم معمولاً به‌عنوان آلوده‌کننده در ماهی در آزمایشات معمولاً به‌عنوان هدف بررسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اطلاعات حاضر برای اهداف مقایسه‌ای برای این عنصر وجود ندارد (Storelli et al., 2005). نتیجه‌گیری کلی اینکه این محاسبات نشان‌دهنده عدم آلودگی شدید منطقه مذکور به عناصر و به تبع آن کمی انباشتگی این عنصر در عضله ماهیان مورد مطالعه می‌باشد. ولی ضروری است تدبیری اندیشه گردد تا با اعمال مدیریت صحیح و قوی بتوان از ورود آلاینده‌های مختلف به این اکوسیستم با ارزش جلوگیری به عمل آید و نهایتاً بر درصد اطمینان از سلامت ماهی و سلامت مصرف‌کننده انسان افزود.

با توجه به روند افزایش فعالیت‌های انسانی در سواحل تالاب انزلی و ورود آلاینده‌های مختلف به اکوسیستم تالاب و به مخاطره افتادن حیات آبریان و همچنین نیاز روزافزون و وابستگی انسان برای تأمین مواد غذایی باید تمعیدات لازم جهت کاهش ورود آلاینده‌ها به اکوسیستم اندیشید.

منابع

- امینی رنجبر، غ. ر. و ستوده نیا، ف.، ۱۳۸۴. تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طلائی (*Mugil auratus*) در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریکی (طول استاندارد، وزن، سن و جنسیت). مجله علمی شیلات. سال چهاردهم. شماره ۳. ۱۵-۱.
- رحیمی، ا. و رئیس، م. ۱۳۸۷. تعیین میزان سرب و کادمیوم در گوشت ماهیان صیدشده از تالاب چغارخور استان چهارمحال بختیاری. مجله دامپزشکی ایران. دوره چهارم شماره ۴. صفحات ۸۳-۷۹.
- سرتاج، م.، فتح‌اللهی دهکردی، ف. و فیلی زاده، ی.، ۱۳۸۳. بررسی منابع آلاینده، توان خودپالایی و عملکرد تالاب انزلی در کاهش و حذف آلاینده‌های صنعتی، کشاورزی و شهری. اولین کنگره ملی مهندسی عمران.
- شهریاری، ع.، ۱۳۸۴. اندازه‌گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در بافت خوراکی ماهیان شوریده و سرخ‌خلیج فارس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره هفتم. صفحات ۶۷-۶۵.
- صادقی راد، م.، امین رنجبر، غ. ر.، ارشد، ع. و جوشیده، ه.، ۱۳۸۲. بررسی میزان تجمع روی و مس در بافت عضله و خاویار تاسماهی (*A. Persicus*) و ازون برون (*A. stellatus*) حوضه جنوبی دریای خزر پژوهش و سازندگی. صفحات ۵۱-۵۵.
- صباغ کاشانی، آ.، ۱۳۸۰. تعیین میزان برخی فلزات سنگین در عضله، کبد، کلیه، آبشش و تخمدان ماهی کفال (*Liza aurata*) سواحل جنوبی دریای خزر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
- عبدلی، ا.، ۱۳۷۸. ماهیان آب‌های داخلی ایران. چاپ اول، انتشارات نقش مانا. صفحه ۳۷۷.
- عبدلی، ا.، نادری، م.، ۱۳۷۸. تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبریان. صفحه ۲۳۷.
- فاضلی، م. ش.، ابطحی، ب. و صباغ کاشانی، آ.، ۱۳۸۴. سنجش تجمع فلزات سرب، نیکل و روی دریافت‌های ماهی کفال (*Liza aurata*) سواحل جنوبی دریای خزر. مجله علمی پژوهشی شیلات. صفحات ۶۵-۷۸.
- کریمی، آ.، یزدان داد، ح. و اسماعیلی، ع.، ۱۳۸۶. بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام‌های باکلان بزرگ *Phalacrocorax carbo* در تالاب انزلی. محیط‌شناسی، سال سی و سوم، شماره ۴۳. صفحه ۹۲-۸۳.

ناصری، م.، رضایی، م.، عابدی، ع. و افشار نادری، ا.، ۱۳۸۴. سنجش مقادیر برخی عناصر سنگین (آهن، مس، روی، منیزیم، منگنز، جیوه، سرب و کادمیوم) در بافت‌های خوراکی و غیرخوراکی سواحل بوشهر (*Liza dussumieri*) ماهی کفال پشت سبز. زمستان و پاییز ۳. شماره ۴. صفحات ۵۹-۶۷.

Al-Yousuf, M. H., El-Shahawi, M. S. and Al-Ghais, S. M., 2000. Trace metals in liver, skin and muscle of *Lethrinus lentjan* fish species in relation to body length and sex. *Science of the Total Environment*. 256: 87-94.

Asadullayeva, E. and Alekperov, I., 2007. Free-living ciliates of the Anzali Wetland of the Caspian Sea. *Turkish Journal Zoology*. 31: 143-149.

Caggiano, R., Sabia, S., D'Emilio, M., Macchiato, M., Anastasio, A., Ragosta, M. and Paino, S., 2005. Metal levels in fodder, milk, dairy products, and tissues sampled in ovine farms of Southern Italy. *Environmental Research* 99, 48-57.

Canli, M. and Atli, G., 2003. The relationships between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. *Environmental Pollution*. 121: 129-136.

Catsiki, A. V. and Stroglyoudi, E., 1999. Survey of metal levels in common fish species from Greek waters. *Sci. Total. Environ.* 237:387-400.

Dalman, O., Demirak, A. and Balç, A., 2006. Determination of heavy metals (Cd, Pb) and trace elements (Cu, Zn) in sediments and fish of the Southeastern Aegean Sea (Turkey) by atomic absorption spectrometry. *Food Chemistry*. 95: 157-162.

Ebrahimipour, M. and Mushrifah, I., 2010. Seasonal Variation of Cadmium, Copper, and Lead Concentrations in Fish from a Freshwater Lake. *Biological Trace Element Research*. (10.1007/s12011-009-8596-2).

EPA, 2003. Methodology for deriving ambient water quality criteria for the protection of human health (2000). Technical Support Document Volume 2: Development of National Bioaccumulation Factors: EPA-822-R-03-030.

Harrad, S. J. and Smith, D. J. T., 1997. Bioaccumulation Factors (BAFs) and Biota to Sediment Accumulation Factors (BSAFs) for PCBs in pike and eels. *Environmental Science and Pollution Research* 4.

Ikem, A. Egiebor, N. O. and Nyavor, K., 2003. Trace elements in water, fish and sediment from Tuskegee lake. Southern USA, *Water, Air, and Soil Pollution* 149: 51-75.

Jafari, N., 2009. Ecological integrity of wetland, their functions and sustainable use. *Journal of Ecology and Natural Environment*. 1(3): 045-054.

Kalas, J. A., Steinnes, E. and Lierhagen, S., 2000. Lead exposure of small herbivorous vertebrates from atmospheric pollution. *Environmental Pollution* 107, 21-2.

Klavins, M., Potapovics, O. and Rodinov, V., 2009. Heavy Metals in Fish from Lakes in Latvia: Concentrations and Trends of Changes. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. 82: 96-100.

Kojadinovic, J., Potier, M., Le Corre, M., Cosson, M. and Bustamante, M., 2007. Bioaccumulation of trace elements in pelagic fish from the Western Indian Ocean *Environmental Pollution*. 146(2): 548-566.

Linde, A.R. Sanchez-Galan, S. Izquierdo, J. I. Arribas, P. Maranon, E. and Garcia-Vazquez, E., 1998. Brown trout as biomonitor of heavy metal pollution: Effect of age on the reliability of the assessment. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 40, 120-125

Moriarty, F., 1999. *Ecotoxicology, the study of pollutants in ecosystems*. 3rd ed. London: Academic press.

Nussey, G.V., uren, J. H. J. And Preez, H. H., 2000. Bioaccumulation of chromium, manganese, nickel and lead in the tissues of the moggel, *Labeoumbratus* (Cyprinidae), from Witbank Dam, Mpumalanga. *Water SA*. 26:269–284.

Pourang, N., Nikouyan, A. and Dennis, J. H., 2005. Concentration in fish surficial surficial surficial sediments and water from northern part of the Perian gulf environmental monitoring and assessment. 109: 293–316.

Ramezani, Z., 2004. Ecological study of phytoplankton of the Anzali lagoon (N Iran) and its outflow into the Caspian Sea. *Czech Phycology, Olomouc*. 4: 145-154.

Romeoa, M., Siaub, Y., Sidoumou, Z., and Gnassia Barelli, M., 1999. Heavy metal distribution in different fish species from the Mauritania coast. *Science of the Total Environment*. 232: 169-175.

Storelli, M. M., Storelli, A., D'dabbo, R., Marano, C., Bruno R. and Marcotrigiano, G. O., 2005. Trace elements in loggerhead turtles (*Caretta caretta*) from the eastern Mediterranean Sea: overview and evaluation. *Environmental Pollution*. 135: 163–170.

Tekin-Ozan, S. and Kir, I., 2008. Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (*Cyprinus carpio* L., 1758) from Beyşehir Lake (Turkey). *Environmental Monitoring and Assessment*. 138: 201–206.

Turan, C., Dural, M., Oksuz, A. and Ozturk, B., 2009. Levels of heavy metals in some commercial fish species captured from the black sea and Mediterranean coast of Turkey. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. 82: 601–604.

Turkmen, A., Turkmen, M., Tepe Y. and Akyurt, I., 2005. Heavy metals in three commercially valuable fish species from Iskenderun Bay, Northern East Mediterranean Sea, Turkey. *Food Chemistry*. 91: 167–172.

Uysal, K., Kose, E., Bulbul, M., Donmez, Z., Erdogan, Y., Koyun, M., Omeroglu, C. and Ozmal, F., 2009. The comparison of heavy metal accumulation ratios of some fish species in Enne Dame Lake (KUtahya/Turkey). *Environmental Monitoring and Assessment*. 157.

Viana, F. Huertas, R. and Danulat, E., 2005. Heavy Metal Levels in Fish from Coastal Waters of Uruguay, *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 48: 530–537

Watanabe, I., Ichihashi, H., Tanabe, S., Amano, M., Miyazaki, N., Petrovc, A. and Tatsukawaax, R., 1996. Trace element accumulation in Baikal seal (*Phoca sibirica*) from the Lake Bikal. *Environmental Pollution*. 94: 69–79.

Yilmaz, F., 2009. The Comparison of Heavy Metal Concentrations (Cd, Cu, Mn, Pb, and Zn) in Tissues of Three Economically Important Fish (*Anguilla anguilla*, *Mugilcephalus* and *Oreochromis niloticus*) Inhabiting Köycegiz Lake-Mugla (Turkey) *Turkish journal of science and technology*. 4:7-15.

Zhang, G., He, L., Li, J. and Wu, Z., 2007. Analysis of Heavy Metals of Muscle and Intestine Tissue in Fish – in Banan Section of Chongqing from Three Gorges Reservoir, China. *Polish Journal of Environmental Studies*. 16: 949-958.