

بررسی میزان و نحوه مصرف نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد دانه گلرنگ (*Carthamus tinctorius* L.)

کامران میرزاشاهی^{۱*} و فریدون نورقلی‌پور^۲

(۱) استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

(۲) استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

* نویسنده مسئول: kamranmirzashahi@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۲/۲۸

تاریخ دریافت: ۹۸/۱۱/۱۵

چکیده

مدیریت کود نیتروژن برای تولید اقتصادی گلرنگ از اولویت خاصی برخوردار است. افزایش کارایی این عنصر علاوه بر افزایش سود اقتصادی، موجب کاهش آلودگی محیط‌زیست نیز می‌شود. بنابراین آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد طی دو سال (۱۳۹۱ و ۱۳۹۳) اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار مقدار نیتروژن خالص صفر شاهد (بدون مصرف نیتروژن)، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار و چهار سطح زمان مصرف نیتروژن به‌صورت تقسیط شده (مصرف تماماً هنگام کاشت T1، مصرف دو سوم هنگام کاشت و یک سوم شروع ساقه‌دهی T2، مصرف یک سوم هنگام کاشت و دو سوم شروع ساقه‌دهی T3 و مصرف یک سوم هنگام کاشت، یک سوم شروع ساقه‌دهی و یک سوم اوایل گلدهی T4) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش تیمارها بر ارتفاع بوته، تعداد طبق بارور در متر مربع، عملکرد دانه، عملکرد روغن، کارایی مصرف و جذب نیتروژن توسط دانه معنی دار بود. اثر اصلی نیتروژن بر تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، درصد روغن و کارایی جذب نیتروژن معنی دار گردید. همچنین، اثر اصلی تقسیط بر تعداد دانه در طبق، درصد روغن و کارایی جذب نیتروژن معنی دار بود. برهمکنش تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد (بدون مصرف نیتروژن) حاکی از افزایش عملکرد دانه و به تبع آن عملکرد روغن بود. از طرفی، با افزایش مصرف نیتروژن در مقایسه با تیمار شاهد و نیز با تقسیط دو و سه مرحله ای آن (T2، T3 و T4) به ترتیب شاخص‌های کارایی نیتروژن کاهش و افزایش نشان داد. بنابراین، با توجه به شرایط اجرای این آزمایش و محاسبه نسبت فایده به هزینه، مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در هر بار یک سوم (T4) با عملکرد دانه ۲۲۲۶ کیلوگرم در هکتار و بیشترین نسبت فایده به هزینه (۴۳/۱۸) و کارایی مصرف نیتروژن (۳۱ کیلوگرم در کیلوگرم) توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: ارتفاع گیاه، روغن و کود شیمیایی.

مقدمه

استفاده بهینه از کودهای شیمیایی به خصوص نیتروژن به عنوان ضروری ترین عنصر کودی مورد نیاز گیاه، یکی از مهمترین رویکردهای تولید به شمار می رود. مقدار مصرف بهینه نیتروژن به عوامل زیادی از جمله میزان نیترات موجود در خاک، زمان مصرف، مدیریت مزرعه، شرایط آب و هوایی، مدیریت آبیاری و کشت قبلی بستگی دارد (Stevens *et al.*, 2008). همچنین به دلیل پایین بودن جذب این عنصر که به طور متوسط در سطح جهانی ۳۰ تا ۵۰ درصد می باشد، هرگونه افزایش در کارایی مصرف نیتروژن منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سود اقتصادی می شود (Arregui and Quemada, 2008). پاسخ گیاه گلرنگ به نیتروژن به طور کلی بیشتر از سایر عناصر غذایی است، به طوری که استفاده از کودهای نیتروژن دار در این گیاه می تواند از طریق اثر بر اجزای عملکرد (تعداد بوته در متر مربع، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه) منجر به افزایش عملکرد دانه گردد (Mundel *et al.*, 2004). بررسی اثر کاشت، مقدار و تقسیم کود نیتروژن بر گلرنگ در رقابت با علف های هرز نشان داد که بیشترین عملکرد روغن (۵۰/۲۵ گرم در متر مربع) از کاربرد ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تقسیم سه مرحله ای به دست آمد (فولادوند و یدوی، ۱۳۹۴). همچنین، در بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن خالص (۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و روش های تقسیم، مشخص گردید که بهترین تیمار مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در دو مرحله (۵۰ درصد هنگام کاشت و ۵۰ درصد شروع ساقه دهی) و یا در سه مرحله (۲۵ درصد هنگام کاشت، ۵۰ درصد شروع ساقه دهی و ۲۵ درصد اوایل گلدهی) از حیث دستیابی به بیشترین عملکرد روغن گلرنگ بود (میرشکاری و صیامی، ۱۳۹۵). بررسی پاسخ خصوصیات زراعی گلرنگ به زمان، مقدار و روش مصرف نیتروژن نشان داد که صفات زراعی مورد بررسی از جمله عملکرد دانه و شاخص برداشت غوزه و نیز کارایی مصرف نیتروژن با افزایش کود نیتروژن از ۱۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار به ۳۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار به طور معنی داری کاهش داشت (میرزاخانی، ۱۳۹۶). همچنین در مطالعه ای مقدار ۱۳۰ کیلوگرم اوره در هکتار با تقسیم سه مرحله ای (هر بار یک سوم هنگام کاشت، روزت و قبل از گلدهی) در منطقه کرمان برای دستیابی به عملکرد بهینه گزارش گردید (نقوی و همکاران، ۱۳۹۷). نتایج به دست آمده در یک پژوهش نشان داد که مصرف ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار سبب دستیابی به عملکرد مطلوب دانه و روغن گلرنگ گردید (Ghasemi *et al.*, 2012). بررسی مقادیر مختلف نیتروژن خالص (۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار) مشخص نمود که بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن گلرنگ از تیمار ۸۰ کیلوگرم در هکتار به میزان ۱۶۱۰ و ۵۹۵ کیلوگرم در هکتار به دست آمد (Ashraf and Gamalat, 2013). همچنین، بررسی سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه گلرنگ در مناطق دیم نشان داد که بهترین تیمار نیتروژن و فسفر برای دستیابی به عملکرد بهینه در مراغه به ترتیب ۳۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار و در سرارود ۶۰ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار بود

(Haghighat Malek and Ferri, 2014). مطالعه‌ای صورت گرفته در خصوص تامین بهینه نیتروژن و زمان مناسب کاربرد آن نشان داد که بیش‌ترین عملکرد دانه گلرنگ با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در سه مرحله (هنگام کاشت، شروع ساقه‌دهی و اوایل گلدهی) حاصل شد (Flemmer *et al.*, 2015). همچنین در یک آزمایش، بیش‌ترین عملکرد دانه گلرنگ با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار گزارش گردید (Edalat *et al.*, 2016). نتایج به‌دست آمده از بررسی کاربرد مقادیر مختلف کود اوره با و بدون کودهای زیستی دلالت بر این داشت که بیش‌ترین عملکرد دانه گلرنگ از مصرف ۱۲۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم اوره در هکتار توام با آغشته نمودن بذر با کودهای زیستی حاصل گردید (Seyed Sharifi *et al.*, 2017). همچنین در یک بررسی، بیش‌ترین عملکرد دانه گلرنگ (۴۳۶ کیلوگرم در هکتار) در شرایط دیم از مصرف توامان به ترتیب ۱۵ و ۱۸ کیلوگرم نیتروژن و فسفر خالص در هکتار و ۲۰۰۰ کیلوگرم کود حیوانی در هکتار گزارش شد (Afzal *et al.*, 2017). افزون بر این، پایین بودن کارایی نیتروژن به دلیل هدر رفت آن از طرق نیترات زدایی، آبشویی و تصعید می باشد (Tilman *et al.*, 2002). تعیین مقدار دقیق کود مورد نیاز محصول، مصرف به موقع کود از لحاظ زمان و تقسیط آن با توجه به مراحل رشد گیاه، نوع کود، اصلاح گیاهی و انتخاب سامانه‌های مناسب کشت از جمله راه‌های افزایش کارایی نیتروژن می باشد (Grant and Entz, 2006; Chen *et al.*, 2017). همچنین، بر افزایش کارایی مصرف نیتروژن در هنگام تقسیط کود اشاره و گزارش شد که عواملی که موجب تسهیل در جذب نیتروژن شود کارایی مصرف آن را بالا می‌برد (Zemenchik and Albrecht, 2002). علاوه بر این، بسته به سطح حاصلخیزی اولیه خاک، تقسیط کود نیتروژن در مقایسه با مصرف یک مرحله ای نیتروژن منتج به افزایش بیشتر بازیابی نیتروژن و نیز عملکرد دانه خواهد شد (Dordas *et al.*, 2014; Sioulas, 2008). از این‌رو، با توجه به اثر گذاری مقدار و زمان مصرف کودهای نیتروژن بر کارایی استفاده از آن، افزایش کارایی نیتروژن همگام با کاهش میزان مصرف آن به موازات بهبود تولید برای ارتقای درآمد کشاورزان، کاهش پتانسیل آلودگی‌های محیط‌زیست و نیز کم نمودن میزان انرژی مورد نیاز برای تولید کودهای نیتروژن حائز اهمیت است (Manlou *et al.*, 2008). همچنین، در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن و لزوم توجه به گسترش زراعت گلرنگ به همین منظور تعیین خصوصیات کمی و کیفی این گیاه در پاسخ به مدیریت بهینه عناصر غذایی از جمله نیتروژن در هر منطقه با ویژگی‌های مشخص و متفاوت، اجرای این پژوهش را ضروری می‌سازد.

مواد و روش‌ها

آزمایش در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد (دزفول) طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ و در مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه و ۱۴ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۲۸ دقیقه طول شرقی و ارتفاع ۸۲ از سطح دریا بر روی یک خاک سری Clayey, mixed, Hyperthermic- Aridic Haplusteps انجام شد. بر اساس داده‌های ایستگاه

هواشناسی واقع در مرکز این منطقه با ۳۴۵ میلی‌متر بارندگی سالانه بر اساس معیار دوماترن دارای رژیم آب و هوایی نیمه خشک و متوسط دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد است. ابتدا قطعه زمینی انتخاب و بعد از عملیات تهیه زمین (آبیاری اولیه، دیسک و تسطیح) نقشه طرح در محل مورد نظر پیاده و یک نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری تهیه و آزمایش‌های لازم مطابق با دستورالعمل‌های موسسه تحقیقات خاک و آب اندازه‌گیری شدند (علی‌احیایی و بهبهانی‌زاده، ۱۳۷۲). نتایج تجزیه خاک نشان داد که خاک مورد آزمایش فاقد شوری (کمتر از چهار دسی‌زیمنس بر متر) و از نظر کربن آلی و به تبع آن نیتروژن کل خاک فقیر بود، زیرا مقدار مواد آلی، کربن آلی خاک که عمده‌ترین منبع ذخیره نیتروژن محسوب می‌شود در مناطق خشک و نیمه خشک و از جمله در منطقه مورد مطالعه ناچیز است (میرزاشاهی، ۱۳۹۶). افزون بر این، درصد کربنات کلسیم معادل بالا و مقادیر فسفر و پتاسیم قابل استفاده پایین بود (جدول ۱).

جدول ۱: متوسط برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

| عمق (سانتی‌متر) | بافت (گل اشباع) | اسیدیته (گل اشباع) | هدایت الکتریکی (دسی‌زیمنس بر متر) | کربن آلی | T.N.V نیتروژن کل (درصد) | فسفر پتاسیم روی (میلی‌گرم بر کیلوگرم) | آهن مس منگنز |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------------------|--|--------------------|
| ۰-۳۰ | C.L | ۷/۷۹ | ۱/۱۵ | ۰/۱۶۲ | ۴۷/۲۵ | ۸۵۰ | ۷/۱۸ |
| | | | | | | ۱۶۲ | ۱/۲۵ |
| | | | | | | ۵/۸ | ۰/۷۸ |
| | | | | | | ۳/۳ | |

هر عدد میانگین سه تکرار است.

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب چهار مقدار نیتروژن خالص (بدون مصرف نیتروژن شاهد، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره) و چهار زمان مصرف نیتروژن به صورت تقسیط شده (مصرف تماماً هنگام کاشت "T1(1)"، دو سوم هنگام کاشت و یک سوم شروع ساقه دهی "T2(2,1)"، یک سوم هنگام کاشت و دو سوم شروع ساقه دهی "T3(1,2)" و یک سوم هنگام کاشت، یک سوم شروع ساقه دهی و یک سوم اوایل گلدهی "T4(1,1,1)") بودند. کاشت بذر گلرنگ (رقم گلدشت) با تنظیم کارنده آزمایشی چغندر قند و به صورت ردیفی با فاصله بین ردیف ۶۱ سانتی‌متر و فاصله پنج سانتی‌متر بین بوته‌ها صورت پذیرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون خاک سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم هر کدام به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار تماماً هنگام کاشت و نیز مقادیر نیتروژن مطابق تیمارها مصرف شدند. نحوه کاربرد کودهای شیمیایی به صورت خاک کاربرد و مخلوط با خاک سطحی صورت گرفت. ابعاد هر کرت (۱۸/۳ متر مربع شش خط به طول پنج متر با فاصله ۶۱ سانتی‌متری) بود. برای جلوگیری از تداخل خاک کرت‌های مجاور، بین هر کرت دو متر و هم‌چنین بین تکرارها پنج متر فاصله در نظر گرفته شد. آبیاری به صورت نشتی و کنترل شده به وسیله سیفون انجام گردید. سایر مراقبت‌های لازم زراعی در طول دوره رشد صورت گرفت. ارتفاع بوته در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ساقه از محل طوقه تا زیر گل‌آذین اندازه‌گیری شد.

قبل از برداشت از هر تکرار تعداد طبق های بارور در متر مربع (در سه کادر یک متر مربعی از هر کرت و تعداد دانه های پر (با شمارش دانه های پر در ۲۰ طبق) و پس از برداشت وزن هزار دانه (با سه بار شمارش از سه گروه تصادفی هزار دانه ای در هر کرت) محاسبه شدند. عمل برداشت محصول پس از حذف اثر حاشیه و نیم متر از بالا و پایین هر کرت بر روی چهار خط وسط به طول چهار متر انجام گردید. در نهایت ارتفاع بوته، تعداد طبق بارور در متر مربع، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن، جذب نیتروژن توسط دانه (حاصل ضرب عملکرد دانه در درصد نیتروژن دانه) و شاخص های کارایی نیتروژن اندازه گیری شدند. برای محاسبه کارایی مصرف و جذب نیتروژن بر حسب کیلوگرم در کیلوگرم از رابطه های ۱ و ۲ استفاده گردید (Sisson *et al.*, 1991):

$$\text{رابطه ۱:} \quad \frac{\text{عملکرد دانه}}{\text{کل نیتروژن در دسترس}} = \text{کارایی مصرف نیتروژن}$$

$$\text{رابطه ۲:} \quad \frac{\text{نیتروژن جذب شده}}{\text{کل نیتروژن در دسترس}} = \text{کارایی جذب نیتروژن}$$

نیتروژن در دسترس بر حسب کیلوگرم در هکتار عبارت است از مجموع نیتروژن کودی به علاوه نیتروژن قابل جذب خاک (مجموع نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی در عمق صفر تا ۳۰ سانتی متری که پس از تبدیل به نیتروژن خالص در هکتار در تیمارهای بدون مصرف کود نیتروژن محاسبه شدند). به این صورت که میانگین مجموع "یون های نیترات و آمونیوم" در سال اول و دوم که به ترتیب ۷/۱ و ۹/۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک بود، با محاسبه وزن یک هکتار خاک به عمق ۳۰ سانتی متر و جرم مخصوص ظاهری ۱/۳۰ گرم بر سانتی متر مکعب به کیلوگرم در هکتار و سپس با احتساب جرم مولکولی یون های نیترات و آمونیوم برای تبدیل نمودن به نیتروژن خالص، میزان نیتروژن قابل جذب خاک در سال اول و دوم به ترتیب ۱۰ و ۱۳ کیلوگرم در هکتار برآورد شد. تعیین میزان نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی نیز با عصاره گیری خاک با کلرور پتاسیم دو مولار و با استفاده از اکسید منیزیم و پودر آلیاژ دوار دو انجام گردید (Mulvaney, 1996). مقدار روغن دانه گلرنگ با استفاده از روش استخراج پیوسته سوکسله اندازه گیری شد (حسینی، ۱۳۶۹). برای بررسی اقتصادی نتایج از نسبت فایده به هزینه (درآمد ناشی از افزایش عملکرد محصول در هر تیمار نسبت به تیمار شاهد به هزینه کود نیتروژن مصرفی در هر تیمار) استفاده گردید (زرین کفش، ۱۳۶۸). پس از اطمینان از همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون بارتلت، تجزیه واریانس مرکب نتایج صورت گرفت. نتایج در هر سال مورد تجزیه واریانس ساده و در پایان دو سال نیز تجزیه واریانس مرکب آزمایش با استفاده از نرم افزار MSTATC انجام گرفت. مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) در سطح احتمال ۵ درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس دو ساله نشان داد که برهم‌کنش تیمارها در سطح احتمال ۱ درصد بر ارتفاع بوته معنی‌دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین برهم‌کنش تیمارها نشان داد که در تقسیط‌های مختلف با افزایش نیتروژن مصرفی، در مقایسه با تیمار عدم مصرف نیتروژن ارتفاع بوته به‌طور معنی‌داری افزایش یافت، به طوری که بیش‌ترین ارتفاع بوته به میزان ۱۱۴ سانتی‌متر از تیمار مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تیمارهای T3 (مصرف به‌صورت یک سوم هنگام کاشت و دو سوم شروع ساقه‌دهی) و T4 (مصرف هر بار به‌میزان یک سوم "هنگام کاشت، شروع ساقه‌دهی و اوایل گلدهی") به‌دست آمد که حدود ۲۱ سانتی‌متر از میانگین ارتفاع بوته در تیمار شاهد بیشتر بود. همچنین در هر سطح از نیتروژن مصرفی، تقسیط دو و سه بار نیتروژن نسبت به مصرف تمامی نیتروژن منجر به افزایش معنی‌دار ارتفاع بوته گردید (شکل ۱). بنابراین زمانی که مواد غذایی به‌ویژه نیتروژن محدود کننده نباشد و این عنصر در زمان‌های مناسب با حداکثر نیاز گیاه مصرف شود، افزایش رشد سلول‌ها در ساقه و به‌تبع آن فاصله میان گره‌ها می‌تواند افزایش ارتفاع گیاه را باعث شود (Gunter and Ovodov, 2005). هم‌چنین گزارش شد که چنانچه نیتروژن به میزان مکفی توسط گیاه جذب شود، انتقال مواد آلی (اسیدهای آمینه، آمیدها و ترکیبات مشابه) حاصل از احیاء بیشتر به شاخه‌ها منتقل و این امر در نهایت موجب افزایش رشد رویشی می‌شود (Ismael and Othman, 1995). نتایج مشابه‌ای در ارتباط با تاثیر نیتروژن بر افزایش ارتفاع گیاه گلرنگ گزارش شده است (Eryigit et al., 2015).

تعداد طبق بارور در متر مربع


نتایج، حاکی از اثر معنی‌دار برهم‌کنش نیتروژن و تقسیط در سطح احتمال ۱ درصد بر صفت مزبور بود (جدول ۲). با توجه به نتایج مقایسه میانگین برهم‌کنش تیمارها، با مصرف نیتروژن و به خصوص با اعمال دو و سه مرحله‌ای مصرف کود نیتروژن تعداد طبق بارور در متر مربع به‌عنوان یکی از اجزای عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد. به‌طوری که، بیشترین تعداد طبق بارور در متر مربع (۲۰۱ عدد) از مصرف ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تقسیط سه مرحله‌ای (T4) به‌دست آمد. درصد افزایش تعداد طبق بارور در متر مربع بر مبنای حصول به بیش‌ترین تعداد این صفت (۲۰۱ عدد) نسبت به تیمار بدون مصرف نیتروژن (شاهد) با میانگین تعداد طبق بارور در متر مربع (۹۶ عدد)، بیش از ۱۰۰ درصد بود. تیمار کودی T4-۱۲۰ به دلیل سطح تقسیط مطلوب نیتروژن و بهبود دسترسی گیاه گلرنگ به این عنصر در مراحل حساس رشدی منجر به چنین افزایش معنی‌داری گردید. هر چند که تیمار T4-۱۲۰ با تیمارهای T4-۶۰، T3-۱۲۰ و نیز با تعداد طبق بارور حاصل شده در سطح مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مراحل دو و سه

تقسیمی (T2، T3 و T4) از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت (شکل ۱). بررسی های صورت گرفته در این زمینه حاکی از افزایش تعداد طبق در متر مربع در نتیجه مصرف نیتروژن بود (Tuncturk and Yildirim, 2004; Ebrahimian and Soleymani, 2013; De Anicesio *et al.*, 2018). هم چنین در یک آزمایش، بیشترین تعداد طبق بارور در متر مربع با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت تقسیم (یک دوم هنگام کاشت و یک دوم شروع ساقه رفتن) گزارش گردید (Moradi Talebbeigi *et al.*, 2018). مصرف کود نیتروژن به افزایش تعداد شاخه جانبی منجر می شود که این عامل سبب افزایش تعداد طبق در گیاه خواهد شد. از سویی، نیتروژن بر رشد گیاه اثر دارد که این تغییرات کمی به دلیل افزایش فتوسنتز گیاه می باشد. افزون بر این، تامین مکفی نیتروژن گیاه بر جابجایی عناصر کم مصرف مانند منگنز در آوند چوبی موثر است. عناصر مذکور به دلیل افزایش آنزیم هایی مانند فسفوکینازها و فسفوترانسفرازها به افزایش تعداد طبق در گیاه کمک می کنند (Marschner, 1995).

تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه

تجزیه واریانس دو ساله آزمایش نشان داد که اثرهای اصلی نیتروژن و تقسیم در سطح احتمال ۱ درصد بر تعداد دانه در طبق معنی دار بود (جدول ۲). تعداد دانه در طبق به عنوان یکی دیگر از اجزای مهم عملکرد دانه گلرنگ با مصرف نیتروژن و با زمان بندی آن، روند صعودی نشان داد. به عبارت دیگر، مصرف نیتروژن در هر سه سطح مصرفی (۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) در مقایسه با تیمار بدون مصرف نیتروژن (شاهد) افزایش معنی دار تعداد دانه در طبق را موجب گردید. بیشترین تعداد دانه در طبق (۲۳/۳۰ عدد) از مصرف ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد که با تیمار ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدون تفاوت معنی دار، اما با سطح ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به طور معنی داری اختلاف داشت، ضمن اینکه در مقایسه با تیمار بدون مصرف نیتروژن تعداد دانه در طبق ۴۶ درصد بیشتر بود. هم چنین، تعداد دانه در طبق با تقسیم نیتروژن به رغم عدم تفاوت معنی دار بین تیمارهای T2، T3 و T4 در مقایسه با مصرف تمام نیتروژن در هنگام کاشت (T1) به طور معنی دار افزایش داشت. به بیان دیگر، میانگین تعداد دانه در طبق در تقسیم های دو و سه مرحله ای نسبت به تعداد دانه در طبق به دست آمده در تیمار شاهد به طور معنی داری بیش از ۱۴ درصد بود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که فقط اثر اصلی نیتروژن بر وزن هزار دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. به طوری که، با مصرف نیتروژن وزن هزار دانه در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد. افزون بر این، بین سطوح نیتروژن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. برهم کنش تیمارها بر این دو صفت معنی دار نبود (جدول های ۲ و ۳). نتایج مشابهی نیز در این ارتباط گزارش شده است (Eryigit *et al.*, 2015; Bonfim-Silva, *et al.*, 2015). در این خصوص، نیتروژن با فراهم نمودن شرایط به منظور تلقیح بهتر نه تنها باعث افزایش تعداد دانه در طبق می شود، بلکه دوره

رشد گیاه را افزایش داده و در اواخر فصل باعث طولانی شدن مدت پر شدن دانه و افزایش وزن هزار دانه می شود (Galavi et al., 2012؛ Marschner, 1995).



شکل ۱: مقایسه میانگین اثر برهمکنش نیتروژن و زمان مصرف* بر ارتفاع بوته و تعداد طبق بارور در متر مربع [۱، ۱، ۱ (T1)؛ ۲، ۱ (T2)؛ ۳، ۱ (T3) و ۴، ۱، ۱ (T4)]*

عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که برهمکنش مقدار نیتروژن و تقسیط بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین نتایج برهمکنش تیمارها نشان داد که عملکرد دانه گلرنگ به مثابه مهم ترین صفت مورد توجه، با مصرف نیتروژن در هر سطح از تقسیط عملکرد دانه به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داشت. هم چنین، بیشترین عملکرد دانه به میزان ۲۶۵۷ کیلوگرم در هکتار از تیمار T4-۱۲۰ به دست آمد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت. میزان افزایش عملکرد حاصل از تیمار T4-۱۲۰ در مقایسه با میانگین عملکرد دانه (۷۶۷ کیلوگرم در هکتار) در تیمار بدون مصرف نیتروژن حدود ۲/۵ برابر بود (شکل ۲). سطوح بهینه مصرف نیتروژن خالص از حیث دستیابی به بیشترین عملکرد دانه بر اساس شرایط اجرای آزمایش در برخی از مطالعات از ۶۰ تا ۲۰۸ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است (سلیمانزاده و همکاران، ۱۳۹۲؛ میرزاخانی، ۱۳۹۶؛ Gecgel et al., 2007; Golzarfar et al., 2012; Taleshi et al., 2012; Santos et al., 2018). افزون بر این، در هر سطح از نیتروژن مصرفی با افزایش تقسیط (تیمارهای T2، T3 و T4) عملکرد دانه به نسبت مصرف نیتروژن فقط در یک مرحله (T1) افزایش معنی داری داشت (شکل ۲). در زمینه زمان بندی مصرف نیتروژن در طی مراحل رشد، نتیجه مشابهی در این باره گزارش شده است که با یافته های به دست آمده از این تحقیق مطابقت دارد (Moradi Talebbeigi et al., 2018). نیتروژن با اثر بر رشد رویشی

به‌ویژه در شرایط مناسب محیطی و متناسب با مراحل حساس رشدی به تداوم فتوسنتز برگ و در نتیجه به توسعه گل‌ها و تلقیح بهتر کمک کرده و از این طریق می‌تواند اجزای عملکرد را افزایش و در نهایت بر مقدار عملکرد دانه بیفزاید (Zong *et al.*, 2015; Anicesio *et al.*, 2014). افزایش عملکرد دانه برآیند اجزای عملکرد دانه می‌باشد، از این‌رو هر گونه افزایش در اجزای عملکرد منجر به افزایش عملکرد دانه می‌گردد. بر این اساس، افزایش عملکرد دانه نتیجه افزایش تعداد طبق بارور در متر مربع، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه تحت اثر مدیریت مصرف نیتروژن و نحوه مصرف آن (تقسیم) قرار گرفت. در مطالعات صورت گرفته افزایش عملکرد دانه گلرنگ به ترتیب ناشی از افزایش تعداد طبق در متر مربع و زیست توده و اجزای عملکرد (تعداد طبق در متر مربع، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه) گزارش شده است (Abbadi *et al.*, 2018; Taleshi *et al.*, 2012; Santos *et al.*, 2008).

درصد روغن و عملکرد روغن

اثرات اصلی مقدار نیتروژن و تقسیم بر درصد روغن در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار، اما برهم‌کنش تیمارها بر این صفت معنی‌دار نبود (جدول ۲). با مصرف نیتروژن در مقایسه با تیمار شاهد، درصد روغن افزایش نشان داد. افزایش درصد روغن ناشی از مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت به تیمار عدم مصرف نیتروژن حدود ۸ درصد بود. افزایش درصد روغن دانه به دلیل مصرف نیتروژن می‌تواند ناشی از تشدید فرایندهای متابولیکی در گیاه و سنتز روغن باشد. از طرفی، با افزایش مصرف نیتروژن درصد روغن کاهش معنی‌داری نشان داد (از ۲۸ درصد در تیمار مصرف ۶۰ کیلوگرم در هکتار به ۲۷ درصد در تیمار ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار). به علاوه، بیش‌ترین درصد روغن (۲۹ درصد) از مصرف نیتروژن در تیمار T2 به دست آمد که تفاوت معنی‌داری با تیمارهای T1، T3 و T4 داشت (جدول ۳). با افزایش مصرف نیتروژن، به دلیل افزایش پیش‌زمینه‌های پروتئینی نیتروژن‌دار، سهم بیشتری از مواد فتوسنتزی جهت تشکیل ترکیبات پروتئینی صرف شده، بنابراین مواد در دسترس برای سنتز اسیدهای چرب کاهش می‌یابد (دانش‌شهرکی و همکاران، ۱۳۸۸). در ارتباط با کاهش و افزایش درصد روغن دانه گلرنگ به ترتیب با افزایش مصرف نیتروژن و تقسیم گزارش مشابه‌ای ارائه شده است (فولادوند و یدوی، ۱۳۹۴). نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که برهم‌کنش تیمارها بر عملکرد روغن در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار شد. مقایسه میانگین نتایج حاکی از روند مشابه تغییرات عملکرد روغن با عملکرد دانه بود، به طوری که بیشترین عملکرد روغن از تیمار T4-۱۲۰ حاصل گردید. به عبارت دیگر، چون عملکرد روغن بیشتر تابع عملکرد دانه است تا درصد روغن، لذا هر گونه افزایش در این صفت سبب افزایش عملکرد روغن نیز می‌شود. عملکرد روغن در تیمار T4-۱۲۰ بیش از ۲/۵ برابر میانگین عملکرد روغن در تیمار شاهد بود (شکل ۲). در این خصوص نتایج حاصل از این آزمایش با یافته‌های چندین تحقیق مطابقت دارد (راستگو و همکاران، ۱۳۹۳؛ Tuncturk and Yildirim, 2004).

جدول ۲: تجزیه واریانس مرکب دو ساله صفات مورد بررسی

| میانگین مربعات | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| منابع تغییرات | درجه آزادی | ارتفاع بوته | تعداد طبق بارور | تعداد دانه در طبق | وزن هزار دانه | عملکرد دانه | درصد روغن | عملکرد روغن | جذب نیتروژن توسط دانه | کارایی مصرف نیتروژن | کارایی جذب نیتروژن |
| سال | ۱ | ۹۲۴۳/۳۷۵** | ۱۷۰۱۳/۳۷۵** | ۲۵۰/۴۵۴** | ۱۰۳۵۲۱۸/۳۴۴** | ۳۶۲/۱۲۱** | ۳۷۴۴۰/۱۷۶** | ۱۸/۳۱۷ ^{ns} | ۲۵۰/۰۰۵** | ۰/۹۱۷** | |
| سال در تکرار | ۴ | ۶/۱۱۵ ^{ns} | ۱۶۲/۴۵۸ ^{ns} | ۷/۹۲۵* | ۳۶۳۴۵/۷۴* | ۵/۴۷۴ ^{ns} | ۶۳۵۹/۴۲۷* | ۷۷/۴۴۶ ^{ns} | ۸۰/۸۷۱* | ۰/۱۲۶* | |
| عامل اول | ۳ | ۱۸۱۸/۷۵** | ۴۳۱۶۴/۹۱۷** | ۲۶۶/۹۸۳** | ۱۱۲۸۱۸۲۲/۲۶** | ۱۴/۷۷۶** | ۸۷۲۳۶۵/۸۶** | ۹۳۷۱/۶۷۹** | ۱۵۴۳۹/۰۵۶** | ۸/۱۵۲** | |
| (مقادیر نیتروژن) | | | | | | | | | | | |
| سال در مقادیر نیتروژن | ۳ | ۰/۷۳۶ ^{ns} | ۱۵۹۷/۸۴۷** | ۵/۵۹۴ ^{ns} | ۱/۸۳۷ ^{ns} | ۰/۹۷۳ ^{ns} | ۳۶۶۳۴/۹۷۹** | ۵۳/۴۹۵ ^{ns} | ۴۸۶/۸۴۲** | ۰/۶۷۲** | |
| عامل دوم | ۳ | ۶۴/۰۵۶** | ۵۷۷۱/۸۰۶** | ۴۲/۳۴۴** | ۱/۹۴۹ ^{ns} | ۳۹/۹۴۲** | ۱۶۰۶۳۵۹/۸۴۴** | ۲۱۳۸/۸۸۹** | ۱۰۲/۰۰۵* | ۰/۱۸۲** | |
| (زمان مصرف نیتروژن) | | | | | | | | | | | |
| سال در زمان مصرف نیتروژن | ۳ | ۶/۲۶۴ ^{ns} | ۱۳/۷۳۶ ^{ns} | ۱/۷۳۳ ^{ns} | ۳/۳۸۷ ^{ns} | ۱/۰۴۲ ^{ns} | ۱۲۱۹/۰۵۹ ^{ns} | ۳۸/۸۵۹ ^{ns} | ۱/۱۷۳ ^{ns} | ۰/۰۲۱ ^{ns} | |
| برهمکنش تیمارها | ۹ | ۸/۰۴۶** | ۱۱۰۶/۳۸۹** | ۴/۵۷۵ ^{ns} | ۱/۴۱۱ ^{ns} | ۳۰۱۰۵۱/۶۲۲** | ۱/۱۵۷ ^{ns} | ۲۲۰۳۸/۲۳۲** | ۲۶۷/۴۸۴** | ۰/۰۵۹ ^{ns} | |
| سال در برهمکنش تیمارها | ۹ | ۱/۴۰۳ ^{ns} | ۲۲/۶۹ ^{ns} | ۰/۰۹۴ ^{ns} | ۰/۵۴۶ ^{ns} | ۵۱۰/۶۸۶ ^{ns} | ۳/۱۷۴ ^{ns} | ۱۲۴۷/۲۵۱ ^{ns} | ۳۷/۶۰۱ ^{ns} | ۰/۰۲۱ ^{ns} | |
| خطا | ۶۰ | ۷/۱۹۲ | ۱۸۷/۱۹۲ | ۳/۸۵۶ | ۲/۲۱۷ | ۱۲۸۴۰/۷۰۶ | ۲/۲۰۳ | ۱۹۹۸/۴۸۵ | ۳۹/۹۹۸ | ۰/۰۳۹ | |
| ضریب تغییرات(درصد) | - | ۲/۵۲ | ۸/۷۸ | ۹/۴۲ | ۲/۹۳ | ۶/۵۱ | ۵/۵۲ | ۹/۴۴ | ۱۳/۸۷ | ۱۷/۹۸ | ۲۲/۵۹ |

- ns, * و ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.


جدول ۳: مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح نیتروژن و زمان مصرف برصفت مورد بررسی

| تیمارها | تعداد دانه در طبق | وزن هزار دانه (گرم) | درصد روغن | کارایی جذب نیتروژن (کیلوگرم در کیلوگرم) | میانگین |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|
| سطوح نیتروژن خالص (کیلوگرم در هکتار) | میانگین دو سال | میانگین دو سال | میانگین دو سال | سال اول | سال دوم |
| ۰ | ۱۵/۹۶ ^c | ۴۷/۹۶ ^b | ۲۵/۹۰ ^c | ۱/۹۵ ^a | ۱/۲۵ ^a |
| ۶۰ | ۲۱/۵۴ ^b | ۵۱/۵۹ ^a | ۲۷/۸۱ ^a | ۰/۶۶ ^b | ۰/۵۹ ^b |
| ۱۲۰ | ۲۳/۳۹ ^a | ۵۱/۶۳ ^a | ۲۷/۰۱ ^{ab} | ۰/۴۷ ^{bc} | ۰/۴۳ ^{bc} |
| ۱۸۰ | ۲۲/۵۸ ^{ab} | ۵۲/۱۲ ^a | ۲۶/۹۳ ^b | ۰/۳۱ ^c | ۰/۳۲ ^d |
| زمان مصرف نیتروژن* | میانگین دو سال | میانگین دو سال | میانگین دو سال | سال اول | سال دوم |
| T1(1) | ۱۸/۸۸ ^b | ۵۰/۹۸ ^a | ۲۵/۷۸ ^c | ۰/۷۵ ^a | ۰/۴۹ ^b |
| T2(2,1) | ۲۱/۲۵ ^a | ۵۰/۷۶ ^a | ۲۸/۶۵ ^a | ۰/۸۷ ^a | ۰/۶۵ ^{ab} |
| T3(1,2) | ۲۱/۵۰ ^a | ۵۰/۴۵ ^a | ۲۷/۰۷ ^b | ۰/۸۹ ^a | ۰/۷۰ ^{ab} |
| T4(1,1,1) | ۲۱/۷۵ ^a | ۵۱/۱۰ ^a | ۲۶/۱۰ ^c | ۰/۸۷ ^a | ۰/۷۵ ^a |

اعداد هر گروه که حداقل در یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون LSD هستند. * زمان مصرف نیتروژن (تماماً هنگام

کاشت "T1(1)", دو سوم هنگام کاشت و یک سوم شروع ساقه دهی "T2(2,1)", "یک سوم هنگام کاشت و دو سوم شروع ساقه

دهی "T3(1,2)", یک سوم هنگام، یک سوم شروع ساقه دهی و یک سوم اوایل گلدهی "T4(1,1,1)".



شکل ۲: مقایسه میانگین اثر برهمکنش نیتروژن و زمان مصرف* بر عملکرد دانه و عملکرد روغن

* [T1(1): 1, T2(2): 2, T3(3): 3, T4(4): 4]


جذب نیتروژن توسط دانه

برهم کنش تیمارها بر جذب نیتروژن دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار گردید (جدول ۲). مقایسه میانگین برهمکنش تیمارها نشان داد که با مصرف نیتروژن جذب نیتروژن به طور معنی داری در مقایسه با تیمار عدم مصرف نیتروژن افزایش داشت. همچنین، در هر سطح از نیتروژن مصرفی با اعمال تقسیط کود نیتروژن به ویژه در تیمارهای T3 و T4 به دلیل فراهمی بیشتر نیتروژن میزان جذب نیز افزایش یافت. بیشترین میزان جذب نیتروژن توسط دانه (۷۳/۲۰ کیلوگرم در هکتار) در تیمار T4-۱۲۰ مشاهده گردید (شکل ۳). میزان جذب نیتروژن دانه گلرنگ از حاصل ضرب درصد نیتروژن دانه و عملکرد دانه در واحد سطح به دست می آید، لذا این نتیجه در اثر مصرف نیتروژن و نحوه تقسیط دور از انتظار نمی باشد، چرا که افزایش کود نیتروژن و تقسیط آن بالاخص در تیمار T4-۱۲۰ باعث افزایش درصد نیتروژن دانه و عملکرد دانه گردید. در این ارتباط نتیجه ی مشابه ای نیز گزارش شده است (Anicesio *et al.*, 2015).

کارایی مصرف و جذب نیتروژن

تجزیه واریانس مرکب نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که برهم کنش تیمارها بر کارایی مصرف نیتروژن در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین نتایج برهم کنش تیمارها نشان داد که با مصرف نیتروژن نسبت به تیمار شاهد و نیز با افزایش مصرف نیتروژن این شاخص کاهش معنی داری نشان داد. از طرف دیگر، با تقسیط نیتروژن شاخص کارایی مصرف نیتروژن افزایش داشت. تقسیط سه مرحله ای (T4) کود نیتروژن در هر سه سطح نیتروژن مصرفی بیشترین مقدار کارایی مصرف را داشت، به طوری که تفاوت معنی داری به استثنای تیمار ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار با تقسیط-های یک و دو مرحله ای داشت. بیشترین شاخص کارایی مصرف نیتروژن به میزان ۳۱/۱۰ کیلوگرم در کیلوگرم در تیمار T4-۶۰ به دست آمد که به طور معنی داری با سطح ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار تفاوت داشت (شکل ۳). این واکنش گیاه بر اساس قانون بازده نزولی قابل توضیح بوده، ضمن اینکه به نظر می رسد یکی از دلایل کاهش کارایی نیتروژن فزونی از دست رفتن عنصر مذکور در مقادیر بالای مصرف کود نیتروژن باشد. کاهش کارایی مصرف نیتروژن در سایر مطالعات مشاهده شده است (غیائی اسکویی و همکاران، ۱۳۹۷؛ موسوی و ذاکرنژاد، ۱۳۹۹؛ Moradi Talebbeigi *et al.*, 2018). طبق نتایج تجزیه واریانس داده ها اثرات اصلی کود نیتروژن و تقسیط در سطح احتمال ۱ درصد بر کارایی جذب نیتروژن معنی دار گردید (جدول ۲). افزایش نیتروژن مصرفی منجر به کاهش کارایی جذب نیتروژن شد. بیشترین کارایی جذب در تیمار شاهد (۱/۶۰ کیلوگرم در کیلوگرم) و سپس در تیمار مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (۰/۶۲ کیلوگرم در کیلوگرم) و کمترین کارایی جذب (۰/۳۲ کیلوگرم در کیلوگرم) در تیمار مصرف ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار بود که هر سه تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. از طرفی، با مصرف نیتروژن در چند مرحله در مقایسه با مصرف نیتروژن تماماً هنگام

کاشت کارایی جذب نیتروژن بیشتر بود (جدول ۳). کارایی جذب نیتروژن بیانگر توان گیاه در استفاده از نیتروژن پراکنده در محیط است. نیترات زدایی ناشی از وجود شرایط غیرهوازی به دلیل آبیاری و بارندگی و نیز آبشویی، از فرایندهای موثر در کاهش کارایی جذب نیتروژن محسوب می شوند. افزون بر این، اثر تشدید کنندگی میزان کود مصرفی بر مقدار نیتروژن از دست رفته در دیگر مطالعات گزارش شده است (قنبری کاشان و همکاران، ۱۳۹۵؛ میرزاشاهی و همکاران، ۱۳۹۷؛ Shahrokhnia and Sepaskhah, 2016).



شکل ۳: مقایسه میانگین اثر برهم کنش نیتروژن و زمان مصرف* بر جذب نیتروژن توسط دانه و کارایی مصرف نیتروژن
* [۱ (T1): ۲ (T2): ۳ (T3): ۴ (T4)]

بررسی اقتصادی نتایج (نسبت فایده به هزینه)

مدیریت بهینه عناصر غذایی یکی از ارکان مهم سامانه کشاورزی پایدار محسوب می شود. در این سامانه چون تولید اقتصادی محصول همراه با حفظ و پایداری بلند مدت حاصلخیزی خاک مد نظر می باشد، ضروری است که با توجه به عملکرد اقتصادی، میزان بهینه کودهای شیمیایی تعیین گردد، زیرا در مزارع کشاورزی کود وسیله ای برای افزایش تولید محصول و درآمد است (کسرای، ۱۳۷۲). بنابراین، نتایج نشان داد که بیشترین نسبت فایده به هزینه به میزان ۴۳/۱۸ از مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در تیمار T4 (هر بار یک سوم مصرف کود نیتروژن هنگام کاشت، شروع ساقه دهی و اوایل گلدهی) به دست آمد (جدول ۴).

جدول ۴: بررسی اقتصادی بر مبنای نسبت فایده به هزینه

| تیمارها | عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) | افزایش عملکرد در هر تیمار نسبت به میانگین عملکرد تیمار شاهد (۷۶۷ کیلوگرم در هکتار) | درآمد حاصل از افزایش عملکرد (تومان)* | هزینه کود نیتروژن مصرفی در هر تیمار (۴) | نسبت فایده به هزینه (ستون ۳ تقسیم بر ستون ۴) |
|-----------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | (۱) | (۲) | (۳) | (۴) | |
| T1(1) | ۷۸۳ ^{hi} | - | - | - | - |
| T2(2,1) | ۸۳۴ ^h | - | - | - | - |
| T3(1,2) | ۷۹۳ ^h | - | - | - | - |
| T4(1,1,1) | ۶۶۰ ⁱ | - | - | - | - |
| T1(1) | ۱۲۶۲ ^g | ۴۹۵ | ۱۵۲۹۵۵۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۴/۶۵ |
| T2(2,1) | ۱۶۱۳ ^f | ۸۴۵ | ۲۶۱۱۰۵۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۲۵/۰۱ |
| T3(1,2) | ۱۸۹۵ ^d | ۱۱۲۸ | ۳۴۸۵۵۲۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۳۳/۳۹ |
| T4(1,1,1) | ۲۲۲۶ ^c | ۱۴۵۹ | ۴۵۰۸۳۱۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۴۳/۱۸ |
| T1(1) | ۱۶۹۳ ^{ef} | ۹۲۵ | ۲۸۵۸۲۵۰ | ۲۰۸۸۰۰ | ۱۳/۶۹ |
| T2(2,1) | ۲۲۱۳ ^c | ۱۴۴۶ | ۴۴۶۸۱۴۰ | ۲۰۸۸۰۰ | ۲۱/۴۰ |
| T3(1,2) | ۲۴۱۰ ^b | ۱۶۴۳ | ۵۰۷۶۸۷۰ | ۲۰۸۸۰۰ | ۲۴/۳۱ |
| T4(1,1,1) | ۲۶۵۷ ^a | ۱۸۹۰ | ۵۸۴۰۱۰۰ | ۲۰۸۸۰۰ | ۲۸ |
| | ۱۲۰ | | | | |
| T1(1) | ۱۷۸۸ ^{de} | ۱۰۲۱ | ۳۱۵۴۸۹۰ | ۳۱۳۲۰۰ | ۱۰/۱۰ |
| T2(2,1) | ۲۲۹۳ ^{bc} | ۱۵۲۶ | ۴۷۱۵۳۴۰ | ۳۱۳۲۰۰ | ۱۵/۱۰ |
| T3(1,2) | ۲۳۴۰ ^{bc} | ۱۵۷۳ | ۴۸۶۰۵۷۰ | ۳۱۳۲۰۰ | ۱۵/۵۲ |
| T4(1,1,1) | ۲۳۷۷ ^b | ۱۶۱۰ | ۴۹۷۴۹۰۰ | ۳۱۳۲۰۰ | ۱۵/۹۰ |
| | ۱۸۰ | | | | |

اعداد هر گروه که حداقل در یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون LSD هستند. زمان مصرف نیتروژن (تماماً هنگام کاشت "T1(1)", دو سوم هنگام کاشت و یک سوم شروع ساقه دهی "T2(2,1)", یک سوم هنگام کاشت و دو سوم شروع ساقه دهی "T3(1,2)", یک سوم هنگام، یک سوم شروع ساقه دهی و یک سوم اوایل گلدهی "T4(1,1,1)". برای محاسبات هزینه هر کیسه کود آورده بنا به تصویب هیات دولت (۱۳۹۸/۷/۷) ۴۰ هزار تومان و هر کیلو دانه گلرنگ در سال ۹۸-۱۳۹۷ براساس قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ۳۰۹۰ تومان در نظر گرفته شد. *ستون ۲ ضرب در قیمت هر کیلو گرم دانه

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که صرف افزایش کود شیمیایی نیتروژن نمی تواند متضمن تولید اقتصادی باشد، زیرا با افزایش مصرف کود نیتروژن شاخص های کارایی از طریق هدرروی و آبشویی کاهش می یابد، اما چنانچه مقدار کود به میزان بهینه و متناسب با مراحل حساس رشدی گیاه مصرف شود نه تنها حصول به عملکرد اقتصادی محتمل خواهد بود، بلکه اثرات منفی زیست محیطی ناشی از کاربرد غیر اصولی کود تعدیل می گردد. از این رو، با توجه به شرایط اجرای این آزمایش و با محاسبه نسبت فایده به هزینه، مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در سه مرحله (هر بار یک سوم "هنگام کاشت، شروع ساقه دهی و اوایل گلدهی") با نسبت فایده به هزینه ۴۳/۱۸ و کارایی مصرف ۳۱ کیلوگرم در کیلوگرم در زراعت گلرنگ قابل توصیه می باشد. همچنین پیشنهاد می گردد اثر منابع مختلف ماده آلی و کودهای

زیستی از جنبه‌های مختلف بر گیاه گلرنگ در دستور کار قرار گیرد. از طرفی، آزمایش‌هایی به صورت مشترک بین متخصصان اصلاح گیاهی و تغذیه گیاهی به منظور دستیابی به ارقامی با کارایی بالا در جذب عناصر به ویژه سه عنصر اصلی (NPK) انجام شود.

سپاسگزاری

بدین وسیله از کلیه همکاران محترم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد به خصوص همکاران شاغل در بخش تحقیقات خاک و آب که در اجرای این پروژه مساعدت نمودند قدردانی به عمل می آید.

منابع

- حسینی، ز. ۱۳۶۹. روش های متداول در تجزیه مواد غذایی. انتشارات دانشگاه شیراز، ایران. ۲۱۰ صفحه.
- دانش شهرکی، ع.، کاشانی، ع.، مسگر باشی، م.، نبوی، م. و کوهی دهکردی، م. ۱۳۸۸. اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. ۱۷:۷۹-۱۰.
- راستگو، ب، عبادی، ع و پرمون، ق. ۱۳۹۳. بررسی اثر مصرف نیتروژن بر عملکرد و ترکیبات ذخیره ای دانه گلرنگ (*Cartamus tinctorius L.*). فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. ۶ (۲۱): ۱۰۲-۸۵.
- زرین کفش، م. ۱۳۶۸. حاصلخیزی خاک و تولید. انتشارات دانشگاه تهران، ایران. صفحه ۱۸-۱.
- سلیمان زاده، ح.، خلیلی اقدم، ن و میر محمودی، ت. ۱۳۹۲. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و صفات زراعی ارقام گلرنگ در منطقه مغان. مجله پژوهش در علوم زراعی. ۵ (۱۹): ۴۰-۲۹.
- علی احمایی، م و بهبهانی زاده، ع. ا. ۱۳۷۲. شرح روش های تجزیه شیمیایی خاک. نشریه فنی شماره ۸۹۳، چاپ اول، موسسه تحقیقات خاک و آب. ۱۵۰ صفحه.
- غیائی اسکویی، م.، آقا علیخانی، م.، سفید کن، ف.، مختصی بیدگلی، ع. و عیاری، م. ۱۳۹۷. اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس (*Cnicus benedictus L.*). به زراعی کشاورزی. ۳: ۶۴۳-۶۵۴.
- فولادوند، م و یدوی، ع. ر. ۱۳۹۴. اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیم کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (*Cartamus tinctorius L.*) در رقابت با علف های هرز. نشریه پژوهش های علوم زراعی ایران. ۳ (۲): ۳۵۸-۳۶۵.

- قنبری کاشان، م.، م. میرزاخانی، م. فرید هاشمی، س. ۱۳۹۵. پاسخ کارایی فیزیولوژیک نیتروژن گلرنگ به مصرف کودهای دامی و شیمیایی در منطقه کاشان. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. ۱۱(۴۱): ۵۳-۶۴.
- کسرای، ر. ۱۳۷۲. چکیده ای درباره علم تغذیه گیاهی (ترجمه). انتشارات دانشگاه تبریز، ایران. ۳۷۲ صفحه.
- موسوی، س. س. و ذاکر نژاد، س. ۱۳۹۹. اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر صفات موفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای (*Zea mays L.*). فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. ۱۲(۴۵): ۹۱-۱۱۱.
- میرشکاری، ب و صیامی، ر. ۱۳۹۵. اثر مقادیر مصرف و تقسیم آورده بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ. مجله بوم شناسی گیاهان زراعی. ۱۲(۲): ۶۳-۵۵.
- میرزاخانی، م. ۱۳۹۶. پاسخ خصوصیات زراعی گلرنگ (*Carthamus tinctorius L.*) به زمان، مقدار، و روش مصرف نیتروژن. نشریه علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. ۴(۴۴): ۸۸۸-۸۷۵.
- میرزاشاهی، ک. ۱۳۹۶. بررسی ادواری کربن آلی خاک در دشت خوزستان و ارایه راهکارهای ترویجی. نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی. ۵(۱): ۱-۱۲.
- میرزاشاهی، ک.، پاک نژاد، ع. ر. و امیدواری، ش. ۱۳۹۷. واکنش چغند قند پاییزه به کاربرد نیتروژن و شاخص های کارایی آن. نشریه پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). ۱۲(۹): ۴۵۶-۴۴۳.
- نقوی، ه.، صباح، آ.، امیرپور رباط، م. و نورقلی پور، ف. ۱۳۹۷. بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر صفات کمی گلرنگ در یک خاک آهکی در منطقه کرمان. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). ۲۲(۲): ۳۹۵-۴۰۶.

Abbadi, J., Gerendás, J. and Sattelmacher, B. 2008. Effects of nitrogen supply on growth, yield and yield components of safflower and sunflower. *Plant and Soil*. 306: 167-180.

Afzal, O., Asif, M., Ahmed, M., Karim, A. F., Aslam, M. A., Zhoor, A., Bilal, M., Shaheen, F. A., Zulficar, M. A. and Ahmed, N. 2017. Integrated nutrient management of safflower (*Carthamus tinctorius L.*) under rainfed conditions. *American Journal of Plant Sciences*. 8:2208-2218.

Anicesio, E. E. A., Bonfim- Silva, E. M, Silva, T. J. A. and Koetz, M. 2015. Dry mass, nutrient concentration and accumulation in safflower (*Carthamus tinctorius L.*) influenced by nitrogen and potassium fertilizations. *Australian Journal of Crop Science*. 9: 552-560.

Arregui, L. M. and Quemada, M. 2008. Strategies to improve nitrogen use efficiency in winter cereal crops under rainfed conditions. *Agronomy Journal*. 100: 277-284.

Ashraf, A. A. and Gamalat, O. M. 2013. Modeling the influence of nitrogen rate and plant density on seed yield, yield components and seed quality of safflower. American Journal of Experimental Agriculture. 3(2):336-360.

Bonfim-Silva, E. M., Sasso Paludo, J. T., Rodrigues Sousa, J. N. and Araujo da Silva, T. J. 2015. Development of safflower subjected to nitrogen rate in Cerrado soil. American Journal of Plant Science. 6(3): 2136-2143.

Chen, P., Du, Q., Liu, X., Zhou, L., Hussain, S., Lei, L., Song, C., Wang, X., Liu, W., Yang, F., Shu, K., Liu, J., Du, J., Yang, W. and Yong, T. 2017. Effect of reduced nitrogen inputs on crop yield and nitrogen use efficiency in a long-term maize- soybean relay strip intercropping system. PLoS ONE. 12(9):1-19.

De Anicesio, E. C. A., Bofirm- Silva, E. M, Da Silva, T. J. A. and Pacheco, A. B. 2018. Nitrogen and potassium in safflower: Chlorophyll index, biometric characteristics and water ues efficiency. Revista Caatinga. 31(2):424-433.

Dordas, C. and Sioulas, C. 2008. Safflower yield, chlorophyll content, photosynthesis, and water use efficiency under rainfed conditions. Industrial Crops and Products.27:75- 85.

Ebrahimian, A. and Soleymani, A. 2013. Growth length and dry matter yield in different stages of safflower as affected by nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers. International Journal of Agronomy and Plant Production. 4(5): 963-969.

Edalat, M. and Naderi, R. 2016. Effect of organic and mineral fertilizer on safflower (*Carthamus tinctorius* L.) seed yield and yield components. Biological forum. 8(2):172-180.

Eryigit, T., Yildirim, B., Kumlay, A. M. and Sancaktaroglu, S. 2015. The effects of different row distances and nitrogen fertilizer rates on yield and yield components of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) under microclimate conditions of Igdır Plain- Turkey. 3 rd International Conference on Biological, Chemical and Environment Sciences. September, 21-22, Kuala Lumpur, Malaysia.p. 17-22.

Flemmer, A. C., Franchini, M. C. and Lindstorm, L. 2015. Description of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) phenological growth stages according to the extended BBCH scale. Annals of Applied Biology. 166: 331-339.

Galavi, M., Ramroudi, M. and Tavassoli, A. 2012. Effect of micronutrients foliar application on yield and seed oil content of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) African Journal of Agricultural Research. 7(3): 482-486.

Gecgel, U., Demirci, M. Esended, E. and Tasan, M. 2007. Fatty acid composition of the oil from developing seeds of different varieties of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) Journal of the American .Oil Chemists' Society. 48 (1): 47-54.

Ghasemi, M., Moghaddasi, M. S. and Omid, A. H. 2012. The effects of biological and chemical nitrogen fertilizers on agronomical traits of winter safflower cultivars in Saveh region of Iran. *Annals of Biological Research*. 3 (11):5141-5144

Grant, C. and Entz, E. 2006. Crop management to reduce N fertilizer use. *Maydica*. 50: 538-542.

Golzarfar M, Shiranirad A. H, Delkhosh, B. and Bitarafan, Z. 2012. Safflower (*Carthamus tinctorius* L.) response to different nitrogen and phosphorus fertilizer rates in two planting seasons. *Zemdirbyste-Agriculture, Scinentific Journal*. 99(2): 159-166.

Gunter, E. A. and Ovodov, Y. S. 2005. Effect of calcium, phosphate and nitrogen on cell growth and biosynthesis of cell wall polysaccharides by *Silene vulgaris* cell culture. *Journal of Biothechnology*. 117: 385- 393.

Haghighat Malek, A. and Ferri, F. 2014. Effects of nitrogen and phosphorus fertilizers on safflower yield in dry lands condition. *International Journal of Research in Agricultural Sciences*.1(1):28-33.

Ismael, M. R. and Othman, A. A. 1995. Ammonium: Nitrate ratio and its relation to the changes in solution pH, growth, mineral nutrition and yield of tomatoes growth in nutrient film technique. *Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science*. 18(3):149-157.

Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Second Edition. Academic Press. New York, USA.

Manlou, C.S., Jaggard, K. W. and Sparkes, D. L. 2008. Nitrogen fertilizer and the efficiency of the sugar beet crop in late summer. *European Journal of Agronomy*. 28: 47-56.

Moradi Talebbeigi, R., Kazemeini, S. A. and Ghadiri, H. 2018. Impact of split application of different N-fertilizer sources on weed growth, safflower yield, and nitrogen use efficiency. *Journal of agricultural Science and Technology*. 20: 1455-1466.

Mulvaney, R. L. 1996. Nitrogen-Inorganic Forms. In Sparks, D.L., Page, A.L., Helmke, P.A., Loeppert, R.H., Soltanpour, P.N., Tabatabai, M.A., Johnston, C.T., and Sumner, M.E. (ed), *Methods of Soil Analysis. Part 3- Chemical Methods*. Soil Science Society American Inc. American Society Agronomy Inc. Book Series, No. 5, Madison, WI, USA., pp: 1123-1184.

Mündel, H. H., Morrison, R. J., Blackshaw, R. E. and Roth, B. 2004. Safflower Production on the Canadian Prairies: Revisited in 2004. *Agricultural Canadian Research Station*. Lethbridge/Alberta.

Santos, R. F., Bassegio, D., Sartori, M. M. P., Zannoto, M. D. and Silva, M. D. A. Z. 2018. Safflower (*Carthamus tinctorius* L.) yield as affected by nitrogen fertilization and different water regime. *Plant Ecophysiology and Crop Production*. 67: 264-269.

Seyed Sharifi, R., Namvar, A. and Seyed Sharifi, R. 2017. Grain filling and fatty acid composition of safflower fertilized with integrated nitrogen fertilizer and biofertilizers. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira*. 4: 236-243.

Shahrokhnia, M. H. and Sepaskhah, A. R. 2016. Effects of irrigation strategies, planting methods and nitrogen fertilization on yield, water and nitrogen use efficiency of safflower. *Agricultural Water Management*. 172: 18-30.

Sisson, V. A., Ruffy, T. W. and Williams, R. E. 1991. Nitrogen use efficiency among flue-cured tobacco genotypes. *Crop Science*. 31: 1615- 1620.

Stevens, W.B., Violett, R. D., Skalsky, S. A. and Mesbah, A. O. 2008. Response of eight sugarbeet varieties to increasing nitrogen application: I. Root, sucrose, and top yield. *Journal of Sugar Beet Research*. 45: 65-83.

Tedone, L., Verdini, L., Grassano, N., Tarraf, W. and De-Mastro, G. 2014. Optimizing nitrogen in order to improve the efficiency, ecophysiology, yield and quality on one cultivar of durum wheat. *Italian Journal of Agronomy*. 9:49-54.

Taleshi, K., Shokoh-Far, A., Rafiee, M., Noormahamadi, G. and Sakinejhad, T. 2012. Safflower yield respond to chemical and biotic fertilizer on water stress condition. *World Applied Science Journal*. 20(11): 1472-1477.

Tuncturk, M. and Yildirim, B. 2004. Effects of different forms and doses of nitrogen fertilizers on safflower (*Carthamus tinctorius* L.). *Pakistan Journal of Biological Sciences*. 7: 1385- 1389.

Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R. and Polasky, S. 2002. Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature*. 418: 671-677.

Zemenchik, R. A. and Albrecht, K. A. 2002. Nitrogen use efficiency and apparent nitrogen recovery of Kentucky bluegrass, smooth brome grass, and orchardgrass. *Agronomy Journal*. 94: 421-428.

Zong, N., Song, M., Shi, P., Jiang, X., Zhang, X. and Shen, Z. 2014. Timing patterns of nitrogen application alter plant production and CO₂ efflux in an alpine meadow on the Tibetan Plateau. *China pedobiologia*. 57: 263-169.