

ناحیه‌بندی سینوپتیک دمای منطقه خزر بر مبنای متغیرهای ترمودینامیک ترازهای فوقانی جو

یوسف قویدل رحیمی^{۱*}، حمید نوری^۲، طلعت یساری^۳

۱- استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲- استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

۳- استادیار گروه فیزیک دانشگاه زابل، زابل، ایران

دريافت: ۸۷/۳/۱ پذيرش: ۸۸/۶/۲۲

چكیده

دما از مهم‌ترین عناصر مؤثر بر آب و هوا و محیط‌زیست هر منطقه است. دریای خزر به عنوان یک توده آبی گستردۀ در حاشیه شمالی ایران می‌تواند سهم مهمی را در تعديل نوسان‌های دما بر عهده داشته باشد. برای بررسی شرایط همدید و تعیین نواحی دمایی منطقه خزر و عوامل مؤثر در ناحیه‌بندی آن، داده‌های روزانه جوی ترازهای مختلف این منطقه در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی فراهم و شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت دمایی شامل دمای هوا، دمای پتانسیل، فرارفت دمای جو در سطوح ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ هکتار پاسکال محاسبه شد. سپس با استفاده از تحلیل مؤلفه مبنا و تحلیل خوش‌های، نقشه نواحی هر سه شاخص دمایی منطقه خزر برای سنتون جوی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ هکتار پاسکال و هم‌چنین نقشه‌های نواحی دمایی برای ترازهای ۳۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۵۰ و ۱۰۰۰ هکتار پاسکال ترسیم شد.

نتایج نشان می‌دهد برای هر کدام از شاخص‌ها، هفت ناحیه در منطقه خزر وجود دارد که عرض جغرافیایی و سیستم‌های سینوپتیکی به خصوص استقرار سامانه پرفشار آسیایی در روزهای سرد سال در بخش شرقی و شمال شرقی خزر (عامل کاهش دما) و انواع سامانه‌های کم فشار و پرفشار مهاجر در بخش غربی و جنوب غربی (عامل افزایش دما)، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تفکیک نواحی دمایی در همه ترازها محسوب می‌شوند. هم‌چنین نتایج حاصل از مقایسه نقشه‌های نواحی شاخص‌های دمایی (دما، دمای پتانسیل و فرارفت دما) نشان می‌دهد که محدوده خشکی و آبی خزر از هم تفکیک نشده است، در این صورت نقش پنهان بزرگ آبی دریاچه، در مقیاس سینوپتیک در توزیع مکانی و ناحیه‌بندی دمایی منطقه، قوی نیست و با احتمال زیاد با انتقال و تبادل انرژی و ایجاد جریان‌های نسیم خشکی- دریا،



تأثیر آن در مقیاس کوچک تا متوسط و در بخش‌هایی از سال قابل رویت است. در مجموع در ترازهای مختلف جوی، بین شمال و جنوب منطقه، به طور متوسط ۷ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد و بین شرق و غرب منطقه به طور متوسط ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد اختلاف دما وجود دارد و سردرین ناحیه در قسمت شمال شرقی منطقه واقع است.

کلیدواژه‌ها: ناحیه‌بندی سینوپتیک، نواحی دمایی، تحلیل چند متغیره، دریای خزر.

۱- مقدمه

دما از مهمترین عناصر اقلیمی است که در تعیین نقش و پراکندگی دیگر عناصر اقلیمی نیز مؤثر بوده و از مؤلفه‌های اصلی در پهنه‌بندی و طبقه‌بندی‌های اقلیمی محسوب می‌شود و از این رو نوسان‌ها و تغییرپذیری آن اهمیت بسیار علمی- کاربردی دارد (علیجانی و قویدل رحیمی، ۱۳۸۴: ۲۲). دما در چرخه‌های طبیعی و بهویژه چرخه‌های آب و انرژی اهمیت بنیادی دارد و از این رو بر فعالیت‌های انسانی (از جمله تأمین آب) و فرایندهای طبیعی هر ناحیه به طور کامل تأثیرگذار است و تغییرات آن در مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌عاملی بسیار مهم است. در دهه‌های اخیر نتایج کاربردی تحلیل دما باعث شده است تا مطالعه وردشی و افت و خیزهای آن در درازمدت، کوتاه‌مدت و بهویژه در مقیاس جهانی مورد توجه جدی قرار گیرد. اغلب مخاطرات محیطی عصر ما از جمله سیل، طوفان، خشک‌سالی، تکثیر بیش از حد حشرات موذی و نیز مصونیت آن‌ها در برابر سموم و مسائلی از این نوع، ریشه در تغییر اقلیم زمین و بهخصوص افزایش دمای جهان دارند (Kundzewicz &at.al., 2008: 118).


به دلیل نقشی که دریای خزر بر اقلیم منطقه دارد، از جوانب مختلف بررسی شده است؛ به طور مثال علیجانی بارش بخش وسیعی از شمال ایران را به دریای خزر مربوط دانسته و پهنه آبی مذکور را منبع تأمین رطوبت بارش‌های مناطق خزری می‌داند (علیجانی، ۱۳۶۹: ۴۲). مرادی بارش دوره سرد سال را در خزر جنوبی با نگرشی سینوپتیک بررسی کرده و الگوهای رایج مؤثر بر هیدرواقلیم خزر را تحلیل کرده است (مرادی، ۱۳۸۱: ۶۱). از مطالعاتی که در آن دما با نگرش سینوپتیک و در ارتباط با نقش وزش دما بررسی شده است، می‌توان به رساله

قویدل رحیمی اشاره کرد. به عقیده او عامل وقوع دماهای فرین زمستانی آذربایجان، وزش دمایی منفی است (قویدل رحیمی، ۱۳۸۸: ۱).

با مرور تحقیقات انجام شده در مورد اقلیم خزر چنین به نظر می‌رسد که دریای خزر و اطراف آن از حیث دما بررسی شده و منطقه‌بندی نشده است، به این ترتیب ناحیه‌بندی دما بر اساس داده‌های جوی ترازهای مختلف، به طور مسلم یک کار جدید در زمینه اقلیم خزر می‌باشد. با توجه به اهمیت دریای خزر در تولید و جرح و تعديل شرایط آب و هوایی نواحی اطراف آن، شناخت ویژگی‌های دمایی و ناحیه‌بندی آن یک قدم اساسی و کاربردی در اقلیم‌شناسی کاربردی خزر است که این موضوع هدف و کوشش اصلی این مطالعه را تشکیل می‌دهد.

۲- داده‌ها و روش‌ها

داده‌های دما، سرعت و جهت باد با تفکیک مکانی $2/5$ در $2/5$ درجه در منطقه دریای خزر، بین عرض جغرافیایی 35° تا 50° درجه و طول جغرافیایی $42/5$ تا $57/5$ درجه (49°) گره^۱ در ترازهای مختلف جو برای همه روزهای سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی تهیه شد (شکل ۱).



شکل ۱ محدوده جغرافیایی مطالعه شده

1. Node

با توجه به مقیاس سینوپتیک مطالعه، محدوده بررسی شده کمی بزرگ‌تر انتخاب شد. همچنین فراستخ‌های دما (C^o)، فرارفت دما (C^o/dy) و دمای پتانسیل (C^o) در ۱۲ تراز (۱۰۰۰، ۹۲۵، ۸۵۰، ۷۰۰، ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰ هکتوپاسکال) برای روزهای سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی محاسبه شد. محاسبه وزش دما (معادله ۱) و دمای پتانسیل (معادله ۲) که بر اساس کار هولتون، ۱۹۹۲، ۷۸ محاسبه شده) به شرح زیر انجام شده است:

$$adt = -1 * (u * dtx / dx + v * dty / dy) \quad (1)$$

در معادله فوق: adt فرارفت دما، dtx و dty نیز به ترتیب نمو دما در جهت مداری و نصفالنهاری هستند (اشتاں، ۲۰۰۰: ۵۸).

$$\theta = [T * (1000 / P)^{0.286} - 273.15] \quad (2)$$


پس از محاسبات مذکور بر روی ماتریس هر کدام از شاخص‌های دمایی (49×4380) تحلیل مؤلفه مبنا و تحلیل خوش‌های انجام و ناحیه دمایی مربوط به هر گره تعیین شد. انتخاب همه داده‌ها در کل ترازها با هدف افزایش دقت در تفکیک نواحی منطقه از راه افزایش مشخصات مکانی داده‌ها بوده است. به عبارت دیگر وضعیت دما، فرارفت دما و دمای پتانسیل مناطق جغرافیایی مختلف بدون توجه به ماهیت هر کدام از ترازهای جوی، تعیین و نواحی دمایی منطقه از راه نگرش کل نگر به لایه جوی تروپوسفر با یکدیگر مقایسه شده است. در هر شاخص دمایی، گره‌ها در صورتی به یک گروه تعلق می‌گیرد که در همه روزهای به اندازه کافی به هم نزدیک باشند. پس از اندازه‌گیری فواصل اقلیدسی یک تحلیل خوش‌های به روش ادغام وارد بر ماتریس D انجام گرفت و ۴۹ گره ماتریس T بر حسب درجه همگونی با یکدیگر خوش‌بندی شد (شکل ۱). با مشخص شدن نواحی دمایی هر یک از شاخص‌ها در نقاط مکانی ماتریس‌های T (گره‌ها)، نقشه هر کدام از شاخص‌های دمایی منطقه خزر ترسیم شد و سپس برای شناخت مناسب‌تر از وضعیت دمایی منطقه، کلیه مراحل مذکور برای دمای ترازهای ۳۰۰

۵۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ هکتوپاسکال انجام شد تا با مقایسه بین ترازهای مختلف جوی و ستون جوی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ هکتوپاسکال، نقش عوامل اصلی در ناحیه‌بندی دمایی در ترازهای مختلف شناسایی شود.


۳- تحلیل داده‌ها

در شکل ۲، کاهش منظم دما از جنوب به شمال منطقه خزر قابل مشاهده است. کاهش مذکور در بخش شمالی به سمت شرق منطقه، تغییر جهت داده است. بیشترین میزان دما در منطقه جنوب‌شرقی به مقدار $20/407$ - درجه سانتی‌گراد و کمترین آن به مقدار $27/681$ - درجه سانتی‌گراد در منطقه شمال شرقی است. به نظر می‌رسد تأثیر عرض جغرافیایی در این منطقه در شکل‌گیری نواحی دمایی بیشتر از عوامل دیگر باشد.

با توجه به نقشه هم‌دامای شکل ۲ و شکل‌های ۳‌الف و ۳‌ب معلوم می‌شود که از میان هفت الگوی اصلی دما، سه الگوی بارز در این منطقه وجود دارد که عبارتند از الگوی مناطق جنوبی بر خشکی و دریا (نواحی ۱ و ۲)، الگوی مناطق شمالی بر خشکی (نواحی ۶ و ۷) و الگوی میانی منطقه خزر (نواحی ۳ و ۴ و ۵). در الگوی خشکی‌های مناطق جنوبی، سواحل آبی و خشکی (ناحیه ۲) از خشکی‌های دورتر و ناحیه ۱ که گرم‌ترین ناحیه منطقه را در بر می‌گیرد، تفکیک شده است. قرارگرفتن بخش‌های شمالی و جنوبی البرز در یک گروه با توجه به مقیاس کوچک، موقعیت داده‌های پایه و انتخاب ۷ گروه در خوشبندی روی داده است. اگر مقیاس موقعیت داده‌های پایه، بزرگ‌تر و گروه‌های منتخب در خوشبندی افزایش پیدا کند، تفکیک نواحی دمایی دقیق‌تر خواهد بود. در الگوی خشکی‌های شمالی، مناطق شرقی (ناحیه ۷) به عنوان سردترین ناحیه، از مناطق غربی (ناحیه ۶) جدا می‌شود.




شکل ۲ نقشه مقادیر هم‌دما براساس کل داده‌های لایه جوی ترازو ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ برحسب درجه سانتی گراد در محدوده خزر



شکل ۳ الف: نمودار درختی دمای ۴۹ گره محدوده خزر؛ ب: نمودار هفت ناحیه دمایی خزر


شکل ۴ نشان می‌دهد که یک محدوده فرارفت مثبت دما در جنوب‌غربی و یک محدوده فرارفت منفی دما با مقایر دمای بیشتر، در شمال غربی منطقه خزر قراردارد. بیشترین مقدار فرارفت دمای منفی بر روی خشکی، در جنوب شرقی به میزان $-0^{\circ}455$ درجه سانتی‌گراد بر روز و کمترین آن نیز روی خشکی غرب منطقه به مقدار $-0^{\circ}037$ درجه سانتی‌گراد بر روز است. کمترین مقدار فرارفت دمای مثبت به میزان $0^{\circ}016$ درجه سانتی‌گراد بر روز در ساحل آبی جنوب‌غربی دریاچه (نژدیک انزلی) و بیشترین مقدار آن به مقدار $0^{\circ}113$ درجه سانتی‌گراد بر روز در همان عرض جغرافیایی و روی خشکی جنوب‌غربی منطقه قرار دارد.




شکل ۴ نقشه مقادیر هم فرارفت دما براساس کل داده‌های لایه‌های جوی 1000 تا 100 هکتوپاسکال در محدوده خزر

نقشه شکل ۴ و شکل‌های ۵ الف و ب نشان می‌دهد که از میان هفت الگوی اصلی فرارفت دما در منطقه خزر، چهار الگوی بارز وجود دارد. الگوی بخش غربی که شمال‌غربی، غرب و جنوب‌غربی منطقه (ناحی ۱ و ۴) را پوشاند. الگوی شمال و شمال‌شرقی (ناحی ۵ و ۷)، الگوی شرق و جنوب‌شرقی (ناحیه ۶) و الگوی میانی منطقه خزر (ناحی ۲ و ۳) که منطقه جنوبی تا بخش مرکزی (دریاچه و سواحل) را در بر

می‌گیرد. در مسیر حرکت از غرب به شرق در جنوب منطقه، گرادیان فرارفت دما افزایش و مقادیر فرارفت دما از مثبت به منفی تغییر پیدا می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که با توجه به تأثیر سامانه پرفشار سیبری در ریزش هوای سرد و خشک به شمال شرقی ایران و جنوب شرقی منطقه خزر در فصول سرد سال (حرکت ساعتگرد هوا)، وجود فرارفت منفی دما در این نواحی توجیه می‌شود. به نظر می‌رسد که فرارفت مثبت دما در جنوب غربی منطقه به علت تأثیرات سامانه‌های گرم و مرطوب عرض‌های جغرافیایی پایین (که از غرب و جنوب غرب وارد ایران می‌شود) باشد. شکل ۶ نشان می‌دهد که یک روند کاهش منظم دمای پتانسیل از جنوب به شمال منطقه خزر وجود دارد. این روند همانند نواحی دمایی منطقه در شمال به سمت شرق ادامه پیدا می‌کند. بیشترین مقدار دمای پتانسیل در جنوب شرقی منطقه روی خشکی (۴۶/۹۶ درجه سانتی گراد) و کمترین مقدار آن در شمال شرقی منطقه روی خشکی (۳۶/۵۹ درجه سانتی گراد) قرار دارد.



شکل ۵ الف: نمودار درختی فرارفت دمایی ۴۹ گره محدوده خزر؛ ب: نمودار هفت ناحیه فرارفت دمایی در محدوده خزر




شکل ۶ نقشه مقادیر هم‌دمای پتانسیل کل لایه جوی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ هکتوپاسکال بر حسب درجه سانتی‌گراد در محدوده خزر

نقشه شکل ۶ و شکل‌های ۷ الف و ۷ ب نشان می‌دهد که از میان هفت الگوی اصلی دمای پتانسیل در منطقه خزر، سه الگوی بارز وجود دارد. الگوی جنوبی شامل جنوب غربی، جنوب و جنوب‌شرقی منطقه (ناحیه ۱ و ۴) با بیشترین مقادیر دمای پتانسیل است که بخش غربی آن (ناحیه ۱) بر روی خشکی از بخش شرقی (ناحیه ۴) تقسیک می‌شود. الگوی میانی (ناحیه ۲، ۳ و ۵) در بخش مرکزی منطقه واقع شده است. الگوی شمالی (۶ و ۷) که بر روی خشکی قراردارد، با کمترین مقادیر دمای پتانسیل، بخش غربی آن (ناحیه ۶) از بخش شرقی (ناحیه ۷) جدا می‌شود. همچنین گرادیان هم دمای پتانسیل در بخش‌های شمالی و جنوبی منطقه نشان می‌دهد شدت ناپایداری‌های جوی در این مناطق متفاوت است که این مسئله با مقایسه دمای هوا و دمای پتانسیل هوا در ترازهای مختلف جوی، قابل بررسی است.

نقشه‌های نهایی ناحیه‌بندی دما، فوارفت دما و دمای پتانسیل به ترتیب در شکل‌های ۸ الف، ۸ ب و ۸ ج ترسیم و مقادیر میانگین شاخص‌های دمایی بر اساس کل داده‌های لایه جوی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتوپاسکال در هر کدام از نواحی هفت‌گانه محدوده خزر در جدول ۱ ارائه شده است. با استفاده از داده‌های جوی ترازهای ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ هکتوپاسکال، میانگین

دماه منطقه خزر ۴۴/۲۴، میانگین فرارفت دما $-0/05^{\circ}\text{C}$ بر روز و میانگین دمای پتانسیل $41/13^{\circ}\text{C}$ (ارقام به درجه سانتی‌گراد) محاسبه شد.




شکل ۷ الف: نمودار درختی دمای پتانسیل ۴۹ گره محدوده خزر؛ ب: نمودار هفت ناحیه دمای پتانسیل محدوده خزر

جدول ۱ مقادیر میانگین شاخص‌های دمایی براساس کل داده‌های لایه جوی 1000×1000 هکتوپاسکال در هر یک از نواحی هفت‌گانه محدوده خزر

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	ناحیه دمایی شاخص دمایی
$-27/10$	$-27/06$	$-25/70$	$-25/26$	$-23/89$	$-22/19$	$-20/66$	C° دما
$-0/0013$	$-0/2514$	$-0/0279$	$-0/0422$	$-0/0301$	$-0/0208$	$0/0788$	فرارفت دما C°/day
$37/38$	$37/40$	$39/80$	$45/62$	$41/80$	$42/20$	$45/23$	C° پتانسیل

به طور کلی، نتایج بررسی نقشه نواحی دمایی و دمای پتانسیل کل ستون جوی 1000×1000 هکتوپاسکال در محدوده خزر نشان می‌دهد که تأثیر عرض جغرافیایی در این منطقه در

شكل گیری نواحی دمایی، بهویژه در نیمه جنوبی محدوده خزر، بیشتر از عوامل دیگر است. هر چند در نیمه شمالی، تأثیر سیستم‌های سینوپتیکی به خصوص پرفشار سیبری در بخش شرقی و سامانه‌های کم‌پشار و پرفشار مهاجر در بخش غربی نیز موجب تفکیک نواحی سردتر شرقی از گرم‌تر غربی شده است. نقشه نواحی فرازدما (شکل ۸ ب) چگونگی تأثیر سیستم‌های سینوپتیک در ناحیه‌بندی دمایی منطقه را نشان می‌دهد.



شکل ۸ الف: نقشه نواحی دمایی؛ ب: نقشه نواحی فرازدما؛ ج: نقشه نواحی دمایی پتانسیل در محدوده خزر

بررسی نقشه نواحی دمایی تراز ۱۰۰۰ هکتوپاسکال در محدوده خزر نشان می‌دهد در جنوب عرض جغرافیایی ۴۰ درجه، عامل عرض جغرافیایی تنها عامل تعیین‌کننده نواحی دمایی است و در عرض‌های جغرافیایی بیش از ۴۰ درجه به دلیل تفکیک نواحی شرقی از غربی، علاوه بر عرض جغرافیایی، تأثیر سامانه‌های سینوپتیک نیز اهمیت دارد. بررسی نقشه نواحی دمایی ترازهای ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال در محدوده خزر (شکل ۹ الف) نشان می‌دهد، با توجه به تفکیک نواحی شمالی- جنوبی و شرقی- غربی آن، کل محدوده مذکور در ترازهای جوی یادشده، تحت تأثیر عرض جغرافیایی و سامانه‌های سینوپتیک است. بررسی نقشه نواحی دمایی تراز ۳۰۰ هکتوپاسکال در محدوده خزر نشان می‌دهد که در جنوب عرض جغرافیایی ۴۵ درجه، عامل عرض جغرافیایی تنها عامل تعیین‌کننده نواحی دمایی بوده اما در عرض‌های بالاتر



از آن به دلیل تفکیک نواحی شرقی از غربی، هم عرض جغرافیایی و هم سامانه‌های سینوپتیک مؤثر هستند. در مجموع در ترازهای مختلف جوی، بین شمال و جنوب منطقه، به طور متوسط ۷ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد و بین شرق و غرب منطقه به طور متوسط ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد اختلاف دما وجود دارد و سرددترین ناحیه در قسمت شمال شرقی منطقه واقع است. با توجه به این که یکی از عوامل ایجاد بارش در منطقه خزری، اختلاف دمای هوای شمال شرقی جنوب‌غربی به میزان حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد است و نقشه نواحی دمایی خزر در ترازهای مختلف بر وجود این اختلاف اقلیمی بهویژه در تراز ۱۰۰۰ هکتوپاسکال دلالت دارد (جدول ۲)، در این صورت شرایط لازم برای ناپایداری جریان هوایی که از شمال شرقی محدوده وارد می‌شود، مهیا است.

جدول ۲ میانگین دمای هوای ترازهای مختلف جوی در نواحی دمایی محدوده خزر (درجه سانتی‌گراد)

ناحیه دمایی (hp) تراز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۰۰۰	۲۳/۲	۱۹/۶۱	۱۵/۱۲	۱۴/۵۷	۱۱/۵۵	۸/۷۹	۸/۵۷
۸۵۰	۱۲/۲۸	۱۰/۸۶	۷/۲۳	۶/۳۰	۱۵/۹	۳/۶	۳/۲
۷۰۰	۲/۹۹	۱/۱۲	-۱/۸۰	-۲/۲۶	۴/۷۸	-۵/۱۶	-۵/۰۸
۵۰۰	-۱۴/۰۳	-۱۶/۵۱	-۱۸/۵۲	-۱۹/۰۹	-۱۴/۸۳	-۲۱/۲۷	-۲۱/۱۸
۳۰۰	-۳۹/۳	-۴۱/۱۰	-۴۲/۹۳	-۴۴/۶۲	-۴۶/۰۴	-۴۷/۵۷	-۴۷/۵۶

نتایج جدول ۳ نشان می‌دهد که تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال با کمترین واریانس، ضریب کشیدگی و دامنه تغییرات، از نقطه نظر دمایی، با ثبات‌ترین و نزدیک‌ترین شرایط به وضعیت نرمال را در بین ترازهای جوی منطقه خزر دارد. این موضوع در کنار تفکیک خوب نواحی دمایی در جهت‌های شمالی و جنوبی، استفاده از نقشه‌های این تراز را در مقایسه با ترازهای دیگر تأیید می‌کند.

جدول ۳ مشخصات آماری دمای هوا در ترازهای مختلف جوی در محدوده خزر

مشخصات آماری	ترازهای جوی	۳۰۰.hp	۵۰۰.hp	۷۰۰.hp	۸۵۰.hp	۱۰۰.hp
تعداد نقاط شبکه	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
میانگین	۱۴/۳۹۴۳	۷/۷۷۱۴	-۱/۲۲۰۲	۱۸/۲۱۴۷-	-۴۴/۱۶۰۸	۱/۳۹۴۳
میانه	۱۳/۶۱	۷/۷۳	-۱/۵۸	-۱۸/۴۶	-۴۴/۵۸۰۰	۱/۳۹۴۳
انحراف معیار	۱۵/۳۱۵۳	۴/۳	۳/۳۹۸	۲/۵۷۱۷	۳	۱/۳۹۴۳
واریانس	۲۸/۲۵۲	۱۸/۵	۱۱/۵۴۶	۶/۶۱۳	۹/۰۵	۱/۳۹۴۳
ضریب چولگی	۰/۳۳۳	۰/۵۱۵	۰/۳۳۰	۰/۲۶۰	۰/۳۱۹	۱/۳۹۴۳
خطای چولگی	۰/۳۴۰	۰/۳۴۰	۰/۳۴۰	۰/۳۴۰	۰/۳۴۰	۱/۳۹۴۳
ضریب کشیدگی	-۱/۱۰۲	-۰/۹۰۵	-۱/۱۱۰	-۱/۱۵۰	-۱/۲۴۵	۱/۳۹۴۳
خطای کشیدگی	۰/۶۶۸	۰/۶۶۸	۰/۶۶۸	۰/۶۶۸	۰/۶۶۸	۱/۳۹۴۳
دامنه	۱۶/۹۳	۱۴/۰۴	۱۰/۷۲	۷/۹۰	۹/۰۳	۱/۳۹۴۳
بیشینه	۷/۸۱	-۲/۲۰	-۵/۷۹	-۲۱/۷۷	-۴۷/۰۷	۱/۳۹۴۳
کمینه	۲۳/۷۴	۱۶/۲۴	۴/۹۳	-۱۳/۸۷	-۳۹/۰۴	۱/۳۹۴۳

۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق، این فرض که دریاچه خزر در شمال ایران تأثیر زیادی در اقلیم دمایی منطقه دارد، آزمون شد. با توجه به این که در ناحیه بندهای اقلیمی استفاده از عناصری مانند دما در




ترازهای مختلف جوی و در کل ستون جوی بالای منطقه، شناخت مطلوب‌تری از اقلیم پهنه‌های جغرافیایی ارائه می‌کند، در این پژوهش تلاش شد تا با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره به‌ویژه تحلیل خوشه‌ای، توزیع مکانی سه متغیر دما، دمای پتانسیل و فرارفت دما در در ترازهای مختلف جوی و در کل ستون جوی منطقه به دست آید تا نقش عوامل مختلف در ناحیه‌بندی دمایی جو به‌ویژه تروپوسفر منطقه شناسایی شود. داده‌های استفاده شده در این مطالعه شامل داده‌های روزانه ۱۰ سال مربوط به سه متغیر دما، دمای پتانسیل و فرارفت دما در همه ترازهای جوی منطقه بوده است.

نتایج حاصل از آرایش شرقی- غربی و شمالی- جنوبی نواحی دمایی نشان می‌دهد، تأثیرپذیری اقلیم این ناحیه از عرض جغرافیایی و سامانه‌های سینوپتیکی به‌خصوص استقرار سامانه پرفشار آسیایی در روزهای سرد سال در بخش شرقی و شمال شرقی خزر (عامل کاهش دما) و انواع سامانه‌های کم فشار و پرفشار مهاجر در بخش غربی و جنوب‌غربی (افزایش دما)، بسیار بیش‌تر از نقش پهنه بزرگ آبی دریای خزر در توزیع مکانی و ناحیه‌بندی دمای منطقه است. به عبارت دیگر، در مقیاس همدید، مرز نواحی دمایی ترسیم شده، خشکی‌ها و دریاچه خزر را از هم تفکیک نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد دریای خزر با انتقال و تبادل انرژی و ایجاد جریان‌های نسیم خشکی- دریا می‌تواند در مقیاس کوچک تا متوسط و در بخش‌هایی از سال، تأثیر قابل توجهی در اقلیم منطقه داشته باشد.

در مجموع در ترازهای مختلف جوی، بین شمال و جنوب منطقه، به طور متوسط ۷ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد و بین شرق و غرب منطقه به طور متوسط ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد اختلاف دما وجود دارد و سردرین ناحیه در قسمت شمال شرقی منطقه واقع است. این مسئله را می‌توان یکی از علل ناپایداری‌های جوی و بارش‌های سنگین جنوب شرقی خزر به‌ویژه در بندر انزلی محسوب کرد.

آرایش جغرافیایی هر سه شاخص دمایی نشان داد که تحلیل خوشه‌ای می‌تواند ابزار مناسبی برای پهنه‌بندی دمایی منطقه خزر باشد. با استفاده از روش خوشبندی وارد و بر مبنای دمای پتانسیل، فرارفت دمایی ۷ ناحیه اقلیمی متفاوت از همدیگر در منطقه خزر تشخیص و

نقشه‌های آن‌ها در شکل‌های ۹ الف، ۹ ب و ۹ ج نشان داده شده است که نتیجه اصلی تحلیل داده‌ها و به کارگیری فنون آماری چند متغیره بوده است.



شکل ۹ الف: نمودار هفت ناحیه دمایی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در محدوده خزر؛ ب: نقشه نواحی دمایی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال

۵- منابع

- علیجانی ب.؛ چگونگی تشکیل فرابار سبیری و اثر آن بر اقلیم شرق ایران؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ۱۷ (۵): ۴۱ - ۴۶، ۱۳۶۹.
- علیجانی ب.، قویدل رحیمی ای؛ مقایسه تغییرات دمای سالانه تبریز با ناهنجاری‌های دمایی کره زمین با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی؛ جغرافیا و توسعه، ۶: ۲۱ - ۳۸، ۱۳۸۴.
- قویدل رحیمی ای.؛ تحلیل سینوپتیک دماهای فرین پایین دوره سرد سال در منطقه شمال غرب ایران؛ رساله دکتری اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸.
- مرادی ح.؛ تحلیل همدید بارش‌های ساحل جنوبی دریای خزر در شش ماه سرد سال؛ مجله علوم دریایی ایران، ۲: ۶۱ - ۷۲، ۱۳۸۱.



- Kundzewicz Z. C.; Giannakopoulos M., Schwarb; I., Stjernquist M., Szwed J., Palutikof ; Impacts of climate extremes on activity sectors – stakeholders' perspective ; Theoretical and Applied Climatology, 93: 117-132 , 2008.
- Stull R.; Meteorology for scientist and engineers: A technical companion book with Ahrens meteorology today, 2000.
- Holton J. R.; An introduction to dynamic meteorology; Third Ed; Academic Press, Inc., 1992.