

## ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزه نخود زراعی (*Cicer arietinum* L.) با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقه کردستان

حیدر نادری<sup>۱\*</sup>، مجید شکرپور<sup>۲</sup>، علی اصغری<sup>۳</sup>، همایون کانونی<sup>۴</sup> و عزت‌الله اسفندیاری<sup>۴</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

۲- استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

۳- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، صندوق پستی: ۷۱۴

۴- عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه مراغه، مراغه

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۸/۲۴

### چکیده

کشت پاییزه نخود در مقایسه با کشت بهاره آن، عملکرد بیشتری تولید می‌نماید؛ اما حساسیت محصول به سرما مانع از انجام این کار می‌شود. به منظور بررسی و شناسایی ارقام پُر محصول و متحمل به سرما برای کشت پاییزه، ۶۵ لاین نخود زراعی (*Cicer arietinum* L.) به همراه رقم حساس به سرما ILC533 در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در ایستگاه سارال مرکز تحقیقات کشاورزی سنندج مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحمل به سرما با استفاده از درصد بقاء و درجه تحمل به سرما مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر صفات ارتفاع بوته، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد و درجه تحمل به سرما اختلاف معنی‌دار وجود داشت. همبستگی عملکرد دانه با درصد بقاء، مثبت و معنی‌دار و با درجه تحمل به سرما، منفی و معنی‌دار بود. تجزیه خوشه‌ای، ارقام مورد مطالعه را در سه گروه حساس و نیمه‌متحمل، متحمل و کاملاً متحمل متمایز کرد. در این پژوهش، ۱۴ لاین با داشتن درجه تحمل سرمای ۳ و کمتر از ۳، درصد بقای ۸۵ تا ۹۰ درصد و عملکرد دانه بیش از ۱۴۱ گرم در مترمربع، به عنوان لاین‌های برتر شناخته شدند.

واژه‌های کلیدی: تحمل به سرما، درصد بقاء، کشت پاییزه، نخود

### مقدمه

(Samdaliri et al., 2010). ایران پس از کشورهای هند، ترکیه و پاکستان، چهارمین کشور تولیدکننده نخود در دنیا است (Gaure et al., 2010; Upadhyaya et al., 2007). دامنه عملکرد نخود از ۰/۳۵ تن در هکتار در ایران تا ۱/۶۰ تن در هکتار در مکزیک گزارش شده است (Upadhyaya et al., 2007).

مجموع سطح زیر کشت، تولید و عملکرد نخود در ایران به ترتیب ۷۳۵ هزار هکتار، ۲۸۸ هزار تن و ۳۹۰ کیلوگرم در هکتار است (Kanouni et al., 2011). در مناطق دیم و به خصوص در نیمه غربی ایران، نخود به دلیل قرار گرفتن در تناوب با گندم و جو دیم، نقش بسیار مهمی در حفظ و بقای کشاورزی این مناطق ایفا می‌کند (Jalilian et al., 2005). در مناطق مدیترانه‌ای، کشت زمستانه نخود نسبت به کشت بهاره آن، ۶۰ تا ۷۰ درصد عملکرد بیشتری تولید می‌کند (Singh, 1991). در مناطق مدیترانه‌ای، عملکرد نخود با تغییر تاریخ کاشت از بهار به زمستان افزایش می‌یابد. اما این امر به دلیل حساسیت ارقام به دماهای پایین و بیماری‌های قارچی

نخود در دنیا پس از لوبیا (*Phaseolus vulgaris* L.) و نخودفرنگی (*Pisum sativum* L.) رتبه سوم و در جنوب آسیا رتبه اول را در بین حبوبات داراست (Gaur et al., 2010). نخود به طور عمده در بهار کشت شده و از رطوبت ذخیره شده در خاک استفاده می‌کند (Malhotra & Saxena, 2002). نخود یکی از مهم‌ترین گیاهان خانواده بقولات است که سرشار از پروتئین و نشاسته بوده و در جیره غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است (Kochaki & Banayan-Aval, 2002). برطرف کردن نقص پروتئینی غلات از طریق افزودن پروتئین حبوبات، یکی از بهترین راه‌حل‌های رفع کمبود پروتئین و کالری در کشورهای در حال توسعه است. مقدار پروتئین نخود در مقایسه با سایر بقولات، ارزش بیولوژیک بالاتری (۵۲ تا ۷۸ درصد) دارد و از پروتئین سایر بقولات مرغوب‌تر است

\* نویسنده مسئول: سنندج، خیابان بروجردی، خیابان چیمین، شماره ۲۵، کد پستی: ۶۶۱۹۹۳۸۳۸۱، همراه: ۰۹۳۵۲۸۲۵۸۷، haidarnaderi@gmail.com

با میانگین عملکرد آزمایش‌های زمستانه با ۷۰ درصد افزایش برابر با ۱۷۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. عملکرد بسیاری از لاین‌ها در کشت زمستانه بیش از چهارتن در هکتار بود. لاین‌های برتر این آزمایش برای کشورهای منطقه مدیترانه ارسال و برتری مشابهی در کشت زمستانه بر کشت بهاره به‌دست آمد (Singh & Saxena, 1999). در زمین‌های مرتفع دیم ایران با بررسی ۴۱ ژنوتیپ نخود زراعی، ۱۶ ژنوتیپ با درجه تحمل به سرمای ۳ و کمتر از ۳ به‌عنوان ژنوتیپ‌های متحمل به سرما گزینش و برای ارزیابی‌های بعدی معرفی شدند. همچنین با بررسی شجره این ژنوتیپ‌ها اعلام شد که اغلب ژنوتیپ‌های انتخاب شده به‌عنوان متحمل به سرما مانند FLIP93-260C، FLIP95-255C و SEL95TH1716 هیبریدهای حاصل از دورگ‌گیری گونه وحشی *C. reticulatum* (ILC182) با ارقام اصلاح‌شده هستند (Kanouni et al., 2009). از مزایای دیگر کشت زمستانه نخود، می‌توان به امکان برداشت مکانیزه محصولات به‌دلیل ارتفاع زیاد بوته در کشت زمستانه نسبت به کشت بهاره، میزان پروتئین بالا، گریز از خشکی، فرار از خسارت آفات و پایداری تولید اشاره کرد (Fraiedi, 2007).

در بررسی تحمل به سرما و مقاومت به یخ‌زدگی ۱۵۲ ژنوتیپ نخود در مزرعه و در شرایط آب و هوایی مشهد، تنوع قابل‌ملاحظه‌ای از نظر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک (تعداد روز از کاشت تا سبز شدن، گلدهی و رسیدگی، ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته) مشاهده و اعلام شد که درصد بقاء (تعداد بوته‌های باقی‌مانده) در ۶۲ درصد از ارقام مورد بررسی، بیش از ۵۰ درصد بود و حدود ۶۰ درصد از آنها عملکرد دانه بیش از ۱۵۰ تا ۴۴۲ گرم در متر مربع تولید کردند (Najibnia et al., 2005). در یک بررسی در شرایط کشت پاییزه و آبیاری تکمیلی، ۱۰ رقم نخود مورد بررسی قرار گرفتند. تفاوت میان ارقام متحمل به سرما از نظر طول دوره رویشی، تعداد و طول شاخه‌ها در بوته، اجزای عملکرد (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن ۱۰۰ دانه) و همچنین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، معنی‌دار بود. رقم MCC291 با ۲۳۱ گرم در مترمربع بالاترین عملکرد دانه را داشت (Nezami et al., 2010). در آزمایشی دیگر، ۳۲ رقم متحمل و یک رقم حساس به سرما در چهار تاریخ، کشت شدند. اثر تاریخ کاشت و ژنوتیپ بر تعداد غلاف در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت، معنی‌دار بود. کاشت پاییزه ارقام نخود سبب بهبود صفات مذکور نسبت به کاشت بهاره آنها شد (Nezami & Bagheri, 2005). در بررسی مقاومت به سرما در عدس، ۳۹ لاین طی دو سال زراعی در شرایط آب و هوایی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین

(*Ascochyta blight*) محدود شده است (Kanouni et al., 2011; Millan et al., 2006). اغلب برنامه‌های اصلاحی با تنوع ژنتیکی کم در خزانه ژنی نخود و تعدادی از تنش‌های غیرزیستی مانند دمای پایین در هنگام گلدهی و غلاف‌دهی مواجه هستند که باعث ناپایداری عملکرد در بسیاری از مناطق رایج تولیدکننده نخود (اغلب در عرض‌های جغرافیایی ۲۰ و ۴۰ درجه) می‌شوند (Clarke & Siddique, 2004). لگوم‌ها، شامل نخودفرنگی، لوبیا، عدس و نخود به‌ویژه در زمان گلدهی، اوایل شکل‌گیری غلاف و مراحل پُرشدن دانه، بسیار حساس به سرما و یخ‌زدگی هستند (Maqbool et al., 2010). یکی از عوامل بازدارنده کشت پاییزه نخود در مناطق سردسیر کشور، صدمات ناشی از سرما و یخبندان می‌باشد (Farayedi, 2007). از آنجایی که مقاومت به سرما در شرایط مزرعه از مرحله جوانه‌زنی تا گلدهی کاهش می‌یابد، تعیین مرحله فنولوژیک در تعیین پاسخ محصول به سرما بسیار مهم است (Wery, 1999). در ایکاردا، ۴۵۰۰ رقم نخود برای تحمل به سرما ارزیابی شد و فقط ۱۵ رقم به‌عنوان ارقام متحمل شناخته شدند (Singh, 1991). در یک بررسی دیگر، اثرات کشت پاییزه و بهاره بر روی عملکرد، در ۲۱ رقم نخود با بررسی اجزای عملکرد در آزمایش‌های مزرعه‌ای در دو سال در جنوب‌شرقی ترکیه انجام شد. دوره رویشی طولانی‌تر نخودهای کشت‌شده در پاییز، اثرات مثبتی بر شاخص‌های مربوط به عملکرد مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد غلاف در بوته و وزن ۱۰۰ دانه داشتند. میانگین کشت پاییزه، ۱۰۲ درصد نسبت به کشت بهاره عملکرد بیشتری تولید کرد (Ozdemir & Karadavot, 2003). به‌منظور اثر تنش موقت سرما در مراحل مختلف فنولوژیک بر ویژگی‌های رویشی و زایشی، پنج اکوتیپ نخود سیاه در مراحل مختلف رشد تحت تنش سرما قرار گرفتند. تنش سرما باعث کاهش ارتفاع و افزایش تعداد شاخه در گیاه گردید. همچنین تنش در مراحل رشد زایشی نخود (ابتدای گلدهی و آغاز غلاف‌بندی) اثرات منفی شدیدتری روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد نسبت به مرحله ابتدایی رشد داشت (Chaichi & Malekifarhani, 2007). با بررسی تحمل به سرما در نخود مشخص شده است که این صفت حداقل توسط پنج‌جفت ژن با اثرات افزایشی و غیرافزایشی کنترل می‌شود و تحمل به سرما بر حساسیت به سرما غالبیت دارد (Malhotra & Singh, 1991). در مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) طی ۱۰ سال و در سه مکان با استفاده از لاین‌های اصلاحی معمولی بین کشت بهاره و زمستانه، مقایسه‌ای انجام شد. در این بررسی، عملکرد متوسط آزمایش‌های کشت بهاره، ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار و در مقایسه

اساس مشاهده خسارت به برگ‌ها و شاخه‌ها در بوته و درصد بوته‌های نابودشده در مزرعه به شرح زیر نمره‌دهی شد:

۱- کاملاً متحمل: بدون علایم خسارت سرمازدگی و همه بوته‌ها سالم.

۳- متحمل: پژمرده شدن و خشکیدگی ناشی از سرمازدگی ۱۱ تا ۲۰ درصد، از بین رفتن هیچ کدام از بوته‌ها.

۵- حد واسط: پژمرده شدن و خشکیدگی ناشی از سرمازدگی ۴۱ تا ۶۰ درصد، از بین رفتن حدود پنج درصد از بوته‌ها.

۷- حساس: پژمرده شدن و خشکیدگی ناشی از سرمازدگی ۸۱ تا ۹۹ درصد، از بین رفتن حدود ۲۶ تا ۵۰ درصد از بوته‌ها.

۹- از بین رفتن ۱۰۰ درصد بوته‌ها. لازم به ذکر است که اعداد ۲، ۴، ۶ و ۸ نیز حد واسط اعداد بالا می‌باشند (Malhotra & Saxena, 1993).

برای صفت درصد بقاء از روش مقیاس‌بندی بر اساس درصد بوته‌های باقی‌مانده پس از یخبندان زمستانه و بهاره استفاده شد. بر این اساس، تحمل به سرما در ارقام با ارزیابی قدرت زنده‌مانی بوته‌ها پس از گذراندن سرمای زمستانه و بهاره با شمارش تعداد بوته‌های سالم (پس از جوانه‌زنی و قبل از وقوع سرمای زمستانه) و از بین رفته (پس از سپری شدن یخبندان بهاره) بررسی شد. از تفاضل بوته‌های جوانه‌زده و بوته‌های از بین رفته بر اثر سرما، میزان تحمل سرما بر اساس تعداد بوته‌های باقی‌مانده به صورت زیر تعیین شد:

خیلی مقاوم به سرما: ۹۶ تا ۱۰۰ درصد بوته‌ها، باقی مانده؛ مقاوم به سرما: ۹۱ تا ۹۵ درصد بوته‌ها باقی مانده؛ متحمل به سرما: ۷۱ تا ۹۰ درصد بوته‌ها باقی مانده؛ حساس به سرما: ۵۰ تا ۷۰ درصد بوته‌ها باقی مانده؛ و کاملاً حساس به سرما: ۱۰۰ درصد بوته‌ها از بین رفته باشند (Erskine et al., 1981). در طول دوران رشد و نمو، علاوه بر مراقبت‌های معمول زراعی نظیر وجین علف‌های هرز، از برخی صفات زراعی نظیر تعداد روز از کاشت تا گل‌دهی، تعداد روز از کاشت تا غلاف‌دهی، تعداد روز از کاشت تا رسیدگی، ارتفاع بوته، عملکرد و وزن ۱۰۰ دانه، یادداشت برداری به عمل آمد. تجزیه‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.19 و مقایسات میانگین با استفاده از روش LSD انجام شد.

### نتایج و بحث

مجموع میزان بارندگی در سال ۸۹-۱۳۸۸، ۴۱۴ میلی‌متر و بیشترین میزان آن در آبان ماه (۱۲۴/۲ میلی‌متر) بود. این امر، مطلوب بودن میزان بارندگی برای سبز شدن بذر را نشان می‌دهد. همچنین، کمترین میزان دما در ماه‌های آبان، آذر

عملکرد دانه با درصد مقاومت به سرما همبستگی مثبت و معنی‌دار ( $r = 0/20$ ) و بین درصد مقاومت به سرما و دوره کاشت تا رسیدگی، همبستگی منفی ( $r = -0/37$ ) وجود داشت (Yazdisamadi et al., 2003). تحمل به سرمای ۵۳۰ نمونه نخود در دو سال زراعی در یک آزمایش مزرعه‌ای در مشهد با هدف شناسایی منابع متحمل به شرایط سخت زمستان در مناطق مرتفع، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۶۴ نمونه در هر دو سال از نظر بقاء پس از زمستان، بسیار متحمل به سرما بودند. همچنین بر اساس شاخص درصد بقاء، ۳۰ نمونه انتخاب شدند (Nezami & Bagheri, 2001). با توجه به افزایش چشمگیر عملکرد نخود در کشت پاییزه و حساس بودن این محصول به سرما، هدف از این پژوهش، ارزیابی و شناسایی لاین‌ها، جهت تحمل به سرما با بیشترین عملکرد در واحد سطح و استفاده از این لاین‌ها در برنامه‌های اصلاحی در نظر گرفته شد.

### مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال کردستان اجرا گردید. ایستگاه مذکور در ۷۰ کیلومتری شمال سمنان، در طول شرقی ۴۷ درجه و ۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه، عرض شرقی ۳۵ درجه و ۴۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۱۲۰ متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. در این منطقه، میانگین بلندمدت بارندگی سالیانه ۴۴۵/۵ میلی‌متر است. در این بررسی به منظور مطالعه تحمل به سرما و انتخاب ارقام پرمحصول و مقاوم به سرما، ۶۵ لاین نخود همراه با یک شاهد حساس به سرما با نام ILC533 از سری مواد ارسالی از مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ICARDA) با عنوان خزانه بین‌المللی نخود متحمل به سرما (Chickpea International Cold Tolerance Nursery: CICTN)، بر اساس طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در دو تکرار کشت و مورد ارزیابی قرار گرفت. عملیات تهیه زمین، شامل شخم و دیسک در اوایل شهریورماه انجام گرفت. بذرهای قبل از کاشت توسط قارچ‌کش تیوبندازول و حشره‌کش آکتلیک‌اسید ضد عفونی و در نیمه دوم مهرماه با دست کشت شدند. هر کرت آزمایشی شامل یک خط یک‌متری بود و بذرهای با فاصله ۱۰ سانتی‌متر روی هر خط به صورت دستی در عمق ۴ تا ۵ سانتی‌متری خاک کاشته شدند. فاصله بین ردیف‌های کاشت، ۳۰ سانتی‌متر بود. پس از کشت و قبل از شرایط سخت زمستان، تعداد بذرهای سبز شده ثبت گردید. به منظور ارزیابی تحمل به سرما در لاین‌ها، مطابق با روش مقیاس‌بندی عددی ۱ تا ۹، بر

بیشترین میزان عملکرد مربوط به لاین FLIP03-7C با ۲۰۵ گرم در مترمربع و کمترین میزان عملکرد بدون در نظر گرفتن رقم حساس ILC533 مربوط به لاین FLIP05-37C با عملکرد ۳۸/۳ گرم در مترمربع، و متوسط عملکرد همه لاین‌ها حدود ۱۱۱ گرم در مترمربع بود (جدول ۳). میانگین درصد بقاء در بین لاین‌ها نشان داد که یک لاین، مقاوم (FLIP05-171C)، ۴۱ لاین متحمل و ۲۳ لاین (به همراه رقم ILC533) حساس به سرما بودند.

بر اساس درجه تحمل به سرما، ۱۰ لاین با کسب نمره ۱، کاملاً متحمل، ۴۶ لاین با کسب نمره ۲، ۳ و ۴، متحمل و ۹ لاین به همراه رقم حساس ILC533 با کسب نمره ۵ و ۶، لاین‌های حد واسط و حساس به سرما شناخته شدند.

دی، بهمن، اسفند و فروردین، به ترتیب با ۴-، ۷/۴-، ۵-، ۱۶-، ۷/۸- و ۴/۶- درجه سانتی‌گراد بود. لازم به ذکر است که لاین‌های مورد مطالعه در دمای ۱۶- درجه سانتی‌گراد اغلب در پوشش برف قرار داشتند. همچنین، بیشترین تعداد روزهای یخبندان در ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین به ترتیب با ۱۰، ۳۰، ۲۴، ۲۷، ۱۰ و ۸ روز مشاهده شد (جدول ۱).

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که بین لاین‌ها از نظر صفات درصد بقاء، درجه تحمل سرما، تعداد روز تا غلاف‌دهی، ارتفاع بوته، وزن ۱۰۰ دانه و عملکرد، اختلاف معنی‌دار وجود داشت (جدول ۲). در یک بررسی روی ۴۰ لاین نخود و یک لاین حساس، بین لاین‌ها از نظر صفات عملکرد دانه، تعداد شاخه‌های ثانویه، وزن ۱۰۰ دانه و درجه تحمل سرما اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (Kanouni *et al.*, 2009).

جدول ۱- اطلاعات هواشناسی سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال کردستان

Table 1. Meteorological data of cropping season 2009-10 for Saral Experimental Station in Kurdistan

ماه Month	بارندگی (میلی‌متر) Precipitation (mm)	دمای حداقل مطلق (درجه سانتی‌گراد) Absolute minimum temperature (°C)	دمای حداکثر مطلق (درجه سانتی‌گراد) Absolute maximum temperature (°C)	متوسط دما (درجه سانتی‌گراد) Temperature mean (°C)	تعداد روزهای یخبندان (روز) Frosty days	رطوبت نسبی (درصد) Relative humidity (%)	تبخیر (میلی‌متر) Evaporation (mm)
مهر October	8	0	25	11.3	0	34	123.4
آبان November	124.2	-4	20.2	6.39	10	64	0
آذر December	16.2	-7.4	8	-0.2	30	80	-
دی January	8.6	-5	11.2	2.99	24	68	-
بهمن February	42.8	-16	14	-0.16	27	74	-
اسفند March	52.5	-4.8	21.8	5.36	18	57	-
فروردین April	90	-7.8	18	6.95	8	60	51.2
اردیبهشت May	42.1	0	24	10.4	0	53	146.7
خرداد June	9	-0.2	28.2	15.35	1	43	211.8
تیر July	6.2	3.8	36	20.29	0	37.77	243.3
مرداد August	0	4.8	32.8	19.46	0	41	286.1
شهریور September	14.4	1.8	32	16.33	0	32	232.6

جدول ۲- تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده در لاین‌های نخود مورد مطالعه

Table 2. Analysis of variance for measured attributes in some chickpea lines

S. O. V	d. f	میانگین مربعات Mean of squares							
		VP (%)	CTR	DF (day)	DP (day)	DM (day)	PHT (cm)	100SW (g)	Yld (g/m <sup>2</sup> )
تکرار Rep.	1	8.50 <sup>ns</sup>	1.03 <sup>ns</sup>	3.269 <sup>ns</sup>	2.126 <sup>ns</sup>	10.28 <sup>ns</sup>	15.38 <sup>**</sup>	17.55 <sup>ns</sup>	4650.27 <sup>ns</sup>
لاین Entry	65	340.723 <sup>+</sup>	3.59 <sup>**</sup>	5.134 <sup>ns</sup>	11.9 <sup>**</sup>	8.52 <sup>ns</sup>	46.626 <sup>**</sup>	5.50 <sup>**</sup>	321592.42 <sup>**</sup>
خطای آزمایشی Error	65	245.6	1.54	5.545	2.4	12.88	1.78	11.55	170842.8

+, \*\*, \* و ns: به ترتیب معنی‌دار در سطح ۱۰ درصد، ۵ درصد، ۱ درصد و غیرمعنی‌دار.  
+, \*\*, \* and ns: Significant at 10%, 5%, 1% and non significant levels, respectively.  
اختصارات: S.O.V: منابع تغییرات؛ d.f: درجه آزادی؛ VP: درصد بقاء؛ CTR: درجه تحمل به سرما؛ DF: تعداد روز تا گلدهی؛ DP: تعداد روز تا غلاف‌دهی؛ DM: تعداد روز تا رسیدگی؛ PHT: ارتفاع بوته؛ 100SW: وزن ۱۰۰ دانه؛ Yld: عملکرد دانه  
Abbreviation: SOV: Sources of variation; df: degree of freedom; VP: Viability Percentage; CTR: Cold Tolerance Rate; DF: Days to flowering, DP: Days to podding; DM: Days to maturity; PHT: Plant height; 100SW: 100 Seed weight, Yld: Yield

جدول ۳- میانگین صفات اندازه‌گیری شده در لاین‌های نخود مورد مطالعه

Table 3. Means of chickpea lines for measured attributes

شماره No.	لاین Entry	CTR	DP	PHT (cm)	100SW (g)	Yld (g/m <sup>2</sup> )
1	FLIP 00-39C	2	240	14	31.5	151.7
2	FLIP 01-40C	3	239	20	31	108.3
3	FLIP 02-61C	3	241	11.5	25	117.5
4	FLIP 02-69C	2	240	22.5	28	131.6
5	FLIP 02-81C	3	239	21.5	27	85.0
6	FLIP 03-1C	2	234	25	22	180.0
7	FLIP 03-2C	3	237	11	20.75	120.0
8	FLIP 03-3C	4	239	22.5	28.5	75.0
9	FLIP 03-5C	3	239	19.5	31	103.3
10	FLIP 03-6C	3	234	27	32.5	141.7
11	FLIP 03-7C	2	239	24.5	36.5	205.0
12	FLIP 03-8C	3	241	20.5	27	143.3
13	FLIP 03-9C	3	241	27.5	19.5	153.3
14	FLIP 03-11C	1	234	20.5	23	181.6
15	FLIP 03-12C	4	239	23.5	22.5	108.3
16	FLIP 03-13C	2	234	21.5	30.5	169.9
17	FLIP 03-14C	2	241	22	35	191.6
18	FLIP 03-80C	4	234	22.5	28.5	81.7
19	FLIP 03-89C	2	237	20.5	29	143.3
20	FLIP 03-133C	2	241	18	35	181.7
21	FLIP 99-26C	3	241	25	29.5	151.7
22	ILC 8262	4	239	36	23	155.8
23	ILC 8617	2	239	20	25.5	131.6
24	FLIP 97-118C	3	237.5	22	30.5	63.3
25	FLIP 99-45C	4	235.5	18	33	111.7
26	FLIP 01-7C	1	235.5	27	29	121.6
27	FLIP 02-51C	5	239	15	26	58.3
28	FLIP 02-52C	4	239	14	16	50.0
29	FLIP 02-55C	2	237	23	25.75	91.7
30	FLIP 02-59C	2	237.5	24	25.5	86.7
31	FLIP 02-80C	3	236.5	18	24.5	95.0
32	FLIP 02-83	6	239	11	26.5	45.0
33	FLIP 02-84	6	236.5	28	19	81.7
34	FLIP 02-85	6	238	25	25.5	78.3
35	FLIP 03-16C	5	238	24	25	86.7
36	FLIP 03-68C	5	235.5	27	31.25	123.3
37	FLIP 03-78C	3	241	27	30.25	78.3
38	FLIP97-120C	3	236	22.5	32.5	100.0

ادامه جدول ۳:

39	FLIP04-2C	1.67	234.67	15.3	31.67	115.5
40	FLIP04-33C	2	236	19	29	106.6
41	FLIP04-34C	3	234	18	33	40.0
42	FLIP04-35C	3	235	19	30	68.3
43	FLIP04-36C	5	236	31	30.5	69.5
44	FLIP04-37C	1	234	25	26.25	90.0
45	FLIP04-38C	1	236	26	29	85.0
46	FLIP05-13C	2	236	17	33	145.0
47	FLIP05-36C	1	240	31	32.25	150.0
48	FLIP05-37C	2	239	23.5	25	38.3
49	FLIP05-38C	5	235	24	33.5	51.7
50	FLIP05-39C	6	241	23	35	119.0
51	FLIP05-45C	2	235	19	37.5	81.7
52	FLIP05-49C	1	241	24.5	30.75	98.3
53	FLIP05-77C	2	234	20.5	36.5	108.3
54	FLIP05-81C	4	236	22	33.75	73.3
55	FLIP05-84C	3	240	31	28	128.3
56	FLIP05-89C	2	237.5	23	31.5	141.7
57	FLIP05-91C	1	235	27	30	101.7
58	FLIP05-94C	2	235	23	30.5	116.7
59	FLIP05-95C	1	240	27	34	135.0
60	FLIP05-101C	3	236	20	29	46.7
61	FLIP05-127C	2	241	19	32	126.6
62	FLIP05-137C	1	237.5	22	27	163.3
63	FLIP05-141C	1	234	27	28.5	116.6
64	FLIP05-146C	2	234	21	35.5	146.6
65	FLIP05-171C	2	235	25	36.5	151.6
66	ILC533	6	240.5	20.75	10.615	36.9
LSD	(5%)	2.48	3.08	2.66	6.78	82.542
Mean		2.84	237.44	22.2	28.81	111.16


See table 2 for abbreviations

برای اختصارات به جدول ۲ مراجعه نمایید.

در لاین‌های FLIP05-37C، FLIP04-34C و رقم حساس ILC533 مشاهده شد که در دامنه ۳۰ تا ۴۵ گرم در مترمربع و بیشترین عملکرد در لاین FLIP03-7C با ۲۱۰ گرم در مترمربع بود. ارتفاع بوته نیز از تنوع زیادی برخوردار بود؛ به طوری که، ارتفاع لاین‌ها از ۱۰ تا ۳۷/۵ سانتی‌متر متغیر بودند. کمترین ارتفاع بوته با ۱۰ سانتی‌متر در سه لاین FLIP02-61C، FLIP03-2C و FLIP02-83 و بیشترین ارتفاع بوته با ۳۷/۵ سانتی‌متر در لاین ILC8262 وجود داشت. ارتفاع اکثر لاین‌ها در دامنه متوسط ۱۷/۵ تا ۲۷/۵ سانتی‌متر قرار داشت. دامنه تغییرات وزن ۱۰۰ دانه لاین‌ها بدون در نظر گرفتن رقم شاهد، از ۱۵ تا ۴۰ گرم بود. اغلب لاین‌ها در دامنه متوسط ۲۵ تا ۳۲/۵ گرم قرار داشتند (شکل ۱).

نتایج حاصل از تجزیه همبستگی ساده بین صفات، حاکی از وجود یک رابطه قوی و معنی‌دار ( $^{**}0.805$ ) بین درجه تحمل به سرما و درصد بقاء بود. همچنین عملکرد با درصد بقاء و درجه تحمل به سرما به ترتیب دارای رابطه مثبت ( $^{**}0.481$ ) و منفی ( $^{**}0.477$ ) معنی‌دار بود (جدول ۴). در یک بررسی روی ۱۰ رقم نخود بین عملکرد و درصد بقاء، همبستگی مثبت و معنی‌دار و بین عملکرد و وزن ۱۰۰ دانه، همبستگی منفی و معنی‌دار گزارش شد (Farayedi, 2007).

محققان دیگر نیز بر اساس درجه تحمل به سرما، ارقام و لاین‌ها را دسته‌بندی کرده‌اند (Kanouni et al., 2009; Fraiedi, 2007; Yazdisamadi et al., 2004). از نظر صفت ارتفاع بوته، بیشترین ارتفاع، مربوط به لاین ILC8262 با ۳۶ سانتی‌متر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به لاین‌های FLIP02-83 و FLIP03-2C با ۱۱ سانتی‌متر بود. نمودار فراوانی درجه تحمل به سرما نشان داد که لاین‌ها، دارای دامنه تغییرات ۱ تا ۶/۵ بودند. بیشترین درجه تحمل (درجه تحمل به سرمای ۱) در لاین‌هایی مانند FLIP03-11C، FLIP01-7C و FLIP04-37C و کمترین درجه تحمل (درجه تحمل به سرمای ۶) در لاین‌هایی مانند FLIP05-39C، FLIP02-84 و FLIP02-85 وجود داشت. همچنین، بیشترین فراوانی با ۲۱ لاین در دامنه ۲ تا ۲/۵ قرار داشت. تعداد روز تا غلاف‌دهی در لاین‌ها در دامنه ۲۳۴ تا ۲۴۱ روز متغیر بود. کمترین تعداد روز تا غلاف‌دهی در لاین‌هایی مانند FLIP03-1C، FLIP03-6C و FLIP03-11C و بیشترین تعداد روز در لاین‌هایی مانند FLIP02-61C، FLIP03-8C و FLIP03-9C وجود داشت. بیشترین فراوانی با ۱۲ لاین در تعداد روز ۲۳۹ قرار داشت. نمودار فراوانی عملکرد نشان داد که بین لاین‌ها از ۳۰ تا ۲۱۰ گرم بر مترمربع تنوع وجود داشت. کمترین میزان عملکرد



شکل ۱- تغییرات صفات مورد بررسی در لاین‌های نخود

Fig. 1. Variations in studied characteristics of chickpea lines

الف) CTR: درجه تحمل به سرما؛ ب) DP: تعداد روز تا غلافدهی؛ ج) SW: وزن ۱۰۰ دانه (گرم)؛ د) PHT: ارتفاع بوته (سانتی‌متر)؛ ه) yld: عملکرد (گرم در متر مربع)  
 CTR: Cold Tolerance Rate; DP: Days to Podding (day); SW: 100 Seed Weight (g); PHT: Plant Height (cm); yld: Yield (g/m<sup>2</sup>)

سرما ۳ و درصد بقای ۷۰ تا ۸۵ درصد به‌عنوان گروه متحمل در نظر گرفته شدند. در گروه دوم، ۱۹ لاین از جمله لاین‌های FLIP05-89C، FLIP05-94C و FLIP05-171C قرار گرفتند که اغلب با داشتن درجه تحمل به سرما ۱ و درصد بقای بالاتر از ۸۵ درصد به گروه کاملاً متحمل موسوم گردید و گروه سوم، ۱۹ لاین از جمله لاین‌های FLIP05-38C، FLIP05-81C و FLIP99-45C به‌همراه رقم شاهد را دربرگرفت. این گروه شامل لاین‌هایی بود که درجه تحمل به سرما ۴ تا ۶ و درصد بقای کمتر از ۷۵ درصد داشتند و به‌عنوان لاین‌های حساس و نیمه‌متحمل شناخته شدند.

در بررسی دیگری روی ۴۱ لاین نخود، همبستگی عملکرد با وزن ۱۰۰ دانه و درجه تحمل به سرما، منفی و معنی‌دار گزارش شد (Kanouni *et al.*, 2009). (Malhotra (1991) Singh & نیز ارقام متحمل به سرما را جزو ارقام دانه‌ریز و متوسط دسته‌بندی کرده‌اند.

تجزیه خوشه‌ای لاین‌ها به‌روش وارد (Ward)، با استفاده از میانگین استاندارد شده صفات و معیار فاصله اقلیدسی، لاین‌ها را در سه گروه مجزا قرار داد (شکل ۲). گروه اول شامل ۲۷ لاین از جمله لاین‌های FLIP03-5C، FLIP01-40C و FLIP02-69C بود که اغلب با داشتن درجه تحمل به

جدول ۴- ضریب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در لاین‌های مختلف نخود  
Table 4. Correlation coefficients among the studied traits in chickpea lines

Characters	VP	CTR	DF	DP	DM	PHT	100SW
CTR	-0.805**						
DF	-0.005	-0.01					
DP	-0.106	0.168	0.199				
DM	-0.213	0.241	0.133	-0.037			
PHT	-0.024	-0.059	0.061	-0.031	-0.085		
100SW	0.313*	0.312*	0.12	-0.189	-0.097	0.04	
SY	0.481**	-0.477**	-0.141	0.102	-0.012	0.171	0.258**

\* and \*\* significant at 5% and 1% levels, respectively

See table 2 for abbreviations.

\* و \*\* به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد


برای اختصارات به جدول ۲ مراجعه نمایید.

سالیانه، رطوبت مناسب خاک، فرار از خسارت آفات و بیماری‌ها (که معمولاً بیولوژی آنها با کشت بهاره نخود سازگار است)، ارتفاع بیشتر و برداشت مکانیزه آسان‌تر است که باعث افزایش قابل توجه عملکرد در نخود می‌شود. با توجه به عملکرد پایین نخود در ایران در کشت بهاره، برنامه‌های اصلاحی نخود بایستی در جهت معرفی لاین‌های متحمل به سرما باشد.

مطالعه حاضر حاکی از وجود تنوع مناسب از نظر تحمل به سرما در بین جمعیت مورد بررسی بود. هر چند برای ارزیابی نتایج مطمئن‌تر و کاربردی نیاز به بررسی پارامترهای فیزیولوژیک مانند فعالیت آنزیم‌های جمع‌آوری‌کننده اکسیژن فعال و یا کارایی فتوسنتز می‌باشد تا مکانیسم تحمل به سرما لاین‌ها بهتر و دقیق‌تر ارزیابی گردد. همچنین تکرار آزمایش در سال‌ها یا مکان‌های مختلف به منظور تعیین پایداری ژنوتیپ‌ها و برآورد صحیح پارامترهای تنوع ژنتیکی توصیه می‌گردد.

به‌طور کلی، با در نظر گرفتن کلیه نتایج حاصل، ۱۴ لاین شامل FLIP03-7C، FLIP02-81C، FLIP00-39C، FLIP03-133C، FLIP03-13C، FLIP03-11C، FLIP03-8C، FLIP05-89C، FLIP05-36C، FLIP05-13C، FLIP99-26C، FLIP05-137C، FLIP05-146C و FLIP05-171C با درجه تحمل به سرما ۳ و کمتر از ۳، درصد بقای ۸۰ تا ۹۵ درصد و عملکرد دانه بیش از ۱۴۱ گرم در مترمربع به‌عنوان لاین‌های متحمل به سرما و برتر در این مطالعه شناسایی شدند. از این لاین‌ها می‌توان به‌عنوان والدین تلاقی‌ها در برنامه‌های دورگیری و یا در تشکیل جمعیت‌های دارای تنوع ژنتیکی برای تحمل به سرما بهره جست. (Farayedi (2007 در مطالعه تحمل به سرما در ارقام مختلف نخود، سه رقم با درجه تحمل به سرما ۳ و کمتر از ۳، درصد بقای بیشتر از ۸۳ درصد و عملکرد بیشتر از ۱۱۹۰ کیلوگرم در هکتار را به‌عنوان ارقام برتر معرفی نمود. اصلاح و معرفی ارقام نخود متحمل به سرما دارای مزایای متعددی است. از جمله آنها، استفاده مناسب از بارندگی‌های





شکل ۲- تجزیه خوشه‌ای لاین‌های نخود مورد بررسی به روش Ward با استفاده از میانگین استاندارد شده صفات و معیار فاصله اقلیدسی  
 Fig. 2. Hierarchical cluster analysis of chickpea lines based on Ward's method using standardized means of traits and Euclidean distance measures

منابع

1. Chaichi, M.R., and Malekifarhani, S. 2007. The effect of cold stress on black chickpea growth and yield in different phonologic stages. Scientific Journal of Agriculture 3: 13-24. (In Persian).
2. Clarke, H.J., and Siddique, K.H.M. 2004. Response of chickpea genotypes to low temperature stress during reproductive development. Field Crop Research 90: 323-334.
3. Erskine, W., Meyveci, K., and Izgin, N. 1981. Screening a world lentil collection for cold tolerance. Lens Newsletter 8: 5-9.
4. Fraiedi, Y. 2007. Study of agronomic characteristic and cold hardiness in chickpea (*Cicer arietinum* L.) genotypes in autumn rainfed sowing conditions. Seed and Plant 23: 489-503. (In Persian).
5. Gaure, P.M., Tripathi, S., Gowda, C.L.L., Ranga, R.G.V., Sharma, H.C., Pande, S., and Sharma, M. 2010. Chickpea seed production manual. Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 28 pp.
6. Jalilian, J., Modarese Sanavi, S.A.M., and Sabaghpour, S.H. 2005. Effect of plant density and supplemental irrigation on yield, yield components and protein content of four chickpea (*Cicer arietinum*) cultivars under dry land condition. Journal Agriculture Science and Nature Resources 12. (In Persian with English Summary).
7. Kanouni, H., Khalily, M., and Malhotra, R.S. 2009. Assessment of cold tolerance of chickpea at rainfed highlands of Iran. American-Eurasian Journal Agriculture & Environment Science 5: 250-254.
8. Kanouni, H., Taleei, A., and Okhovat, M. 2011. Ascochyta blight (*Ascochyta rabiei* (Pass.) Lab.) of chickpea (*Cicer arietinum* L.): Breeding strategies for resistance. International Journal of Plant Breeding and Genetics 5: 1-22.
9. Kochaki, A., and Banayaneaval, M. 2002. Pulse Crops. Mashhad Academic Jahad Publishers.
10. Malhotra, R.S., and Saxena, M.C. 1993. Screening for cold and heat tolerance in cool-season food legumes. In: K.B. Singh and M.C. Saxena (Eds.). Breeding for Stress Tolerance in Cool-Season Food Legume. John Wiley and Sons, Chichester, U. p. 428-438.
11. Malhotra, R.S., and Saxena, M.C. 2002. Strategies for overcoming drought stress in chickpea Carvan. Available at web site <http://www.icarda.org/publications/carvan/ /carvan17/Focus//Strategies.htm>. (verified 17 December 2002).
12. Malhotra, R.S., and Singh, K.B. 1991. Gene action for cold tolerance in chickpea. Theoretical and Applied Genetics 82: 598-601.
13. Maqbool, A., Shafiq, Sh., and Lake, L. 2010. Radiant frost tolerance in pulse crops. Euphytica 172: 1-12.
14. Millan, T., Clark, H.J., Siddique, K.H.M., Buhariwalla, H.K., Gaur, P.M., Kumar, J., Gil, J., Kahl, G., and Winter, P. 2006. Chickpea molecular breeding: New tools and concepts. Euphytica 147: 81-103.
15. Najibnia, S., Porsa, H., Nazemi, A., and Bagheri, A. 2005. Study of phenological and morphological characteristics of chickpea (*Cicer arietinum* L.) cold tolerant germplasms on field conditions in autumn culture in Mashhad. First Iranian Pulse Crops Symposium, November 20-21, 2005. Ferdowsi University of Mashhad. p. 495-498. (Persian with English Summary).
16. Nezami, A., and Bagheri, A. 2001. Evaluation of Mashhad chickpea collection for cold tolerance in field conditions (Abstract). In: <http://SID.ir>. (In Persian).
17. Nezami, A., and Bagheri, A. 2005. Responsiveness of cold tolerant chickpea characteristics in fall and spring planting: II. Yield and yield components. Iranian Journal of Field Crops Research 3: 156-170. (Persian with English Summary).
18. Nezami, A., Sedaghatkhahi, H., Porsa, H., Parsa, M., and Bagheri, A.R. 2010. Evaluation of autumn sowing chickpea (*Cicer arietinum* L.) genotypes of cold tolerant under supplemental irrigation. Iranian Journal of Field Crops Research 8: 415-423. (In Persian).
19. Ozdemir, S., and Karadavut, U. 2003. Comparison of the performance of autumn and spring sowing of chickpeas in a temperature region. Turk. J. Agric. For. 27: 345-352.
20. Samdaliri, M., Saiedsharifi, R., and Esmailpor, B. 2010. Pulse Crops. Islamic Azad University the Unit of Challos Publishers.
21. Singh, K.B. 1991. Winter chickpea: problems and potential in the Mediterranean region. Ciheam-Options Mediterranean's 9: 25-34.
22. Singh, K.B., and Saxena. M.C. 1999. Chickpeas. Macmillan Education Ltd., London, Bisingtone.

23. Upadhyaya, H.D., Dwivedi, S.L., Gowda, C.L.L., and Singh, S. 2007. Identification of diverse germplasm lines for agronomic traits in chickpea (*Cicer arietinum* L.) core collection for use in crop improvement. *Field Crop Research* 100: 320-326.
24. Wery, J. 1999. Adaption to frost and drought stress in chickpea and implication in plant breeding. *Ciheim-Options Mediterranean's* 9: 77-85.
25. Yazdisamadi, B., Majnonhossaini, N., and Paighambari, S.A. 2004. Evaluation of cold hardiness in lentil genotypes (*Lens culinaris* Medik.). *Seed and Plant* 20: 23-37. (In Persian).

Archive of SID

## Evaluation of cold tolerance in winter sowing of chickpea (*Cicer arietinum* L.) using morphological and phenological traits in Kurdistan region

Naderi<sup>1\*</sup>, H., Shokrpour<sup>2</sup>, M., Asghari<sup>2</sup>, A., Kanooni<sup>3</sup>, H. & Esfandiari<sup>4</sup>, A.

1- MSc. Student of Plant Breeding, Mohaghghegh Ardebili University, Ardebil

2- Contributions from Agronomy & Plant Breeding Department, Mohaghghegh Ardebili University, Ardebil

3- Contribution from Agricultural Research Center & Natural Sciences of Kurdistan, Sanandaj

4- Contribution from Agronomy & Plant Breeding Department, Maragheh University, Maragheh

Received: 8 May 2012

Accepted: 14 November 2012

### Abstract

Winter sown chickpeas produce more yields in comparison with spring type. This function is hampered by the sensitivity of the crop to low temperature. In order to study and identify high yielding and cold tolerant chickpea (*Cicer arietinum* L.) lines, 65 entries along with one susceptible check variety namely ILC533 were evaluated in a randomized complete block design (RCBD) with two replications during 2010-11 cropping season at Saral Agricultural Research Station of Kurdistan province, west of Iran. Cold tolerance was investigated via viability percentage and cold tolerance rate parameters. Analysis of variance revealed that there were significant differences among the lines for plant height, 100 seed weight, seed yield and cold tolerance rate. Significant negative and positive correlations were found among yield and cold tolerance rate and viability percentage, respectively. The cluster analysis, categorized the lines into three distinct groups. According to this study, 14 lines having 3 and less than 3 of cold tolerance rate, 80-95 viability percentage and more than 141 g/m<sup>2</sup> seed yield recognized as superior lines for cold tolerance.

**Key words:** Chickpea, Cold tolerance, Viability percentage, Winter sowing

---

\* Corresponding Author: haidarnaderi@gmail.com, Mobile: 09352782587