

فاکتورهای بیماریزایی *Puccinia triticina* Eriksoon عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در استان گلستان در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۱

شعبان کیا^{۱*} و فرزاد افشاری^۲

۱، مریب پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
گرگان، ۲، استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
(تاریخ دریافت: ۸۹/۸/۵ - تاریخ تصویب: ۹۰/۵/۵)

چکیده

زنگ قهوه‌ای یا زنگ برگی گندم با عامل *Puccinia triticina* Eriksoon یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر دنیاست. شناسایی فاکتورهای بیماریزایی و تغییرات احتمالی سالیانه در جمعیت عامل بیماری در مناطق مختلف در تهیه ارقام مقاوم با ژن‌های مقاومت مؤثر ضروری می‌باشد. به همین منظور طی سال‌های ۱۳۸۱-۸۶ خزانه‌های تله (Trap Nursery) شامل ۳۷ لاین تقریباً آیزوژنیک (Near Isogenic Lines) تهیه شده با رقم Thatcher که هر لاین دارای ژن مقاومت مشخصی به زنگ قهوه‌ای (Lr-gene) است، به اضافه رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در شرایط آلودگی طبیعی و زیر سیستم آبیاری مهپاش در گرگان و بدون سیستم آبیاری مهپاش درگندب کاشته شدند. یادداشت برداری در مرحله ظهور برگ پرچم و زمانی که رقم شاهد بالاترین میزان آلودگی را نشان داد، برای درصد آلودگی و همچنین تیپ آلودگی انجام شد. واکنش "S" به عنوان وجود بیماریزایی (Virulence) و واکنش‌های "O"، "R" و "MS" به عنوان عدم وجود بیماریزایی (Avirulence) منظور گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در طی سال‌های زراعی ۱۳۸۱-۸۶ برای ژن‌های Lr3ka Lr3 Lr2c Lr1 Lr21 Lr20 Lr18 Lr16 Lr15 Lr14b Lr13 Lr12 Lr11 Lr10 Lr3bg به دست آمده در منطقه گرگان و گندب مشاهده شد. وجود بیماریزایی برای ژن‌های Lr17 Lr14b Lr10 Lr3 Lr34 Lr33 Lr32 Lr30 Lr26 Lr24 Lr23 Lr22b Lr22a فقط در منطقه گرگان دیده شد. برای ژن‌های مقاومت Lr9 Lr2b Lr2a Lr18 Lr26 Lr18 و Lr34 در هیچ‌کدام از مناطق، بیماریزایی مشاهده نشد. عدم وجود بیماریزایی روی ژن‌های مقاومت فوق امکان استفاده از این ژن‌های مقاومت در برنامه‌های اصلاح ارقام مقاوم به بیماری زنگ قهوه‌ای را فراهم می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: زنگ برگی، بیماریزایی، خزانه تله، لاین‌های آیزوژنیک، ژن‌های مقاومت.

در تمام دنیا بوده و یک خطر جدی برای تولید گندم محسوب می‌شود (McIntosh *et al.*, 1995). در ایران نیز اهمیت و خسارت این بیماری بعد از زنگ زرد در درجه دوم قرار دارد ولی گستردگی آن از زنگ زرد بیشتر است

مقدمه

زنگ قهوه‌ای (Brown rust) یا زنگ برگی (Leaf rust) گندم با عامل *Puccinia triticina* (Syn : *P. recondita* f.sp. *tritici*) از مهمترین بیماری‌های گندم

برای تعیین نژاد و فاکتورهای بیماریزایی زنگ قهوه‌ای پیشنهاد گردید و بر اساس آن تعیین نژادهای فیزیولوژیک در یک سیستم اصلاح شده نامگذاری یکسان $R_{QH}HG \pm 8$ $R_{QH}HG 1 XP H_{WLRQ}$ با فرمول (Long & Kolmer, 1989) تصویب شد، Avirulence/Virulence (1989).

در زمینه تعیین نژاد و ژن‌های بیماریزایی زنگ قهوه‌ای گندم در نقاط مختلف دنیا تحقیقات زیادی انجام شده است. در سال ۱۹۸۳ در مطالعه انجام شده در کانادا با استفاده از ۲۳ لاین آیزوژنیک، برای ژن‌های $Lr16$, $Lr21$, $Lr25$, $Lr26$, $Lr19$, $Lr16$, $Lr29$ و $Lr16$ بیماریزایی در ایالات متحده در دیده نشد (Samborski, 1983). در سال ۱۹۸۶ (Long et al., 1986) پاتوتیپ بیماریزا و غیر بیماریزا و برای ژن‌های $Lr9$ و $Lr16$ برای اولین بار بیماریزایی گزارش شد (Lr29). در تحقیقات انجام شده در چین با ۸۱۱ جدایه زنگ قهوه‌ای، بیماریزایی برای ژن‌های $Lr16$, $Lr14b$, $Lr14a$, $Lr2a$ کمتر از ۳۰٪ و برای ژن‌های $Lr21$, $Lr23$, $Lr24$, $Lr19$, $Lr15$, $Lr9$, $Lr2a$ ژن‌های $Lr13$, $Lr11$, $Lr10$, $Lr3bg$, $Lr3ka$, $Lr3$, $Lr2c$ با فراوانی $Lr29$ و $Lr21$ با فراوانی $Lr20$, $Lr18$, $Lr17$ گزارش شد (Chen & Zhang, 1993). Park & (Felesenstine, 1998) با جمع آوری ۸۵۰ جدایه زنگ قهوه‌ای از اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئیس و انگلستان و بررسی آنها روی ۲۰ لاین آیزوژنیک مشخص کردند که کلیه جدایه‌ها روی ژن‌های $Lr9$, $Lr25$, $Lr24$, $Lr21$, $Lr19$ در بررسی انجام شده در پاکستان میزان فراوانی بیماریزایی برای ژن‌های $Lr1$, $Lr3$, $Lr2c$, $Lr2b$, $Lr2a$, $Lr17$, $Lr15$, $Lr14a$, $Lr11$, $Lr10$, $Lr3bg$, $Lr3ka$, $Lr33$, $Lr32$, $Lr30$, $Lr26$, $Lr25$, $Lr23$, $Lr21$, $Lr18$, Lrb و $Lr37$ تا ۱۰۰٪ تعیین شد. همچنین ژن‌های $Lr9$, $Lr19$, $Lr28$ و $Lr35$ نسبت به جمیعت عامل بیماری مؤثر بودند (Rattu et al., 2009). در سال ۲۰۰۷ در آفریقای جنوبی، پنج پاتوتیپ شناسایی شدند که هیچکدام روی گیاهان حامل ژن‌های مقاومت $Lr3bg$

و همه ساله در اواخر فصل رویش گندم در مزارع ظاهر شده و باعث کاهش نسبی محصول، چروکیدگی و نامرغوب شدن بذور می‌شود (Behdad, 1983). خسارت ناشی از زنگ قهوه‌ای در ایالت‌های اوکلاهما و کانزاس آمریکا در سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۳ حدود ۴/۱۱ میلیون تن برآورد شده است (Roelf, 1978). در پاکستان در سال ۱۹۷۸ خسارت ناشی از این بیماری حدود ۱۰٪ محصول معادل ۸۶ میلیون دلار برآورد شده است (Hussain et al., 1980). همه گیری این بیماری در مکزیک در سال زراعی ۱۹۷۶-۱۹۷۷ باعث کاهش بیش از ۴۰٪ محصول شد (Dubin & Torres, 1981). در سال ۱۹۹۲ در استرالیا غربی همه‌گیری این بیماری (McIntosh et al., 1995) باعث خسارت ۳۷٪ محصول گردید.

وجود نژادهای فیزیولوژیک زنگ قهوه‌ای اولین بار توسط Mains & Jackson (1923) بر اساس آلوده‌سازی دو رقم Kanred و Malakaf گزارش شد. بررسی‌های ژنتیکی روی مقاومت به زنگ قهوه‌ای منجر به شناسایی ژن‌های مقاومت به آن شده که با استفاده از سیستم Ausemus et al. (1946) گزارش شده و سپس Browder (1980) این ژن‌ها را تا شماره ۲۹ ($Lr29$) مشخص نمود. تا سال ۱۹۹۸ تعداد ژن‌های مقاومت شناخته شده زنگ قهوه‌ای ۴۶ ژن بوده که به صورت $Lr1$ تا $Lr46$ مشخص شده‌اند. ژن‌های LrW , $LrVPM$, $LrTb$ و $LrW2$ نیز هنوز با وجود معرفی نامگذاری نشده‌اند (McIntosh et al., 1998). فرضیه ژن برای ژن بار توسط Flore (1971) (Flore, 1942) مطرح شد و Person (1959) و Thatcher (Near Isogenic) (آیزوژنیک) با استفاده از رقم برای زنگ قهوه‌ای گندم تهیه و معرفی شدند. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین ژن‌های مقاومت به زنگ قهوه‌ای در هشت رقم استاندارد گندم فرضیه ژن برای ژن را اثبات کرد (Dyck & Samborski, 1968). در سال ۱۹۸۶ به وسیله گروهی از محققین زنگ قهوه‌ای (North American Leaf Rust Workers Committee) استفاده از ارقام منوژنیک که هر یک $Lr3$, $Lr2c$, $Lr2a$, $Lr1$ حامل یک ژن مقاومت شامل

مختلف می‌توان نسبت به تهییه ارقام مقاوم با ژن‌های مقاومت مؤثر در مناطق مورد نظر اقدام نمود که این کار با کاشت خزانه‌های تله (Trap Nursery) در مناطق مختلف امکان‌پذیر می‌باشد. این پژوهش جهت شناسایی ژن‌ها یا فاکتورهای بیماریزایی در جمعیت عامل بیماری زنگ قهقهه‌ای گندم و تعیین ژن‌های مقاومت مؤثر در مرحله بلوغ گیاه در استان گلستان انجام شد تا از آنها در جهت اصلاح ارقام گندم با خصوصیات زراعی مناسب و مطلوب استفاده شود.

مواد و روش‌ها

جهت بررسی واکنش ژن‌های مقاومت و شناسایی فاکتورهای بیماری‌زاویی عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۱، از خزانه تله شامل ۳۷ لاین تقریباً آیزوژنیک (Near Isogenic Lines) دریافتی از مرکز تحقیقات بین‌المللی سیمیت مکزیک استفاده شد. این لاین‌ها عمدتاً از رقم Thatcher تهیه شده‌اند و هر لاین دارای ژن مقاومت مشخصی $JH\pm U$ به زنگ قهوه‌ای می‌باشد. هر یک از لاین‌ها در دو خط یک سانتی‌متری، روی یک پشتہ با فاصله خطوط ۳۰ سانتی‌متری و فاصله پشتہ‌ها ۵۰ سانتی‌متر کاشته شدند. رقم حساس بولانی هم به عنوان شاهد و پخش‌کننده (Spreader) بیماری در بین لاین‌ها و اطراف خزانه کشت گردید. در گرگان جهت تامین رطوبت لازم برای گسترش بیماری از سیستم آبیاری مهپاش (Mist Irrigation) استفاده شد ولی در گنبد خزانه بدون سیستم مهپاش بود. با توجه به بررسی وضعیت فاکتورهای بیماری‌زاویی در شرایط طبیعی، از آلودگی مصنوعی خزانه خودداری شد. در طول فصل زراعی، مراقبت‌های لازم از قبیل آبیاری، وجین و مبارزه با آفات و علف‌های هرز انجام شد. یادداشت‌برداری از واکنش لاین‌ها در مرحله ظهور برگ پرچم و زمانی که رقم حساس آلودگی بالایی از خود نشان داد، بر اساس مقیاس اصلاح شده کوب (The Peterson et al., 1992) انجام شد. این مقیاس مبتنی بر مکانیزم مقاومت مخصوصی (Modified Cobbs Scale) است که از ترتیبی از ۱۰۰ تا ۰ درجه در برخاسته است. در این مقیاس، مقادیر ۱۰۰ و ۰ مخصوصاً ایجاد نمی‌شوند. این مقیاس بر اساس روش Roelfs (Roelfs et al., 1992) برای هر لاین مشخص گردید. جهت بررسی وجود یا عدم وجود فاکتورهای بیماری‌زاویی برای

Lr16 بیماریزا نبودند ولی بیشتر آنها روی گیاهان حامل ژن‌های Lr3ka، Lr3a، Lr11، Lr20، Lr24 و Lr30 بیماریزایی داشتند. همچنین هیچ جدایه‌ای روی Lr1، Lr2c و Lr10 غیر بیماریزا نبودند (Terefe *et al.*, 2009). اخیراً در هندوستان دو پاتوییپ جدید به نامهای 121R60-1 و 377R60-1 شناسایی شدند که روی Lr28 بیماریزایی داشتند (Bhardwaj *et al.*, 2010).

در ایران Bamdadian (1973) با استفاده از هشت رقم استاندارد، نژادهای Rin1, Rin2, Rin3, Rin4, Rin5, Rin6, Rin7 و Rin8 را شناسایی کرد که روی ۱۴۳ زنگ قوهای را شناسایی کرد که روی ۱۲۲ زنگ قوهای را شناسایی کرد که روی ۵۷ زن های مقاومت Lr2c, Lr2a, Lr11, Lr25 بیماریزایی داشتند. Mahdian *et al.* (1999) با بررسی ۱۱۵ جدایه زنگ قوهای روی ۳۴ لاین تقریباً آیزوژنیک در شرایط گلخانه ای نشان دادند که تمامی جدایه ها روی لاین های حامل زن های Lr12, Lr18, Lr14b, Lr14a, Lr34, Lr35, RL6061 و LrB بیماریزا بودند ولی روی لاین های حامل زن های Lr9, Lr24, Lr19, Lr29 و Lrw بیماریزایی نداشتند. در بررسی دیگری در طی سال های ۱۳۷۴-۱۳۷۶ با استفاده از خزانه تله با ۲۸ لاین آیزوژنیک، مشخص شد که برای زن های Lr1, Lr2c, Lr2b, Lr2a, Lr13, Lr12, Lr11, Lr10, Lr9, Lr3bg, Lr3ka, Lr3, Lr22a, Lr21, Lr18, Lr17, Lr16, Lr15, Lr14a یا چند منطقه بیماریزایی وجود داشت (Torabi *et al.*, 2002). در استان خوزستان در یک آزمایش با ۳۰ جدایه زنگ قوهای روی ۳۵ لاین تقریباً آیزوژنیک مشخص شد که لاین های با زن های Lr9, Lr25, Lr26, Lr29 و Lr27+Lr31 به همه جدایه ها مقاوم بودند، چند تا از جدایه ها روی Lr19 بیماریزایی داشتند و همچنین لاین های با زن های Lr16 شدت

بهترین روش کنترل بیماری زنگ قهقهه‌ای گندم استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. در راستای تهیه ارقام مقاوم، شناسایی فاكتورهای بیماریزایی عامل بیماری در منطقه مورد نظر و پاتوتیپ‌های جدیدی که به منطقه وارد یا غالب شده‌اند، دارای اهمیت است. با شناسایی فاكتورهای بیماریزایی و بررسی تغییرات آنها در مناطق

Lr13 Lr12 Lr11 Lr10 Lr3bg Lr3ka Lr3 Lr2c Lr22b Lr20 Lr17 Lr16 Lr15 Lr14b Lr14a
Lrb Lr33 Lr32 Lr26 Lr24 Lr23 بیماریزایی و *Lrb* مشاهده شد و برای سایر ژن‌های مقاومت بیماریزایی دیده نشد. در گنبد فقط برای ژن‌های *Lr11 Lr1* و *Lrb* بیماریزایی وجود داشت و روی بقیه ژن‌های مقاومت واکنش بیماریزایی به صورت تیپ‌های O, R, MS ظاهر شد.

سال زراعی ۱۳۸۵-۸۶

در سال زراعی ۸۵-۸۶ در گرگان برای ژن‌های *Lr20*, *Lr15*, *Lr14b*, *Lr14a*, *Lr12*, *Lr11*, *Lr3bg* و *Lrb* بیماریزایی مشاهده شد و برای سایر ژن‌های مقاومت بیماریزایی دیده نشد. در گنبد برای ژن‌های *Lr32*, *Lr12*, *Lr11*, *Lr3ka*, *Lr2c* و بیماریزایی دیده شد ولی برای سایر ژن‌های مقاومت واکنش بیماریزایی به صورت تیپ‌های *O*, *R*, *MR* و *MS* ظاهر شد.

بر اساس نتایج به دست آمده از تعیین فاکتورهای بیماریزایی عامل بیماری زنگ قوههای گندم در طی پنج سال متوالی، برای ژن‌های Lr1 Lr3 Lr2c Lr14b Lr14a Lr13 Lr12 Lr11 Lr10 Lr3bg Lr22a Lr21 Lr20 Lr18 Lr17 Lr16 Lr15 Lr34 Lr33 Lr30 Lr26 Lr24 Lr23 Lr22b و Lrb در یک یا چند سال و در یک یا هر دو منطقه بیماریزایی مشاهده شد. از طرفی برای ژن‌های Lr3 Lr34 Lr26 Lr18 Lr17 Lr14b Lr10 منطقه گرگان بیماریزایی مشاهده شد و برای ژن‌های Lr35 Lr29 Lr28 Lr25 Lr19 Lr9 Lr2b Lr2a و Lr36 در هیچ سالی در مناطق مورد نظر بیماریزایی دیده نشد. در مقایسه ژن‌های بیماریزایی عامل زنگ قوههای برای غلبه بر ژن‌های مقاومت، بیشترین فراوانی بیماریزایی در طی پنج سال برای ژن مقاومت Lr11 دیده شد. پس از آن بیشترین فراوانی بیماریزایی به ترتیب برای ژن‌های مقاومت Lr3bg Lr32 Lr24 Lr15 و Lr33 دیده شد. کمترین فراوانی بیماریزایی هم برای ژن‌های مقاومت Lr17 Lr3ka Lr34 Lr30 Lr18 مشاهده گردید.

با توجه به عدم وجود سوابقات، ۹۱٪ از نهادهای

رن‌های مقاومت، تیپ‌های آلودگی به صورت R , O , S و MS به عنوان غیر بیماریزایی (Avirulence) و تیپ آلودگی S به عنوان بیماریزایی (Virulence) در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث

و اکنш لاین‌های تقریباً آیزوژنیک (تک زنی) در مقابل عامل بیماری زنگ قهقهه‌ای در دو منطقه گرگان و گنبد در طی پنج سال اجرای آزمایش (۱۳۸۱-۸۶) به طور جداگانه در جدول‌های ۱ و ۲ ثبت شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بیماری‌زایی برای گیاهان حامل ژن‌های مقاومت در سال‌های مختلف در مناطق مورد بررسی، به شرح زیر می‌باشد:

سال زراعی ۱۳۸۱-۸۲

در سال زراعی ۸۱-۸۲ در گرگان برای ژن‌های *Lr1*, *Lr15*, *Lr14a*, *Lr12*, *Lr11*, *Lr3bg*, *Lr3ka*, *Lr3*, *Lr2c*, *Lr33*, *Lr32*, *Lr24*, *Lr22b*, *Lr22a*, *Lr21*, *Lr20*, *Lr16* و *Lrb* بیماریزایی مشاهده شد و برای سایر ژن‌های مقاومت بیماریزایی دیده نشد. در گندم برای ژن‌های *Lr14a*, *Lr13*, *Lr12*, *Lr11*, *Lr3bg*, *Lr3ka*, *Lr2c*, *Lr1*, *Lr24*, *Lr23*, *Lr22b*, *Lr22a*, *Lr21*, *Lr20*, *Lr16*, *Lr15* و *Lrb* بیماریزایی وجود داشت و برای سایر ژن‌های مقاومت بیماریزایی دیده نشد.

سال زراعي ١٣٨٢-٨٣

در سال زراعی ۸۲-۸۳ در گرگان و گنبد فقط برای ژن *Lr11* بیماریزایی دیده شد و روی بقیه ارقام دارای ژن مقاومت واکنش بیماریزایی به صورت O.R.MR و MS بود.

سال، زراعي، ١٣٨٣-٨٤

در سال زراعی ۸۳-۸۴ در گرگان برای ژن‌های مقاومت *Lr14b* *Lr13* *Lr11* *Lr3bg* *Lr3* *Lr2c* *Lr1* مقاومت *Lr33* *Lr32* *Lr30* *Lr26* *Lr24* *Lr20* *Lr18* *Lr15* و *Lr34* بیماریزایی مشاهده شد و برای سایر ژن‌های مقاومت بیماریزایی وجود نداشت. در گندب بر خلاف گرگان آلدگی در حد پایین ظاهر شد و بیماریزایی فقط روی ژن‌های *Lr11*, *Lr14a*, *Lr22b* و *Lr332* مشاهده شد و روی بقیه لاین‌های دارای ژن مقاومت واکنش بیماریزایی به صورت O, R, MR و MS ظاهر شد.

سال، زادع، ۱۳۸۴-۸۵

Lr1 درساً، زداعی، ۸۴-۸۵ د، گگان بای، ژن‌های

فقط برای یک ژن مقاومت، در سال سوم برای ۱۸ ژن مقاومت، در سال چهارم برای ۲۰ ژن مقاومت و در سال پنجم برای ۱۶ ژن مقاومت بیماریزایی دیده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین و کمترین بیماریزایی به ترتیب مربوط به سال‌های اول و دوم اجرای آزمایش بود که علت آن می‌تواند مربوط به فراوانی بیماریزایی برای ژن‌های خاص در عامل بیماریزایی باشد. از طرفی شرایط مساعد و یا نامساعد محیطی برای ظهور و فعالیت ژن‌های بیماریزایی عامل بیماری نیز در این مورد بی‌تأثیر نمی‌باشد.

Lr36 Lr35 Lr28 Lr25 Lr19 Lr9 Lr2b و *Lr37* در طی پنج سال اجرای آزمایش امکان استفاده از این ژن‌های مقاومت در برنامه‌های اصلاح ارقام مقاوم را فراهم می‌نماید. همچنین برای ژن‌های *Lr17 Lr3ka* و *Lr34 Lr30 Lr18* که فقط در یک سال بیماریزایی روی آنها مشاهده شد، می‌توان به عنوان منبع مقاومت مؤثر در اصلاح ارقام مقاوم همراه با سایر ژن‌های مقاوم استفاده کرد.

مقایسه نتایج پنج سال پژوهش نشان داد که در سال اول اجرای آزمایش برای ۲۱ ژن مقاومت، در سال دوم

جدول ۱- واکنش لاین‌های تقریباً آیزوژنیک نسبت به عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در گرگان در طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۶

شماره لاین	نام/شجره	ژن مقاومت	۱۳۸۱-۸۲	۱۳۸۲-۸۳	۱۳۸۳-۸۴	۱۳۸۴-۸۵	۱۳۸۵-۸۶
1	Thatcher	<i>Lr22b</i>	40S	40MS	40MS	70S	40S
2	TC*6/CENTENARIO (RL6003)	<i>Lr1</i>	20S	50MS	40S	80S	20MS
3	TC*6/WEBSTER (RL6016)	<i>Lr2a</i>	0	0	40MS	0	10R
4	TC*6/CARINA(RL6019)	<i>Lr2b</i>	40MS	10MS	10MR	0	10MR
5	TC*6/LOROS(RL6047)	<i>Lr2c</i>	30MS	10MR	50S	40S	20MS
6	TC*6/DEMOCRAT(RL6002)	<i>Lr3</i>	70S	10MR	80S	70S	20MS
7	TC*6/ANIVERSARIO(RL6007)	<i>Lr3ka</i>	50S	10R	20R	0	0
8	BAGE/8*TC(RL6042)	<i>Lr3bg</i>	60S	30MS	70S	70S	80S
9	TRANSFER/6*TC(RL6010)	<i>Lr9</i>	50MS	20MR	0	0	10R
10	TC*6/EXCHANGE(RL6004)	<i>Lr10</i>	40MS	30MS	10MR	70S	20MR
+ 8 66\$ 5 :		<i>Lr11</i>	50S	70S	60S	80S	50S
12	EXCHANGE/6*TC(RL6011)	<i>Lr12</i>	40S	40MS	40MS	50S	40S
0 \$ 1 , 78 2 8		<i>Lr13</i>	30MS	20MR	60S	70S	20MS
14	SELKIRK/6*TC(RL6013)	<i>Lr14a</i>	40S	10MR	20MS	70S	40S
15	TC*6/MARIA ESCOBAR(RL6006)	<i>Lr14b</i>	10MS	20MS	50S	60S	40S
16	TC*6/KENYA1483(RL6052)	<i>Lr15</i>	50S	40MS	70S	80S	70S
17	TC*6/EXCHANGE(RL6005)	<i>Lr16</i>	50S	20MR	20MS	70S	20MR
. / (, 1 / 8 & (5 2 7 & 5 /		<i>Lr17</i>	10MR	20MS	40MS	80S	10MS
19	TC*7/AFRICA43(RL6009)	<i>Lr18</i>	20MS	20MR	70S	0	0
20	TC*7/TR(RL6040)	<i>Lr19</i>	20MR	40MS	0	0	0
21	THEW(W203)	<i>Lr20</i>	40S	30MS	60S	80S	70S
22	TC*6/RL5406(RL6043)	<i>Lr21</i>	50S	5MR	0	20MS	20MS
23	TC*6/RL5404(RL6044)	<i>Lr22a</i>	70S	5MR	10R	30MS	20MR
24	LEE310/6*TC(RL6012)	<i>Lr23</i>	30MS	20MR	5R	80S	70S
25	TC*6/AGENT(RL6064)	<i>Lr24</i>	50S	5MS	40S	70S	60S
26	TC*?/TRANSEC	<i>Lr25</i>	60MS	0	40MS	0	0
27	TC*6/ST-1-25(RL6078)	<i>Lr26</i>	20MS	20MR	50S	60S	10MS
28	CS2D-2M	<i>Lr28</i>	20MS	0	0	0	0
29	TC*6/CS7AG#11(RL6080)	<i>Lr29</i>	0	0	5R	30MR	0
30	TC*6/TERENZ10(RL6049)	<i>Lr30</i>	20MS	20MS	70S	10MR	20MR
31	TCLR32(RL5497)	<i>Lr32</i>	60S	30MS	70S	90S	70S
32	TC*6/PI58548(RL6057)	<i>Lr33</i>	70S	10R	70S	50S	60S
33	TC*6/PI58548(RL6058)	<i>Lr34</i>	50MS	10R	50S	10MR	20MS
34	RL5711	<i>Lr35</i>	10MR	20MR	20MS	0	0
(1 (3 \$ (63 (/ 72 , ' (6 Z «		<i>Lr36</i>	0	0	10MS	0	0
36	TC*6/VPM(RL6081)	<i>Lr37</i>	40MS	40MS	40MS	50MS	10R
37	TC*6//CARINA(RL6051)	<i>Lrb</i>	40MS	50MS	50MS	80S	70S
38	Bolani(Susceptible Check)		90S	60S	80S	100S	80S

O: مصون، R: مقاوم، MR: نیمه مقاوم، MS: نیمه حساس، S: حساس.

جدول ۲- واکنش لاین‌های تقریباً آیزوژنیک نسبت به عامل بیماری زنگ قهقهه‌ای گندم در گندم در طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۱

شماره لاین	نام/شجره	زن مقاومت	۱۳۸۱-۸۲	۱۳۸۲-۸۳	۱۳۸۳-۸۴	۱۳۸۴-۸۵	۱۳۸۵-۸۶
1	Thatcher	Lr22b	50MS	20MS	20S	20S	20MS
2	TC*6/CENTENARIO (RL6003)	Lrl	20S	20MS	20MS	20S	10MR
3	TC*6/WEBSTER (RL6016)	Lr2a	20MS	0	5R	0	20MS
4	TC*6/CARINA(RL6019)	Lr2b	30S	0	0	0	20S
5	TC*6/LOROS(RL6047)	Lr2c	30S	15MS	0	0	50S
6	TC*6/DEMOCRAT(RL6002)	Lr3	40MS	20MS	20MR	20MS	20MS
7	TC*6/ANIVERSARIO(RL6007)	Lr3ka	40S	5MS	10MS	10MS	80S
8	BAGE/8*TC(RL6042)	Lr3bg	60S	10MS	5R	20MS	0
9	TRANSFER/6*TC(RL6010)	Lr9	30MR	5MS	10MR	5MS	20MR
10	TC*6/EXCHANGE(RL6004)	Lrl0	20S	30MS	15MS	20MS	10MS
+ 8 66\$ 5 :		Lrl1	70S	40S	40S	70S	50S
12	EXCHANGE/6*TC(RL6011)	Lrl2	60S	20MS	10R	40S	10S
0 \$ 1 , 78 2 8		Lrl3	50S	10MS	10MR	20S	0
14	SELKIRK/6*TC(RL6013)	Lrl4a	50S	10MS	20MS	10S	10MS
15	TC*6/MARIA ESCOBAR(RL6006)	Lrl4b	20S	10S	20S	5S	10MR
16	TC*6/KENYA1483(RL6052)	Lrl5	40S	10S	10MS	20S	10MR
17	TC*6/EXCHANGE(RL6005)	Lrl6	70S	15S	20MS	10MS	0
. / (, 1 / 8 & (5 2 7 & 5 /		Lrl7	20S	10S	10S	20S	10MS
19	TC*7/AFRICA43(RL6009)	Lrl8	10S	10MS	10MR	0	0
20	TC*7/TR(RL6040)	Lrl9	40MR	0	0	0	0
21	THEW(W203)	Lrl0	40S	20MS	10MS	20MS	15MS
22	TC*6/RL5406(RL6043)	Lrl1	60S	0	10S	0	0
23	TC*6/RL5404(RL6044)	Lrl2a	70S	0	0	0	0
24	LEE310/6*TC(RL6012)	Lrl23	40S	5MR	20S	10S	0
25	TC*6/AGENT(RL6064)	Lrl24	30S	10MS	10MR	5MS	5MR
26	TC*?/TRANSEC	Lrl25	50MS	0	10MS	0	0
27	TC*6/ST-1-25(RL6078)	Lrl26	20MS	10MR	5R	20MR	10R
28	CS2D-2M	Lrl28	10MS	5MR	5R	0	0
29	TC*6/CS7AG#11(RL6080)	Lrl29	0	0	0	0	0
30	TC*6/TERENZ10(RL6049)	Lrl30	20MS	0	0	0	40S
31	TCLR32(RL5497)	Lrl32	30S	0	50S	20S	10MS
32	TC*6/PI58548(RL6057)	Lrl33	40S	10MS	10R	5MS	5R
33	TC*6/PI58548(RL6058)	Lrl34	20MR	5MR	5R	10MR	10R
34	RL5711	Lrl35	0	0	0	0	10R
(1 (3 \$ (63(/ 72, ' (6 Z«	Lrl36	0	0	0	0	0
36	TC*6/VPM(RL6081)	Lrl37	10MR	20MR	10MS	0	10MS
37	TC*6//CARINA(RL6051)	Lrb	20S	20MS	10MS	10S	10MS
38	Bolani(Susceptible Check)		80S	60S	50S	70S	50S

O: مصون، R: مقاوم، MR: نیمه مقاوم، S: نیمه حساس.

گرگان نسبت به گندم باشد که باعث بروز آلودگی مطلوب لاین‌ها شده است.

مقایسه نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج بررسی‌های Afshari *et al.* (2002) و Torabi *et al.* (2005) نشان می‌دهد که فاکتورهای بیماری‌زایی جمعیت عامل بیماری در سال‌ها و مناطق مختلف تغییرات فراوانی می‌یابد که باستی مورد توجه قرار گیرد. عدم بیماری‌زایی روی بعضی از زن‌ها مانند Lrl9 و Lrl9 با نتایج Torabi *et al.* (2001, 2002) مطابقت دارد که می‌تواند به عنوان منبع مقاومت مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات انجام شده در بلغارستان نشان داد که لاین‌های دارای زن Lrl9 و Lrl9 مقاوم بوده که

نتایج به دست آمده از منطقه گرگان در مقایسه با منطقه گندم نشان می‌دهد که میزان فاکتورهای بیماری‌زایی در گرگان نسبت به گندم در طی پنج سال بیشتر بود که می‌تواند به دلیل فراهم بودن شرایط محیطی مساعد (رطوبت کافی و دمای مناسب) برای گسترش بیماری باشد. فقط در سال دوم اجرای آزمایش، فاکتورهای بیماری‌زایی در گرگان و گندم یکی بود که مربوط به زن مقاومت Lrl1 می‌باشد. در حالی که در بقیه سال‌ها تعداد فاکتورهای بیماری‌زایی در منطقه گرگان بیشتر از منطقه گندم بود که می‌تواند بدلیل شرایط محیطی مناسب از نظر دما و رطوبت نسبی (وجود سیستم آبیاری مهپاش) برای گسترش بیماری در

در این بررسی بیماریزایی روی آن دیده نشد. با توجه به طیف گسترده بیماریزایی برای ژن‌های مقاومت شناسایی شده برای زنگ قهوه‌ای گندم (به جز چند ژن)، به نظر می‌رسد که جهت تهیه ارقام مقاوم باقیستی ژن‌های شناسایی شده جدید (*Lr46* تا *Lr38*) که هنوز بیماریزایی برای آنها مشاهده نشده را نیز در مناطق مختلف آزمایش نمود تا بتوان از ژن‌های مقاومت مؤثر هر منطقه جهت تهیه ارقام مقاوم بهره برد.

از آنجایی که مقاومت یک رقم تک ژنی نمی‌تواند پایداری زیادی داشته باشد و با یک موتاسیون در عامل بیماری یا ظهور یک نژاد جدید، احتمال شکسته شدن آن زیاد است، بنابراین باقیستی از ترکیب چند ژن مقاومت که دارای تأثیر متقابل (Interactive effects) همراه با اثرات افزایشی مقاومت (Additive effects) (Kolmer, 1996; Singh & Rajaram, 1994) در کانادا از ترکیب ژن‌های *Lr10* و *Lr13* و یا ژن‌های *Lr13* و *Lr34* استفاده شد (Kolmer, 1997). در مطالعه انجام شده در دانشگاه سیدنی استرالیا با استفاده از پاتوتیپ‌های عامل بیماری روی تعدادی از لاین‌ها و ارقام، وجود ترکیب ژنی در بیشتر موارد مشاهده و نتیجه گرفته شد که استفاده از ترکیب ژن‌های مقاومت یکی از بهترین راههای پایداری مقاومت ارقام در مقابل عامل بیماری می‌باشد (Singh, 1993; Afshari, 2000).

نتیجه‌گیری کلی

بر اساس نتایج به دست آمده، به طور کلی وضعیت بیماریزایی روی ژن‌های مقاومت مختلف در سال‌های متمادی، متفاوت بود که نشان‌دهنده اختلاف در توان بیماریزایی عامل بیماری در سال‌های مختلف می‌باشد. بنابراین بسته به شرایط محیطی و فعال بودن یا نبودن بعضی نژادهای عامل بیماری، فاکتورهای بیماریزایی جمعیت عامل بیماری از سالی به سال دیگر تغییر می‌کند. با توجه به اینکه بروز و گسترش بیماری در هر منطقه به میزان زادمایه (مایه تلقیح) و شرایط آب و هوایی بستگی دارد، ممکن است همه ساله شرایط مساعد برای ایجاد آلودگی‌های شدید فراهم نباشد. بنابراین ردیابی عامل بیماری، شناسایی و تغییرات احتمالی ژن‌های بیماریزایی عامل بیماری با استفاده از

نشان‌دهنده کمیاب بودن بیماریزایی برای این دو ژن در سایر مناطق دنیا می‌باشد (Radisiete et al., 1983). در طی سال‌های Mesterhazy et al. (2000) ۱۹۹۶-۱۹۹۹ با بررسی بیماریزایی جمعیت زنگ قهوه‌ای گندم در اروپا نشان دادند که *Lr9* و *Lr19* در سراسر اروپا بسیار مؤثر است. در منطقه قفقاز و فدراسیون روسیه نیز ارقام دارای ژن‌های *Lr9* و *Lr19* در مقابل قارچ عامل بیماری زنگ قهوه‌ای مقاوم بودند (Volkova, 2004). در بررسی انجام شده در پاکستان در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۶، نشان داده شد که ژن‌های *Lr9* و *Lr19* در تمام مناطق مقاوم بودند و بیماریزایی در آنها دیده نشد (Fayyaz et al., 2008).

بیماریزایی برای ژن *Lr9* از آمریکا (Shaner et al., 1972)، برزیل، آرژانتین (McIntosh et al., 1995) و ایتالیا، آفریقا، پاکستان (Huerta-Espino, 1992) و مکزیک (Huerta-Espino & Singh, 1994) گزارش شده است. وجود بیماریزایی برای *Lr9* در مناطق ذکر شده نشان‌دهنده نژاد خاص ۵DFH±6SHIIIF بودن این ژن می‌باشد که در این حالت کاشت ارقام دارای این ژن به تنها یک منجر به بروز بیماریزایی برای آن و شکستن مقاومت آن خواهد شد. بنابراین باقیستی این ژن در کنار سایر ژن‌های مقاومت مؤثر گیاهچه‌ای و گیاه کامل استفاده گردد.

علیرغم مؤثر بودن ژن *Lr19* در مقاومت به زنگ قهوه‌ای ولی به دلیل همبستگی (Linkage) با ژن تولید رنگدانه و زرد نمودن آرد، استفاده از آن به عنوان منبع مقاومت محدود شده است (Knott, 1989). بیماریزایی روی این ژن بسیار نادر و در یک مورد گزارش گردید (Huerta-Espino & Singh, 1994). تشخیص وجود این ژن در ارقام گندم بسیار دشوار و نیاز به مارکرهای آیزو زایمی دارد. Singh & Rajaram (1991) در بررسی مقاومت ۵۰ رقم مکزیکی به زنگ قهوه‌ای، رقم ۸۶ را دارای ژن‌های *Lr13* و *Lr19* گزارش کردند. بر اساس تحقیقات انجام شده در اسپانیا وجود بیماریزایی *Lr14b*, *Lr12*, *Lr11*, *Lr10*, *Lr2c*, *Lr2b* برای ژن‌های (Del Olmo & Rubiales, 2004) *Lrb* و *Lr23* شد *Lr20*, *Lr18* که با نتایج این مطالعه بسیار نزدیک می‌باشد و فقط در ژن *Lr2b* اختلاف دیده می‌شود که

بیماریزایی جدید در جمعیت عامل بیماری برای ژن‌های مقاومت مختلف در مناطق مختلف کشور به دست آید. بنابراین اجرای مداوم و هر ساله اینگونه پژوهش‌ها ضروریست.

خرانه‌های تله حاوی ارقام آیزوژنیک در شرایط آلودگی طبیعی باید به طور دائم ادامه باید تا اطلاعات مفید و جامعی از ماهیت عامل بیماری، تغییرات احتمالی ژن‌های بیماریزایی و ظهور فاکتورهای

REFERENCES

1. Afshari, F. (2000). *Studies on rust resistance in wheat with particular emphasis on stripe rust*. Ph. D. Thesis, QYHWWRI 6\QHQ \$ XWDD SS
2. Afshari, F., Torabi, M., Kia, Sh., Dadrezaei, S. T., Safavi, S. A., Chaichi, M., Karbalaei Khiavi, P., Zakeri, A., Bahrami Kamangir, S., Nasrollahi, M., Patpour, M. & Ebrahimnejad, Sh. (2005). Monitoring of virulence factors of *Puccinia triticina* Eriksson, the causal agent of wheat leaf rust in Iran during 2002-2004. *Seed and Plant*, 21, 485-500. (In Farsi).
3. Ausemus, E. R., Harrinton, J. B., Reitz, L. P. & Worzella, W. W. (1946). A summary of genetic studies in hexaploid and tetraploid wheats. *Agronomy Journal*, 38, 1082-1099.
4. Bamdadian, A. (1973). Physiologic races of *Puccinia recondita* in Iran (1968-1972). *Cereal Bulletin*, 1, 45-47.
5. Behdad, A. (1983). *Crop Diseases of Iran*. Neshat of Esfahan Publication. 223 pp. (In Farsi).
6. Bhardwaj, S. C., Prashar, M., Jain, S. K., Sharma, Y. P., Sivasamy, M. & Kalappanavar, I. K. (2010). Virulence of *Puccinia triticina* on Lr28 in wheat and its evolutionary relation to prevalent pathotypes in India. *Cereal Research Communications*, 38 (1), 83-89.
7. Browder, L. E. (1980). A compendium of information about named genes for low reaction to *Puccinia recondita* in wheat. *Crop Science*, 20, 775-779.
8. Chen, W., Hu, C. & Zhaug, S. (1993). Analysis of virulence genes of *Puccinia recondita* f.sp. *tritici* population in China. *Scientia Agricultura Sinica*, 26(2), 17-23.
9. Del Olmo, A. I. & Rubiales, D. (2004). Physiologic specialization of *Puccinia triticina* in Andalusia (Spain) in 2003. In: Proceedings of the 11th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, 22 to 27 Aug. John Innes Centre, Norwich, England. p.15.
10. Dubin, H. J. & Torres, E. (1981). Causes and consequences of the wheat leaf rust epidemic in North West Mexico. *Annual Review of Phytopathology*, 19, 41-44.
11. Dyck, P. L. & Samborski. (1968). *Genetic of resistance to leaf rust in the common wheat varieties*. Webster, Loros Brevit, Carina, Malakof and Centenario.
12. Elyasi-Gomari, S. (2010). Virulence of *Puccinia triticina* on wheat in Iran. *Africa Journal of Plant Science*, 4(2), 26-31.
13. Fayyaz, M., Rattu, A. R., Ahmad, I., Akhtar, M. A., Hakro, A. A. & Mujeeb-Kazi, A. (2008). Current status of the occurrence and distribution of (*Puccinia triticina*) wheat leaf rust virulence in Pakistan. *Pakistan Journal of Botany*, 40(2), 887-895.
14. Flor, H. H. (1942). Inheritance of pathogenicity in *Melampsora lini*. *Phytopathology*, 32, 653-669.
15. Flor, H. H. (1971). Current status of the gene for gene concept. *Annual Review of Phytopathology*, 9, 275-296.
16. Hussain, M., Hassan, S. F. & Kirmani, M. A. S. (1980). Virulence in *Puccinia recondita* Rob. ex. Desm. f. sp. *tritici* in Pakistan during 1978-1979. In: Proceedings of the 5th European and Mediterranean Cereal Rust Conference, Bari, Italy, pp. 179-184.
17. Huerta-Espino, J. (1992). *Analysis of wheat leaf and stem rust on a world wide basis*. Ph. D. Thesis, QYHWWRI 0 IQQHRW 8 6\$
18. Huerta-Espino, J. & Singh, R. P. (1994). First report of virulence for wheat leaf rust gene Lr19 in Mexico. *Plant Disease*, 78, 640.
19. Knott, D. R. (1989). *The Wheat Rusts. Breeding for Resistance*. Monograph on theoretical and Applied Genetics. 12. Springer Verlag, Berlin. 201pp.
20. Kolmer, J. A. (1996). Genetics of resistance to wheat leaf rust. *Annual Review of Phytopathology*, 34, 435-455.
21. Kolmer, J. A. (1997). Virulence in *Puccinia recondita* f.sp. *tritici* from Canada: Genes for adult plant resistance to wheat leaf rust. *Plant Disease*, 81, 267-271.
22. Long, D. L. & Kolmer, Y. A. (1989). A North American system of nomenclature for *Puccinia recondita* f. sp. *tritici*. *Phytopathology*, 79, 525-529.
23. Long, D. L., Schafer, J., Roelf, A. & Robert, S. (1986). Virulence and epidemiology of *puccinia recondita* f.sp.*tritici* IQWH8 QWGG6WM Plant Disease, 77, 786-791.

24. Mahdian, S., Bamdadian, A., Torabi, M. & Alizadeh, A. (1999). Avirulence/ virulence factors in *Puccinia recondita* f. sp. *tritici* isolates from different parts of Iran. *Seed and Plant*, 15, 56-67. (In Farsi).
25. ۰ ۱۱۰V (% -IFNRQ ۰ ۶ ۶W1QV RI WH OH UXWRI ZKHWIQ WH 8 Q1MG 6WAV Phytopathology, 13, 36.
26. McIntosh, R. A., Hart, G. E., Devos, K. M., Gale, M. D. & Rogers, W. J. (1998). Catalogue of gene symbols for wheat. In: Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, 2-7 Aug. Vol. 5, Saskatoon, Canada.
27. McIntosh, R. A., Wellings, C. R. & Park, R. F. (1995). *Wheat rusts, an atlas of resistance genes*. CSIRO, Australia.
28. Mesterhazy, A., Bartos, P., Goyeau, H., Niks, R. E. & Csosz, M. (2000). European Virulence survey for leaf rust in wheat. *Agronomie*, 20, 703-804.
29. Park, R. F. & Felesenstien, F. G. (1998). Physiological specialization and pathotype distribution of *Puccinia recondita* in Western Europe. *Plant Pathology*, 47, 157-164.
30. Person, C. O. (1959). Gene for gene relationship in host-parasite system .*Canadian Journal of Botany*, 37, 1101-1130
31. Peterson, R. F., Campbell, A. B. & Hannah, A. E. (1948). A diagramatic scale for estimate rust intensity of leaves and stem of cereal. *Canadian journal of Reasearch*, 26, 496-500.
32. Radisiete, S., Dimov, S. & Gospodinor, E. (1983). Virulence of brown rust on wheat in south Bulgaria in 1979-1981. *Rastoniv Dni Nauki*, 20, 113-119.
33. ۵ DWX \$ ۵ \$ KP DG ,)D\DJ ۰ \$ NKWU ۰ \$ +DIXH , ۸ / =DNID ۰ \$ I]DO ۶ ۱ Virulence analysis of *Puccinia triticina* cause of leaf rust of wheat. *Pakistan Journal of Botany*, 41(4), 1957-1964.
34. Roelfs, A. P., Singh, R. P. & Saari, E. E. (1992). *Rust disease of wheat: concepts and methods of disease management*. CIMMYT. Mexico.
35. Roelfs, A. P. (1978). *Estimated losses caused by rust in small cereal in the United States 1918-76*. Miscellaneous Publication. 85 pp.
36. Samborski, D. J. (1983). Occurrence and virulence of *puccinia recondita* in Canada in 1982. *Canadian Journal of Plant Pathology*, 5, 194-196.
37. Shaner, G. J. J., Roberts, R. E. & Finny, R. E. (1972). A culture of *Puccinia recondita* virulent to the wheat cultivar transfer. *Plant Disease Reporter*, 56, 828-830.
38. Singh, P. R. & Rajaram S. (1991). Resistance of *Puccinia recondita* f. sp. *tritici* in 50 Mexican bread wheat cultivars. *Crop Science*, 31, 1471-1479.
39. Singh, P. R. & Rajaram S. (1994). Genetics of adult plant resistance to stripe rust in two bread wheats. *Euphytica*, 12, 1-7.
40. Singh, R. P. (1993). Resistance to leaf rust in 26 Mexican wheat cultivars. *Crop Science*, 33, 633-637.
41. Terefe, T., Paul, I., Mebalo, J., Naicker, K. & Meyer, L. (2009). Occurrence and pathogenicity of *Puccinia triticina* on wheat in South Africa during 2007. *South Africa Journal of Plant Soil*, 26(1), 51-54.
42. Torabi, M., Mardoukhi, V., Forutan, A., Kashani, A., Aliramaei, M., Dadrezaei, S. T., Akbari Moghadam, H., Regaei, S. & Azimi, H. (2002). Virulence genes of *Puccinia recondita* f. sp. *tritici*, the causal agent of weheat leaf rust in som region of Iran during 1995-1999. *Seed and Plant*, 18, 432-449. (In Farsi).
43. Torabi, M., Nazari, K. & Afshari, F. (2001). Genetics of pathogenicity of *Puccinia recondita* f.sp. *tritici*, the causal agent of leaf rust of wheat. *Iranian Journal of Agricultural Sciences*, 32, 625-635. (In Farsi).
44. Volkova, G. V. (2004). Virulence of *Puccinia triticina* population in the North-Caucasian Region, Russia. In: Proceedings of the 11th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, 22-27 Aug. John Innes Centre, Norwich. p. 72.