

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان

زهره کرمی^{a*}, حبیب الله میرزایی^b, زهرا امام جمعه^c, علیرضا صادقی ماهونک^b, مرتضی خمیری^b

^aدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع غذایی، گرگان، ایران

^bاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران

^cدانشیار دانشگاه تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۲/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۹/۲۶

چکیده

۵

مقدمه: امروزه با افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به سالم بودن افروندنی‌های غذایی خصوصاً آنتی اکسیدان‌ها سعی بر این است که از این مواد به جای مواد شیمیایی ترکیبی در مواد غذایی استفاده شود. شیرین بیان یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی می‌باشد که دارای ترکیبات فیتوشیمیایی با اثرات سلامتی بخش است. از این ترکیبات می‌توان گلیسیرینزین و ترکیبات فنولیک را به عنوان آنتی اکسیدان، کاهنده آسیب‌های اکسیداتیو به سلول که منجر به سلطان، بیماری‌های قلبی و ... می‌شود نام برد. کیفیت گیاهان دارویی تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله زمان برداشت قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت بررسی اثر زمان برداشت روش مناسبی برای رسیدن به بهترین کیفیت دارویی گیاه شیرین بیان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ریشه شیرین بیان در ۲ فصل پاییز و زمستان (۲۰ مهر و ۲۰ دی) از استان گلستان (ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله) جمع‌آوری گردید. ترکیب شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه‌های برداشت شده در ۲ فصل متفاوت با آزمونهای DPPH، قدرت احیاکنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل ارزیابی شد.

یافته‌ها: مقدار رطوبت در ریشه‌های برداشت شده در فصل پاییز بیشتر بود در حالی که مقدار پروتئین، قند، خاکستر و ترکیبات فنولیک در ریشه‌های برداشت شده در فصل زمستان (۲۰ دی) بیشتر بود. نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ریشه شیرین بیان برداشت شده در فصل زمستان (۲۰ دی) بیشتر می‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که عوامل محیطی سبب تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و کیفیت مواد مؤثره آنها می‌گردد لذا برداشت یک گیاه دارویی زمانی مقرر به صرفه است که مواد مؤثره آن به حد مطلوب رسیده باشد. برداشت گیاهان دارویی در زمان نامناسب نه تنها میزان محصول به دست آمده را کاهش می‌دهد بلکه محصول برداشت شده نیز از کیفیت خوبی برخوردار نخواهد بود زیرا عملکرد اندام مورد نظر و هم‌چنین میزان متابولیت‌های ثانویه یک گیاه دارویی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه متفاوت است.

واژه‌های کلیدی: ریشه شیرین بیان، زمان برداشت، عصاره اتانولی، فعالیت آنتی اکسیدانی

مقدمه

شیرینیان یکی از مهمترین گیاهان دارویی از لحاظ اقتصادی است که به صورت گستردۀ مورد پژوهش قرار گرفته است (Fenwick *et al.*, 1990). نام علمی شیرینیان گلایسریزا است. این گیاه متعلق به تیره اصلی بقولات^۱ و تیره فرعی پروانهواران^۲ و از راسته گل سرخیان^۳ است. گیاهان دارویی گیاهانی هستند که مواد موثره موجود در آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر درمانی دارد و به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد (امید بیگی، ۱۳۸۳). در اندامهای مختلف گیاهان دارویی مواد خاصی ساخته و ذخیره می‌شود که مواد موثره یا مواد فعال نام دارند. این مواد تاثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده به جا می‌گذارند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرآیندهای ویژه و پیچیده شیمیایی به مقدار بسیار کم و معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه ساخته می‌شوند و کاشت، داشت و برداشت این گیاهان صرفاً به خاطر استفاده از مواد موثره آنها صورت می‌گیرد (امید بیگی، ۱۳۸۴). شیرینیان^۴ سرشار از ترکیباتی با خواص درمانی می‌باشد که از این ترکیبات می‌توان ترکیبات فولیک مانند فلاوانونها^۵ یا فلاوانولهای^۶ کلکونها^۷، ایزوفالوانها^۸ و ایزوفالانونها^۹ را نام برد که از میان آنها فلاوانونها و کلکونها از انواع اصلی هستند (Fenwick *et al.*, 1990). گلیسیریزین^{۱۰} یکی از اجزای اصلی ریشه شیرینیان است که از لحاظ بیولوژیکی و پزشکی ترکیبی فعال است. هم اکنون عصاره‌های شیرینیان و گلیسیریزین کاربردهای گستردۀ ای در صنایع غذایی، داروسازی و دخانیات دارند. در آمریکا میزان بالایی از شیرینیان و گلیسیریزین با مصرف تقریبی ۳/۶ - ۰/۰۲۷ میلی گرم گلیسیریزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز توسط مردم مصرف می‌شود. گرفته در مورد فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه شیرینیان حاکی از وجود ترکیبات با خاصیت آنتی‌اکسیدانی در ریشه شیرینیان می‌باشد. در سال ۱۹۹۷، Vaya اثر آنتی‌اکسیدانی هفت ترکیب ایزوله شده از گلیسیریزا گلابرا را بر روی اکسیداسیون LDL بررسی کرد که این هفت ترکیب عبارت بودند از: هیسپاگلابریدین^{۱۱}،

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرینیان

هیسپاگلابریدین^B، گلابریدین، چهارارتومتیل گلابریدین، ایزولیکورتیجنین، ایزوپرنیل چالکون و فورمنتین. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که ترکیبات مورد استفاده همگی آنتی‌اکسیدانهای بسیار قوی در مهار اکسیداسیون LDL می‌باشند.

یکی از مهمترین عواملی که در میزان ماده موثره گیاهان دارویی موثر است و در هنگام جمع‌آوری و بهره‌برداری از اندامهای گیاهی باید به آنها توجه نمود، زمان جمع‌آوری گیاه است تغییراتی که در میزان مواد موثره در طول سال و حتی ساعات یک روز وجود دارد، اهمیت جمع‌آوری گیاه دارویی را در زمان مناسب نمایان می‌سازد (شريعت، ۱۹۹۲). به عنوان مثال، ریشه و ریزوم را در اوخر پاییز برداشت می‌کنند زیرا در بهار ریشه‌ها معمولاً گوشتی و اسفنجی شکل هستند و در اثر خشک شدن به سرعت خرد شده و کیفیت خود را از دست می‌دهند (septak, 1999). برداشت اندامهای زیرزمینی شیرینیان در فصلی که برگ‌ها در حال ریختن است و در انتهای فصل رویشی (پاییز و زمستان) باید انجام شود زیرا در این دوره از رشد گیاه، ریشه دارای حداکثر مقدار ماده گلیسیریزین است (Mirheidar, 1996). با توجه به اهمیت زمان برداشت گیاهان دارویی، در این تحقیق به بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه شیرینیان در دو فصل پاییز (مهر) و زمستان (دی) پرداخته شد.

مواد و روش‌ها

ریشه شیرینیان در دو فصل پاییز و زمستان (۲۰ مهر و ۲۰ دی ۱۳۸۹) از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان تهیه شد. مواد شیمیایی مورد نظر در این تحقیق اتانول، فری سیانید پتاسیم، تری کلرواستیک اسید، کلرید آهن، اسید سولفوریک، فسفات سدیم، آمونیوم مولیبدات، اسید گالیک، فولین سیوکالتو، DPPH و استانداردهای BHT و گلیسیریزین بودند. تمامی مواد مورد استفاده از شرکت مرک و سیگما خریداری شدند.

- آماده‌سازی ریشه شیرینیان

ریشه‌های مرطوب شیرینیان پس از تمیز شدن و گرفتن گل و لای آن، با قیچی باغبانی به قطعات

¹ Leguminosae
⁷ Chalcones

² Fabaceae
⁸ Isoflavones

³ Rosales
⁹ Isoflavanones

⁴ Licorice
¹⁰ Glycyrrhizine

⁵ Flavanones

⁶ Flavanonols
¹¹ Hispa-Glabridin

٪۲۵ = ضریب محلول فهلهینگ
 ٪۷۰ = حجم اصلی
 ٪۴ = وزن نمونه

ب- روش اندازه گیری قند کل (قند بعد از هیدرولیز)
 ۵۰ میلی لیتر محلول قندی با استفاده از اسید کلریدریک غلیظ (حدود ۸ تا ۹ قطره) و به کار بردن کاغذ تورنسل خنثی شده و پس از خنثی شدن کامل ۵ میلی لیتر دیگر اسید کلریدریک به آن اضافه شد و روی بنماری در ۲۰°C به مدت ۱۰ دقیقه حرارت داده شد و بلافضله تا دمای محیط سرد شد. محلول حاصل سپس با هیدروکسید سدیم ۲ نرمال (تقریباً ۲۸ میلی لیتر) و با استفاده از کاغذ تورنسل خنثی و حجم آن به ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد و طبق آزمایش قبلی با استفاده از محلول فهلهینگ و معرف متیلن بلو ٪۱ تیتر و طبق معادله زیر درصد قند تام محاسبه گردید:

$$\text{درصد قند بعد از هیدرولیز} = \frac{(100/4) \times (100 \times 100) \times (70/100)}{(100/25)}$$

- تهییه عصاره

جهت تهییه عصاره فنلی از حلال اتانول ٪۸۰ (حجمی: حجمی) استفاده شد. سپس به منظور تهییه عصاره از مایکروویو خانگی طبق روش Mirzapour و همکاران (Mirzapour *et al.*, 2010) استفاده گردید (Mirzapour *et al.*, 2010). در این روش ۵ گرم نمونه با حلال اتانول ٪۸۰ و با نسبت نمونه به حلال (۱:۱۵) مخلوط گردید. مخلوط سپس با امواج مایکروویو در ۵ دقیقه اشعه دهی شد. عصاره های حاصله با استفاده از کاغذ صافی از مواد گیاهی جدا گردیدند و به وسیله تبخیر کننده چرخان (مدل laborata 4000 ساخت کمپانی هایدولف) در دمای ۴۰°C تغییض شدند. در نهایت عصاره ها توسط خشک کن انجام داده شد (FDB550-Operun ساخت کرده جنوبی) در دمای ۵۰°C-۱۸°C به پودر تبدیل و تا زمان استفاده در ظروف غیر قابل نفوذ به هوا در فریزر ۱۸°C- قرار گرفتند (Pan *et al.*, 2000).

- اندازه گیری ترکیبات فنولی کل

مقدار کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره ریشه شیرین بیان توسط رنگ سنگی به روش فولین- سیوکالتو' مورد بررسی قرار گرفت. در این روش مقدار کل ترکیبات

کوچکتری بربد و در آون معمولی با دمای ۴۰°C به مدت ۱ هفته خشک شدند. ریشه های خشک شده با آسیاب چکشی پودر و در کیسه های پلی اتیلن در فریزر (دمای ۱۸°C) نگهداری شدند.

- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی نمونه
 در این تحقیق اندازه گیری رطوبت، چربی، پروتئین، خاکستر بر طبق روش پروانه (۱۳۸۵) انجام شد.

- اندازه گیری قند قبل و بعد از هیدرولیز
 ۴ گرم پودر عصاره شیرین بیان را در ۵۰ میلی لیتر آب مقطر حل و به یک ارلن مایر ۲۰۰ میلی لیتری منتقل نموده، جهت تهشیش شدن رزین ها و مواد رنگی و گلیسیرین حدو ۱۲ میلی لیتر استات سرب نرمال (استات سرب اشباع) به آن اضافه و خوب هم زده شد و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده سپس به مدت ۱۵ دقیقه با ۷۰-۱۸۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. در نهایت به ۵۰ میلی لیتر از محلول صاف رویی (محلول قندی) به اندازه کافی کربنات سدیم ۲ نرمال (حدود ۱۵ میلی لیتر) اضافه شد تا سرب باقیمانده تهشیش شود، سپس حجم محلول به ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد و ۱۵ دقیقه دیگر سانتریفیوژ شد، مایع صاف رویی به یک بشر منتقل و برای تعیین قند قبل از هیدرولیز ۵۰ میلی لیتر از محلول قندی رویی به یک ارلن مایر منتقل و باقیمانده جهت اندازه گیری قند بعد از هیدرولیز نگهداری شد (Helrich, 1990).

الف- روش اندازه گیری قند قبل از هیدرولیز به شرح زیر است:

پنج میلی لیتر محلول فهلهینگ A و پنج میلی لیتر محلول فهلهینگ B به یک ارلن مایر ۲۰۰ میلی لیتری منتقل و خوب هم زده شد سپس محلول حاصل به مدت ۱۰-۱۵ ۱ ثانیه جوشانده و سپس دو قطره متیلن بلو ۱٪ اضافه شد و در حال جوشاندن با محلول قندی به سرعت تیتر شد تا جایی که رنگ متیلن بلو از بین رفته و رسوب قرمز آجری مشاهده شد (تیتراسیون باید در مدت ۳ دقیقه انجام شود) سپس از رابطه زیر قند قبل از هیدرولیز محاسبه شد (Helrich, 1990):

$$\text{درصد قند قبل از هیدرولیز} = \frac{(100/4) \times (100 \times 100) \times (70/100)}{(100/25)}$$

$$\frac{(A_c - A_s)}{A_c} \times 100 = \text{مهار رادیکال‌های آزاد DPPH (\%)}$$

که در این رابطه A_c و A_s به ترتیب جذب کنترل و جذب نمونه می‌باشند.

- قدرت احیاکنندگی^۰

تووانایی عصاره‌ها برای احیاء یون‌های آهن سه ظرفیتی با روش Yildirim و همکاران (۲۰۰۱) اندازه‌گیری شد. برای این منظور، محلول‌هایی با غلظت ۰-۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر از عصاره‌های پودر شده در حلال اتانول و نیز BHT تهیه گردید. ۱ میلی‌لیتر از محلول عصاره یا آنتیاکسیدان سنتزی با ۲/۵ میلی‌لیتر بافر فسفات (pH = ۶/۶) ۲/۵ میلی‌لیتر پتاسیم فری‌سیانید (۱۰ گرم در لیتر) مخلوط شد و به مدت نیم ساعت در حمام آب با دمای ۵۰°C قرار گرفت. پس از افزودن ۲/۵ میلی‌لیتر تری کلرو استیک اسید ۱۰٪ (وزنی: حجمی) نمونه‌ها ۱۰ دقیقه با دور ۱۶۵۰g ۱۶۵۰g سانتریفیوژ شدند پس از سانتریفیوژ. از محلول بالاتر ۲/۵ میلی‌لیتر به دقت برداشته و پس از افزودن ۲/۵ میلی‌لیتر آب مقطر، جذب نمونه‌ها در طول موج ۷۰۰ نانومتر قرائت گردید.

- تعیین مقدار گلیسیریزین عصاره‌ها با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
محلول استاندارد گلیسیریزین با خلوص ۷۵ درصد برای اندازه‌گیری میزان گلیسیریزین استفاده شد. دو نمونه ۷/۵ و ۱۱/۲۵ میکروگرمی اسید‌گلیسیریزیک در ۱۰ میلی‌لیتر فاز متحرک (متانول) حل شد و جهت رسم منحنی کالیبراسیون استفاده گردید. دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با ستون نوع C₁₈ فاز معکوس، ابعاد ۳/۹ میلی‌متر قطر و ۳۰ سانتی‌متر طول، حجم تزریق ۱۰ میکرولیتر، سرعت جریان ۱/۵ میلی‌متر در دقیقه و طول موج آشکارساز ۲۵۴ نانومتر مورد استفاده قرار گرفت محلول استاندارد و مجھول نمونه‌ها) پس از عبور از صافی یکبار مصرف با قطر منفذ ۰/۴۵ میکرومتر به دستگاه تزریق شد تا کروماتوگرام‌های مورد نظر برای هر نمونه بدست آید (Shi Ong & Mei Len,) (2003).

^۱ Folin-Ciocalteu

^۴ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

² Gallic Acid

فنولی بر اساس یک ترکیب فنولی انتخاب شده، بیان می‌گردد و در اغلب موقع این ترکیب اسید‌گالیک^۳ بوده و نتایج آن به صورت اکی‌والانت اسید‌گالیک بیان می‌گردد. پس از تهیه عصاره‌ها، ۱۰۰ میکرولیتر از عصاره در لوله آزمایش ریخته شده، سپس ۲/۸ میلی‌لیتر آب مقطر به عصاره اضافه کرده و با ۱۰۰ میکرولیتر معرف فولین-سیوکالتو (که به نسبت ۱:۱۰ با آب مقطر رقیق شده بود) و ۲ میلی‌لیتر محلول کربنات‌سدیم ۲ درصد به خوبی مخلوط شد. نمونه‌ها به مدت نیم ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس مقدار جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۷۵۰ نانومتر خوانده شد. مقدار کل ترکیبات فنولی با استفاده از معادله خط رسم شده برای اسید‌گالیک بر مبنای اسید‌گالیک و به صورت میکروگرم در گرم نمونه خشک بیان گردید (Lin & Tang, 2007). معادله خط رگرسیونی که رابطه غلظت اسید‌گالیک را با میزان جذب محلول‌ها در ۷۵۰ نانومتر نشان می‌دهد به صورت زیر می‌باشد. در این معادله Y مقدار جذب و X مقدار ترکیبات فنولی بر اساس اکی‌والانت اسید‌گالیک را نشان می‌دهد.

$$Y=0.0008X+0.0649$$

$$R^2=0.9976$$

۸

- ارزیابی میزان مهار رادیکال‌های آزاد^۳
میزان مهار رادیکال‌های دی‌پی‌پی‌اج (DPPH)^۴، با روش Shimada و همکاران (۱۹۹۲) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، محلول‌هایی با غلظت‌های ۵۰-۵۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر از تمامی عصاره‌ها و نیز آنتیاکسیدان سنتزی BHT در حلال متانول آماده شدند. روش آزمایش به این صورت بود که یک میلی‌لیتر از محلول متانولی DPPH (با غلظت ۱/۰ میلی‌مولار) به ۳ میلی‌لیتر از عصاره افزوده و مخلوط حاصله به شدت هم زده شد. لوله‌های آزمایش به مدت ۳۰ دقیقه در محل تاریک قرار گرفتند. بعد از این مدت میزان جذب در طول موج ۵۱۷ نانومتر قرائت شد. لازم به ذکر است در نمونه کنترل، عصاره با ۳ میلی‌لیتر متانول جایگزین شد. در نهایت درصد مهار رادیکال‌های DPPH توسط عصاره با فرمول زیر محاسبه گردید:

^۳ Free Radical Scavenging Activity

^۵ Reducing Power

و پروتئین نمونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین‌ها (جدول ۱) نشان داد که میزان بیشتر رطوبت در ریشه‌های جمع‌آوری شده در مهر ماه (۱۰٪) و میزان کمتر رطوبت در ریشه‌های جمع‌آوری شده در دی ماه (۳٪) به دست آمد ولی میزان بیشتر پروتئین در ریشه‌های جمع‌آوری شده در دی ماه (۶٪) و میزان کمتر پروتئین در ریشه‌های جمع‌آوری شده در مهر ماه (۸٪) به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که فصل برداشت اثر معنی‌داری بر میزان ترکیبات چربی در ریشه‌های شیرین بیان ندارد.

جدول ۱- ترکیب شیمیایی ریشه شیرین بیان (بر حسب وزن خشک) در دو فصل برداشت (مهر = T_1 و دی = T_2)

T_2	T_1	زمان برداشت	ترکیب شیمیایی	%
$۲/۵۳\pm ۰/۰۷^a$	$۲/۱۶\pm ۰/۲۱^a$		چربی	
$۳/۴\pm ۰/۴۲^b$	$۱۰\pm ۱/۴۱^a$		رطوبت	
$۷/۶۵\pm ۰/۱۴^a$	$۵/۰۸\pm ۰/۲۱^b$		خاکستر	
$۶/۶۴\pm ۰/۲۱^a$	$۵/۸۸\pm ۰/۱۴^b$		پروتئین	
$۹/۳\pm ۰/۱۴^a$	$۸/۱\pm ۰/۱۴^b$		قند قبل از هیدرولیز	
$۱۲/۴\pm ۰/۱۴^a$	$۱۱/۴\pm ۰/۱۴^b$		قند بعد از هیدرولیز	

حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

- بررسی اثر زمان برداشت بر میزان ترکیبات فنولیک ریشه شیرین بیان

در این تحقیق میزان ترکیبات فنولیک ریشه شیرین بیان به روش فولین-سیوکالتو تعیین شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد، فصل برداشت ریشه شیرین بیان تاثیر معناداری ($P<0/05$) بر مقدار ترکیبات فنولی عصاره‌ها دارد (جدول ۲). در مقایسه دو فصل، میزان ترکیبات فنولیک ریشه شیرین بیان برداشت شده در دی ماه (T_2)، $۱۸/۳$ درصد نسبت به زمان مهر ماه (T_1) افزایش یافته است.

جدول ۲- مقدار کل ترکیبات فنولی به دست آمده از ریشه شیرین بیان در دو زمان برداشت متفاوت

زمان	ترکیبات فنولی (mg GA eq/g dry sample)	برداشت
	$۴۵/۸۵۳\pm ۰/۴۸^b$	(مهر ماه) T_1
	$۵۴/۲۶۶\pm ۰/۶۴^a$	(دی ماه) T_2

حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

- ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل^۱

برای اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل عصاره‌ها از روش Prito و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد. $۰/۰$ میلی لیتر از محلول عصاره و آنتی‌اکسیدان ستری BHT با غلظت‌های مختلف ($۱۰۰-۲۰۰$ میکروگرم در میلی لیتر) با ۱ میلی لیتر از معرف (اسید سولفوریک $۰/۶$ مولار، فسفات سدیم ۲۸ میلی مولار و آمونیوم مولیبدات ۴ میلی مولار) در لوله آزمایش مخلوط شد و به مدت $۱/۵$ ساعت در حمام آب با دمای ۹۰°C قرار گرفت. پس از سرد کردن، جذب نمونه‌ها در طول موج ۶۹۵ نانومتر قرائت گردید. در نمونه شاهد به جای عصاره از $۱/۰$ میلی لیتر متابول استفاده شد. نحوه آماده سازی معرف به این صورت بود که پس از آماده سازی محلول اسید سولفوریک $۰/۶$ مولار، مقادیر محاسبه شده از فسفات سدیم و آمونیوم مولیبدات برای رسیدن به غلظت مورد نظر در یک لیتر معرف، به صورت جداگانه در اسید سولفوریک حل شدند. سپس این دو محلول با هم ادغام و مخلوط حاصله با باقی مانده اسید سولفوریک به حجم یک لیتر رسانده شد.

- تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش از روش آنالیز واریانس (ANOVA) و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ($P<0.05$) صورت گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SAS 9.1 و رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام شد. کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شدند.

یافته‌ها

- ترکیب شیمیایی عصاره ریشه شیرین بیان نتایج جدول ۱ نشان می‌دهد اثر فصل برداشت بر میزان قند قبل و بعد از هیدرولیز ریشه شیرین بیان معنی‌دار است و در فصل زمستان میزان قند قبل و بعد از هیدرولیز بیشتر می‌باشد. همچنین جدول ۱ نشان می‌دهد میزان خاکستر در ریشه‌های شیرین بیان برداشت شده در فصل زمستان بیشتر از ریشه‌های برداشت شده در فصل پاییز است. نتایج تجزیه واریانس درصد رطوبت و پروتئین نمونه‌ها (جدول ۱) نشان می‌دهد که تاریخ برداشت به طور معنی‌داری درصد رطوبت

¹ Total Antioxidant Capacity

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان

مورد بررسی قادر به رقابت با آن نبودند. همان‌طور که گفته شد در مقایسه بین مقدار ترکیبات فنولی عصاره‌های ریشه شیرین بیان (مهر و دی ماه) اختلاف معنی‌داری از این نظر بین این دو عصاره وجود داشت (جدول ۲). بنابراین می‌توان گفت فعالیت آنتیاکسیدانی با میزان ترکیبات فنولی در ارتباط است.

جدول ۳- مقایسه میانگین مقدادر EC_{50} (میلی‌گرم عصاره در میلی‌لیتر) برای عصاره‌های ریشه شیرین بیان برداشت شده در دو فصل متفاوت در روشن قدرت احیاء‌کنندگی

EC_{50}	عصاره
۰/۸۵۳ ^a	مهر ماه
۰/۷۶۳ ^b	دی ماه
۰/۰۷۳ ^c	BHT

حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است

- ظرفیت آنتیاکسیدانی کل
نتایج آنالیز واریانس نشان داد، اختلاف معنی‌داری بین ظرفیت آنتیاکسیدانی کل عصاره‌های دو فصل (مهر و دی) و آنتیاکسیدان سنتزی BHT در سطح احتمال ۵٪ وجود دارد. ظرفیت آنتیاکسیدانی کل عصاره‌های دو فصل و آنتیاکسیدان سنتزی BHT در نمودار ۲ نشان داده شده است. با افزایش غلظت عصاره‌ها ظرفیت آنتیاکسیدانی آنها به طور معنی‌داری ($P<0.05$) افزایش یافت.

- قدرت احیاء‌کنندگی


نتایج آنالیز واریانس حاکی از آن بود که عصاره‌های مختلف در ۲ فصل برداشت از نظر قدرت احیاء‌کنندگی اختلاف معنی‌داری ($P<0.05$) با یکدیگر و با BHT دارند. همچنین با افزایش غلظت میزان جذب محلول‌های حاوی عصاره به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

نمودار ۱ مقایسه میانگین میزان جذب غلظت‌های مختلف عصاره‌های ریشه شیرین بیان در دو زمان‌های برداشت مختلف (T_1 و T_2) و با BHT را نشان می‌دهد.

نتایج نشان داد در تمامی غلظت‌های مورد بررسی (۲۰۰-۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر) آنتیاکسیدان سنتزی BHT دارای بیشترین قدرت احیاء‌کنندگی است. البته در غلظت‌های پایین تفاوت معنادار بیشتری بین عصاره‌ها و BHT وجود داشت ولی در غلظت‌های بالاتر (حدود ۲ mg/ml)، این تفاوت کمتر می‌شود.


به منظور مقایسه بهتر قدرت احیاء‌کنندگی مقدادر EC_{50} برای عصاره‌های مختلف تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. در این روش، غلظتی از عصاره که در طول موج ۷۰۰ نانومتر جذبی معادل ۰/۵ دارد، تحت عنوان EC_{50} نامیده می‌شود.
۱۰

نتایج مقایسه میانگین نشان داد، اختلاف معنی‌داری بین مقدادر EC_{50} عصاره‌های مختلف در سطح احتمال ۵٪ وجود دارد (جدول ۳) با توجه به جدول، بیشترین میزان EC_{50} در این روش به ترتیب متعلق به عصاره اتانولی مهر ماه می‌باشد و آنتیاکسیدان سنتزی BHT کمترین میزان EC_{50} را به خود اختصاص داد و هیچ کدام از عصاره‌های



غلظت (میکروگرم در میلی‌لیتر)

نمودار ۱- مقایسه میانگین قدرت احیاء‌کنندگی غلظت‌های مختلف عصاره‌های ریشه شیرین بیان در ۲ فصل برداشت و BHT
حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.



نمودار ۲- مقایسه میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی غلظت‌های مختلف عصاره‌های ریشه شیرین بیان در دو فصل مختلف برداشت و BHT.
حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

در جدول نشان داده شده است (جدول ۴). طبق نتایج به دست آمده، در این روش نیز آنتی اکسیدان سنتزی BHT کمترین میزان EC₅₀ و در نتیجه ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتری را داشت و پس از آن عصاره‌های T_۱ و T_۲ در مراتب بعدی قرار گرفتند. همان‌طور که قبل ذکر شد، عصاره T_۱، حاوی کمترین مقدار ترکیبات فنولی بود و در روش‌های مختلف بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی بیشترین مقدار EC₅₀ به این عصاره تعلق داشت.

- ارزیابی مهار رادیکال‌های آزاد

نتایج آنالیز واریانس نشان داد نوع و غلظت عصاره‌ها و آنتی اکسیدان سنتزی تاثیر معنی‌داری بر میزان مهار رادیکال‌های آزاد داشتند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که توانایی عصاره‌ها در مهار رادیکال‌های آزاد وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت فعالیت ضد رادیکالی آنها افزایش می‌یابد. نمودار ۳ نشان می‌دهد که کاهش معنی‌داری (P<0.05) در غلظت رادیکال‌های DPPH به علت توانایی در مهار رادیکال‌ها توسط عصاره‌های ریشه شیرین بیان و استاندارد می‌باشد. از BHT به عنوان استاندارد استفاده شد. اثر مهار رادیکال آزاد DPPH توسط عصاره‌های ریشه شیرین بیان و استاندارد به این صورت می‌باشد BHT>T₂>T₁. با توجه به نتایج در محدوده غلظت ۴۰۰-۶۹۵ میکروگرم در میلی‌لیتر تفاوت معناداری بیان عصاره‌ها و BHT بود ولی در غلظت‌های بالاتر تفاوت معناداری در مهار رادیکال‌های آزاد بین عصاره‌ها و

همان‌طور که در شکل ۲ نیز دیده می‌شود، عصاره‌های اتانولی ریشه شیرین بیان T_۲ (دی ماه) در تمامی غلظت‌های مورد بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به عصاره‌های اتانولی ریشه شیرین بیان T_۱ (مهر ماه) داشتند و در میزان جذب عصاره‌های اتانولی در غلظت‌های بالا (حدود ۲۰۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر) تفاوت کمتری نسبت به غلظت‌های پایین مشاهده می‌شود و آنتی اکسیدان سنتزی BHT بیشترین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی را به خود اختصاص داد.


جدول ۴- مقایسه میانگین مقادیر EC₅₀ (میلی‌گرم عصاره در میلی‌لیتر) برای عصاره‌های ریشه شیرین بیان برداشت شده در دو فصل متفاوت در روش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل

عصاره	EC ₅₀	مهر ماه	دی ماه	BHT
	۰/۵۹ ^a			
	۰/۴۹۲ ^b			
	۰/۱۶۵ ^c			

حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

در این روش نیز مقادیر EC₅₀ برای عصاره‌های ریشه شیرین بیان و آنتی اکسیدان سنتزی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. منظور از EC₅₀ در این روش غلظتی (بر حسب میلی‌گرم در میلی‌لیتر) از عصاره است که در طول موج ۶۹۵ نانومتر جذبی معادل ۵/۰ دارد. نتایج نشان داد که فصل تاثیر معنی‌داری بر میزان EC₅₀ عصاره‌ها دارد. مقایسه میانگین مقادیر EC₅₀ برای عصاره‌های (T_۱ و T_۲)

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان



نمودار ۳- مقایسه میانگین درصد مهار رادیکال‌های آزاد DPPH غلظت‌های مختلف عصاره‌های T_1 و T_2 ریشه شیرین بیان و آنتیاکسیدان استریزی BHT

حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

- آنالیز عصاره‌های فنولی ریشه شیرین بیان با HPLC

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۶) نشان داد که تاریخ برداشت بر میزان گلیسیریزین اثر معنی‌داری دارد به طوری که مقدار بیشتر در دی ماه ($1/112 \pm 0.07$) درصد وزن خشک) و میزان کمتر این ماده در مهر ماه (0.886 ± 0.02) تعیین شد.

جدول ۶- مقایسه میانگین میزان گلیسیریزین در زمان‌های مختلف برداشت گیاه شیرین بیان

زمان برداشت	میزان گلیسیریزین(%)
T_1 (مهر ماه) 0.886 ± 0.02^b	
T_2 (دی ماه) $1/112 \pm 0.07^a$	

حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است

BHT وجود نداشت این نتایج نشان می‌دهد که در محدوده غلظت $100-300$ میکروگرم در میلی لیتر بیشترین میزان مهار رادیکال‌های آزاد متعلق به BHT بود اما در غلظت‌های بالا (400 میکروگرم/میلی لیتر) عصاره ریشه شیرین بیان در مهار رادیکال‌های آزاد با آنتیاکسیدان استریزی رقابت می‌کند.

برای مقایسه فعالیت ضدرادیکالی عصاره‌های T_1 و T_2 و BHT، از فاکتور EC_{50} استفاده می‌شود. همان‌طور که گفته شد EC_{50} به غلظتی از عصاره اطلاق می‌گردد که در آن 50% از رادیکال‌های آزاد DPPH موجود در محیط واکنش مهار شوند. بنابراین هر چه این غلظت کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که عصاره مورد نظر فعالیت ضدرادیکالی بیشتری دارد. در این بررسی نیز مقادیر EC_{50} برای عصاره‌های T_1 و T_2 تعیین و با آنتیاکسیدان استریزی BHT مقایسه گردید (جدول ۵) همانطور که در جدول دیده می‌شود، کمترین میزان EC_{50} متعلق به BHT بود که از این نظر اختلاف معنی‌داری ($P < 0.05$) با عصاره‌های T_2 و T_1 داشت. هر دو عصاره نسبت به آنتیاکسیدان استریزی BHT ضعیفتر بودند و بیشترین میزان EC_{50} متعلق به عصاره‌های T_1 بود.

جدول ۵- مقایسه میانگین مقادیر EC_{50} (میلی گرم عصاره در میلی لیتر) برای عصاره‌های ریشه شیرین بیان برداشت شده در دو زمان متفاوت در روش مهار رادیکال‌های آزاد DPPH

عصاره	EC_{50}
مهر ماه	0.156^a
دی ماه	0.123^b
BHT	0.0518^c

حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است

بحث
- ترکیب شیمیایی عصاره ریشه شیرین بیان
طبق استاندارد شماره ۲۳۴۳ ایران، میزان قند قبل و بعد از احیا به ترتیب باید حداقل 7 و 10 درصد باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل معنی‌دار شدن اثر فصل بر میزان قند قبل و بعد از هیدرولیز موجود در ریشه شیرین بیان این باشد که در دوره‌های مختلف رشد گیاه ترکیبات قندی تولید می‌شود که مقداری از این قند تولید شده به مصرف سوخت و ساز گیاه می‌رسد و مازاد آن در ریشه ذخیره می‌شود. در اوایل فصل رشد که سوخت و ساز گیاه زیاد است میزان قند ذخیره شده در ریشه گیاه کاهش می‌یابد و با نزدیک شدن به فصل خواب گیاه به دلیل کاهش سوخت و ساز گیاه، قند کمتری مصرف می‌شود و میزان قند ریشه افزایش می‌یابد، در فصل خواب، فعالیت‌های گیاه به شدت کاهش می‌یابد و

گیاهی ایجاد می‌کند و بنابراین میزان آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز (PAL) (آنزیم مهم در بیوسنتز ترکیبات فنولیک) را افزایش می‌دهد و در نتیجه میزان ترکیبات فنولیک افزایش پیدا می‌کند. انواع استرس‌هایی مثل اشتعه‌دهی، جراحت، کمبود مواد مغذی، فرآیند علف‌کشی، دمای پایین، حمله پشه‌ها و قارچها می‌تواند ستر PAL یا فعالیت PAL را افزایش دهند (Morello *et al.*, 2005).

معرف فولین سیوکالتو به صورت غیراختصاصی با ترکیبات فنولی واکنش می‌دهد، علاوه بر این سایر ترکیبات موجود در عصاره نظیر قندها، آمینواسیدها، ویتامین‌ها، اسیدهای آلی، آمین‌های آروماتیک و ویتامین‌ها نیز قادر به احیای این معرف می‌باشد (Mohsen & amar, 2009). بنابراین فعالیت آنتی‌اکسیدانی توسط فاکتورهای زیادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که توصیف آن به طور کامل با یک روش امکان پذیر نمی‌باشد. بنابراین استفاده از چندین آزمون جهت محاسبه فعالیت آنتی‌اکسیدانی ضروری می‌باشد. همچنین ممکن است اطلاعات گستردگی در رابطه با توانایی آنها در مهار رادیکال‌های آزاد دهد. در این تحقیق جهت ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های ریشه شیرینیان از آزمون‌های میزان مهار رادیکال‌های DPPH، قدرت احیاکنندگی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل استفاده شد.

- قدرت احیاءکنندگی

در مطالعه حاضر، قدرت احیاکنندگی عصاره‌های ریشه شیرینیان بر اساس احیا آهن ۳ ظرفیتی و تبدیل آن به آهن ۲ ظرفیتی سنجیده شد و با استاندارد BHT به عنوان عامل احیاکننده قوی مقایسه شد. حضور عوامل احیاءکننده (آنتی‌اکسیدان‌ها) منجر به احیاء کمپلکس‌های فری‌سیانید و تبدیل آنها به شکل فروس می‌گردد که بسته به ظرفیت احیاءکنندگی عصاره‌های مورد بررسی با تغییر رنگ محلول از زرد به درجات مختلفی از رنگ‌های سبز و آبی همراه است. از آنجائی که این کمپلکس در طول موج ۷۰۰ نانومتر دارای حداکثر میزان جذب می‌باشد، لذا می‌توان غلظت یون‌های آهن دو ظرفیتی را با اندازه‌گیری میزان جذب محلول تعیین نمود (Soares *et al.*, 2009).

قدرت احیاکنندگی عصاره‌ها وابسته به غلظت افزایش پیدا می‌کند. عصاره ریشه شیرینیان در فصل دی ماه که

در نتیجه قند ذخیره شده در ریشه گیاه ثابت می‌ماند، بنابراین انتظار می‌رود بیشترین میزان قند ذخیره شده در ریشه گیاه قبل از فصل خواب باشد.

میزان خاکستر طبق روش پروانه (۱۳۸۵) به دست آمد. در استاندارد شماره ۲۳۴۳ ایران و استاندارد MAFCO میزان خاکستر ریشه شیرینیان باید از ۹ درصد کمتر باشد. نتایج به دست آمده برای میزان خاکستر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۱ به دست آمد. نتایج نشان داد که اثر فصل بر میزان خاکستر ریشه شیرینیان در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار است. معنی‌دار شدن اثر فصل می‌تواند به دلیل متفاوت بودن عناصر معدنی خاک در ۲ فصل پاییز و زمستان باشد که هر چه میزان عناصر معدنی خاک بیشتر باشد، میزان خاکستر بیشتر است.

- بررسی اثر زمان برداشت بر میزان ترکیبات فنولیک ریشه شیرینیان

فنول‌ها به دلیل خاصیت مهار رادیکال‌های آزاد به واسطه گروه هیدروکسیل آنها، از متابولیت‌های مهم گیاهی محسوب می‌شوند، بنابراین میزان ترکیبات فنولیک گیاهان به طور مستقیم مربوط به خاصیت آنتی‌اکسیدانی آنها می‌باشد. مشخص است که میزان ترکیبات فنولیک در انواع مواد گیاهی تحت تاثیر فرآیند، ژنتیک، زمان برداشت و شرایط رشد متغیر است و تغییر غلظت فنولیک در ریشه شیرینیان اثر زمان برداشت، شرایط آب و هوایی را در تولید و آزادسازی این متابولیت‌ها تایید کرد. تغییر در محتوای ترکیبات فنولیک وابسته به تعادل متابولیک بین بیوسنتز و کاتابولیسم گیاهان و اختلالات محیط خارجی می‌باشد (Liu *et al.*, 2007). مطالعات قبلی نشان می‌دهد که استرس دمای پایین در میزان تولید ترکیبات فنولیک در میوه‌های هلو، گوجه فرنگی، سیب زمینی و میوه Meng *et al.*, 2009) کیوی تاثیرگذار می‌باشد. (Padda & Picha, 2008؛ Toor گیاهی محل اصلی تجمع ترکیبات فنولیک می‌باشد (Savage, 2006 &). در دماهای پایین، نفوذپذیری غشاها، سلولی و فعالیت آنزیم‌های درون سلولی تغییر می‌کند و سبب تجمع ترکیبات واسطه سمی در سلول‌ها می‌شود. این موضوع استرس فیزیولوژی را در سلول‌های

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان

پروآتوسیانیدین میباشد (Liu & Yao, 2007). در سال ۲۰۰۸، Oliveira و همکاران مقدار ترکیبات فنولی و قدرت احیاء کنندگی عصاره‌ی آبی پوسته سبز ۵ رقم مختلف گردو را بررسی کردند. نتایج نشان داد رقم‌های فرانکوت^۱، ماربوت^۲، مایته^۳، پازین^۴ و ملانایز^۵ به ترتیب حاوی بیشترین مقدار ترکیبات فنولی بود و مقادیر EC₅₀ این رقم‌ها در این عصاره‌ها به ترتیب ۰/۵، ۰/۵۱، ۰/۶۷ و ۰/۷ میلی‌گرم در میلی‌لیتر گزارش شد. در کل عصاره‌های حاوی مقادیر بیشتری از ترکیبات فنولی EC₅₀ کمتری داشتند.

- ظرفیت آنتیاکسیدانی کل

اساس کار در این روش احیاء مولیبدن ۶ ظرفیتی به مولیبدن ۵ ظرفیتی در محیط اسیدی و دمای بالا است. این واکنش با تشکیل کمپلکس‌های سبز رنگ فسفو مولیبدن همراه بوده که در طول موج ۶۹۵ نانومتر دارای حداکثر میزان جذب میباشد. عصاره‌هایی که شدت جذب بالاتری در این طول موج دارند، ظرفیت آنتیاکسیدانی بیشتری از خود نشان می‌دهند (Prito et al., 1999). در بررسی‌های انجام شده توسط Kumaran & Karunakaran در سال ۲۰۰۷، عصاره‌های مтанولی ۵ واریته گیاه *Phyllanthus* از نظر ظرفیت آنتیاکسیدانی کل با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ارتباط مشبی بین مقدار ترکیبات فنولی در واریته‌های مختلف با این ویژگی وجود داشت به طوری که واریته‌های حاوی مقادیر بیشتری از ترکیبات فنولی، ظرفیت آنتیاکسیدانی Arabshahi & Urooj بیشتری داشتند. در سال ۲۰۰۶، عصاره‌های اتانولی و استونی مقدار ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره‌های مtanولی، استونی، آبی و BHT به ترتیب ۱/۳۹۳، ۱/۳۸۶، ۱/۶۶ و ۳/۹۲۱ معادل میکرومول آلفا-کوکوفرول در گرم عصاره بود. همچنین مقدار ترکیبات فنولی به ترتیب در عصاره‌ی مtanولی < استونی > آبی بود. نتایج به دست آمده در این تحقیق از نظر وجود ارتباط بین مقدار ترکیبات فنولی عصاره‌ها با ظرفیت آنتیاکسیدانی آنها با نتایج به دست آمده توسط محققین دیگر مطابقت داشت.

شامل بیشترین مقدار ترکیبات فنولیک میباشد عامل احیاکننده قوی‌تری میباشد و از آنجایی که عصاره ریشه شیرین بیان در ماه مهر دارای ترکیب فنولی کمتری میباشد احیاکننده ضعیفتری نیز میباشد. روابط مشابه بین قدرت احیاء کنندگی و میزان ترکیبات فنولیک در مطالعات گزارش شده است اگرچه همبستگی همیشه ممکن است به صورت خطی نباشد (Yildirim et al., 2000؛ Arabshahi- & Urooj, 2007).

در سال ۲۰۰۸، Oliveira و همکاران میزان ترکیبات فنولی را در پوست سبز گردو (*Juglans regia* L.) در ۵ کشت متفاوت اندازه‌گیری کرده و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره‌ها را با روش‌های DPPH، قدرت احیاء کنندگی و بی‌رنگ شدن بتا کاروتین تعیین کردند. این محققین نشان دادند که فعالیت آنتیاکسیدانی با ۳ روش ذکر شده به صورت وابسته به غلظت تغییر پیدا می‌کند و عصاره‌های حاوی ترکیبات فنولی بیشتر، فعالیت آنتیاکسیدانی بالاتری را نشان می‌دهند. نتایج به دست آمده توسط سایر محققین وجود ارتباط بین میزان ترکیبات فنولی عصاره و قدرت احیاء کنندگی آن را تأیید می‌نماید. در سال ۲۰۰۴ Negi و همکاران با بررسی قدرت احیاء کنندگی عصاره‌های مtanولی، *Hippophae* rhamnoides کلروفرمی، اتیل استات و استونی سنجاق (Karunakaran) در غلظت‌های ۴/۸-۴/۸ میلی‌گرم در میلی‌لیتر گزارش کردند، میزان جذب عصاره‌های مختلف با افزایش غلظت آنها افزایش یافت. عصاره مtanولی در تمامی غلظت‌های مورد بررسی بیشترین میزان جذب را داشت که به بالابودن بازدهی استخراج و مقدار ترکیبات فنولی آن نسبت داده شد. فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره‌های مtanولی، اتانولی و استونی دانه‌های جو نیز با ۲ روش مهار رادیکال‌های آزاد و قدرت احیاء کنندگی مورد بررسی قرار گرفت و با اسید اسکوربیک و BHT مقایسه شد. نتایج حاکی از آن بود که در هر دو روش به ترتیب اسید اسکوربیک، BHT و عصاره استونی بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی را داشته و اختلافی بین عصاره‌های اتانولی و مtanولی مشاهده نگردید. همچنین مقایسه میزان ترکیبات فنولی عصاره‌ها نشان داد، عصاره استونی، اتانولی و مtanولی به ترتیب حاوی بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و

¹ Franquette² Marbot³ Mayette⁴ Parisienne⁵ Mellanaise

توسط Tep و همکاران در سال ۲۰۰۵، بررسی شد و مقدار EC₅₀ اسانس مورد مطالعه ۱۷/۱ mg/ml براورد شد که نشانگر فعالیت آنتی‌رادیکالی نسبتاً کم این اسانس می‌باشد. در تحقیق دیگری فعالیت آنتی‌رادیکالی اسانس و عصاره ۲۰۰ ppm Anethum graveolens L. در غلظت گذشتگی رادیکال به ترتیب ٪/۸۱/۶، ٪/۹۶/۵، ٪/۸۸/۵ و ٪/۹۳/۴ از گزارش شد. نتایج نشان داد که علت قوی‌تر بودن فعالیت آنتی‌رادیکالی عصاره بذر نسبت به اسانس آن، حضور بیشتر دو ترکیب فولیک آنتول و دیل آپیول است (Singh *et al.*, 2005).

در کل از بین عصاره‌های ریشه‌شیرین‌بیان، عصاره ریشه برداشت شده در ماه مهر عملکرد ضعیفتری در ارتباط با مهار رادیکال‌های آزاد داشت. در کل افزایش غلظت ترکیبات فنولی به طور مستقیم میزان توانایی عصاره‌های مختلف را در مهار رادیکال‌های آزاد افزایش می‌دهد. در غلظت‌های بالاتر ترکیبات فنولی به دلیل افزایش تعداد گروه‌های هیدروکسیل موجود در محیط واکنش، احتمال اهداء هیدروژن به رادیکال‌های آزاد و به دنبال آن قدرت مهارکنندگی عصاره افزایش می‌یابد (Sanchez-Moreno *et al.*, 1999).

مطالعه‌ای در مورد اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست و دانه انگور، توسط Emad در سال ۲۰۰۶ در روغن آفتابگردان انجام گرفت و نتایج نشان‌دهنده فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالاتر عصاره پوست انگور، به علت وجود ترکیبات فنولیک بیشتر در آن بود. به عبارت دیگر اثرات پرواکسیدانی در عصاره دانه انگور بیشتر دیده شد.

- آنالیز عصاره‌های فنولی ریشه‌شیرین‌بیان با HPLC

عوامل محیطی مثل خاک، آب، هوا و روش‌های کاشت در ترکیب مواد مؤثره دخالت دارند بنابراین ارزیابی یکایک آن‌ها به تنها یکی بسیار مشکل است (شریعت، ۱۹۹۲). در سال ۱۹۹۰، Fenwick و همکاران و در سال ۱۹۹۸ Hayashi و همکاران گزارش کردند که غلظت گلیسیرین در ریشه‌های شیرین‌بیان به واریته، محل و زمان برداشت وابسته است. آب موجود در خاک عامل اصلی جایه‌جایی و توزیع مواد درون خاک است و بالا بودن مقدار

- ارزیابی مهار رادیکال‌های آزاد

ارزیابی مهار رادیکال‌های DPPH، که در واقع اندازه‌گیری توانایی ترکیبات احیاء‌کننده نظیر فنول‌ها جهت انتقال اتم هیدروژن به رادیکال می‌باشد، معمول ترین روش برای محاسبه فعالیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. در این روش نتایج بر حسب درصد کاهش در میزان جذب محلول‌های DPPH در حضور عصاره نسبت به محلول DPPH فاقد عصاره بیان می‌گردد (Ferreres *et al.*, 2007). در بررسی سایر گیاهان، محققان نتایج را گزارش کردند که نتایج تحقیق حاضر با آنها همخوانی داشت. بر طبق Yanishlieva & Marianova در سال ۱۹۹۶ افزودن عصاره مرزه به روغن آفتابگردان روند اکسیداسیون را کند می‌کند. این عصاره در غلظت ۵۰۰۰ ppm بهتری نسبت به BHT در غلظت ۲۰۰ ppm دارد. در مطالعه‌ای توسط Singh و همکاران در سال ۲۰۰۵ فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره ثبت با استفاده از آزمون آون در روغن کلزا بررسی شد. اسانس و عصاره با غلظت ۲۰۰ ppm به روغن افزوده شد و تغییرات عدد پراکسید و تیوباریتوريک اسید در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۸ روز بررسی شد. ترتیب قدرت فعالیت آنتی‌اکسیدانی به این صورت بود: BHA < BHT < عصاره < اسانس. حضور ترکیبات فولیکی مانند دیل آپیول و آنتول سبب اثرات آنتی‌اکسیدانی ذکر گردید. محققین دیگری نیز توانایی عصاره‌های گیاهی مختلف را در مهار رادیکال‌های آزاد DPPH مورد بررسی قرار داده‌اند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس Thymus spathulifolius L. نیز با آزمون DPPH و بی‌رنگ شدن بتاکاروتون مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور EC₅₀ برای اسانس ۲۴۳ µg/ml بود. درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی برای اسانس ٪/۹۲ و برای BHT به عنوان کنترل مثبت، ٪/۹۶ گزارش شد. تیمول، کارواکرول و ۷-تریپین، سه ترکیب فنولیکی عمده در این اسانس، عامل اصلی در حذف ترکیبات رادیکالی بیان شدند (Atalay *et al.*, 2004) و همکاران (Kordali, 2005). Artemesia dracunculus فعالیت آنتی‌رادیکالی اسانس را در ۴ سطح غلظتی ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۱۰۰۰ µg/ml بررسی کردند که درصد فعالیت گذشتگی رادیکال به ترتیب ۴، ۱۰، ۸ و ۱۸ درصد به دست آمد. فعالیت آنتی‌رادیکالی اسانس Cyclotrichium origanifolium L.

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان

جمع آوری شده در مهر ماه ($0.5/88\%$) به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که فصل برداشت اثر معنی داری بر میزان چربی در ریشه شیرین بیان ندارد.

منابع

- امید بیگی، ر. (۱۳۸۳). تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد سوم، انتشارات آستان قدس رضوی. ۳۹۷ صفحه.
- امید بیگی، ر. (۱۳۸۴). تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول، انتشارات آستان قدس رضوی. ۲۸۰ صفحه.
- پروانه، و. (۱۳۸۵). کنترل کیفی و آزمایش های شیمیائی مواد غذایی. چاپ سوم. موسسه ای انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ۳۳۲ ص.
- شريعت، ص. (۱۳۸۲). ترجمه تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی به روش میکروسکوپی و کروماتوگرافی، اشتال، آ. انتشارات روزبهان.

Arabshahi-Delouee, S. & Urooj, A. (2007). Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (*Morus indica L.*) leaves. *Food Chemistry*, 102, 1233-1240.

Atalay, S., Medine, G. & Dimitra, D. (2004). The *in vitro* antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanole extracts of endemic *Thymus spathulifolius*. *Food Chemistry*, 15, 627-634.

Emad, S. (2006). Antioxidant effect of extracts from red grape seed and peel on lipid oxidation in oils of sunflower. *LWT*, 883-892.

Fenwick, G. R., Lutomski, J. & Nieman, C. (1990). Liquorice, composition, uses and analysis, *Food Chemistry*, 38, 119-143.

Ferreres, F., Sousa, C., Valento, P., Seabra, R. M., Pereira, J. A. & Andrade, P. B. (2007). Tronchuda cabbage (*Brassica oleracea L. var. costata DC*) seeds: phytochemical characterization and antioxidant potential. *Food Chemistry*, 101, 549-558.

Ghahraman, A. (1999). Basic Botany: Anatomy and Morphology, Vol. 1. University of Tehran Press, 539p.

Hayashi, H., Hiraoka, N., Ikeshiro, Y., Yammamoto, H. & Yoshikawa, T. (1998). Seasonal variation of glycyrrhizin and isoliquiritigenin glycosides in the root of *Glycyrrhiza glabra* L. *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 21, 9. 987-989.

Helrich, k. (1990). Official methods of analysis of the association of official analytical chemists (AOAC), 15th Edit.

رطوبت بر جذب ریشه اثر مهمی دارد زیرا میزان تحرک انتشار و نفوذ یونهای مواد غذایی را بر اثر حل شدن ترکیبات آنها بالا می برد و آنها را در حد مطلوبی برای جذب در مجاورت ریشه قرار می دهد (Ghahraman, 1999). در طی دوره دو ماهه برداشت گیاه، دی ماه دارای کمترین مقدار بارندگی بوده است؛ هم چین بر طبق نتایج حاصله از بررسی میزان رطوبت نمونه های برداشت شده از ریشه های برداشت شده در سایر ماهها بود. از آنجایی که گلیسیریزین در آب محلول می باشد. غلظت گلیسیریزین موجود در نمونه های برداشت شده در دی ماه، بالاتر از سایر ماهها بود

نتیجه گیری

اثر فصل برداشت بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ریشه شیرین بیان تاثیر معنی داری را نشان داد. از بین عصاره های ریشه شیرین بیان، عصاره ریشه برداشت شده در ماه مهر عملکرد ضعیفتری نسبت به ماه دی در ارتباط با مهار رادیکال های آزاد، قدرت احیا کنندگی و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل داشت. این نتایج نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین افزایش غلظت ترکیبات فنولی با فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره وجود دارد. همچنین اثر فصل برداشت بر میزان قند قبل و بعد از هیدرولیز ریشه شیرین بیان معنی دار بود. در اوایل فصل رشد به دلیل بالاتر بودن سوخت و ساز گیاه میزان قند ذخیره شده در گیاه کاهش می یابد به همین دلیل میزان قند در دی ماه بالاتر بود.

همچنین فصل بر میزان خاکستر ریشه شیرین بیان در سطح احتمال ۵ درصد تاثیر معنی داری داشت. معنی دار شدن اثر فصل احتمالاً می تواند به دلیل متفاوت بودن عناصر معدنی خاک در دو فصل پاییز و زمستان باشد که هر چه میزان عناصر معدنی خاک بیشتر باشد، میزان خاکستر بیشتر است. همچنین تاریخ برداشت به طور معنی داری درصد رطوبت و پروتئین نمونه ها را تحت تاثیر قرار داد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رطوبت در ریشه های جمع آوری شده در مهر ماه (10.1%) و کمترین میزان رطوبت در ریشه های جمع آوری شده در دی ماه (3.0%) در حالیکه بیشترین میزان پروتئین در ریشه های جمع آوری شده در دی ماه (16.6%) و کمترین میزان پروتئین در ریشه های

- Isbrucker, R.A. & Burdock, G. A. (2006). Risk and safety assessment on the consumption of Licorice root(*Glycyrrhiza* sp.), its extract and powder as a food ingredient, with emphasis on the pharmacology and toxicology of glycyrrhizin. *Regulatory Toxicology and pharmacology*, 46, 167-192.
- Kumaran, A. & Karunakaran, R. J. (2007). In vitro antioxidant activities of methanol extracts of five *Phyllanthus* species from India. *LWT*, 40: 344-352.
- Lin, J. Y. & Tang, C. Y. (2007). Determination of total phenolic and flavonoid contents in selected fruits and vegetables, as well as their stimulatory effects on mouse splenocyte proliferation. *Food Chemistry*, 101, 140-147.
- Liu, W., Zu, Y. G., Fu, Y. J., Kong, Y., Ma, W. & Yang, M. (2010). Variation in contents of phenolic compounds during growth and post-harvest storage of pigeon pea seedlings. *Food Chemistry*, 121, 732-739.
- Liu, Q. & Yao, H. (2007). Antioxidant activities of barley seeds extracts. *Food Chemistry*, 102, 732-737.
- Mohsen, S. M. & Ammar, A. S. M. (2009). Total phenolic contents and antioxidant activity of corn tassel extracts. *Food Chemistry*, 112, 595-598.
- Meng, X., Han, J., Wang, Q. & Tian, S. (2009). Changes in physiology and quality of peach fruit treated by methyl jasmonate under low temperature stress. *Food Chemistry*, 114, 1028-1035.
- Mirzapour, M., Hamedi, M. & Rahimipanah, M. (2010). Sunflower Oil Stabilization by Persian Walnut Leaves Extract During Oven Storage Test. *Food Science and Technology Research*, 16, 443-446.
- Mirheidar, H. (1996). Plant Education with plant employed in prevention and Disease remedy. 3, Farhang-e eslami Press, 532p.
- Morello, J. R., Romero, M. P., Ramo, T. & Motilva, M. J. (2005). Evaluation of L-phenylalanine ammonia-lyase activity and phenolic profile in olive drupe (*Olea europaea* L.) from fruit setting period to harvesting time. *Plant Science*, 168, 65-72.
- Negi, P.S., Jayaprakasha, G.K. & Jena, B.S. (2004). Antioxidant and antimutagenic activities of pomegranate peel extracts. *Food Chemistry*, 80, 393-397.
- Oliveira, I., Sousa, A., Ferreira, I. C. F. R., Bento, A., Esteveinio, L. & Pereira, J. A. (2008). Total phenols, antioxidant potential and antimicrobial activity of walnut (*Juglans regia* L.) green husks. *Food and Chemical Toxicology*, 46, 2326-2331.
- Padda, M. S. & Picha, D. H. (2008). Effect of low temperature storage on phenolic composition and antioxidant activity of sweetpotatoes. *Postharvest Biology and Technology*, 47, 176-180.
- Pan, X., Liu, H., Jia, G. & Shu, Y. (2000). Microwave-assisted extraction of glycyrrhetic acid from licorice root. *Journal of Biochemical Engineering*, 5, 173-177.
- Prieto, P., Pineda, M. & Aguilar, M. (1999). Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E. *Analytical Biochemistry*, 269, 337-341.
- Sanchez-Moreno, C., Larrauri, J. A. & Saura-Calixto, F. (1999). Free radical scavenging capacity and inhibition of lipid oxidation of wines, grape juices and related polyphenolic constituents. *Food Research International*, 32, 407-412.
- Septak, M. (1999). Comparison study of Antimicrobal effects of root and leaf pure extract of licorice and licorice powder in market. Ph.D. Thesis Pharmaceutics faculty, Ferdowsi University, Mashhad, 102p.
- Shimada, K., ujikawa, F. K., Yahara, K. & Nakamura, T. (1992). Antioxidative properties of xanthin on autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 40: 945-948.
- Shi, O. E. & Mei, L. S. (2003). Pressurized hot water extraction of berberin, baicalein and glycyrrhizin in medicinal plants. *Analytica Chemica Acta*, 482, 81-89.
- Soares, A. A., Souza, C. G. M., Daniel, F. M., Ferrari, G. P., Costa, S. M. G. & Peralta, R. M. (2009). Antioxidant activity and total phenolic content of *Agaricus brasiliensis* (*Agaricus blazei Murrill*) in two stages of maturity. *Food Chemistry*, 112, 775-781.
- Singh, G., Maurya, S. & Catalan, C. (2005). Chemical constituents antimicrobial investigations and antioxidant potentials of *Anethum graveolens* essential oil and acetone extract. *Journal of Food Science*, 70, 208-215.
- Tepe, B., Sokmen, M., Sokmen, A., Daferera, D. & Polissiou, M. (2005). Antimicrobial and antioxidative activity of the essential oils various extracts of *Cyclotrichium origanifolium* (Labill.) Manden. & Scheng. *Journal of Food Engineering*, 69, 335- 342.

اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان

- Toor, R. K. & Savage, G. P. (2006). Changes in major antioxidant components of tomatoes during post-harvest storage. *Food Chemistry*, 99, 724–727.
- Vaya, J., Belinky, P. A. & Aviram, M. (1997). Antioxidant constituents from licorice roots: isolation, structure elucidation and antioxidative capacity toward LDL oxidation. *Free Radical Biol. And medicine*, 23, 303-313.
- Yanishlieva, N. V. & Marinova, E. M. (1996). Antioxidative effectiveness of some natural antioxidants in sunflower oil. *Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A*. 203, 220-223.
- Yildirim, A., Mavi, A. & Kara, A. A. (2001). Determination of antioxidant and antimicrobial activities of *Rumex crispus* L. extracts. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49, 4083–4089.
- Yildirim, A., Mavi, A., Oktay, A. A., Algur, O. F. & Bilaloglu, V. (2000). Comparison of antioxidant and antimicrobial activity of *tilia* (*Tilia argenta* Desf. Ex. D.C.), sage (*Salvia triloba* L.) and black tea (*Camellia sinensis* L.) extracts. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48, 5030–5034.

Archive of SID