

ارزیابی و مقایسه ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ دو نمونه گیاه خرفه ایرانی متعلق به شمال (استان گیلان) و جنوب (استان فارس)

مریم افشار^{a*}, بابک غیاثی طرزی^b, مریم قراچورلو^c, علیرضا بصیری^d, حسین باخدا^e

^aدانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^bاستادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^cدانشیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^dاستادیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

^eاستادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۲/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۱/۱۹

۵۹

چکیده

مقدمه: با توجه به اثرات سلامتی بخش گیاه خرفه به دلیل داشتن اسید چرب امگا-۳ و استفاده از آن در رژیم غذایی مردم نقاط مختلف ایران و جهان، ارزیابی و مقایسه ترکیبات برگ این گیاه و معرفی آن به عنوان یک ماده غذایی ارزشمند می‌تواند نقش بسزایی در ارتقاء سلامتی انسان داشته باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ دو گیاه خرفه ایرانی متعلق به دو منطقه شمال ایران (استان گیلان) و جنوب (استان فارس) می‌باشد.

مواد و روش‌ها: گیاه خرفه متعلق به دو استان گیلان (منطقه گیلاکجان) و فارس (شهر شیراز) تهییه و پس از آماده‌سازی پودر برگ گیاه آزمون‌های شیمیایی شامل اندازه‌گیری رطوبت با استفاده از آون، اندازه گیری خاکستر توسط کوره، ارزیابی فیبر خام توسط روش هضم اسیدی-قیلایی، میزان پروتئین به روش کلدار و چربی توسط دستگاه سوکسله و همچنین تعیین پروفایل اسیدهای چرب دو نمونه خرفه با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف مجهز به آشکارساز شعله‌ای انجام شد.

یافته‌ها: راندمان استخراج روغن از برگ گیاه خرفه ۸/۴۳ درصد در خرفه شمال و ۷/۷۹ درصد در خرفه جنوب می‌باشد که دارای اختلاف معنی‌دار ($P<0.05$) بوده و ترکیب اسیدهای چرب در این دو نمونه برگ خرفه نشان‌دهنده غالب بودن الفا-لینولنیک اسید در روغن هر دو نمونه بود. میزان رطوبت در دو نمونه دارای اختلاف معنی‌دار نبود ($P>0.05$) لیکن میزان پروتئین، فیبر، خاکستر، چربی و کربوهیدرات در این دو نمونه دارای اختلاف معنی‌دار بودند ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: روغن برگ گیاه خرفه غنی از لینولنیک اسید (امگا-۳) به عنوان اسید چرب ضروری می‌باشد که با توجه به خودرو بودن و فراوانی این گیاه در سراسر کشور منبع خوب به عنوان مکمل غذایی بشمار می‌رود.

واژه‌های کلیدی: امگا-۳، ترکیبات اسیدهای چرب، ترکیب شیمیایی، روغن برگ خرفه.

مقدمه

خرفه با نام علمی *Portulaca oleracea L.* گیاهی یکساله از خانواده portulacaceae با ساقه‌های گوشدار و برگ‌های متقابل و گل‌های کوچک زرد است، این گیاه بومی ایران بوده و سابقه کشت آن به عنوان سبزی بر می‌گردد. اسناد مربوط به فوائد این گیاه به عنوان سبزی، ادویه و دارو در دوره مصر باستان وجود داشته و در متون متعلق به قرون وسطی در انگلستان از این گیاه تحت عنوان گیاهی مغذی نام برده شده است.

خرفه به صورت علف هرز در مزارع روییده و به عنوان هشتمین گیاه معمول در جهان می‌باشد، عموماً در بیشتر نقاط جهان وجود داشته و امروزه هم به صورت خودرو و هم به صورت کشت شده وجود دارد (Dweck, 2001). این گیاه در مناطق گرم و مرطوب به راحتی و با سرعت کشت شده و در سرتاسر جهان به وفور یافت می‌شود. خرفه در مناطق جنوبی کشور به عنوان یک سبزی مهم مورد کشت و کار قرار می‌گیرد و به پرپین (پر پهنه) مشهور است. این گیاه در بسیاری از کشورهای دنیا برای اهداف گوناگون از جمله تغذیه انسان و صنایع تبدیلی و دارویی کاربرد دارد. قسمتهای خوارکی خرفه، اندام‌های جوان، به ویژه برگها و ساقه‌های ترد می‌باشند که مزه ای شبیه اسفناج دارند، ولی از بسیاری جهات بر اسفناج ارجح است.

این گیاه قبل و بعد از پخت فاقد مزه تلخ بوده و دارای اسیدهای چرب امگا-3 و پروتئین بالایی است همچنین به دلیل خاصیت موسیلاژی برای ایجاد قوام در سوپ‌ها و خورش‌ها بسیار مناسب است. خرفه یک منبع غنی از آنتی‌اسیدان، ویتامین‌های آ، ب، ث، بتاکاروتون، ملاتونین و سایر اسیدهای آمینه ضروری است (Stephe, 2012). همچنین این گیاه دارای مقادیر قابل توجهی پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن می‌باشد به علاوه تاکنون هیچ نوع اثر سمی بودن در آن گزارش نشده است. این گیاه در تمام دنیا در سالادها و به عنوان سبزی کاربرد دارد. خرفه در موارد متعددی از جمله سردرد، معده‌درد، سوزش ادرار، ماستیتیس، التهاب روده کوچک، بیماری‌های زنانه و شیردهی ناکافی مادران استفاده دارویی دارد و بیشترین استفاده آن در درمان سوختگی، گوش درد، نیش حشرات، التهابات، بیماری‌های پوستی، زخم معده، اگرما و دمل به ثبت رسیده است (Agha-hosseini et al., 2009).

بیماری‌ها از خماد گیاه تازه یا عصاره آن استفاده می‌شود. از دیگر خواص شناخته شده خرفه به خواص آنتی‌بacterیال و خواص ضد قارچی آن می‌توان اشاره کرد. مطالعات اخیر نشان داده که خرفه خصوصیات تغذیه‌ای بیشتری نسبت به اکثر سبزیجات زراعی داشته به ویژه این گیاه در صد بالای آلفا لینولنیک را داراست و منبع غنی این اسید چرب نسبت به هر گیاه برگی شکل دیگری است که تا به حال بررسی شده است (Liu et al., 2000).

همچنین خرفه توسط WHO (سازمان بهداشت جهانی) تحت عنوان یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی معرفی شده و عنوان Global Panacea یا اکسیر جهانی به آن داده شده است (Lim & Quah, 2007). در سال ۱۹۸۶ Simopoulos و همکاران، خرفه را به عنوان منبع غنی و مقرن به صرفه از لحاظ اقتصادی برای مصرف انسان و حیوان معرفی کردند (Simopoulos & Salem, 1999). در سال ۱۹۸۶ Rudriguez-Garcia و همکاران تحقیق در رابطه با طبقه‌بندی چربی‌ها و کاروتونوئید‌های برگ شش گیاه وحشی خوارکی انجام دادند. در این تحقیق مشخص گردید که برگ گیاه خرفه دارای میزان قابل توجهی از اسیدهای چرب ضروری امگا-6 و امگا-3 است (Rudriguez-Garcia et al., 1999).

در سال ۲۰۰۰ Lixialiu و همکاران اسیدهای چرب و بتاکاروتون در خرفه استرالیایی را مورد بررسی قرار دادند (Liu et al., 2000)

نتایج تحقیقات بروی محتوای ترکیبات فنولیک و خاصیت آنتی‌اسیدانی برگ گیاه خرفه نشان دهنده ترکیبات فنولیک قابل توجه و خاصیت آنتی‌اسیدانی بالا در این گیاه بود (Cai et al., 2004; Souris et al., 2007; Chon et al., 2008).

در سال ۲۰۰۹ Oliveira و همکاران خصوصیات فیتوکمیکال و خاصیت آنتی‌اسیدانی برگ و ساقه گیاه خرفه را مورد بررسی قرار داده و ترکیب غالب اسید چرب این گیاه را لینولئیک اسید در هر دو بخش برگ و ساقه تشخیص دادند. همچنین اشاره نمودند که برگ‌های گیاه دارای بیشترین میزان ترکیبات فنولیک بوده و نیز خاصیت آنتی‌اسیدانی بالاتری نسبت به ساقه دارد (Oliveira et al., 2009).

در سال ۲۰۱۰ Aberoumand&Deokule تحقیقی را

شستشو در محیط خنک به دور از نور مستقیم آفتاب و تحت هوای در گردنش خشک شدند. سپس برگ‌ها از ساقه جدا و برای ارزیابی‌های مورد نظر توسط آسیاب مکانیکی به صورت پودر درآمده و پس از عبور از الک با مش ۳۱ پودر حاصله در ظروف دربسته در دمای ۴ درجه سانتی گراد تا زمان آزمون نگهداری شد. مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق از شرکت‌های مرک و سیگما آلمان تهیه شد. تعیین درصد روغن نمونه برگ گیاه خرفه بر طبق استاندارد AOAC 920.39 با استفاده از دستگاه سوکسله با استفاده از حلال هگزان به نسبت (۱۰) و دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد انجام شد.

تعیین درصد خاکستر کل نمونه برگ گیاه خرفه بر طبق استاندارد AOAC 930.05 با استفاده از کوره ۵۵۰ درجه انجام گرفت.

تعیین درصد فیبر خام نمونه برگ گیاه خرفه بر طبق استاندارد ۹۶۲.۰۹AOAC با استفاده از روش هضم اسیدی-قلیایی صورت گرفت.

تعیین درصد پروتئین نمونه برگ گیاه خرفه بر طبق استاندارد AOAC 978.04 با استفاده از روش کلال انجام گرفت.

درصد کربوهیدراتات تام پس از اندازه گیری‌های فوق و بر طبق رابطه ۱ صورت گرفت (Indrayan *et al.*, 2009; Nile *et al.*, 2009).

(رابطه ۱)

= درصد کربوهیدراتات تام
(درصد چربی + درصد رطوبت + درصد پروتئین + درصد خاکستر) - ۱۰۰

برای تعیین پروفایل اسیدهای چرب برگ خرفه استخراج روغن به روش حلال سرد انجام شد تا آسیب به اسیدهای چرب حساس به حرارت به حداقل برسد. جهت استخراج روغن از نمونه از مخلوط کلروفرم- متانول به نسبت ۲:۱ استفاده شد به این ترتیب که نمونه پودر گیاه به نسبت ۱۰ به ۱ با حلال مخلوط گردید و اختلاط به مدت ۲۴ ساعت صورت گرفت. سپس توسط سانتریفیوژ با سرعت ۳۸۰۰ rpm در ۱۵ دقیقه ذرات معلق آن حذف و توسط تبخیرکننده چرخان در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد حلال آن جداگشته و نمونه جهت بررسی ترکیب اسیدهای چرب مورد آزمون قرار گرفت. جهت تعیین ترکیب اسیدهای چرب،

در رابطه با تشخیص ارزش تغذیه ای رژیم غذایی بر پایه سبزیجات و ارتباط آن با کربوهیدراتات مورد نیاز انسان انجام دادند، در این تحقیق گیاه خرفه به عنوان منبع خوبی از کربوهیدراتات معرفی گردید (Aberoumand & Deokule, 2010).

در سال ۲۰۱۱ Besong و همکاران تحقیقی را روی اثر مکمل‌های غذایی مت Shank از خرفه خشک شده به روش انجامدادی روی افراد بالغ با کلسترول بالا انجام دادند. نتیجه این تحقیق نشان داد که افزودن مکمل غذایی حاوی برگ خرفه به رژیم غذایی بعد از ۴ هفته کلسترول بد (LDL) و کلسترول کل را پایین آورده در حالیکه باعث افزایش کلسترول خوب (HDL) شده است. همچنین در این تحقیق میزان پروتئین، خاکستر، چربی، ویتامین C و ویتامین E محاسبه شد و گیاهی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشبع معرفی گشت (Besong *et al.*, 2011).

در سال ۲۰۱۲ Xiang و همکاران تحقیقی را در مورد اثر پلی ساکاریدهای خام حاصل از خرفه روی کوفنگی ناشی از شنا بررسی کردند و نشان دادند که خرفه به صورت مکمل می‌تواند اثر ضدخستگی روی ماهیچه‌های اسکلتی داشته باشد (Xiang *et al.*, 2012).

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه دو واریته خرفه متعلق به شمال و جنوب کشور از لحاظ ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ آنها می‌باشد. با توجه به اینکه مصرف کنندگان امروزه تمایل زیادی به استفاده از مواد غذایی غنی‌تر، طبیعی و مقرن به صرفه در رژیم غذایی روزانه خود دارند بررسی و معرفی گیاه خرفه به عنوان یک مکمل غذایی ارزشمند مطلوب و ضروری است.

مواد و روش‌ها

برگ گیاه خرفه شمال از منطقه گیلانکجان (N) با آب و هوای معتدل و رطوبت بالا تهیه و برگ خرفه جنوب (S) متعلق به شیراز با آب و هوای معتدل شمالي از نوع آب و هوای ابری بوده است. شهر شیراز به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا (بیش از ۱۵۰۰ متر) از نقاط هم عرض خود مانند کازرون و بنادر ریگ و کناره بسیار خنک‌تر می‌باشد، رطوبت و بارندگی هرچند ناکافی ولی نسبت به سایر شهرهای جنوبی ایران زیادتر است. نمونه‌گیری به روش کاملاً تصادفی در تیر و مرداد ماه انجام شد و نمونه‌ها پس از

یافته‌ها

در جدول ۱ نتایج آزمونهای درصد ترکیبات موجود در برگ دو نمونه خرفه شمال و جنوب و در جدول ۲ ترکیب اسیدهای چرب مشخص گردیده است.

با توجه به جدول ۱ میزان رطوبت در نمونه‌ها دارای اختلاف معنی دار نیست ($P>0.05$) لیکن میزان پروتئین، فیبر، خاکستر، چربی، کربوهیدرات (بر پایه وزن خشک) در این دو نمونه دارای اختلاف معنی دار می‌باشد ($P<0.05$). همان طور که مشاهده می‌شود هر دو نمونه دارای مقادیر قابل توجهی اسیدهای چرب غیر اشباع بخصوص الفا-لینولنیک اسید هستند. این میزان در نمونه خرفه شمال، $44/37$ درصد و در نمونه خرفه جنوب $44/17$ درصد محاسبه شده است. میزان ناچیزی اروسیک اسید ($22:1$) در نمونه شمال دیده شد در حالیکه نمونه خرفه جنوب فاقد آن بود. در رابطه با دیگر اسیدهای چرب موجود در دو نمونه اسیدهای چرب لوریک، میریستیک، پالمیتیک، پالمیتوئیک در نمونه خرفه شمال کمتر از نمونه جنوب شناسایی شده است، نمونه خرفه شمال از نظر اسیدهای چرب استئاریک، اولئیک و لینولئیک بر نمونه جنوب برتری دارد.

آماده‌سازی نمونه بصورت مشتق متیل استر بر اساس استاندارد AOAC به شماره ۹۶۹/۳۳ صورت گرفت و سپس از دستگاه گاز کروماتوگراف Agilent مدل Acme6100 مجهز به آشکار ساز شعله‌ای (FID) و ستون مولین ۱۰۰ متری cp sill 88 مطابق استاندارد AOCS به شماره Cele-۹۱ استفاده شد به طوریکه درجه حرارت محل تزریق، محل ستون و دنکتور به ترتیب ۲۴۰ ، ۱۹۸ و ۲۸۰ درجه سانتی‌گراد بود و سرعت جریان گاز حامل (نیتروژن) ۱۴ میلی‌لیتر بر دقیقه و مقدار تزریق نمونه ۱ مایکرولیتر بوده است، این آزمون در دو تکرار انجام شد (Liu et al., 2000; ۱۳۸۵).

- تجزیه و تحلیل آماری

در این بخش برای بررسی اختلاف معنی دار بین نمونه‌ها از آزمون‌های one-way ANOVA و مقایسه چند دامنه دانکن استفاده گردید. نرم‌افزار مورد استفاده در این تحقیق SPSS.19 بوده است. برای رسم نمودارها از نرم‌افزار EXCEL استفاده شد.

۶۲

جدول ۱ - ترکیبات شیمیایی دو نمونه خرفه شمال و جنوب

S	N	آزمون
$۹۲/۴۴\pm ۰/۳۳^a$	$۹۲/۸۷\pm ۰/۳۷^a$	رطوبت (%)
$۱۸/۴۹\pm ۰/۰۶^a$	$۱۸/۰۳\pm ۰/۰۸^b$	پروتئین (%)
$۱۲/۰۲\pm ۰/۰۰^a$	$۱۲/۰۰\pm ۰/۰۰^b$	فیبر (%)
$۲۴/۲۶\pm ۰/۱۱^a$	$۲۳/۵\pm ۰/۱۹^b$	خاکستر (%)
$۷/۷۹\pm ۰/۱۴^a$	$۸/۳۳\pm ۰/۰۷^b$	چربی (%)
$۳۰/۶۰\pm ۰/۰۹^a$	$۳۱/۳۰\pm ۰/۲۵^b$	کربوهیدرات (%)

اعداد جدول میانگین سه تکرار \pm انحراف معيار هستند. سطرهایی که با حروف مختلف شناس داده شده اند، بر اساس آزمون دانکن در سطح (<0.05) (P) با یکدیگر اختلاف معنی دارند. درصدهای محاسبه شده بر اساس وزن خشک می‌باشد.

جدول ۲ - ترکیب اسیدهای چرب دو نمونه خرفه شمال و جنوب

نمونه N (%)	نمونه S (%)	اسید چرب
۱/۰۲	۱/۹۸	۱۲:۰C
۱/۵۱	۲/۸۰	۱۴:۰C
۰/۳۲	-	۱۵:۰C
۲۳/۷۵	۳۰/۹۳	۱۶:۰C
۳/۸۷	۵/۲۶	۱۶:۱C
۳/۳۵	۲/۶۲	۱۸:۰C
۴/۸۲	۴/۰۴	۱۸:۱C
۱۴/۲۳	۹/۴۳	۱۸:۲C
۴۴/۱۷	۴۳/۳۹	۱۸:۳C
۲/۹۰	-	۲۲:۱C

بحث

برخی بیشتر گزارش شده (Liu *et al.*, 2000). همچنین ثابت شده است که میزان اسیدهای چرب گیاه با تغییر واریته و شرایط کشت تغییر می‌کند و کاملا مشابه نیست (Simopoulos *et al.*, 1992).

گیاه خرفه بیشترین میزان اسید چرب امگا-۳ را در بین گیاهان برگدار خشکی داراست، از فوائد ارزشمند اسید چرب امگا-۳ می‌توان به اثرات مثبت بر روی شریان‌ها و کاهش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی، بهبود فعالیت مغز، خاصیت ضد تورم و التهاب، سلامت مفاصل، تنظیم دستگاه ایمنی، دستگاه گردش خون، انعقاد خون، درمان امراضی چون آسم، سرطان، بیماری‌های قلبی، بالا بودن فشار خون، بالا بودن چربی خون، پوکی استخوان، آرتروز، افسردگی و ناراحتی‌های روحی و روانی اشاره نمود (Franzen- Castel & Ritter-Gooder, 2010). مقدار قابل توجه اسید پالmitik و بالا بودن آن در منطقه جنوب نسبت به شمال به بیوستتر تری‌آسیل گلیسرول در اقلیم گرم و خشک بر می‌گردد (Piravi-vanak *et al.*, 2012). به دلیل نسبت بالای اسیدهای چرب غیر اشباع در برگ این گیاه، خرفه یکی از منابع غذایی توصیه شده و ارزشمند در برنامه غذایی انسان معرفی شده و با توجه به شرایط آسان و کم هزینه رشد و خودرو بودن در بسیاری از نقاط ایران، همچنین دارا بودن طعم خاص و مطلوب و بافت منحصر به فرد این گیاه، انجام تحقیقات بیشتر بر روی ترکیبات این گیاه پیشنهاد می‌گردد.

نتیجه‌گیری

نتایج کلی در رابطه با ترکیبات شیمیایی دو نمونه خرفه شمال و جنوب وجود تفاوت معنی‌دار در میزان پروتئین، کربوهیدرات، خاکستر، فیبر خام و چربی را نشان می‌دهد ($P<0.05$). همچنین پروفایل اسیدهای چرب متعلق به این دو نمونه دارای تفاوت می‌باشد که نشان می‌دهد شرایط آب و هوایی، کشت و محیط جغرافیایی و گونه تاثیر بسزایی بر روی ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه می‌گذارد، همچنین بررسی پروفایل اسیدهای چرب هر دو گونه نشان دهنده وجود میزان قابل توجهی اسید چرب امگا-۳ در برگ این گیاه است. با توجه به تحقیقات صورت گرفته وجود اسید چرب ضروری امگا-۳ و تعادل بین این اسید چرب و اسید چرب امگا-۶ در رژیم غذایی بر روی جلوگیری از

با توجه به این موضوع که دو نمونه خرفه شمال و جنوب از لحاظ ترکیبات شیمیایی به جز رطوبت دارای اختلاف معنی‌داری هستند ($P<0.05$) می‌توان استنباط کرد که رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم، تحت تأثیر عواملی از جمله گونه، اقلیم، منطقه، محیط خاک، ارتفاع از سطح دریا، رطوبت، نور، عناصر غذایی و موقعیت جغرافیایی قرار دارد (مظاہری و همکاران، ۱۳۸۵). دو نمونه مورد استفاده در این آزمون از لحاظ رطوبت دارای مقادیر متفاوت نبودند ($P>0.05$). دلیل این مورد می‌تواند به عوامل ذکر شده برگردد، که در واقع شبهات‌هایی از این دست منجر به رطوبت مشابه در این دو نمونه شده است. بررسی خصوصیاتی از جمله خاکستر، پروتئین، چربی، فیبر و کربوهیدرات در این دو نمونه تفاوت معنی‌داری را بین دو نمونه نشان داد، که این موضوع با یافته‌های Ezekwe و همکاران (۱۹۹۹) در مقایسه برگ چند گیاه خرفه متعلق به مناطق مختلف مطابقت داشت که در تحقیق خود نشان دادند که خرفه‌های متعلق به مناطق جغرافیایی مختلف از لحاظ مقایسه پروتئین، کربوهیدرات و چربی دارای اختلاف معنی‌دار هستند. مقدار پروتئین در دو نمونه این تحقیق از نتایج بدست آمده توسط Ezekwe و همکاران (۱۹۹۹) کمتر بود، دلیل آن به مراحل رشد گیاه بر می‌گردد زیرا خرفه مورد بررسی توسط Ezekwe و همکاران (۱۹۹۹) در ماه‌های فروردین و اردیبهشت برداشت و مورد آزمون قرار گرفت و بر طبق نتایج طباطبایی و همکاران (۱۳۸۴) با افزایش رشد گیاه و ورود آن به مراحل گلدهی از میزان پروتئین آن کم می‌شود پس می‌توان نتیجه گرفت که خرفه‌های مورد بررسی این تحقیق که در ماه‌های تیر و مرداد برداشت شدند دارای پروتئین کمتری در برگ خود باشند. خاکستر بدست آمده از هر دو خرفه نشان می‌دهد که میزان خاکستر با نتایج Ezekwe و همکاران (۱۹۹۹) مطابقت داشته است. بالا بودن میزان خاکستر در برگ این گیاه به دلیل نیاز گیاه به نگهداری آب در بافت‌های آن بر می‌گردد (Mohemad et al., 1994) و همچنین نشان‌دهنده این است که این گیاه به صورت غیرعادی حاوی املاح می‌باشد. بررسی پروفایل اسیدهای چرب غالب بودن اسید چرب امگا-۳ را در تمامی تحقیقات نشان می‌دهد، هر چند این میزان در برخی تحقیقات کمتر (اسدی و همکاران، ۱۳۸۵) و در

تأثیر اینولین و گالاکتوالیگوساکاریدها بر سس کچاپ پری بیوتیک

Franzen-Castel, L. D. & Ritter-Gooder, P. (2010). Omega-3 and Omega-6 fatty acids. Extention of University of Nebrasca-Lincoln, Institute of Agriculturale and Natural Resources.

Indrayan, A. K., Agrawal, P., Rathi, A., Shatru, A., Agrawal, N. & Tyagi, D. (2009). Nutritive value of some indigenous plant rhizomes resembling Ginger, Natural Product Radiance, 8(5):507-513.

Oliveira, I., Valentao, P., Lopes, R. & Bento, A. (2009). Phytochemical characterization and radical scavenging activity of Portulacaoleraceae L. leaves and stems. Microchemical Journal, 92: 129–134.

Lim, Y. Y. & Quah, E. P. L. (2007). Antioxidant properties of different cultivars of Portulacaoleracea. Food Chemistry, 103, 734–740.

Liu, L., Howe, P. & Hocart, C. (2000). Fatty acids and B-carotene in Australian purslane varieties. Journal of Chromatography A, 893, 207-213.

Mohamed, A. & Hussein, A. (1994). Chemical composition of Purslane, Plant Foods of Human Nutrition, 45, 1-9.

Nile, Sh. & Khobragade, C. N. N. (2009). Determination of Nutritive Value and Mineral Elements of some Important Medicinal Plants from Western Part of India. Journal of medical plants, 8(5):79-87.

Piravi-vanak, Z., Ghasemi, J. B., Ghavami, M., Ezzatpanah, H. & Zolfonoun, E. (2012). The Influence of Growing Region on Fatty Acids and Sterol Composition of Iranian Olive Oils by Unsupervised Clustering Methods, 89(3):371-378

Rodriguez-Garcia, I. & Guil-Guerrero, J. (1999). Lipids classes, fatty acids and carotenoids of the leaves of six edible wild plants. Eur Food Res Technol., 209, 313–316.

Simopoulos, A. P. & Salem, N. J. (1986). Purslane a tresstrial source of omega-3 fatty acids. N. Engl j. Med.315.833.

Simopoulos, A. P., Norman, H. A., Gillaspy, J. E. & Duke, J. A. (1992). Common Purslane: a source of omega-3 fatty acids and antioxidants. N. Engl. J. Med. 217-224

Souri, E., Gholamreza, A. & Farsam, H. (2008). Screening of Thirteen Medicinal Plant Extracts for Antioxidant Activity. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 7(2), 149-15.

Xiang, C., Xiaowei, Z., Xiaojuan, L., Yong. H., Guohai, Z., Xueqi, G., Jin, Q., Yuexian, P. & Yongping, Y. (2012). Effects of Crude Polysaccharides on Fatigue induced by forced Swimming. African Journal of Biotechnology, 11(4), 923-929.

بیماری‌های قلبی و عروقی، انواع سرطان و افزایش طول عمر اثرگذار است، به همین دلیل گیاه خرفه از گیاهان موثر بر روی سلامت انسان است. همچنین این گیاه منبع خوبی از فیبر، چربی، پروتئین و کربوهیدرات می باشد و به عنوان منبع خوبی از مواد مغذی می تواند نقش قابل توجهی در رژیم غذایی انسان و همچنین دام ایفا نماید.

منابع

- اسدی، ح.، حسندخت، م. و دشتی، ف. (۱۳۸۵). مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، اگزالیک اسید و عناصر معدنی بذر و برگ ارقام خرفه ایرانی با نمونه خارجی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، دوره ۳، شماره ۳، ۵۳-۴۹.
- طباطبایی، م.، حجت، ح.، زابلی، خ.، عربی، ح.، ساکی، ع. و هژبری، ف. (۱۳۸۴). اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی یونجه همدانی در چین دوم، نشریه پژوهش و سازندگی، شماره ۶۳-۶۲.
- مظاہری، د.، حسینی، ن. و چائی چی، م. (۱۳۸۵). اثر ارتفاع بر روغن اسانس و ترکیبات گیاه دارویی آویشن وحشی منطقه طالقان. نشریه پژوهش و سازندگی، شماره ۷۳، ۱۱-۳.

Aberoumand, A. & Deokule, S. S. (2008). Comparison of Phenolic Compounds of Some Edible Plants of Iran and India. Pakistan Journal of Nutrition, 7 (4): 582-585.

Agha-Hosseini, F., BorhanMojabi, K. & Monsef-Esfehani, H. R. (2010). Efficacy of Purslane in the treatment of Oral Lichen Planus. Phytotherapy Research, 240-244.

Besong, S. &Ezekwe, M. (2011). Evaluating the effect of freeze dried suppliments of purslane on blood lipids in hypercholesterolemic adults. International Journal of Nutrition & Metabolism, 3(4), 43-49.

Cai, Y., Luo, O., Sun. M. & Corke, H. (2004). Antioxidant activity & phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. *Life Sci.*, 74: 2157–2184.

Chon, S. U., Heo, B. G., Park, Y. S. & Cho J. K. (2008). Charactristics of the leaf parts of some traditional Korean salad plants used for food. *J Sci Food Agric.*, 88:1963–1968

Dweck, A. (2001). Purslane – The global panacea. Personal care magazine, 2(4):7-15.

Ezekwe, M. O., Omara-Alwala, T. R. & Membrahtu, T. (1999). Nutritive characterization of purslane accessions as influenced by planting date. *Plant Foods Hum. Nutr.*, 54: 183-191.