

بررسی مقایسه ای بیان مارکرهای bcl2 و CD105 در کیست رادیکولار، کیست دنتی ژروس، کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و آملوبلاستوما به روش ایمونوهیستوشیمی

آزاده غلامی^۱، وحیده معتمدالصنایع^{۲*}، علی بیژنی^۳

^۱ مربی و متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۲ استادیار و متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۳ پزشک عمومی و مشاور آمار، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
^۴ نویسنده مسئول: بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دانشکده دندانپزشکی
 پست الکترونیک: Motamedv871@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای بیان ایمونوهیستوشیمیایی bcl2 و CD105 در کیست رادیکولار، کیست دنتی ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما می باشد.

مواد و روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی است. تعداد ۵۰ نمونه وارد مطالعه شدند. درصد سلول های رنگ گرفته با آنتی بادی bcl2 در درشتمایی ۴۰ در ۱۵ کیست رادیکولار، ۱۵ کیست دنتی ژروس، ۱۵ ادنتوژنیک کراتوسیست و ۵ آملوبلاستوما ارزیابی شدند و برای بررسی آنژیوژنز متوسط رگ- های مثبت شده با CD105 در درشتمایی ۴۰ شمارش شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون Paired t-test Repeated Measures ANOVA، برای مقایسه متغیر های کمی در گروه های مختلف و ضریب همبستگی پیرسون جهت رابطه های دو به دو بین متغیر های کمی به کار برده شد و $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: بیان bcl2 در آملوبلاستوما (۷۸) و OKC (۷۱/۱۳) بیشتر از RC (۴۸) و DC (۴۵) بود ولی تفاوت معنی داری بین OKC و آملوبلاستوما دیده نشد ($P > 0.05$). درصد رگ های CD105 مثبت در کیست رادیکولار (۱۸/۶۰) بیشترین مقدار بود و بعد از آن به ترتیب در کیست دنتی ژروس (۱۰/۶۰)، OKC (۷/۶۷) و آملوبلاستوما (۷) کاهش یافت. تفاوت CD105 فقط بین OKC و آملوبلاستوما معنی دار نبود ($P > 0.05$).

نتیجه گیری: رفتار نهاجمی تر OKC و آملوبلاستوما می تواند با بیان بالاتر bcl2 در این ضایعات توجیه شود اگر چه به نظر می رسد که آنژیوژنز در این خصوصیت نقشی نداشته باشد.

واژه های کلیدی: کیست رادیکولار، کیست دنتی ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست، آملوبلاستوما، bcl2 و CD105، ایمونوهیستوشیمی

وصول: ۹۴/۲/۱۳

اصلاح: ۹۴/۸/۴

پذیرش: ۹۴/۸/۲۶

مقدمه

کیستهای ادنتوژنیک فک یک دسته از ضایعات تخریبی استخوان هستند که از اپیتلیوم ادنتوژنیک، اپیتلیوم کاهش یافته مینایی، بقایای اپیتلیالی مالاسز، بقایای دنتال لامینا و لایه بازال اپیتلیوم دهانی منشا می گیرند. کیستهای ادنتوژنیک گروه وسیعی از ضایعات با رفتارهای بیولوژیک متفاوت از ملایم تا مهاجم هستند [۲،۱].

کیست رادیکولار (Radicular cyst) یک کیست ادنتوژنیک التهابی است که از بقایای اپیتلیالی مالاسز ایجاد می شود [۴،۳]. شایع ترین کیست ادنتوژنیک تکاملی کیست دنتی ژروس (Dentigerous cyst) است که از تجمع مایع بین اپیتلیوم مینایی کاهش یافته و تاج دندان ایجاد می شود [۵].

ادنتوژنیک کراتوسیست (Odontogenic keratocyst) کیستی تکاملی است که دارای رفتار تهاجمی و میزان عود بالا می باشد [۹-۶]. WHO در سال ۲۰۰۵ نام ادنتوژنیک کراتوسیستیک تومور را برای این ضایعه انتخاب کرد [۱۰]. کیست رادیکولار، دنتی ژروس و ادنتوژنیک کراتوسیست هر یک دارای الگوی رشد و رفتار بالینی خاص خود هستند. آملوبلاستوما شایع ترین تومور ادنتوژنیک اپیتلیالی است که دارای رشد آهسته و موضعا مهاجم می باشد [۱۱]. تغییرات در استروما مانند نئوواسکولاریزاسیون نقش مهمی را در گسترش تومور بازی می کند [۱۲]. خونرسانی فراوان نقش مهمی را در بسیاری از بیماریها بازی می کند [۱۳].

CD105 (cluster of differentiation) یا اندوگلین به عنوان مارکری برای آنژیوژنز شناخته شده است که نقش مهمی در آنژیوژنز و فیبروز تومور دارد [۱۴،۱۵]. از آنجایی که CD105 در رگهای تازه ایجاد شده فراوان بیان می شود، در مقایسه با سایر مارکرهای اندوتلیالی مارکر دقیق تری برای مشخص کردن رگهای تازه تشکیل شده است [۱۶،۱۷]. آپوپتوز که مرگ برنامه ریزی شده سلول است در تمام موجودات پرسلولی یک مکانیسم اساسی است. خانواده Bcl2 دارای پروتئینهای آپوپتوتیک و آنتی آپوپتوتیک می باشد. Bcl2 از اعضای آنتی آپوپتوتیک می باشد که در بسیاری از تومورها و بیماریها به مقدار بیشتری بیان می شود [۱۸،۱۹]. هایپوکسی نیز می تواند

آپوپتوز را در سلولهای اندوتلیال رگها از طریق مسیر P38 MAPK القا کند. با توجه به اینکه آنژیوژنز و آپوپتوز دو عامل مهم در رفتار تهاجمی ضایعات پاتولوژیک هستند بررسی مارکرهای اندوگلین و Bcl2 دخیل در این دو مکانیسم میتواند تا حدی پیش بینی کننده رفتار تهاجمی ضایعاتی مثل آملوبلاستوما و OKC باشند. با توجه به مشکلات تشخیصی در کیستها و تومورهای ادنتوژنیک یافتن روش مناسب جهت تشخیص قطعی این ضایعات ضروری است، روش ایمونوهیستوشیمی با استفاده از مارکرهای ملکولی می تواند برای پیش بینی رفتار ضایعات و انتخاب روش مناسب درمان به کار رود. رنگیانی^۱ و همکارانش در سال ۲۰۰۹ بیان بالای bcl2 را در لایه بازال کیستهای ادنتوژنیک کراتینیزه یافتند. با توجه به این یافته آنها پیشنهاد کردند که نسبت bcl2 به bax در لایه های بازال و سوپرابازال می تواند توجیه کننده رفتار نئوپلاستیک و درصد عود بالای OKC باشد [۲۰]. گدبیل^۲ در سال ۲۰۱۱ آنژیوژنز را با روش هیستومورفومتريک در آملوبلاستوما، OKC، دنتی ژروس و مخاط نرمال دهان ارزیابی کردند و دریافتند که نسبت رگهای که CD105 را بیان کردند به رگهایی که بیان نکرده اند در آملوبلاستوما دارای بیشترین مقدار بود و به ترتیب در OKC، مخاط نرمال و دنتی ژروس کاهش یافت [۲۱]. هدف این مطالعه اندازه گیری و مقایسه bcl2 و CD105 در آملوبلاستوما، OKC، کیست دنتی ژروس و کیست رادیکولار می باشد.

روش کار

انتخاب نمونه: این مطالعه مقطعی به استناد مقالات مشابه [۲۰] روی ۴۵ نمونه بافتی شامل ۱۵ ادنتوژنیک کراتوسیست کراتینیزه، ۱۵ کیست دنتی ژروس، ۱۵ کیست رادیکولار انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی از آرشیو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ تهیه شدند. نمونه ها بطور جداگانه توسط دو پاتولوژیست بررسی شدند. برای تایید تشخیص و ورود نمونه ها به مطالعه، برشهای ۵ میکرونی تهیه شده و با روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی

1-Rangiani

2- Gadbaill

شدند. بعد از تایید تشخیص نمونه های با بافت کافی انتخاب شدند. ایمونوهیستوشیمی: برشهای پارافینی با ضخامت ۴ میکرونی تهیه شدند و پارافین زدایی و آبگیری انجام شد. برای باز یافت آنتی ژن، برشها ۱۵ دقیقه در میکروبیو حرارت داده شدند و برای متوقف کردن فعالیت پراکسید داخلی اسلایدها در آب اکسیژنه ۳٪ بمدت ۳۰ دقیقه انکوبه شدند [۱۹]. آنتی بادی CD105 (آنتی بادی مونوکلونال موش با رقت ۱/۵۰) و bcl2 (آنتی بادی مونوکلونال موش با رقت ۱/۵۰) به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق به کار برده شدند. برشها با PBS شسته شدند و با DAB واکنش دادند. قطعات کبد برای CD105 و لنف نود هایپرپلاستیک برای bcl2 بعنوان کنترل مثبت انتخاب شدند و برای کنترل منفی آنتی بادی اولیه حذف شد. در نهایت برش ها با هماتوکسیلین مایر آماده شدند و توسط دو پاتولوژیست بطور جداگانه ارزیابی شدند [۱۹، ۲۲].

فیلد ۱ میلیمتر مربع بررسی شدند. برای CD105 تعداد سلولهای رنگ شده در ۱۰ فیلد میکروسکوپی که بیشترین شدت رنگ پذیری را در مقایسه با بقیه مساحت لام داشتند با درشتنمایی ۴۰۰ شمرده و بصورت درصد بیان شدند. تمام نمونه ها شمارش شدند. تعداد رگهای کوچک (Mean vascular count) با شمارش تعداد رگهای رنگ گرفته در این نواحی در درشتنمایی ۱۰۰ شمرده شدند. اطلاعات بوسیله نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه مقایسه ای با تحلیل آماری Mann-whitney T-test برای دو نمونه مستقل انجام شد و $Pvalue < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

بیان Bcl2 بطور معنی داری در اپیتلیوم OKC بالاتر از کیست رادیکولار و دنتی ژروس بود ($P < 0.05$). آملوبلاستوما نیز bcl2 را بمقدار بیشتری از کیست رادیکولار و دنتی ژروس بیان کردند ($P < 0.05$). در حالیکه تفاوت معنی داری بین آملوبلاستوما و OKC مشاهده نشد. کیست رادیکولار و دنتی ژروس نیز تفاوت معنی داری نداشتند. اطلاعات در جدول ۱ نشان داده شده است. در رابطه با آنژیوژنز بیان CD105 در کیست رادیکولار بیشترین مقدار بود و به ترتیب در کیست دنتی ژروس،

جدول ۱: ارزیابی مقایسه ای بیان مارکر Bcl2 در RC و DC و OKC و آملوبلاستوما

Marker	specimen	specimen	Mean difference	P value
Bcl2	RC	DC	۳/۰۰۰	$P < 0.001$
		OKC	-۲۳/۱۳۳	$P < 0.000$
DC	OKC	Ameloblstoma	-۳۰/۰۰۰	$P < 0.000$
		Ameloblastoma	-۲۶/۱۳۳	$P < 0.000$
	Ameloblastoma	OKC	-۳۳/۰۰۰	$P < 0.000$
		Ameloblastoma	-۶/۸۶۷	$P < 0.295$

جدول ۲: ارزیابی مقایسه ای بیان مارکر CD105 در RC و DC و OKC و آملوبلاستوما

Marker	Specimen	specimen	Mean difference	P value
CD105	RC	DC	۸/۰۰۰	$P < 0.000$
		OKC	۱۰/۹۳۳	$P < 0.000$
		Ameloblstoma	۱۱/۶۰۰	$P < 0.000$
	DC	OKC	۲/۹۳۳	$P < 0.000$
		Ameloblastoma	۳/۶۰۰	$P < 0.001$
		Ameloblastoma	۰/۶۶۷	$P < 0.888$

متفاوت bcl2 به bax در لایه های بازال و سوپرابازال توجیه شود [۲۰]. مطالعه ما نیز این نتایج را تایید کرد. نتایج مطالعه حاضر مانند یافته های سلوک^۳ و همکارانش در سال ۲۰۱۲ می باشد [۲۴]. آنها بیان bax، bcl2 و Ki67 را در کیست ادنتوژنیک کراتینیزه با آملوبلاستوما و کیست رادیکولار مقایسه کردند. آنها بیان کم bcl2 را در پوشش اپیتلیالی کیست رادیکولار گزارش کردند در حالیکه bcl2 در تمام ضخامت اپیتلیوم OKC و بطور عمده در سلولهای لایه محیطی جزایر آملوبلاستوما به مقدار بالا بیان شد. بیان بالاتر bcl2 همچنین در سلولهای استروما OKC و آملوبلاستوما در مقایسه با کیست رادیکولار گزارش شد. این واقعیت می تواند به الگوی رشد تهاجمی تر OKC و آملوبلاستوما منجر شود. در مطالعه حاضر درصد رگهای رنگ شده با CD105 در کیست رادیکولار بیشترین مقدار و به ترتیب در کیست دنتی ژروس، OKC و کیست رادیکولار کمتر بود. گدبیل به نتایجی متفاوت با این مطالعه رسیدند و بیان بالاتر CD105 را در آملوبلاستوما و بعد از آن بترتیب در OKC، مخاط نرمال و کیست دنتی ژروس گزارش کردند [۲۱]. این تفاوت می تواند بدلیل تفاوت های تکنیکی یا تفاوت هایی در تعداد نمونه ها باشد. سانتوس^۴ و همکاران در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که MCV در کیست رادیکولار دارای بیشترین مقدار است و به ترتیب در کیست دنتی ژروس و OKC کاهش می یابد. البته این تفاوت معنی دار نبود [۲۵]. این نتایج مطابق نتایج مطالعه حاضر می باشد. در مطالعه ما بیان CD105 در کیست رادیکولار و دنتی ژروس میتواند بدلیل التهاب نمونه باشد. اگر چه PCR تکنیک جدیدی است اما دارای هزینه بالا و هدر رفتن زمان و بافت و خطاهای تکنیکی زیاد می باشد. بنابراین ایمونوهیستوشیمی با هزینه کمتر می تواند جایگزین این روش باشد.

نتیجه گیری

عود و رفتار تهاجمی OKC می تواند توسط bcl2 توجیه شود در حالی که چنین نقشی احتمالا برای CD105 وجود ندارد.

OKC و آملوبلاستوما کاهش یافت. ANOVA و T-test تفاوت معنی داری در MVC (Mean vascular count) بین گروهها بجز آملوبلاستوما و OKC نشان داد. اطلاعات در جدول ۲ نشان داده شده است. در نتیجه CD105 مارکر مناسبی جهت پیش بینی رفتار ضایعات و در مان مناسب می باشد ولی bcl2 با توجه به نتایج این مطالعه مارکر قابل اطمینانی جهت تشخیص نیست.

بحث

در مطالعات مختلف، فعالیت تکثیری در اپیتلیوم کیست ادنتوژنیک کراتینیزه با سایر کیستهای ادنتوژنیک مقایسه شده است. نتایج ایمونوهیستوشیمی در این مطالعه نیز تفاوت های معنی داری را بین کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و سایر کیستها نشان داد. تمام موارد کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و آملوبلاستوما در بیشتر از ۵۰٪ سلولها bcl2 را بیان کردند در حالیکه در کیست رادیکولار و دنتی ژروس کمتر از ۵۰٪ سلولها را بروز دادند. به نظر می رسد که این نتایج توجیه کننده رفتار تهاجمی تر کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و میزان عود بیشتر این کیست باشد. این مطالعه بیان بیشتر bcl2 را در کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و آملوبلاستوما در مقایسه با کیست رادیکولار و دنتی ژروس نشان دادند. این نتایج مطابق یافته های مطالعه پیاتلی^۱ و همکارانش در سال ۱۹۹۸ می باشد. آنها گزارش کردند که بیان bcl2 در لایه بازال اپیتلیوم نمونه های کیست ادنتوژنیک کراتینیزه بمقدار بالا بیان می شود در حالیکه کیست دنتی ژروس و رادیکولار bcl2 را بیان نکردند [۲۲].

کیچی^۲ و همکاران در سال ۲۰۰۵ بیان bcl2 را در اپیتلیوم کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و دنتی ژروس بررسی کردند تا دریابند چرا کیست ادنتوژنیک کراتینیزه تشکیل تومور نمی دهد؟ بیان bcl2 در لایه بازال تمام کیستهای ادنتوژنیک کراتینیزه مشاهده شد [۲۳].

رنگیانی و همکارانش در سال ۲۰۰۹ بیان بالای bcl2 را در لایه بازال کیست ادنتوژنیک کراتینیزه گزارش کردند و پیشنهاد نمودند که میزان عود بالا و رفتار نئوپلاستیک کیست ادنتوژنیک کراتینیزه می تواند توسط نسبتهای

تشکر و قدردانی

این تحقیق مربوط به پایان نامه شماره ۱۹۲۲ می باشد که با حمایت مالی مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شد.

از کلیه مسئولین دانشکده دندانپزشکی بابل و جناب آقای آقاجانپور بخاطر همکاری در کارهای آزمایشگاهی تقدیر و تشکر می شود.

Archive of SID

References

1. Avelar RL, Antunes AA, Carvalho RWF, Bezerra PGCF, Neto PJO, Andrade ESS, Odontogenic cysts: a clinicopathological study of 507 cases, *J Oral Sci* 2009;51:581-6.
2. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE, *Patologia Oral e Maxilofacia*, 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2009. p. 679-700.
3. Nonaka CFW, Maia AP, do Nascimento GJF, Freitas RA, Souza LB, Galvão HC, Immunoexpression of vascular endothelial growth factor in periapical granulomas, radicular cysts, and residual radicular cysts, *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2008;106:896-902.
4. Gadbaill AR, Chaudhary M, Patil S, Gawande M, Actual proliferating index and p53 protein expression as prognostic marker in odontogenic cysts. *Oral Dis* 2009;15:490-8.
5. GADBAIL ET AL, Tumor angiogenesis: Role in locally aggressive biological behavior of ameloblastoma and keratocystic odontogenic tumor, *Head and neck*. 2013; 329-334.
6. Chirapathomsakul D, Sastravaha P, Jansisyanont P, A review of odontogenic keratocysts and the behavior of recurrences, *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2006;101:5-9; discussion 10.
7. Shear M, The aggressive nature of the odontogenic keratocyst: is it a benign cystic neoplasm? Part 1. Clinical and early experimental evidence of aggressive behavior, *Oral Oncol* 2002;38:219-226.
8. Shear M, The aggressive nature of the odontogenic keratocyst: is it a benign cystic neoplasm? Part 2, Proliferation and genetic studies, *Oral Oncol* 2002;38:323-331.
9. Shokoofeh Jamshidi, Massoumeh Zargaran, Fahime Baghaei, Setareh Shojaei, Reza Zare Mahmoodabadi, Arash Dehghan, and Abbas Moghimbeigi An Immunohistochemical Survey to Evaluate the Expression of CD105 and CD34 in Ameloblastoma and Odontogenic Keratocyst *J Dent [Shiraz]*, 2014 Dec; 15[4]: 192-198. PMID: PMC4247843
10. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D, World Health Organization Classification of Tumors, WHO Histological classification of odontogenic tumors, Lyon: IARC Press; 2005. pp 306-307.
11. Junquera L, Ascani G, Vicente JC, Garcia-Consuegra L, Roig P, Ameloblastoma revisited, *Ann Otol Rhinol Laryngol*, 2003;112:1034-1039.
12. DeWever O, Mareel M, Role of tissue stroma in cancer cell invasion, *J Pathol*, 2003;200:429-447.
13. Hillen F, Griffioen AW, Tumour vascularization: sprouting angiogenesis and beyond, *Cancer Metastasis Rev*. 2007;26:489-502.
14. Fonsatti E, Altomonte M, Nicotra MR, Natali PG, Maio M, Endoglin [CD105]: a powerful therapeutic target on tumor-associated angiogenetic blood vessels, *Oncogene*, 2003;22:6557-6563.
15. Sánchez-Elsner T, Botella LM, Velasco B, Langa C, Endoglin expression is regulated by transcriptional cooperation between the hypoxia and transforming growth factor-beta pathways., *J Biol Chem*, 2002 Nov 15;277[46]:43799-808. Epub 2002 Sep 11.
16. Minhaj R, Mori D, Yamasaki F, Sugita Y, Satoh T, Tokunaga O, Organ specific endoglin [CD105] expression in the angiogenesis of human cancers, *Pathol Int*. 2006;56:717-723.
17. Ding S, Li C, Lin S, "et al", Comparative evaluation of microvessel density determined by CD34 or CD105 in benign and malignant gastric lesions, *Hum Pathol*, 2006;37:861-866.
18. Billen LP, Kokoski CL, Lovell JF, Leber B, Andrews DW: Bcl-XL inhibits membrane permeabilization by competing with Bax, *PLoS Biol* 2008, 6:e147
19. Hardwick JM, Soane L, Multiple functions of BCL-2 family proteins. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2013 Feb 1;5[2]. pii: a008722. doi: 10.1101/cshperspect.a008722.
20. Rangiani A, Motahary P, Evaluation of bax and bcl-2 expression in odontogenic keratocysts and orthokeratinized odontogenic cysts: A comparison of two cysts, *Oral Oncol*, 2009 Jul;45[7]:e41-4.
21. Gadbaill AR, Cyst: An immunohistochemical study, *J Oral Carcinogenesis*. 2011; PP 24: S6.
22. Piattelli A, Fioroni M, Rubini C, Differentiation of odontogenic keratocysts from other odontogenic cysts by the expression of bcl-2 immunoreactivity, *Oral Oncol*, 1998 Sep;34[5]:404-7.
23. Kichi E, Enokiya Y, Muramatsu T, Hashimoto S, Inoue T, Abiko Y, Shimono M, Cell proliferation, apoptosis and apoptosis-related factors in odontogenic keratocysts and in dentigerous cysts, *J Oral Pathol Med*. 2005 May;34[5]:280-6.

24. SolukTekkeşin M, Mutlu S, Olgaç V, Expressions of bax, bcl-2 and Ki-67 in odontogenic keratocysts [Keratocystic Odontogenic Tumor] in comparison with ameloblastomas and radicular cysts, Turk Patoloji Derg, 2012;28[1]:49-55
25. Andrade Santos PP, Aquino AR, Oliveira Barreto A, Almeida Freitas R, Galvão HC, Souza LB. Immunohistochemical expression of nuclear factor κ B, matrix metalloproteinase 9 and endoglin [CD105] in odontogenic keratocysts, dentigerous cysts, and radicular cysts, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011 Oct;112[4]:476-83.

Archive of SID

Comparative analysis of CD105 and bcl2 expression in radicular cyst, dentigerous cyst, OKC and ameloblastoma by immunohistochemistry

Gholami¹, Motamedosanaye V^{2*}, Bijani A³

¹Oral and Maxillofacial Pathologist, Dental school, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

²Assistant Professor of Operative Dentistry, Dental school, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

³MD, Non communicable Pediatrics Disease Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

*Corresponding Author : Dental School, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

Email: Motamedv871@yahoo.com

Abstract

Background & Objectives: The purpose of this study is to evaluate the immunohistochemical expression of CD105 and Bcl2 in radicular cyst, dentigerous cyst, OKC and ameloblastoma.

Material and methods: In this analytical retrospective study, 15 samples of radicular cyst, 15 dentigerous cyst, 15 OKC and 5 samples of ameloblastoma were selected. The samples were deparafinized and antigens were retrieved. Immunohistochemistry technique was applied for evaluation of CD105 and bcl2. Findings were analyzed by SPSS17 software. Comparative analysis of data was performed by using the Mann-Whitney T-test for two independent samples. A p value of less than 0.05 was considered to be statistically significant.

Results: The mean value of bcl2 expression in radicular, dentigerous, OKC and ameloblastoma were 78, 71.13, 48 and 45 respectively. There is no significant difference between OKC and ameloblastoma ($p > 0.05$). The percentage of CD105 positive vessels was higher in radicular cyst and decreased in dentigerous cyst, OKC and ameloblastoma.

Conclusion: The higher expression of bcl2 in OKC and ameloblastoma can explain the more aggressive clinical behavior of these lesions, although, angiogenesis has no impression on it.

Keywords: radicular cyst, dentigerous cyst, OKC, ameloblastoma, CD105 and bcl2, Immunohistochemistry.