

بررسی تاثیر استفاده از وج کفشهای خارجی، بر کنترل پوسچر کودکان فلج مغزی همی پلزی

سارا بیات^۱، دکتر سعید طالبیان^۲، مهدی عبدالوهاب^۳، دکتر شهره جلائی^۴، محمود جلیلی^۳، پروین راجی^۳، سیما مرادی^۱

۱- کارشناس ارشد کاردینانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- دانشیار گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- مریمی گروه کاردینانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴- استادیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: در فلجه مغزی که شایع ترین آسیب حرکتی دوران کودکی با شیوه ۲ در ۱۰۰۰ تولد زنده می‌باشد، کنترل پوسچر و حرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نوع همی پلزی آن تفاوت در تون پوسچرال دو سمت بدن وجود دارد که باعث جا به جای وزن به سمت سالم می‌شود. در این کودکان اختلالات پوسچرال در قالب اختلالات ثبات پوسچر شامل حفظ پوسچر [جابجایی مرکز فشار (Center of Pressure) و سطح جابجایی (Area)] و کنترل پوسچر (متغیرهای سرعت) دیده می‌شود. روشی که به تازگی برای استفاده اجرایی از اندام مبتلا بر اساس **Constraint-Induced Movement (CIMT)**) بیان شده قرار دادن وج زیر اندام سالم است. در این مطالعه با استفاده از وج روی صفحه نیرو به بررسی ثبات پوسچر پرداخته شد.

روش بررسی: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و روش نمونه گیری آن به شکل در دسترس بود. ۱۶ کودک همی پلزی در این برنامه شرکت کرده و در دو وضعیت روی صفحه نیرو قرار گرفتند. کودک روی سطح سخت در مرحله اول، بدون وج و در مرحله دوم با وج ۵° زیر پای سالم می‌ایستاد تا اطلاعات مربوط به مرکز فشار توسط صفحه نیرو ثبت شود. زمان هر آزمایش نیز ۲۰ ثانیه بوده و هر یک از این مراحل ۳ بار تکرار می‌شد.

یافته ها: کاهش معنی داری در جابجایی طرفی و سطح جابجایی قدمای خلفی و سرعت جابجایی تفاوت معنی داری ایجاد نشد. همچنین در مورد بررسی وضعیت تقارن، به کمک وج میانگین نیروهای مرکز فشار بر روی پای مبتلا به طور معنی داری افزایش یافت و تقارن در تحمل وزن بر روی دو پا ایجاد شد.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که بدنیال استفاده از وج ۵° می‌توان فاکتورهای کنترل پوسچر را بهبود بخشید و به تقارن در وزن انداختن بیماران همی پلزی رسید.

کلید واژه ها: وج کفشهای خارجی، کنترل پوسچر، همی پلزی، فلجه مغزی

(وصول مقاله: ۱۳۸۹/۶/۲۱؛ پذیرش مقاله: ۹/۹/۱۳۸۹)

نویسنده مسئول: تهران- خیابان انقلاب- پیچ شمیران- دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیوتراپی

Email: talebian@sina.tums.ac.ir

مقدمه

فلجه مغزی یک گروه از آسیبهای حرکتی پوسچر و عملکرد حرکتی است که دائمی بوده و در عین حال متغیر نیز می‌باشد (۱). یکی از نمودهای این بیماری، اختلال تون به صورت هایپرتونیوسیتی است که از یک تغییر نرم و آرام بین تحرک و ثبات در بدن جلوگیری می‌کند (۲).

Ferdjallah Diener و همکارانش در مطالعه خود روی افراد فلجه مغزی بیان کرد که توانایی نگه داشتن کنترل پوسچر فاکتوری حیاتی برای انجام فعالیتهای روزمره زندگی است. بدیهی است که ایستادن غیر متقاضان، همراه با بخش بزرگی از تحمل وزن روی سمت سالم، می‌تواند فرد همی پلزی را در معرض افتادن با جایه‌جا کردن مرکز نقل (COG) به یک سمت قرار داده و ایجاد بی ثباتی کند (۳).

از این رو رویکردهای درمانی مورد استفاده برای کودکان همی پلزی همگی در این راستا قرار می‌گیرند که با استفاده اجرایی از اندام مبتلا تون عضلانی سمت درگیر را به وضعیت نرمال سوق داده و عملکرد آن را بهبود بخشنند. یکی از راه‌هایی که در اندام فوکانی ما را به این هدف نزدیک می‌کند روش **Constraint-Induced Movement Therapy** می‌باشد

در کودکان مبتلا به همی پلزی، تفاوت در تون پوسچرال دو سمت بدن وجود دارد. بنابر این، یکی از ضروری ترین تمرينهای درمانی می‌تواند یکپارچه کردن دو سمت بدن باشد. از فاکتورهای دیگری که در کودکان فلجه مغزی همی پلزی دچار آسیب می‌شود، کنترل پوسچر است که از تعامل فرد با وظیفه و محیط به وجود می‌آید. در واقع توانایی کنترل وضعیت بدن در فضا از مجموعه تعاملات عضلانی اسکلتی و سیستم های عصبی حاصل می‌شود که به آنها "سیستم کنترل پوسچر" می‌گوییم (۴).

Sensitivity 10 Sampling Rate 400 Hz Duration 37 Size 90×90 Height 15.2 cm

مشخصات بود: Sensitivity 10 Sampling Rate 400 Hz Duration 37 Size 90×90 Height 15.2 cm

مطالعه حاضر در ۲ مرحله انجام شد. این دو مرحله بر اساس داشتن و نداشتن وج بر روی سطح سخت تفکیک می‌شد و برای این که از تأثیر آنی استفاده از کفی گوه ای در مرحله بدون وج پیشگیری شده باشد، اول مرحله بدون وج انجام شده و بعد مرحله با وج صورت می‌گرفت.

مرحله اول ایستادن بدون وج روی سطح سخت، مرحله دوم ایستادن با وج روی سطح سخت بود. زمان هر آزمایش نیز ۲۰ ثانیه بود و هر یک از این مراحل ۳ بار تکرار می‌شد. در زمان انجام تست به بیمار گفته می‌شد به سمت روبرو نگاه کند. دوره ۱۲۰ ثانیه ای به صورت نشسته برای استراحت بعد از هر مرحله در نظر گرفته می‌شد (۶). از هیچ وسیله کمکی حین انجام مراحل تست استفاده نمی‌شد. همکار آزمونگر در کنار بیمار می‌ایستاد البته با ذکر این نکته که هیچ کمکی از جانب او داده نخواهد شد.

داده‌های پوسچرال بر مبنای جابجایی و سرعت نوسانات مرکز فشار (COP) و سطح جابجایی بین دو محور X و Y با استفاده از دستگاه صفحه نیرو (Force plate) جمع آوری شد. جهت بررسی توزیع نرمال داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov Test) استفاده شد. سپس به بررسی ضریب تکرار پذیری در داده‌ها و ضریب همبستگی بین دو تکرار پرداختیم. در مرحله بعد، اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای واپسنه را از طریق آزمون اندازه‌گیری تکراری (Repeated Measures) بررسی کردیم. سطح معنی داری به صورت p کمتر از ۰.۰۵ در همه افراد در نظر گرفته شد و در نهایت به بررسی دو به دوی حالت‌ها پرداختیم.

یافته‌ها

پس از آنالیز اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون اندازه‌های تکراری مشخص شد که بدنال استفاده از وج ۵ درجه در زیر پای سالم کودکان فلچ مغزی همی پلژی، میانگین نیروهای مرکز فشار بر پای مبتلا از متوسط ۰/۷۸٪ به ۰/۴۴٪ متوسط ۵/۷٪ بر روی سطح سخت (p<0.000) رسید. نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای کنترل پوسچر بعد از استفاده از وج

بر روی سطح سخت در قالب جدول ۱ بیان شده است:

که با محدود کردن اندام فوقانی سالم فرد را مجبور به استفاده از اندام فوقانی مبتلا می‌کند. این روش مستقیماً در اندام تحتانی عملی نیست اما می‌توان این دیدگاه را به نوعی دیگر در اندام تحتانی پیاده کرد. استفاده از بالابر و کفی گوه ای از جمله این روش‌ها هستند.

در مطالعه حاضر در جستجوی این بودیم که آیا می‌توان با یک وسیله ساده (مانند یا همان کفی گوه ای شکل با زاویه ۵ درجه) که در داخل کفش پای سالم کودک فلچ مغزی همی پلژی قرار می‌گیرد، او را مجبور به ایستادن متقاضن کرده و در واقع استفاده اجباری از اندام مبتلا را در او تسهیل کرد. در ارزیابی‌ها علاوه بر وضعیت تقارن به تغییر فاکتورهای کنترل پوسچر بدنال استفاده از وج نیز پرداخته شد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و روش نمونه‌گیری آن به شکل نمونه‌گیری در دسترس بود. بیمار فلچ مغزی مراجعه کننده به کلینیک کاردیمانی دانشکده توانبخشی علوم پزشکی تهران، در صورت دارا بودن شرایط ورود به مطالعه انتخاب شده و فرم رضایت نامه کتبی توسط والدین امضا می‌شد. ۱۶ کودک (۷ دختر، ۹ پسر) با درگیری یکطرفه، ۸ نفر همی‌پلژی راست و ۸ نفر همی‌پلژی چپ با میانگین سنی ۷/۶ سال و ۸ ماه در این مطالعه شرکت کردند.

معیارهای ورود شامل موارد زیر بود:

فلچ مغزی همی‌پلژی با نمود تحمل وزن نامتقاضن، گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال، توانایی ایستادن مستقل بدون وسیله کمکی بر روی دو پا به مدت ۳۰ ثانیه (۵) و نداشتن مشکلات بینایی در حدی که اخلالی در تعادل ایجاد کند.

عواملی که موجب خروج بیمار از مطالعه می‌شد شامل عدم همکاری کودک حین انجام آزمایش، وجود اختلالات بارز در ثبت سیگنالهای صفحه نیرو، بروز خستگی ناشی از طولانی بودن مراحل تست، همچنین بی قراری و بی حوصلگی بیمار و در نهایت استفاده از دارو به دلایل مختلف مانند بیش فعالی بود. قبل از اینکه بیمار روی صفحه نیرو قرار بگیرد، محل قرار گیری بیمار روی آن با علامت مشخص شده بود. از بیمار خواسته می‌شد که روی صفحات نیرو قرار گرفته و دستهایش را آرام در کنار بدن قرار دهد و در طول زمان آزمایش آرام باشد. صفحه نیرو یا دستگاه Force Plate از نوع 9090 Series با این

جدول ۱- مقایسه میانگین (انحراف معیار) متغیرهای کنترل پوسپر روی سطح سخت در حالت بدون وج و با وج (n=۱۶)

سطح معنی داری	با وج	بدون وج	جابجایی قدامی خلفی (cm)	سطح جابجایی طرفی (cm)	سرعت جابجایی (cm/sec)
.۰/۳۳۹	۱/۷۸۶ (۰/۹۴)	۲/۰۲ (۱/۰۲)	۲/۶۴۵ (۱/۶۳)	۲۰/۲۳۴ (۱۳/۸۴)	۱۵/۱۲ (۱۵/۸۵)
۰/۰۳۳	۱/۸۰۹ (۰/۸۴)	۱/۷۸۶ (۰/۹۴)	۱۵/۳۶۹ (۱۰/۶۵)	۱۷/۶۵۶ (۱۲/۳۶)	۰/۶۵۵
۰/۲۷۶	۰/۰۳۳	۰/۰۳۳			

بحث

انداختن اجباری روی اندام مبتلا شد، اما وج ۵ درجه بیشترین تقارن را در وضعیت ایستادن فرد همی پلزی ایجاد می کرد که حدوداً برابر با $۵۱/۴۴\%$ از میزان وزن بدن روی اندام مبتلا بود، و این نتیجه مشابه نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر یعنی $۵۷/۲۴\%$ بود. به عبارتی دیگر این روش درمانی همانند کاربردی که در همی پلزی بزرگسالان دارد در کودکان نیز به عنوان یک رویکرد درمانی می تواند موثر باشد و احتمالاً این تفاوت کوچک در میزان درصد انتقال وزن، بدلیل تفاوت علت بروز همی پلزی در این دو گروه باشد (۱۰).

Chadhuri و همکاران (۲۰۰۰)، در مطالعه ای دیگر بر روی ۱۰ فرد همی پارزی سکته ای، به بررسی تاثیر بالابر ۶ و ۹ میلیمتری در کفش پای سالم، بر روی تقارن وزن و **posturography** دینامیک افراد و تعیین پاسخ افراد به اغتشاش های ناگهانی پرداختند. در مطالعه آن ها هم این نتیجه دیده شده بود که پاسخ قدرتی پای مبتلا که در حالت بدون بالابر نصف پای سالم است بدبندی استفاده از بالابر اندازه بزرگتری پیدا کرده و بهبود تقارن و کاهش تأخیر در پاسخ مشاهده شده است (۱۱). از این رو، تحقیق حاضر از این نظر که به بررسی تاثیر این وج در کودکان فلاح مغزی همی پلزی پرداخته، مطالعه ای جدید به حساب می آید.

وج استفاده شده در این مطالعه زاویه ۵ درجه داشت، و دلیل انتخاب این زاویه، مطالعات قبلی بود که در آن ها همگی به این نتیجه رسیده بودند که با این زاویه، بیشتر از بقیه زوایا به هدف مورد نظر (تقارن وزن اندازی در افراد همی پلزی)، می توان دست یافت.

جنبه دیگری که در این تحقیق به بررسی آن پرداختیم، تأثیر وج بر متغیرهای مربوط به کنترل پوسپر بود که می توان آن را وجه تمایز دیگر این پژوهش بر سایر مطالعات دانست، چرا که در میان مطالعات در دسترس، فقط **Togami** و همکارانش (۲۰۰۳)، از میان فاکتورهای کنترل پوسپر به بررسی جابجایی طرفی تنها پرداختند. نتایج آن ها نیز مشابه با مطالعه

مبتلایان به فلاح مغزی همی پلزی دچار عدم تقارن در تحمل وزن می باشند و این ایستادن نامتقارن با تحمل بیشتر وزن بر روی سمت قوی تر، می تواند فرد همی پلزی را در معرض افتادن قرار دهد (۴). تکنیکهای متعددی برای باز آموزی ایستادن متقارن وجود دارد. این وزن انداختن غیر متقاضان منجر به راه رفتن غیر طبیعی می شود. بنابراین استفاده اجباری از اندام مبتلا همیشه به عنوان روشی که می تواند منجر به بهبود تعادل و افزایش توانایی تحمل اخلال های وارد بر پوسپر شود مطرح بوده است.

در زمینه رسیدن به این نتایج درمانی، تحقیقات اندکی کلیت این عدم تقارن را مورد بررسی قرار داده است. بنابراین نیاز ضروری و فوری برای تحقیق در زمینه ارزیابی و نتایج درمان احساس می شود، به گونه ای که کودک مجبور شود در حین حرکت و راه رفتن روی پای مبتلا نیز به اندازه پای سالم وزن بیندازد. در یکی از تحقیقاتی که اخیراً در بیماران سکته مغزی همی پلزی انجام شده نشان داده شد که بدبندی استفاده از وج ۵ درجه زیر پای سالم بیماران همی پلزی میانگین **Ground Force Reaction** بر روی سمت مبتلا به طور معنی داری افزایش یافت (۷). در مطالعه ای دیگر که در بیماران سکته مغزی همی پلزی در کفش پای سالم منجر به تقارن وزن اندازی حین ایستادن می شود (۸). بررسی دیگری که در این زمینه در افراد سکته مغزی همی پلزی صورت گرفته نشان داد که، در مقایسه حالت های بدون وج، با وج ۵ درجه، $۷/۵$ درجه و $۱۲/۵$ درجه بر روی صفحه نیرو، با استفاده از وج ۵ درجه می توان به تقارن تحمل وزن بر روی پای مبتلا، در شرایطی که فرد روی سطح سخت ایستاده رسید که با نتایج حاضر مشابه است (۹).

در پژوهش دیگری که در این زمینه بر روی ۹ فرد سکته ای همی پارزی انجام شد، از ۳ نوع وج (۵ درجه، $۷/۵$ درجه و $۱۲/۵$ درجه) و ۳ نوع بالابر ($۰/۶$ ، $۰/۹$ و $۱/۲$ سانتیمتر) استفاده شد. طبق نتایج آن ها، کاربرد همه این موارد باعث وزن

حاضر، حاکی از کاهش جابجایی طرفی تن به بدنبال استفاده از وج در کفش پای سالم بیماران بود. البته مطالعه **Togami** و همکارانش، از این نظر که بدنبال استفاده از وج ۵ درجه به تقارن در تحمل وزن انداختن روی دو پا رسیدند نیز با تحقیق حاضر تشابه دارد.

این مطالعه نشان داد که یک کفی گوهای شکل در سمت سالم می‌تواند تقارن تحمل وزن را حین ایستادن بهبود بخشد.

قدرتانی

این مقاله حاصل (بخشی از) پایان نامه تحت عنوان بررسی تأثیر استفاده از کفی گوهای، بر کنترل پوسچرال کودکان فلج مغزی همی پلژی ۵ تا ۱۲ سال در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۸-۸۹ کد ۱۶ می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.

REFERENCES

1. Cans, C., D-L-C., J., Mermet, M.-A., Epidemiology of cerebral palsy.J Pediatric and Child Health, 2008.18(9): 393_398.
2. Umphred, D. A. , Neurological rehabilitation. 4th ed. 2001. 259 _260.
3. Shumway_ Cook A, Marjorie H. Motor Control translating research into clinical practice. third ed, 2007. 158 _164.
4. Ferdjallah M, Harris G.F, Smith P, Wertsch, J.J. Analysis of postural control synergies during quiet standing in healthy children and children with cerebral palsy. J Clinical Biomechanics,2002.17: 203_210.
5. O' Reily T. The effect of ankle foot orthoses on symmetry of weight_ bearing and functional ability in children with hemiplegia. J Gait and Posture, 2006. S 87.
6. Rodriguez G.M. and Aruin, A.S. The effect of shoe wedges and lifts on symmetry of stance and weight bearing in hemiparetic individuals. Arch Phys Med Rehabil, 2002. 83(4): 478-82.
7. Chen C.H, Lin K.H, Lu T.W, Chai, H-M, et al. Immidiate effect of lateral-wedged insole on stance and ambulation after stroke.J Phys Med Rehabil, 2010;89:48-55.
8. Chen C.H, Lin K.H, Lu T.W, Chai H-M, et al. Kinetic analysis of lateral-wedge insole on symmetry of stance and ambulation in stroke individuals. J Phys Med Rehabil, 2005; 21.106.
9. Aruin A.S, Rodriguez G.M. Compelled weight bearing in persons with hemiparesis following stroke: the effect of a lift insert and goal-directed balance exercise. J Rehabil Res Dev, 2000. 37(1): 65-72.
10. Aruin A.S, Rodriguez G.M. The effect of the angled shoe wedge on symmetry of stance and weight bearing in hemiparetic individuals. Arch Phys Med Rehabil, 2002. 83:" 1-2.
11. Chaudhuri S, Aruin A.S. The effect of shoe lifts on static and dynamic postural control in individuals with hemiparesis. Arch Phys Med Rehabil, 2000. 81(11): 1498-503.