

تأثیر کشش استاتیک دستی و ماساژ پا و مج پا بر تعادل مردان سالمند بالای ۶۰ سال : کارآزمایی بالینی تصادفی

حسین صفاخیل^۱، دکتر غلامرضا علیایی^۲، مهدی عبدالوهاب^۳، پروین راجی^۳، دکتر بهروز عطارباشی^۴، دکتر احمد رضا باغستانی^۵، سید علی مولایی سار^۶

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد کاردemanی جسمانی

۲- استاد گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- مری گروه کاردemanی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴- استادیار گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۶- کارشناس ارشد فیزیوتراپی

چکیده

زمینه و هدف: تقویت عوامل موثر در حفظ تعادل می‌تواند به عنوان یک راهبرد اساسی در درمان مشکلات تعادلی سالمندان باشد و تحریک گیرنده‌های لمس و فشاری پوست، عضلات و کپسول می‌تواند به بهبود حس عمقی مفصلی و در نتیجه به ثبات عملکردی مفصل کمک کند، هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نحوه‌ی تاثیر گذاری یک دوره‌ی طولانی مدت تمرینات کششی و ماساژ بر روی تعادل سالمندان می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی بصورت تصادفی انجام گردید. پس از غربالگری ۲۰۵ سالمند مرد سالم ساکن جامعه، نمونه‌ها به روش غیراحتمالی آسان در دسترس انتخاب گردیدند. گروه مورد مشکل از ۱۸ نفر با میانگین سنی $۵/۴ \pm ۴/۵$ سال و گروه شاهد مشکل از ۱۷ نفر با میانگین سنی $۸/۴ \pm ۲/۵$ سال بودند. تمرینات کششی و ماساژ، ۱۵ جلسه‌ی یک ساعته و در مدت ۵ هفته (۳ جلسه در هفته) توسط درمانگر انجام گردید. برای ارزیابی نتایج از مقیاس تعادلی برگ (BBS) و آزمون زمان‌دار برخاستن و برگشتن (Timed Up and Go: TUG) استفاده شد.

یافته‌ها: جهت تجزیه و تحلیل آماری از برنامه‌ی SPSS-۱۹ استفاده شد. برای بررسی میزان تغییر نمره‌ی تست‌های TUG و BBS، قبل و بعد از مداخله، از تست t زوجی و تست t مستقل استفاده گردید. اختلاف میانگین تغییرات تست‌های تعادلی TUG و BBS در دو گروه مداخله و کنترل دارای تفاوت معناداری بود ($p < 0.001$).

نتیجه‌گیری: مداخلات انجام شده در گروه مداخله باعث بهبود معنادار مهارت‌های تعادلی سالمندان گردیده است.

کلید واژه‌ها: تعادل، کشش دستی، سالمند، ماساژ

(ارسال مقاله ۱۲/۲۰، ۱۳۹۰، پذیرش مقاله ۳/۸/۱۳۹۱)

نویسنده مسئول: خیابان میرداماد، میدان مادر، خ شهید شاه نظری، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: Olyaeigh@sina.tums.ac.ir

مقدمه

مدون و خاصی برای این قشر نداشته باشند در ۲۰ سال آینده، کشور دچار یک بحران و معضل اساسی برای رفع این مشکلات خواهد شد. در همین راستا نشان داده شده است تغییرات فیزیولوژیکی که در طی فرآیند سالمندی رخ می‌دهد و شامل تغییرات مشخص در دستگاه عصبی عضلانی اسکلتی است، می‌تواند بر انجام حرکات پیچیده اثر گذاشته، باعث افزایش بروز زمین خوردن و حوادث دیگر می‌شود. افتادن (Fall) غالباً به عنوان تغییر ناگهانی در وضعیت (Position) است که به افتادن بر روی زمین ختم می‌شود (۳) و اساسی ترین علت شکستگی

بهبود تکنولوژی‌های پزشکی، جراحی و بهداشت عمومی به طور مطلوبی طول عمر بشر را افزایش داده است. در حال حاضر حدود ۱۳٪ جمعیت جهان سالمند می‌باشد و این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰٪ می‌رسد (۱). در ایران نیز طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۸۵، نشان داده شد که ۷/۲۷ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهد که این میزان تا ۲۰ سال آینده به ۱۴/۷۰ درصد خواهد رسید و این به معنای انفجار سالمندی در کشور ما خواهد بود (۲). این ارقام نشان می‌دهند که اگر برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور از هم اکنون برنامه

عضلانی سالمدان می‌باشد و یافته‌های این پژوهش علاوه بر پاسخ دادن به برخی از ابهامات بالینی موجود، برای توسعه تمرینات ورزشی ساده‌ای که می‌تواند در جهت کاهش اختلالات تعادلی و جلوگیری از سقوط‌های مکرر در سالمدان بکار روند، مؤثر باشند. چراکه همانطور که قبلاً ذکر گردید، توجه به پیشگیری یا کاهش احتمال سقوط در افراد مسن توسط برنامه ریزی تمرینات ویژه می‌تواند به سلامتی و کیفیت زندگی آنها کمک قابل توجهی نموده و در نتیجه بطور عمده‌ای در استفاده از منابعی که صرف هزینه‌های مراقبت بهداشتی می‌شود، صرفه جویی نماید.

به طور دقیق‌تر، از آنجاییکه براساس مطالعات مذکور، تقویت عوامل موثر در حفظ تعادل اعم از حس عمقی مفاصل می‌تواند به عنوان یک راهبرد اساسی در درمان و پیشگیری از مشکلات تعادلی موثر باشد و تحریک گیرنده‌های لمس و فشاری پوست، عضلات و کپسول می‌تواند به بهبود حس عمقی مفصلی و در نتیجه به ثبات عملکردی مفصل کمک کند، بنابراین هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نحوه تاثیر گذاری یک دوره طولانی مدت تمرینات کششی و ماساژ بر روی تعادل سالمدان می‌باشد.

روش بررسی

نوع مطالعه از دسته‌ی تجربی یا کارآزمایی بالینی تصادفی (Randomized Controlled Trial) است. جامعه آماری شامل سالمدان ۶۰-۸۰ ساله‌ی سالم ساکن در جامعه بود. این افراد از بین سالمدان مراجعه کننده به مراکز برگزار کننده‌ی طرح رایگان پایش سلامت سالمدان شهر کرج انتخاب گردیدند. تعداد نمونه‌ها نیز پس از مطالعه مقدماتی و با نظر مشاور آماری با توجه به مطالعه‌ی پایلوت برای هر گروه ۱۷ نفر در نظر گرفته شد. زمان مطالعه از دی ماه ۱۳۸۹ و با استفاده از تبلیغات شهری (اطلاع رسانی رادیویی، ارسال پیامک، تبلیغات شهری و تبلیغ در سایت خبری منطقه‌ای) روند جذب شرکت کنندگان آغاز گردید. مکان مطالعه نیز ۲ نقطه‌ی مرکزی از شهر، در یک مرکز سالمدان و یک کلینیک کاردیمانی و فیزیوتراپی بود. سالمدان مراجعه کننده ابتدا توسط پزشک، پرستار، کاردیمانگر، فیزیوتراپیست، کارشناس ارتوپدی فنی، روانشناس از نظر جنبه‌های مختلف پزشکی- توانبخشی و معیارهای متفاوت ورودی بررسی می‌گشتند. سپس افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن میانگین سنی مورد نظر بصورت تصادفی و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل فرستاده

ها در سالمدان می‌باشد، سقوط در ۳۰٪ افراد ۶۵ ساله و ۴۰٪ افراد ۸۰ ساله اتفاق می‌افتد.^(۴)

کنترل پوسچر سیستمی کاملاً پیچیده است که شامل اجزای حسی و حرکتی می‌باشد. از میان دروندادهای حسی مربوط به هماهنگی و تنظیم نوسانات پوسچر، امروزه اهمیت اطلاعات حسی پیکری پاها و مج کاملاً اثبات شده است^(۵-۷). تاثیر تحریکات گیرنده‌های حسی پیکری پا از طریق پوست، عضلات، تاندون‌ها و مفاصل بر روی کنترل پوسچر اثبات شده است. این تحریکات می‌توانند به صورت سرما^(۸)، بی‌حس کردن^(۷)، تحریک ناحیه پنجه‌ی پا^(۹) و ویراسیون عضلات مج پا^(۱۰) باشند. از نظر بالینی نیز اثبات شده است که تغییر یا فقدان اطلاعات حسی پیکری (somatosensory) در اندام تحتانی که ناشی از بیماری‌هایی چون نوروپاتی محیطی دیابتیک می‌باشد، کنترل پوسچر را دچار مشکل می‌کند^(۱۱). تحریک پیشرونده‌ی اطلاعات حسی اندام تحتانی بدنبال افزایش سن نیز یکی از یافته‌های بالینی مشخص می‌باشد و حتی یک عامل مهم در وقوع سقوط در سالمدان در نظر گرفته شده است^(۱۲). بنابراین تلاش برای یافتن یک مداخله درمانی با هدف افزایش عملکرد سیستم حسی پیکری پاها و مج میتواند سهم بزرگی در کنترل تعادل و جلوگیری از سقوط در افراد سالمدان داشته باشد.

Handrakis و همکاران در سال ۲۰۱۰ تاثیر تمرینات Self stretching را بر روی تعادل دینامیک افراد میانسال ۴۰-۶۰ ساله بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این تمرینات منجر به افزایش تعادل دینامیک می‌گردد^(۱۳). یافته‌های تحقیق حاضر همچنین با نتایج مطالعه‌ی Costa و همکاران در سال ۲۰۰۹ نیز همخوانی دارد. نامبرده حدود ۲۸ خانم ۳۵-۱۸ ساله را با تمرینات کششی ۱۵-۴۵ ثانیه‌ای تحت بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که این تمرینات منجر به کاهش بی‌ثبتاتی وضعیتی (Postural Instability) و افزایش تعادل پویا (Dynamic balance) می‌گردد^(۱۴). همچنین تاثیر گذاری مثبت تمرینات کششی در سالمدان بر روی راه رفتن آنها نیز بررسی گردیده است^(۱۵).

بنابراین بر اساس بررسی‌های انجام شده، تا به حال مطالعه‌ای بر روی بررسی تاثیر کاربرد طولانی مدت تمرینات کششی و ماساژ بر روی تعادل سالمدان و اندازه‌گیری آن از طریق تست‌های عملکردی (Functional) انجام نگرفته است و مطالعات انجام شده محدود به بررسی تاثیر کاربردهای کوتاه مدت کشش و دیگر تحریکات حسی پیکری در حوزه‌هایی چون راه رفتن، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی مفاصل و قدرت

مراجعین ابتدا به مدت ۲۰ دقیقه (برای هر پا ۱۰ دقیقه) با هدف دریافت تحریکات لامساهای، افزایش جریان خون موضعی، افزایش تحرک بافت همبند و نیز Warm Up توسط دستیاران تحت عمل ماساژ فریکشن دایره‌های (در ناحیه‌ی Sole از کف پا) قرار می‌گرفتند. سپس توسط کاردeman و فیزیوتراپیست تحت مراحل کششی جلسه‌ی درمانی که شامل ۵ حرکت (۱-دورسی فلکشن، ۲-پلاتنار فلکشن، ۳-اورسیون، ۴-اینورسیون و پلاتنار فلکشن ۵-اینورسیون و دورسی فلکشن) بود، قرار می‌گرفتند. لازم به ذکر است که میزان کشش تا حد احساس می‌گرفتند. کششی جلسه‌ی درمانی که شامل ۳ تکرار ۳۰ Minimal Discomfort بود، هر حرکت به صورت ۳ ثانیه‌ای با فواصل استراحت ۱۵ ثانیه‌ای انجام می‌گرفت که جمعاً کل پروسه‌ی کششی برای هر دو پا ۲۵ دقیقه (هر پا ۱۲ دقیقه) به طول می‌انجامید. نهایتاً پس از ۵ هفته مداخله و با خروج یک نفر از گروه مورد دومین جلسه‌ی ارزیابی برای ارزیابی مجدد هر دو گروه مورد و شاهد برگزار گردید. گروه شاهد در طول ۵ هفته هیچگونه مداخله یا تمرینی دریافت نکردند و فقط برای ارزیابی ثانویه به کلینیک مراجعه نمودند. لازم به ذکر است که کیفیت و نحوه‌ی برگزاری جلسه‌ی ارزیابی ثانویه مشابه اولین جلسه‌ی ارزیابی برگزار گردید (۱۹-۱۷).

معاینه‌ی مختصر وضعیت شناختی :

(Mini-Mental State Examination: MMSE)

معاینه‌ی مختصر وضعیت شناختی کارکردهای مختلف شناختی را سنجیده و برآورده کلی از وضعیت شناختی آزمودنی فراهم می‌کند. این ابزار غربالگری مخصوص اختلالات شناختی سالمدان می‌باشد. این تست دارای ۱۱ آیتم بوده و حداقل نمره در آن ۳۰ می‌باشد (۱).

تست تعادلی برگ :

اندازه‌گیری این تست با استفاده از میزان نمراتی که هر فرد بعد از انجام دستور حرکتی خاص باید انجام بدهد. این مقیاس ۱۴ آیتم دارد که در هر مورد فرد بر اساس نحوه و کیفیت اجرای آزمون می‌تواند نمره‌ی صفر تا ۴ را به خود اختصاص دهد. در این مقیاس ۶۵ معادل بهترین وضعیت (نرمال) و صفر معادل بدترین وضعیت می‌باشد، نمره‌ی کمتر از ۴۵ نیز نشان دهنده‌ی وجود ریسک افتادن (ترس از افتادن) می‌باشد (۲۰).

می‌شدند. تمامی سالمدان شرکت کننده در مطالعه همراه با تکمیل فرم رضایت‌نامه، در جریان جزئیات طرح قرار گرفتند. معیارهای ورود عبارت بودند از سن ۶۰ تا ۸۰ سال، کسب نمره‌ی ۴۵ یا پایین‌تر در تست تعادلی Berg (یعنی وجود خطر افتادن در سالمند)، وابسته نبودن به وسیله کمکی نظیر واکر و عصاء، کسب نمره‌ی ۲۲ به بالا در آزمون "معاینه‌ی مختصر وضعیت شناختی" (Mini Mental Status)، کسب نمره‌ی ۳۲ به پایین در "پرسش نامه‌ی سنجش معلولیت ناشی از گیجی" (Dizziness Handicap Inventory) عدم ابتلا به نواقص بینایی و شنوایی، بیماریهای عصبی عضلانی، اختلالات نورولوژیک، نواقص سیستم اعصاب محیطی، پاتولوژی‌های عروقی و نواقص سیستم دهلیزی. سالمدان مورد نظر در صورت عدم تمايل به ادامه همکاری در پژوهش و یا در صورت بروز بیماری‌های عصبی عضلانی، نورولوژیک و عروقی در زمان انجام تحقیق، از مطالعه خارج می‌شدند.

در نمونه‌گیری که بصورت غیر احتمالی آسان در دسترس انجام گردید، سالمدانی که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، با نظر مشاور آماری از طریق همتا سازی بر اساس سن بصورت تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفتند و فرم رضایت نامه توسط آنها تکمیل گردید. سپس تمامی آزمودنی‌ها مجدداً با تست تعادلی برگ، آزمون زمان دار برخاستن و برگشتن (Timed Up and Go: TUG) و نمایه‌ی توده‌ی بدن ارزیابی شدند. برای تست TUG پس از ۳ مرتبه اندازه‌گیری، میانگین ۳ مرحله به عنوان نمره‌ی اولیه ثبت گردید و در مورد تست مقیاس تعادلی برگ (Berg Balance Scale: BBS)، پس از ۳ مرتبه اندازه‌گیری، بالاترین نمره به عنوان نمره‌ی اولیه ثبت گردید (۱۶). جلسات مداخله ۳ جلسه در هفته به مدت ۵ هفته انجام گردید که مدت زمان هر جلسه حدود یک ساعت بود. هر جلسه شامل ۲۰ دقیقه کشش و ۱۰ دقیقه ماساژ فریکشن دایره‌های در هر پا بود که مجموعاً بر روی هر دو پا حدود ۱ ساعت زمان صرف گردید (۱۷-۱۶.۵).

برای اجرای طرح از یک فیزیوتراپیست و ۲ دستیار گروه پزشکی کمک گرفته شد تا بتوان تمامی ۱۸ شرکت کننده‌ی گروه درمان را در فاصله‌ی زمانی ۹ صبح تا ۱۳ تحت درمان قرار داد. کشش استاتیک دستی توسط کاردeman و فیزیوتراپیست انجام می‌گردید و ماساژ فریکشن توسط دستیاران آموخت دیده. برای اطمینان از یکسان بودن روند اجرایی مراحل درمانی نیز، چندین جلسه قبل از شروع مداخله اجرا کنندگان بصورت عملی مراحل اجرایی را با یکدیگر مرور نمودند.

قد، وزن و نمایه توده بدن (Body Mass Index: BMI) با تغییرات نمره‌ی تست تعادلی برگ و TUG در گروه مورد، ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه گردید.

یافته‌ها

در طی مدت ۱ ماه غربالگری که ۲۰۵ سالمند در آن شرکت نمودند، با در نظر گرفتن میانگین و محدوده سنی افراد، نهایتاً ۱۸ نفر برای گروه مداخله و ۱۷ نفر برای گروه کنترل در نظر گرفته شدند. بنابراین ۳۵ سالمند براساس سن طبقه بندی شده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. گروه مورد مشتمل از ۱۸ سالمند با میانگین سنی ۷۴/۶ و انحراف معیار ۵/۴۵ بوده و گروه شاهد ۱۷ سالمند با میانگین سنی ۷۵/۸ و انحراف معیار ۴/۲۷ (که از نظر آماری معنادار نبود، $P < 0.05$) . اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار خصوصیات فردی و شاخص‌های تعادلی اولیه‌ی سالمندان در جدول ۱ نشان داده شده است.

تست Timed Up and Go (TUG)

فرد روی صندلی دسته دار استاندارد می‌نشیند. در حالی که به پشتی صندلی تکیه داده و ساعدهایش روی دسته‌ی صندلی قرار دارد و کفش‌های معمولی اش را که در راه رفتن می‌پوشد به پا دارد. با شنیدن کلمه‌ی «برو» که توسط آزمونگر اعلام می‌گردد از روی صندلی بلند شده و یک مسیر ۳ متری (حدوداً ۱۰ ثانیه) را مستقیم روی کف اتاق راه رفته، سپس بدون مکث چرخیده و به سمت صندلی بازگشته و مجدداً روی صندلی می‌نشیند. مدت زمانی (بر حسب ثانیه) که شخص این مانور حرکتی را از لحظه‌ی بلند شدن از روی صندلی تا نشستن مجدد روی آن انجام دهد با کرونومتر اندازه‌گیری می‌شود(۱۶).

با استفاده از نرم افزار SPSS-۱۹ باز اطلاعات Kolmogorov-Smirnov بدست آمده، ابتدا با استفاده از آزمون نرمال بودن توزیع جامعه‌ی آماری تعیین گردید . برای بررسی میزان تغییر نمره‌ی تست تعادلی برگ و TUG قبل و بعد از مداخله بر اساس نرمال بودن جامعه‌ی آماری از تست t و توست t مستقل استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین ارتباط

جدول ۱- مشخصات توصیفی و شاخص‌های تعادلی اولیه‌ی سالمندان گروه مورد و شاهد

متغیرها	شاخص‌های آماری	گروه شاهد	گروه مورد	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین
قد(سانتی متر)		۱۶۵	۱۶۳	۶/۹	۷/۸	۶۷	۶۵/۲	۷۵/۸	۷۴/۶
وزن(کیلوگرم)		۶۷	۶۵	۸/۹	۱۳/۸	۲۴/۶	۲۴/۳	۴/۳	۳/۹
نمایه توده بدن									

شد و این نتایج در دو گروه مورد و شاهد مقایسه گردید که جدول ۲ بیانگر اطلاعات آماری مربوط به مقایسه‌ی تغییرات تست‌های تعادلی TUG و BBS با استناد به آزمون t مستقل و همچنین سطح معناداری آنها می‌باشد.

نتایج این مطالعه بصورت زیر بود :

اثر تحريكات حسی پیکری مج و کف پا که در قالب ماساژ و کشش استاتیک دستی در سالمندان سالم جامعه انجام گرفت توسط دو تست تعادلی معتبر BBS و TUG اندازه‌گیری

جدول ۲- مقایسه‌ی میانگین تغییرات تست‌های تعادلی برگ (BBS) و آزمون زمان دار برخاستن و برگشتن (TUG) (قبل و بعد از مداخله) بین گروه‌های مورد و شاهد ، توسط آزمون T مستقل

تست‌های تعادلی	شاخص‌های آماری	میانگین تغییرات	انحراف معیار	اندازه t	درجه آزادی	سطح معناداری
تست تعادلی برگ		۵/۱۷	۶/۴۳	۰/۸۰	۳۲	<۰/۰۰۱
آزمون زمان دار برخاستن و برگشتن		-۳/۳۵	-۵/۰۹	۰/۶۵	۳۲	<۰/۰۰۱

مهمنترين نکته و نتيجه قابل بحث در اين مطالعه آن است که ميزان افزایش تعادل عملکردي در سالمندان گروه مورد بسیار چشمگير می باشد و این نکته، پاسخ يکی از مهمترین سوالات محقق برای اجرای پژوهش است. به عبارتی تعیین ميزان و گستره تاثيرگذاري تمرینات کششی و ماساژ و همچنین روند تاثيرگذاري طولاني مدت آنها يکی از مهمترین ابهامات موجود در مطالعات انجام شده بوده است. مکانیسم تاثيرگذاري مداخله حاضر بر تعادل عملکردي سالمندان به ۲ صورت قابل توجيه و تفسير می باشد:

(۱) تاثير بر گيرندهای حس عمقي / افزایش حس عمقي مفصلی: از آنجائیکه در مطالعات مختلف، عملکرد سیستم حسی پیکری به عنوان مهمترین منبع حسی برای کنترل وضعیتی در سالمندان مطرح گردیده است، به این ترتیب که ۷۵ تا ۶۰ درصد کل اطلاعات هنگام ایستاندن بر روی یک سطح با ثبات، توسط این سیستم به مراکز عصبی ارسال می گردد و با افزایش سن افت عملکردي آن اجتناب ناپذیر است(۲۱)، این مداخله توансته است به افزایش دروندادهای سیستم حسی پیکری کمک کرده باشد. از آنجائیکه براساس مطالعات مذکور، تقویت عوامل موثر در حفظ تعادل اعم از حس عمقي مفاصل می تواند به عنوان یک راهبرد اساسی در درمان و پیشگیری تعادل موثر باشد و تحريك گيرندهای لمس و فشاری پوست، عضلات و کپسول می تواند به بهبود حس عمقي مفصلی و در نتيجه به ثبات عملکردي مفصل کمک کند، بنابراین در مداخله حاضر که در طی تمامي مراحل اجرائي دست در تماس مستقilm با پوست بوده و تمامي تحريکات لامسه‌ای و عمقي گوناگون در قالب ماساژ و کشش استاتيک به ساختارهای فوق الذکر ارائه گردیده است، اين مداخله موجب فراهم شدن اطلاعات حس عمقي پوست گردیده و بر اين اساس توансنه است توانايی مج را برای پايش حرکات و وضعیت‌ها بالا ببرد. از اين‌رو کشش دستی و ماساژ توansasنه است حس عمقي را به نحوی تغيير دهد که بر کارايی تعادلی فرد اثر گذار بوده است. اين نکته با يافته های مطالعه Valliant و همکاران در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ که تاثيرآنی ماساژ را بر تعادل سالمندان سالم بررسی کردنده همخوانی دارند(۲۲).

همچنین يافته‌های Cheung و همکاران در سال ۲۰۰۸ نيز مويد اظهارات مذکور می باشد. ناميردگان تاثير تحريکات حس عمقي که از طريق Whole Body Vibration به مفاصل اندام تحتاني در وضعیت ایستاده داده می شد را بر تعادل سالمندان بررسی کردنده و توسط تست Reach Test تاثير گذاري اين مداخلات را اثبات نمودند(۲۳).

با توجه به نتایج بدست آمده از انجام آزمون t مستقل در جدول فوق، اختلاف میانگین تغييرات تست های تعادلی BBS و TUG در دو گروه مداخله و کنترل دارای تفاوت معناداري است ($p < 0.001$) و اين بدین معنی است که مداخلات انجام شده در گروه مداخله موثر بوده و باعث بهبود معنادار مهارت‌های تعادلی گردیده است. همچنین از بين تمامي متغيرات مطالعه، همبستگی‌های معنادار بدست آمده فقط مابين افزایش نمرة تست BBS و قد سالمندان ($P < 0.01$) و نيز افزایش نمرة تست BBS و وزن سالمندان ($P < 0.05$) بودند. رابطه معنا دار دیگری نيز بين متغيرات مطالعه و افزایش کارکردهای تعادلی یافت نشد.

در طول انجام مداخلات تحقيق نيز هیچگونه عارضه‌ی جانبی ماندگاری توسط نمونه‌ها گزارش نگردید.

بحث

براساس يافته‌های تحقيق مشخص گردید که اختلاف مدت زمان در انجام تست TUG و همچنین اختلاف نمرةی تست تعادلی BBS نيز بعد از مداخله بين دو گروه مورد و شاهد معنی دار بوده و اين به معنی تاثيرگذاري کشش دستی استاتيک و ماساژکف پا بر روی تعادل سالمندان می باشد. افزایش نمرةی تست تعادلی برگ و کاهش مدت زمان انجام تست TUG در سالمندان گروه مورد هر دو به معنی بهبود معيارهای تعادلی سالمندان مذکور می باشد.

اين نتایج مشابه يافته‌های مطالعه‌ی Handrakis و همکاران در سال ۲۰۱۰ برروی افراد میانسال ۴۰-۶۰ ساله می باشد که نشان دادند تمرینات Self stretching برای مدت ۱۰ دقیقه و بصورت ۳۰ ثانیه کشش و ۳۰ ثانیه استراحت در بخش تحتاني بدن منجر به افزایش تعادل پویا می گردد(۲۴).

يافته‌های تحقيق حاضر همچنین با نتایج مطالعه‌ی Costa و همکاران در سال ۲۰۰۹ نيز همخوانی دارد. محقق ۲۸ خانم ۳۵-۱۸ ساله را با تمرینات کششی ۱۵-۴۵ ثانیه‌ای تحت بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيد که اين تمرینات منجر به کاهش بي ثباتي وضعیتی و افزایش تعادل پویا می گردد(۲۵).

همچنین تاثيرگذاري تمرینات کششی در حوزه‌های دیگر عملکردي سالمندان نيز اثبات گردیده است. Kerrigan و همکاران در سال ۲۰۰۳ تاثير گذاري تمرینات کششی را بر روی راه رفتن ۹۲ سالمند بررسی کردنده. اين تمرینات ۲ بار در روز و به مدت ۱۰ هفته بصورت ۳۰ ثانیه کشش و ۳۰ ثانیه استراحت (به تعداد ۴ مرتبه) و توسط خود سالمندان انجام گردید(۲۶).

عملکرد موثر و کارا وجود دارد. به علاوه پیشنهاد می‌گردد مطالعات دیگری در خصوص انجام چنین مداخلات درمانی در آسایشگاه‌های سالمندان نیز انجام گردد. سالمندان ساکن آسایشگاه‌ها بدلیل محرومیت از حضور در اجتماع، عملکرد محدودتر و گذراندن مدت زمان بیشتری در تخت خواب، دچار محدودیت وضعیت حرکتی بیشتری در مفاصل و بافت نرم اندام تحتانی می‌باشند. بررسی نتایج اجرای چنین مداخلاتی بر روی عملکردهای تعادلی این گروه از سالمندان و مقایسه آن با نتایج پروژه حاضر، می‌تواند به ایجاد برنامه درمانی جامع و مدونی در ارتباط با تکنیک‌های بکاربرده شده، موثر باشد. همچنین شرایط مراقبت و نگهداری امروزی مراکز سالمندان، نیازمند متخصصین و تکنیک‌های درمانی خاصی است که علاوه بر تاثیرگذاری مناسب، در زمان نیز صرفه‌جویی نمایند. با توجه به اینکه بیشترین درصد سقوط سالمندان در حین راه رفتن اتفاق می‌افتد و مداخله حاضر منجر به افزایش تعادل پویا و عملکردی می‌گردد، این مداخله می‌تواند به خوبی توسط درمانگران و حتی پرسنل و مربی‌های آموزش دیده‌ی آسایشگاه‌های سالمندان به عنوان یک روش موثر انجام گردد و علاوه بر افزایش تعادل آنها، از عواقب بعدی سقوط‌های مکرر بخصوص شکستگی هیپ، فمور و دست جلوگیری نماید.

قدرتدازی

با امتنان از زحمات تمامی استادی دپارتمان کاردترمانی و فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تشکر و قدردانی ویژه خود را از حمایتهای بی‌شایبه مسئولین محترم آسایشگاه سالمندان زرمان کرج، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، مدیریت محترم رادیو البرز، مدیریت محترم آزمایشگاه حکیم کرج و همچنین تمامی سالمندان عزیز شرکت کننده در طرح، اذعان داشته و آرزوی سالمندی موفقی را برای این عزیزان خواهم داشت.

البته با وجود یافته‌های فوق، مطا لعاتی نیز وجود دارند که نتیجه‌های مخالف با یافته‌های فوق را نشان می‌دهند. نجاتی در سال ۱۳۸۹ با استفاده از بکار بردن بربس نرم مج پا در وضعیت‌های تعادلی گوناگون، تأثیر آنی اطلاعات حس عمقی را در ۲۲ سالمند بررسی نمود و به این نتیجه رسید که در مطالعه‌ی او استفاده از حمایت کننده‌های مفصلی موجب بهبودی عملکردهای تعادلی سالمندان نمی‌گردد که علت متضاد بودن نتیجه‌گیری این محقق می‌تواند به دلیل تفاوت در روش و نوع مداخله و نیز بررسی نکردن تأثیر طولانی مدت تحریکات بوده باشد(۲۳).

(۱) افزایش انعطاف پذیری و دامنه‌حرکتی مفاصل مج و پا:
بنابر آنچه که از ماهیت تکنیک بکاربرده شده بر می‌آید و همچنین نتایج بدست آمده از اغلب مقالات و مطالعات، افزایش دامنه‌حرکتی مفصل و انعطاف پذیری بافت نرم، از اثرات مستقیم کشش دستی می‌باشند. به دنبال افزایش دامنه‌حرکتی و انعطاف پذیری بافت نرم نیز عملکرد و حرکت مفصل در وضعیت‌های تعادلی گوناگون افزایش یافته و دامنه پاسخ‌های تعادلی و استراتژی‌های برگرداننده مرکز ثقل گسترش‌تر خواهند شد و این موضوع با مطالعه Mecagni در سال ۲۰۰۰ همخوانی دارد. دامنه‌حرکتی مج پا و تعادل عملکردی وجود دارد(۲۴).

همچنین Perrier و همکاران در سال ۲۰۱۱ و Herda و همکاران در سال ۲۰۱۱ اثبات نمودند که تمرینات کششی استاتیک و دینامیک بصورت آنی منجر به افزایش انعطاف پذیری و دامنه‌حرکتی مفاصل می‌گردد(۱۸،۱۹).

در مجموع از آنجاییکه توانایی تعادلی سالمندان برای جلوگیری از افتادن و حفظ حرکت و استقلال آنها در زندگی روزمره ضروری است، استفاده از مداخله حاضر به عنوان یک تکنیک بالینی ساده و بدون نیاز به استفاده از تجهیزات خاص، توصیه می‌گردد. چرا که در اکثر فعالیت‌های روزمره مانند راه رفتن، بالارفتن از پله، چرخیدن، لباس پوشیدن و غیره، نیاز به گیرنده‌های حسی پیکری و استراتژی‌های تعادلی مج پا برای

REFERENCES

- Pedretti LW, Early MB. Occupational therapy: Practice skills for physical dysfunction, St. Louis MO, Mosby; 2005;6:1169-93.
- Fathi Rezaee Z, Aslan-Ali M. Comparison of three functional balance scale in elderlies with and without Fall. Journal of Shahrood University of Medical Science 2009;5(1):22-27.
- Lord SR, Sherrington C, Menz H.B. Falls in older people: risk factors and strategies for prevention ,Cambridge Univ press 2007;3-4.

4. Kikuchi R, Kozaki K, Iwata A, Hasegawa H, Toba K. Evaluation of risk of falls in patients at a memory impairment outpatient clinic. *Geriatrics & Gerontology International* 2009;9(3):298-303.
5. Vaillant J, Rouland A, Martigné P, Braujou R, Nissen MJ, Caillat-Miousse JL, et al. Massage and mobilization of the feet and ankles in elderly adults: Effect on clinical balance performance. *Manual Therapy* 2009;14(6):661-64.
6. Vaillant J, Vuillerme N, Janvey A, Louis F, Braujou R, Juvin R, et al. Effect of manipulation of the feet and ankles on postural control in elderly adults. *Brain Research Bulletin* 2008;75(1):18-22.
7. Meyer PF, Oddsson LIE, De Luca CJ. The role of plantar cutaneous sensation in unperturbed stance. *Experimental Brain Research* 2004;156(4):505-12.
8. Magnusson MÅN, Enbom HÅK, Johansson R, Pyykkö I. Significance of pressor input from the human feet in anterior-posterior postural control: the effect of hypothermia on vibration-induced body-sway. *Acta Oto-Laryngologica* 1990;110(3-4):182-88.
9. Kavounoudias A, Roll R, Roll JP. The plantar sole is a'dynamometric map'for human balance control. *Neuroreport* 1998;9(14):32-47.
10. Hay L, Bard C, Fleury M, Teasdale N. Availability of visual and proprioceptive afferent messages and postural control in elderly adults. *Experimental Brain Research* 1996;108(1):129-39.
11. Van Deursen R, Simoneau G. Foot and ankle sensory neuropathy, proprioception, and postural stability. *The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy* 1999;29(12):71-78.
12. Skinner HB, Barrack RL, Cook SD. Age-related decline in proprioception. *Clinical Orthopaedics and Related research* 1984;18(4):20-28.
13. Handrakis JP, Southard VN, Abreu JM, Aloisa M, Doyen MR, Echevarria LM, et al. Static stretching does not impair performance in active middle-aged adults. *The Journal of Strength & Conditioning Research* 2010;24(3):82-87.
14. Costa PB, Graves BS, Whitehurst M, Jacobs PL. The acute effects of different durations of static stretching on dynamic balance performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research* 2009;23(1):14-19.
15. Kerrigan D. Effect of a hip flexor stretching program on gait in elderly. *Arch Phys Med Rehab* 2003;20(2):84-89.
16. Mirzaee GH, Noori-zadeh S. Comparison of functional balance in elderlies with and without total hip arthroplasty. *Iranian Journal of Ageing* 2009;8(13):21-26.
17. Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods: USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006;4:210-20.
18. Herda TJ, Costa PB, Walter AA, Ryan ED, Hoge KM, Kerksick CM, et al. Effects of Two modes of static stretching on muscle strength and stiffness. *Medicine & Science in Sports & Exercise* 2011;43(9):17-27.
19. Perrier ET, Pavol MJ, Hoffman MA. The Acute effects of a warm-Up including static or dynamic stretching on countermovement jump height, reaction time, and flexibility. *The Journal of Strength & Conditioning Research* 2011; 25(7):19-25.
20. Davatgaran T.K. [Translation and adaptation of Berg scale to Farsi language in Iranian Geriatrics (Persian)]. Thesis for master in physical therapy. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2005.
21. Noobahar M, Nejati V, Hoseini A. A Comparison of age related balance variables in elderlies and young people. *Salmand Iranian Journal of Ageing* 2010(15):6-12.
22. Cheung KKW, Au KY, Lam WWS, Jones AYM. Effects of a structured exercise programme on functional balance in visually impaired elderly living in a residential setting. *Hong Kong Physiotherapy Journal* 2008;26(1):45-50.
23. Nejati V. Efficacy of ankle joint soft braces on elderlies static and dynamic balance. *Academic Journal of Medical Organization of IRI* 2010;28(3):5-9.
24. Mecagni C, Smith JP, Roberts KE, O'Sullivan SB. Balance and ankle range of motion in community-dwelling women aged 64 to 87 years: a correlational study. *Physical Therapy* 2000;80(10):1004-11.

Randomized Clinical Trial of manual static stretch and massage of the feet and ankle joints on balance of male elderlies

Safakheil H¹, Olyaei G.R^{2*}, Abdolvahab M³, Raji P³, Attarbashi B⁴, Baghestani A⁵, Molaei A⁶

1. M.Sc of Occupational Therapy

2. Full Professor of Tehran University of Medical Sciences

3. Lecturer of Tehran University of Medical Sciences

4. Assistant Professor of Tehran University of Medical Sciences

5. Department of Biostatics, Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6. M.Sc of Physical Therapy

Abstract

Background and Aim: Improving the affecting factors of balance could be a critical procedure in managing the elderly's balance dysfunction. The goal of this study is to find out how and to which amount a prolonged period of stretch and massage impact on elderly's balance.

Materials and Methods: In this RCT study with a simple randomized case selection, 205 normal subjects screened and after that, 18 subject (74.6 ± 5.45 Years) for intervention group and 17 (75.8 ± 4.27 Years) subjects for control group contributed for the study. The procedure was 15 sessions in 5 weeks (3 sessions per week). Each session last about 1 hour. Berg Balance Scale (BBS) and Timed Up and Go (TUG) were used for evaluation of balance.

Results: Using by SPSS-19 software and after independent T-test, significant differences in balance scales were found between the intervention and the control groups ($p < 0.05$).

Conclusion: According to present evidence, stretch and massage are significantly effective on elderly's balance function.

Key words: Balance, Manual stretch, Elderly, Massage.

***Corresponding Author:** Dr. Gholam Reza Olyaei, Rehabilitation Faculty, Tehran University of Medical Sciences.

Email: Olyaeigh@sina.tums.ac.ir

This research was supported by Tehran University of Medical Sciences (TUMS)