



بررسی میزان کلیفرم کل، کلیفرم گرمای و کلر باقی مانده آب استخراهای شنای سرپوشیده شهر کرمانشاه در سال های ۱۳۸۸-۹۰

نویسنده‌گان: کیومرث شرفی^۱، مقدماد پیرصاحب^۲، امیر کرمی^۳، مسعود مرادی^۴

۱. مری گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲. داشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۳. دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

۴. نویسنده مسئول: عضو مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن: ۰۹۱۸۳۸۵۹۹۱۰ Email: mahfooz60@gmail.com

طلوع بهداشت

چکیده

مقدمه: مطلوب بودن پارامترهای کلرباقیمانده، کلیفرم کل و باکتری‌های گرمای پاچی نشان دهنده تامین حداقل استاندارد آب استخراها می‌باشد که در پایش کیفی آب آنها اهمیت فراوانی را دارد. لذا در این مطالعه، کیفیت آب ۱۷ استخرا سرپوشیده شهر کرمانشاه از نظر کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و کلرباقیمانده مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: این پژوهش یک نوع مطالعه توصیفی - تحلیلی می‌باشد. در این تحقیق، در کل ۱۲ ماه سال به مدت سه سال پیاپی، کیفیت آب ۱۷ استخرا سرپوشیده شهر کرمانشاه با برداشت ۶۱۸ نمونه از نظر کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و کلرباقی مانده مورد بررسی قرار گرفت. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایشها طبق روش استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب انجام گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که مطلوب‌ترین و نامطلوب‌ترین کیفیت آب از نظر کلرباقی مانده به ترتیب مربوط به استخراهای C و L و (P و I) بود. مطلوب‌ترین و نامطلوب‌ترین کیفیت نیز از نظر کلیفرم گرمای مربوط به استخراهای (C و I) و (G و H) می‌باشد. از نظر کلرباقی مانده، فوردهن و اردبیهشت ماه کمترین مطلوبیت و مهر و آبان ماه بیشترین مطلوبیت و از نظر کلیفرم مدفوعی، مرداد و شهریور کمترین مطلوبیت و آذر و دی بیشترین مطلوبیت را به خود اختصاص دادند. روند مطلوبیت کیفیت آب استخراها از نظر کلرباقی مانده و کلیفرم مدفوعی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ یک روند صعودی بوده و از نظر فصل، کمترین مطلوبیت مربوط به فصول بهار و تابستان و بیشترین مطلوبیت مربوط به پاییز و زمستان بود. از هر دو نظر کلرباقی مانده و کلیفرم مدفوعی، استخراها صرفاً مردانه بیشتر مطلوبیت، نوع صرفاً زنانه‌ی آن کمترین مطلوبیت و نوع زنانه-مردانه، حالت بینایی دو نوع فوق الذکر را دارا بود.

نتیجه گیری: روند نظارتی و بازرگانی مأمورین بهداشت محیطی در پایش کیفیت آب استخراها، تأثیر مثبتی در ارتقاء کیفیت آب استخراها در طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. با توجه به نتایج، هر چند که کیفیت آب استخراها از نظر پارامترهای مورد بررسی در حد تقریباً مطلوبی قرار دارد اما باید در فصول گرم بویژه در استخراها صرفاً زنانه و استخراها با منع تأمین آب شهری نسبت به سایر استخراها، نظارت بیشتری صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: آب استخرا شنا، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، کلرباقی مانده، کرمانشاه

فصلنامه علمی پژوهشی

دانشکده بهداشت یزد

سال سیزدهم

شماره: چهارم

مهر و آبان ۱۳۹۳

شماره مسلسل: ۴۶

تاریخ وصول: ۱۳۹۱/۸/۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۴/۴



مقدمه

پایش های روتین بررسی و اندازه گیری آنها بسیار مهم است و در صورت نامطلوب بودن این پارامترها، سایر پارامترهای میکروبی نظیر قارچ، انگل، سودوموناس آئروژنیزا و... ممکن است در حد استاندارد نباشند و این امر موجب شیوع بیماری های مختلف در بین شناگران شود.

در ارتباط با ارزیابی کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی آب استخرها، در ایران و جهان مطالعات زیادی صورت گرفته است بطور نمونه راستی (۲۰۱۱) و علمدار (۲۰۰۹) ویژگی های فیزیکوشیمیایی، انگلی و باکتریایی استخرهای سرپوشیده شهرهای کاشان و کرمان را مورد مطالعه قرار داده اند(۴،۶) و همچنین لطفی (۲۰۰۹) برخی از فاکتورهای بهداشت محیطی استخرهای شهر یاسوج و کارگر (۲۰۰۸) ویژگی های باکتریولوژیکی و فیزیکوشیمیایی استخرهای سرپوشیده شهر یزد را مورد بررسی قرار داده اند(۷،۸). در مطالعه باریک بین (۲۰۰۵) و نیک آین (۲۰۱۱) پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی استخرهای شهر بیرونی و اصفهان بررسی شده اند (۹،۱۰). Rabi (۲۰۰۲) نیز شرایط بهداشتی استخرهای شنا عمومی در امان (اردن) را مورد بررسی قرار داده است (۱۱).

اما مطالعه ای که در طی چند سال پیاپی و با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون ماه، فصل، نوع استخر، سیستم گندزدایی، منبع تأمین آب و غیره باشد النجام نشده است. لذا در این مطالعه سعی بر این است که استخرهای سرپوشیده شهر کرمانشاه از نظر کیفیت میکروبی (کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی) و میزان کلر باقیمانده مورد بررسی قرار گیرند.

استخرهای شنا به علت حضور قشرهای مختلف جامعه در آنها وجود محیط مناسب جهت انتقال بیماریهای مختلف حائز اهمیت بهداشتی فراوان می باشند، زیرا در اثر اضافه شدن موادی از بدن شناگران مانند مو، چربی، میکروب های دستگاه تنفسی، گوارشی، تناسلی و سایر باکتریهای مضر و مواد زاید موجود بر روی پوست بدن، آب استخرها آلوده شده و چون میزان این آلودگی بر اثر شمار و استفاده افراد مختلف به طور مرتب رو به افزایش است، عده زیادی از مردمی که از آب استخر استفاده می کنند در معرض ابتلا به بیماری های مختلف می باشند (۱، ۲). امروزه کاملا ثابت شده است که شناکردن در استخرها یکی از راه های انتقال بیماری های عفونی در جهان می باشد(۳)، لذا با توجه به اهمیت شنا کردن در سلامت جسم و روان و جنبه آب درمانی بیماریها ، رعایت بهداشت و استانداردها در استخرهای شنا حائز اهمیت بوده و انجام آزمون های میکروبیولوژی آب استخرهای شنا برای تعیین کیفیت بهداشتی آب ضروری است (۴،۵).

مطابق استاندارد ایران (آب استخرهای شنا - ویژگی های میکروبیولوژیکی) میزان باکتری های گرمایی کمتر از ۱ عدد در ۱۰۰ میلی لیتر، pH بین ۸-۷/۲ و کلر باقیمانده ۱-۳ میلی گرم در لیتر می باشد (۵). با توجه به اینکه کیفیت آب استخرها بسته به نوع استخر (مردانه، زنانه و مردانه - زنانه)، فصل و ماه (کثیر مراجعت)، سیستم تصفیه و گندزدایی و منبع آب متفاوت می باشد، مطلوب بودن پارامترهای کلر باقیمانده، کلیفرم کل و باکتری های گرمایی نشان دهنده تامین حداقل استاندارد آب استخرها می باشد و در



روش بررسی

نظر گرفته شد و بالاتر از محدوده های مذکور برای دو پارامتر مورد بررسی (کلیفرم کل و کلیفرم گرمایی) بعنوان نمونه های نا مطلوب تلقی شد (۵).

برای اینکه اخلاق در پژوهش توسط محققین رعایت شده باشد، هر یک از استخراها، با کدهای A تا Q نامگذاری شد. در میان استخراها مورد بررسی، استخر K صرفاً زنانه، استخراها M و O صرفاً مردانه و سایر استخراها بطور شیفتی، زنانه-مردانه بودند. در بین ۱۷ استخر مورد بررسی، تنها استخراها E و L فاقد سونا و جکوزی بوده و همچنین از میان این استخراها، فقط استخراها J و O از فرآیند گندздایی، کلر+ازن استفاده می کردند، در بقیه موارد صرفاً از فرآیند کلرزنی استفاده می شد. آب مورد نیاز ۲ استخر (P و Q) از شبکه توزیع آب شهری تأمین می شد و منبع تأمین آب سایر استخراها، آب چاه بود.

با توجه به نمونه های برداشتی در هر سال یا فصل خاص، استخراها مورد بررسی به عنوان گروه های برداشت نمونه در نظر گرفته شدند بدین معنی که فراوانی مطلوبیت نمونه ها از لحاظ میکروبی و کلرزنی در گروه ها (استخراها) برای هر سال یا فصل خاص محاسبه شد و در نهایت ارتباط درصد فراوانی مطلوبیت نمونه ها (از لحاظ کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی) با سال های مورد بررسی، فصول و ماه های مختلف سال با استفاده از آزمون Chi-square در سطح معناداری ($\alpha=0.05$) مورد بررسی قرار گرفت. برای سایر متغیرها (ماه های سال، نوع سیستم گندздایی، استخراها مورد بررسی وغیره) نیز چنین روال مشابهی اجرا گردید.

برای انجام این تحقیق که بصورت تصویفی- مقطعی انجام شد، در طی سه سال مطالعه، جمعاً ۶۱۸ نمونه از کلیه استخراها سرپوشیده شهر کرمانشاه (۱۷ استخر) برداشت گردید. بدین صورت که نمونه ها از عمق ۳۰ - ۲۰ سانتی متری آب استخر جمع آوری شد و در کمتر از یک ساعت نمونه های برداشتی طبق شرایط استاندارد (در icebox) جهت سنجش میزان آلدگی به کلیفرم کل و کلیفرم مدفعی به آزمایشگاه میکروبیولوژی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه منتقل شد. سنجش میزان کلرباقی مانده در محل برداشت نمونه توسط دستگاه Palintest انجام شد. کلیه مواد مصرفی در انجام آزمایشها، از شرکت مرک (Merck) خریداری گردید. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایشات طبق روش استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب و دستورالعمل های مندرج در ارتباط با کیفیت میکروبی آب استخراها شنا که از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی منتشر شده است، انجام گرفت (۱۲، ۱۳). برای تعیین میزان مطلوب و یا نا مطلوب بودن، میزان کلر باقی مانده، کلیفرم کل (MPN) و کلیفرم مدفعی آب استخراها مورد بررسی با میزان استاندارد اعلام شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقایسه شد. بطوریکه میزان کلر باقی مانده (۳-۱ میلی گرم در لیتر)، بعنوان میزان مطلوب و خارج از این محدوده بعنوان میزان نامطلوب در نظر گرفته شد. میزان کلیفرم کل کمتر از ۴۶۰ عدد و کلیفرم گرمایی کمتر از ۱ عدد در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه بعنوان نمونه های مطلوب از نظر دو پارامتر فوق الذکر در



یافته ها

مانده صفر، صفر تا ۱، ۱ تا ۳ و بیشتر از ۳ میلی گرم در لیتر به ترتیب در ۱۴/۶٪، ۳۰/۴٪، ۵۳/۷٪ و ۱/۳٪ نمونه های برداشتی خود را نشان داد. محدوده MPN /۱۰۰ cc صفر، صفر تا ۴۶۰ و بیشتر از ۴۶۰ برای کلیفرم کل به ترتیب در ۸۲/۵٪، ۱۵/۴٪ و ۱/۲٪ نمونه های برداشتی نشان داده شد. همچنین بر اساس نتایج مشخص شد که ۸۷/۴٪ نمونه های برداشتی از نظر MPN /۱۰۰ cc برای کلیفرم مدفعی در محدوده صفر تا ۱ و ۱۲/۶٪ نمونه های نیز از این نظر دارای MPN /۱۰۰ cc بیشتر از ۱ بودند.

درصد نمونه های برداشتی مطلوب و نامطلوب آب استخراهای سرپوشیده شهر کرمانشاه از لحاظ کلر باقی مانده، کلیفرم کل و کلیفرم گرمایپایی به تفکیک هر یک از استخراها در جدول ۱، بر اساس ماه های سال در جدول ۲، بر اساس متغیرهای مختلف دیگر (سال های مورد بررسی، فصل، نوع استخر از نظر مردانه-زنانه بودن، نوع منبع تأمین آب و سیستم گندزدایی) در جدول ۳ نشان داده شده است. علاوه بر موارد فوق نتایج نشان داد که محدوده کلر باقی

جدول ۱: درصد نمونه های برداشتی مطلوب و نامطلوب آب استخراهای سرپوشیده شهر کرمانشاه از لحاظ کلر باقیمانده، کلیفرم کل و کلیفرم

گرمایپایی به تفکیک استخراها در طی سال های ۹۰-۱۳۸۸

کد استخ	تعداد نمونه های کلر باقی مانده	کل کلیفرم نامطلوب	کلیفرم گرمایپایی نامطلوب	کد استخ	تعداد نمونه های کلر باقی مانده	کل کلیفرم نامطلوب	کلیفرم گرمایپایی نامطلوب
۱۹/۲	۸۷/۸	۰	۱۰۰	۳۸/۵	۶۱/۵	۲۶	A
۱۵/۶	۸۴/۴	۶/۵۲	۹۳/۵	۵۳	۴۶/۶	۴۶	B
۲/۵	۹۷/۵	۰	۱۰۰	۳۱/۷	۶۸/۳	۴۱	C
۱۲/۷	۸۷/۳	۰	۱۰۰	۵۴/۵	۴۵/۵	۵۲	D
۳/۶	۹۶/۴	۰	۱۰۰	۳۹/۳	۶۰/۷	۲۸	E
۱۶/۱	۸۳/۹	۱/۸	۹۸/۲	۴۱/۱	۵۸/۹	۵۵	F
۲۳/۴	۷۶/۴	۵/۵	۹۴/۵	۵۴/۵	۴۵/۵	۵۵	G
۳۰/۴	۶۹/۶	۸/۷	۹۱/۳	۷۴	۲۶	۲۳	H
۲/۸	۹۷/۲	۰	۱۰۰	۵۵/۵	۴۴/۵	۳۶	I
۱۰/۶	۸۹/۴	۰	۱۰۰	۴۲/۵	۵۷/۵	۴۷	J
۱۷/۵	۸۲/۵	۷/۵	۹۲/۵	۵۰	۵۰	۴۰	K
۷/۴	۹۲/۶	۰	۱۰۰	۳۷/۱	۶۲/۹	۲۷	L
۱۲/۵	۸۷/۲	۳/۲	۹۶/۸	۳۷/۵	۶۲/۵	۳۲	M
۶/۷	۹۳/۳	۳/۲	۹۶/۸	۴۰	۶۰	۳۱	N
۶/۵	۹۳/۵	۰	۱۰۰	۳۸/۷	۶۱/۳	۳۱	O
۱۳/۱	۸۶/۹	۰	۱۰۰	۶۰/۹	۳۹/۱	۲۳	P
۸/۷	۹۱/۳	۰	۱۰۰	۴۷/۸	۵۲/۲	۲۳	Q
۱۲/۳	۸۸	۵/۲	۹۷/۸	۴۶/۸	۴۸/۹	-	میانگین کل



مشاهده گردید ($P < 0.05$) اما در ارتباط با درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخراج های مورد بررسی با نوع سیستم گندزدایی و نوع منع تأمین آب ارتباط معناداری مشاهده نشد ($P > 0.05$).

نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخراج های مورد بررسی با سال های بررسی ، فصول و ماه های مختلف سال و نوع استخراج (هم از کیفیت میکروبی و هم از لحاظ وضعیت کلریزی) ارتباط معناداری وجود دارد و چنین موضوعی هم برای خود استخراجها

جدول ۲: درصد نمونه های برداشتی مطلوب و نامطلوب آب استخراج های شهر کرمانشاه از لحاظ کلرباقی مانده، کلیفرم کل و کلیفرم گرمابای بر اساس ماه های سال در طی سال های ۱۳۸۸-۹۰

ماه	تعداد نمونه های برداشتی	کلریزی مانده	کل کلیفرم مطلوب	کل کلیفرم نامطلوب	مطلوب	نامطلوب	کلیفرم گرمابای مطلوب	کلیفرم گرمابای نامطلوب
فروردین	۴۷	۳۴/۰۴	۶۵/۹۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۸۹/۳	۱۰/۷
اردیبهشت	۴۷	۴۰/۴۲	۵۹/۵۷	۹۵/۷	۴/۳	۹۵/۷	۸۷/۳	۱۲/۷
خرداد	۶۰	۵۰	۵۰	۹۸/۳	۱/۷	۹۸/۳	۷۸/۳	۲۱/۷
تیر	۷۹	۴۴/۴۳	۵۵/۷	۹۸/۷	۱/۳	۹۸/۷	۸۶	۱۴
مرداد	۵۸	۴۱/۴	۵۸/۶	۹۶/۵	۲/۵	۹۶/۵	۸۴/۲	۱۵/۸
شهریور	۳۸	۶۰/۵	۳۹/۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۸۴/۲	۱۵/۸
مهر	۳۸	۶۳/۲	۳۶/۸	۹۴/۸	۵/۲	۹۴/۸	۸۹/۵	۱۰/۵
آبان	۵۸	۷۰/۷	۲۹/۳	۹۸/۳	۱/۷	۹۸/۳	۹۱/۳	۸/۷
آذر	۶۱	۵۹/۰۱	۴۰/۹۹	۹۸/۳	۱/۷	۹۸/۳	۹۶/۷	۳/۳
دی	۵۶	۶۷/۸	۳۲/۲	۴۳/۵	۵۶/۵	۴۳/۵	۸۷/۵	۱۲/۵
بهمن	۵۳	۴۳/۵	۵۶/۵	۵۳/۷	۴۶/۳	۵۳/۷	۸۶/۹	۱۳/۱
اسفند	۲۳	۵۳/۷	۴۶/۳	۵۳/۷	۴۶/۳	۵۳/۷	۸۶/۹	۱۳/۱
میانگین	-	۴۸/۲	۴۷/۶	۵۹/۹	۱۳/۹	۵۹/۹	۸۷/۳	۱۲/۹



جدول ۳: درصد نمونه های برداشتی مطلوب و نامطلوب آب استخراهای شهر کرمانشاه از لحاظ کلرباقی مانده، کلیفرم کل و کلیفرم گرمایشی بر اساس متغیرهای مختلف در طی سال های ۹۰-۱۳۸۸

متغیر	تعداد نمونه	کلرباقی مانده	کل کلیفرم	کلیفرم گرمایشی	نامطلوب	مطلوب	نامطلوب	مطلوب	نامطلوب	مطلوب	نامطلوب	مطلوب
سال	۱۳۸۸	۱۴۹	۳۸/۲	۶۱/۸	۹۷/۹	۲/۱	۸۳/۲	۸۵/۲	۳/۳	۹۶/۷	۸۰/۲	۱۶/۸
۱۳۸۹	۲۱۶	۴۱/۶	۵۸/۴	۵۲/۳	۹۷/۸	۲/۲	۸۶/۷	۸۴/۴	۲	۹۷/۸	۹۱/۷	۱۴/۸
۱۳۹۰	۲۵۳	۷۳/۱	۳۶/۹	۹۸/۸	۱/۲	۹۱/۷	۸۶/۳	۸۷/۱	۰/۸	۹۷/۲	۸۵	۸/۳
میانگین	-	۵۰/۹	۵۲/۳	۹۷/۸	۲/۲	۸۶/۷	۸۴/۴	۸۴/۶	۱/۲	۹۷/۲	۸۵	۱۵/۶
فصل	۱۵۴	۴۲/۲	۵۷/۸	۹۸	۹۷/۸	۹۷/۸	۹۱/۷	۸۶/۳	۱۳/۸	۸۶/۲	۸۷/۱	۱۳/۷
تابستان	۱۷۵	۴۶/۸	۵۳/۲	۹۷/۲	۲/۸	۸۵	۸۵	۸۷/۱	۰/۸	۹۹/۲	۸۷/۹	۱۲/۹
پاییز	۱۵۷	۶۴/۳	۳۵/۷	۸۶/۲	۱۳/۸	۱۳/۸	۹۱/۷	۸۶/۲	۱۳/۷	۸۶/۲	۸۷/۱	۱۳/۷
زمستان	۱۳۲	۶۳/۷	۳۶/۳	۸۶/۲	۱۳/۸	۱۳/۸	۹۱/۷	۸۶/۳	۱۳/۷	۸۶/۲	۸۷/۱	۱۲/۹
میانگین	-	۵۴/۲	۴۵/۷	۹۵/۱	۴/۸	۸۵/۷	۸۵/۷	۸۴/۶	۱/۲	۹۸/۸	۸۶/۸	۱۴/۳
مردانه	۹۱	۶۰/۴	۳۹/۶	۹۸/۹	۱/۱	۹۱/۲	۹۱/۲	۹۱/۲	۰/۸	۹۹/۲	۹۷/۲	۸/۸
نوع استخر	۴۸۸	۵۲/۶	۴۷/۴	۹۸/۱	۱/۹	۸۶/۸	۸۶/۸	۸۶/۸	۱/۹	۹۸/۱	۸۶/۸	۱۳/۲
مردانه-زنانه	۳۹	۵۱/۲	۴۸/۷	۹۸/۸	۱/۲	۸۴/۶	۸۴/۶	۸۴/۶	۱/۲	۹۸/۸	۸۷/۵	۱۵/۴
زنانه	-	۵۴/۷	۴۵/۲	۹۵/۱	۴/۸	۸۵/۷	۸۵/۷	۸۴/۶	۱/۴	۹۸/۶	۸۷/۱	۱۲/۴
میانگین	۱۱۷	۵۳/۸	۴۶/۲	۹۷/۴	۲/۶	۸۸	۸۸	۸۷/۲	۲	۹۸	۸۷/۲	۱۲/۸
گندزدایی	۵۰۱	۵۳/۷	۴۶/۳	۹۸	۲	۸۷/۲	۸۷/۲	۸۷/۶	۲/۳	۹۷/۷	۸۷/۶	۱۲/۴
میانگین	-	۵۳/۷۵	۴۶/۲۵	۹۷/۷	۰	۱۰۰	۸۸/۸	۸۸/۸	۰	۱۰۰	۸۷/۶	۱۲/۲
منبع تأمین	۴۵	۵۴/۴	۴۵/۶	۹۵/۱	۱۰۰	۸۸/۸	۸۸/۸	۸۷/۲	۲/۳	۹۷/۷	۸۷/۲	۱۲/۸
آب شهری	۵۷۳	۴۴/۴	۵۵/۶	۹۷/۷	۹۷/۷	۸۷/۲	۸۷/۲	۸۷/۲	۲/۳	۹۷/۷	۸۷/۲	۱۲/۸
آب	-	۴۹/۴	۵۰/۶	۹۸/۸	۱/۱	۸۸	۸۸	۸۷/۵	۱/۱	۹۸/۸	۸۸	۱۲/۵
میانگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

بحث و نتیجه گیری

نظر مربوط به استخراهای P(۱/۳۹٪) و I(۵/۴۴٪) بود. مطلوبترین

کیفیت آب از نظر کلیفرم کل مربوط به C(۵/۹۷٪) و I(۵/۹۷٪)

مانده در تطابق با میزان استاندارد، مربوط به استخراهای G(۴/۷۶٪) و H

(۶/۷۶٪) می باشد.

نتایج نشان داد که مطلوبترین کیفیت آب استخراها از نظر کلرباقی

مانده در تطابق با میزان استاندارد، مربوط به استخراهای C(۳/۶۸٪)

تعداد نمونه های برداشتی) و L(۹/۶۲٪) و نامطلوبترین آن از این



های فصل پاییز) می باشد (۱۷، ۱۶، ۱۴، ۱۱، ۱۰). شایان ذکر است که از نظر وضعیت کلرباقی مانده، رعایت اصول کلربزنی توسط اپراتور و متقدیان استخراها از نظر میزان کلر افزوده شده به آب (با توجه به کیفیت آب و میزان کلر خواهی آن) در جهت تأمین کلرباقی مانده کافی، می تواند فاکتور اصلی و تأثیرگذار در متفاوت بودن کیفیت آب استخراها در ماه های مورد بررسی باشد (۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۱).

نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخراهای کرمانشاه هم از لحاظ میکروبی و هم کلربزنی با سال های مورد بررسی ارتباط معناداری وجود دارد ($P < 0.05$). بطوری که روند مطلوبیت کیفیت آب استخراها از نظر کلرباقی مانده و کلیفرم کل و مدفوعی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۸ یک روند صعودی را نشان داد. این موضوع حاکی از آن است که پایش و نظارت مسئولین بهداشت محیطی و مدیران استخراها در ارتباط با وضعیت بهداشت محیطی استخراها، بویژه کیفیت میکروبی آب این اماکن با توجه به حساسیت بالای آن، روز به روز دقیق تر و در طی زمان، وضعیت مذکور مطلوب تر شده است.

همچنین نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخراهای کرمانشاه هم از لحاظ میکروبی و هم کلربزنی با فصول سال ارتباط معناداری وجود دارد ($P < 0.05$). بطوری که از نظر فصل، کمترین مطلوبیت کیفیت میکروبی و وضعیت کلربزنی، مربوط به فصول بهار و تابستان و بیشترین مطلوبیت مربوط به پاییز و زمستان بود. همچنان که ذکر

تفاوت کیفیت میکروبی و وضعیت کلربزنی آب استخراهای مورد بررسی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در وهله اول میزان آگاهی و نگرش مدیران و متقدیان استخراها به اهمیت کیفیت آب استخراها جهت تأمین سلامت شناگران و نظارت و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت آب استخراها (از جمله کلربزنی مناسب و بجا) و در وهله دوم نظارت مأمورین بهداشت محیطی بر این کیفیت از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مختلف بودن کیفیت میکروبی و وضعیت کلربزنی آب استخراها می تواند باشد. علاوه بر آن، رعایت بهداشت فردی توسط شناگران، وضعیت بهداشت محیطی استخراها، استحمام قبل از شنا کردن و... می تواند در متفاوت بودن کیفیت میکروبی آب استخراها مؤثر باشد (۲-۱۶).

نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخراهای کرمانشاه هم از لحاظ میکروبی و هم کلربزنی با ماه های سال ارتباط معناداری وجود دارد ($P < 0.05$). بطوری که از نظر کلرباقی مانده، فروردین و اردیبهشت کمترین مطلوبیت (به ترتیب برابر با $42/4\%$ ، $34/0\%$ و $40/0\%$) دارند. تعداد نمونه های برداشتی (مهربانی و آبان) (به ترتیب با $63/2\%$ و $70/7\%$) بیشترین مطلوبیت را دارا بودند، علاوه بر آن از نظر کلیفرم مدفوعی، مرداد و شهریور کمترین مطلوبیت (هر دو با $84/2\%$ و $91/3\%$ و $96/7\%$) را آبان و آذر بیشترین مطلوبیت (به ترتیب برابر با $91/3\%$ و $96/7\%$) را به خود اختصاص دادند. این موضوع حاکی از آن است که با توجه به تکرار استفاده از آب استخراها و گرمای هوا در ماه های گرم، کیفیت میکروبی آب استخراهای مورد بررسی در فصول گرم (از جمله ماه های فصل بهار) نا مطلوب تر از فصل سرد (از جمله ماه



آب را تامین کندو همچنین در سیستم های گندزدایی ترکیبی که گندزدایی توسط ازن صورت می گیرد و به دلیل عدم وجود باقیمانده آن در آب جهت کنترل آلودگی ثانویه کلرزنی استفاده می شود لذا تفاوت آنچنانی بین کیفیت میکروبی آب استخرها مشاهده نشد(۱۵،۱۱).

نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخر های کرمانشاه هم از لحاظ میکروبی و هم کلرزنی با منبع تأمین آب استخر ارتباط معناداری وجود ندارد($P > 0.05$). بطوری که از هر دو نظر کلرباقی مانده و کلیفرم مدفوعی، استخرهای با منبع تأمین آب شهری کیفیت مطلوبتری نسبت به استخرهای با منبع تأمین آب چاه داشتند هر چند که این اختلاف مطلوبیت ناچیز بود. هر چند که از نظر کیفیت میکروبی، آلودگی آب استخرها، عمدتاً آلودگی ثانویه می باشد اما احتمالاً تفاوت کیفیت شیمیایی آب چاه و آب شهری بر میزان کلر خواهی و یا محافظت میکروب ها در برابر گندزدایی تأثیر گذار باشد؛ و همچنین با توجه به اینکه آب شهری خود دارای کلرباقیمانده می باشد در نتیجه در متفاوت بودن کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی آب استخرها می تواند مؤثر باشد اما معنادار نمی باشد(۱۵).

در سال های اخیر مطالعات وسیعی در خصوص بهداشت استخرها و پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آنها صورت گرفته است، در مطالعه علمدار و همکارانش میانگین میزان کلر باقی مانده (ppm) $2/53 \pm 1/55$ ، $pH (7/8 \pm 0/31)$ در حد استاندارد و $8/8\%$ از نمونه ها دارای آلودگی باکتریایی بوده است(۵). مطالعه لطفی و

شد، با توجه به تکرار استفاده شناگران از آب استخرها، گرمای هوای مراجعة بیشتر مردم در فصول گرم به استخرها و با عنایت به اینکه سطح سرانه هر شناگر $1/8$ مترمربع است و براساس مطالعات قبلی بین میزان کلیفرم کل و مساحت استخر با $P < 0.05$ ارتباط معنی داری به صورت معکوس وجود دارد لذا کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی آب استخر ها در فصول گرم (بهار و تابستان) نا مطلوب تر از فصول سرد (پاییز و زمستان) می باشد (۱۸، ۱۴، ۱۱، ۹، ۲).

نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخر های کرمانشاه هم از لحاظ میکروبی و هم کلرزنی با نوع استخر ارتباط معناداری وجود دارد($P < 0.05$). بطوری که هم از نظر کلرباقی مانده و هم از نظر کلیفرم مدفوعی، استخرهای صرفاً مردانه بیشترین مطلوبیت و نوع صرفاً زنانه ی آن، کمترین مطلوبیت و نوع زنانه-مردانه، حالت بینیانی دو نوع فوق الذکر را دارا بودند. این موضوع می تواند بدليل استفاده بیشتر مواد آرایشی توسط خانم ها و نیز بیشتر بودن ترشحات در میان زنان نسبت به مردان باشد که باعث مصرف کلرباقیمانده استخر شده و به تبع آن کیفیت میکروبی کاهش می یابد(۱۹، ۱۵).

همچنین نتایج آزمون آماری کای دو (Chi-square) نشان داد که درصد فراوانی مطلوبیت نمونه های برداشتی در استخر های کرمانشاه هم از لحاظ میکروبی و هم کلرزنی با نوع سیستم گندزدایی آب استخر ارتباط معناداری وجود ندارد($P > 0.05$). زیرا از نظر نوع سیستم گندزدایی (کلر زنی یا کلر + ازن زنی) با توجه به اینکه بار میکروبی آب استخرها در حدی است که اگر میزان کلرباقیمانده در محدوده استاندارد باشد کلرزنی می تواند مطلوبیت کیفیت میکروبی



کلر باقیمانده در ۲۲/۸ درصد نمونه ها در حد استاندارد، ۷۷/۲ درصد خارج از حد استاندارد و از لحاظ شمارش کل باکتریهای موجود در آب، ۴۵/۲ درصد نمونه ها در حد استاندارد و ۵۴/۸ درصد آنها خارج از حد استانداردمی باشد(۲۰). مطالعه Rabi و همکارانش در کشور اردن نشان داد مطلوبیت آب استخرها از نظر پارامترهای میکروبی ۵۶/۵٪، کلر باقیمانده ۴۹/۴٪، pH ۸۷/۷٪ و با افزایش زمان، کیفیت میکروبی کاهش یافته است(۲۱). در مطالعه lika و همکارانش میزان کلیفرم کل، اشرشیاکلی و استرپتوکوک Dingman مدفوعی بیش از حد مجاز بوده است (۲۲). مطالعه داد میکروب هایی که در آب استخرها جدا شده اند و مشکل ساز می باشند کلی فرم و پسودوموناس می باشند و نقش ضدغذوی آب در این مورد موثر است(۲۳).

با توجه به اینکه در طی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ کیفیت میکروبی وضعیت کلرزنی آب استخرها افزایش یافته است لذا باید با تداوم در نظارت و پایش دقیق تر توسط بازرگانی بهداشت محیطی و همچنین افزایش آگاهی و نگرش اپراتورها و متقدیان استخرها، این روند صعودی افزایش کیفیت آب استخرها، ادامه داشته باشد. با توجه به نتایج، هر چند که کیفیت آب استخرها از نظر پارامترهای مورد بررسی در حد تقریباً مطلوبی قرار دارد اما باید در فضول گرم بویژه بر استخرهای صرف‌آستانه و استخرهای با منبع تأمین آب شهری نسبت به سایر استخرها، نظارت بیشتری صورت گیرد.

References

- 1-Mokhtari M, Babaye A. Sanitary of house & public places. 1st ed.Tehran: Sobhan publication, 2006.[Persian]
Available from: mboh.umsha.ac.ir/uploads/ab.pdf

همکارانش در شهر یاسوج نشان داد که نتایج آزمایشات میکروبی در حد استاندار بوده و در هیچ استخراج E.coli مشاهده نشده است(۷). در بررسی راستی و همکارانش در شهر کاشان، کلر باقیمانده در ۷۱٪ نمونه ها و pH با میانگین ۷/۷ در ۸۸٪ نمونه ها استاندارد بودند (۴). در مطالعه کارگر و همکارانش در شهر یزد، میانگین pH آب استخرهای مورد بررسی برابر ۷/۶ و میانگین میزان کلر باقیمانده برابر ۱/۳ میلیگرم در لیتر بوده است. همچنین بررسی آلدگی میکروبی در استخرهای نشان داد که بیشترین مورد آلدگی میکروبی با میانگین کل کلیفرم ۲۴ MPN /۱۰۰ cc و کمترین آن با میانگین کل کلیفرم ۹ MPN /۱۰۰ cc بوده است که در مقایسه با استاندارد در حد مطلوب قرار دارد (۸). مطالعه مهدی نژاد در شهر گرگان نشان داد که در ۶۶/۶ درصد موارد pH بزرگتر از ۸ بوده و میزان کلی فرم، کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوکوس فیکالیس در حد استاندارد و میزان کلر باقیمانده در ۶۱/۱ درصد موارد از حد استاندارد پایین تر بوده است (کمتر از ۱ mg /l) و فقط در دو استخر مطابق با استانداردهای موجود می باشد(۲). بررسی باریک بین و همکارانش در شهر بیرون نشان داد کلر آزاد باقیمانده به طور میانگین در ۷۵٪ از نمونه ها نامطلوب و شاخصهای میکروبی، در ۶۰٪ از استخرهای مورد تحقیق، وضعیت (MPN) در حد استاندارد ولی به طور میانگین در ۲۵/۵٪ از نمونه ها بیش از حد استاندارد بود. در هیچ یک از استخرها، موردی از E.coli مشاهده نشد(۹). مطالعه جابری و همکارانش در شهر مشهد نشان داد میزان



- 2-Mehdinejad MH. The determination of health indicators of water quality swimming pools of Gorgan city. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2005;5(12):89-95.[Persian] Available from: mboh.umsha.ac.ir/uploads/ab.pdf
- 3-Borgmann-Strahsen R. Comparative assessment of different biocides in swimming pool water. International Biodeterioration & Biodegradation 2003; 51: 291-97
- 4-Rasti S, Asadi MA, Iranshahi L, et al. The physicochemical parameters of fungal and parasitic infections of indoor pools of Kashan city during the 2008-2009 years. Faith The Journal - Research grace 2011; 15(1):77-83.[Persian]
- 5-Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Swimming pools - features of Microbiology. National Standard of Iran, first publication 2007;9412.[Persian]
- 6-Alamdar M, KHALOOYE A, Moradi A, et al. Physico -chemical characteristics and bacterial and fungal and parasitic infections prevalent in the indoor pool water of Kerman city during the 2006-2007 years.12th National Conference on Environmental Health, Beheshti University of Medical Science 2009.[Persian]
- 7-Lotfi F, Sarkari B, Rayegan Shirazinejad A, et al. Survey of some environmental health factors of Yasuj city, swimming pools during the 2006-2007 years. 12th National Conference on Environmental Health, Beheshti University of Medical Science 2009.[Persian]
- 8-Karegar MH, Ehrampoosh MH, Askarshahi M, et al. Physico- chemical and bacteriological evaluation of indoor swimming pools in the city of Yazd. 11th National Conference on Environmental Health, Zahedan University of Medical Science, 2008.[Persian]
- 9-Barikbin B, Khodadady M, Ali Abadi R. Assessment of microbiological and physicochemical parameters in public swimming pools in Birjand. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2005;12(3-4):84-8.[Persian]
- 10-Nik Ayeen M, Hatam Zadeh M, Wahid Dastjerdy M, et al. Survey the Quality of physical, chemical and microbial water pools of the Esfahan city, using standard indicators. Journal of Esfahan University of Medical Sciences 2011;28(108):346-56.[Persian]
- 11-Rabi A, Khader Y, Alkafajei A, Abu Agoula. Sanitary conditions of a public swimming pools in Amman Jordan. Int J Environ Ros Public Health 2002; 5(3):152-57.



- 12-Institute of Standards and Industrial Research of Iran Search and counting Coli forms in water a few tube method. National Standard of Iran 1996;3759.[Persian]
- 13-APHA, AWWA ,WPCF. Standard method for the examination of water and wastewater. 21th ed Washington D.C: publication office American public health association; 2005:5-19.
- 14-Dindarloo K, Solaimani Ahmadi M, Zareh SH, et al. Sanitary status of swimming pools of Bandar Abbas in the half of 2003. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2005 ; 9(1):41-6. [Persian]
- 15-Asel Hashemi A. Environmental health in swimming pools. Akhtar publication, 3th edition 2010:190-241. [Persian]
- 16-Nanbakhsh H, Diba K, Hazrati Tapeh KH. Evaluation of some physico-chemical parameters and fungal contamination of indoor public swimming pool in Urmia in 2001. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2005; 10(2):26-35. [Persian]
- 17-Asel Hashemi A ,Dehghanzadeh Rehani R, Taghi Poor H, Ghasem Zadeh. Evaluation of chemical and biological water quality parameters of public swimming pools and Jacuzzi of Tabriz city. Tabriz university of medical sciences 2011; 33(6):19-24. [Persian]
- 18-Roy AP. An environmental model for swimming pool bacteriology. Arn J Public Health 1972 ; 62:770-772.
- 19-Nourian AA, Badali H, Hamzehei H. Fungal Contamination in Indoor Swimming Pools in Zanjan-Iran 2005. Pak J Biol Sci 2006; 9(13):2524-7.
- 20-Jaberi A, Sadeghi A, Alizadeh MH, The study of swimming pools pollution of Mashhad city. Movement Science Quarterly 2008; 7(13) :91-9.[Persian]
- 21-Rabi A, Khader Y, Alkafajei A, et al. Sanitary Conditions of Public Swimming Pools in Amman, Jordan Int. J. Environ. Res. Public Health 2007; 4(4): 301-6.
- 22-Lika M, Dako A, Mece O. The microbial pollution in pools and diseases connected with them. Natura montenegrina podgoria 2008; 9(3):859-66.
- 23-Dingman J. Public pool disinfection. Journal of Environmental Health. 1990; 529: 341-343.



Evaluation of Total Coliform, Fecal Coliform and Residual Chlorine in Swimming Pools in Kermanshah on the Season, the type of Pool, Disinfection System and Source of Water Supply in the during of three years (2010-2012)

SHarafi K (M.Sc)¹, Pirsahab M (Ph.D)², Karami (M.Sc)³, Moradi M (M.Sc)⁴

1.Instructor, Department of Environmental Health Engineering. Kermanshah University of Medical Sciences and Ph.D student in Environmental Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2.Assistant Professor. Department of Environmental Health Engineering, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

3.Ph.D student in Environmental Health Engineering, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

4. M.Sc ,Member of Environmental Epidemiology research, Kermanshah University of Medical Sciences and Ph.D student in Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract

Introduction:desirable of residual chlorine, total and fecal coliforms, bacteria parameters indicates the water pools is to provide minimum standards that in water quality monitoring is important. So In this study, perspective of Total Coliforms, fecal coliforms and residual chlorine water quality of 17 indoor pools of Kermanshah city were studied.

Methods: This is a descriptive - analytical study. In this study, a total of 12 months a year for three consecutive years, indoor pool, and 17 water qualities in Kermanshah with the sample of 618 Total Coli forms, fecal coliforms, and residual chlorine were studied. All the samples and tests were performed according to standard methods of testing water and wastewater treatment.

Results: showed that the most desirable and undesirable the water quality perspective of chlorine residual, is depend to (C and L) and (P and I) pools, respectively. Most desirable and undesirable the quality perspective of fecal Coli forms, is depend to (C and I) and (G and H) pools. Of residual chlorine, April and May least desirable and October and November were most desirable and of fecal Coli forms, August and September least desirable and December and February were dedicated to the most desirability.

Consider the desirability of water quality in pools of residual chlorine and fecal Coli forms from 2009 to 2011 has been an upward trend & of the seasons, spring and summer were least desirable and most desirable to due to the fall and winter.

From both the residual chlorine and fecal Coli forms, pools merely masculine more desirable, feminine, it just kind of the least desirable and feminine - masculine, borderline case, had the two types mentioned above.

Conclusion: Consider the Environmental health officers inspection & oversight the regulatory and monitoring water quality in pools, shows the positive impact on upgrade the water quality during 2009 to 2010.

From the results , although the pools of water quality parameters has been studied in almost ideal But in summer, especially on a female pools and pools with wells water supply source than other pools , to be more oversight .

Keywords: Water Swimming Pool, Total Coliform, Fecal Coliform, Residual Chlorine,

Kermanshah