



بررسی تاثیر میزان صدا و شدت روشنایی بر وضعیت بدن دانشجویان حین مطالعه در

کتابخانه خوابگاههای پسرانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسنده‌گان: زهرا زمانیان^۱، مصطفی بروزیده^۲، سعید قنبری^۳، هادی داشمندی^۴

۱. دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲. کارشناسی ارشد گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳. کارشناسی ارشد گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴. نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن تماس: ۰۹۱۷۱۱۹۰۶۰۱ Email: daneshmand@sums.ac.ir

طلوغ بهداشت

چکیده

مقدمه: صدا و روشنایی از جمله عوامل فیزیکی هستند که می‌توانند بر پوسچر افراد حین مطالعه تاثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت عوامل فیزیکی یاد شده و تاثیر آنها بر وضعیت بدنی افراد، اندازه‌گیری و ارزیابی این دو پارامتر و تعیین ارتباط آنها با پوسچر افراد در سالنهای مطالعه ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق با هدف اندازه‌گیری و ارزیابی صدا و روشنایی و تعیین ارتباط این دو عامل با پوسچر دانشجویان انجام شده است.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد، ۱۶۷ نفر از دانشجویان مرد و مجرد خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه‌گیری صدا و روشنایی بر اساس استانداردهای کیمیه ملی بهداشت حرفه‌ای ایران انجام گرفت. همچنین ارزیابی پوسچر دانشجویان به روش RULA انجام شد.

یافته‌ها: در جامعه مورد مطالعه، شدت روشنایی ($114/83 \pm 433/88$ لوکس) و تراز فشار صوت ($49/598 \pm 4/646$ دسی بل) به دست آمد. در ارزیابی به روش RULA، $34/7\%$ از افراد مورد مطالعه در سطح اولویت اقدامات اصلاحی $2, 41/3$ ، $2, 4/1/3$ در سطح 3 و $24/7\%$ در سطح 4 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تراز فشار صوت با پوسچر دانشجویان دارای ارتباط معنی داری نمی‌باشد، اما بین شدت روشنایی و پوسچر دانشجویان ارتباط معنی داری مشاهده شد ($R = -0.701$, $p < 0.001$).

نتیجه‌گیری: از میزان شدت روشنایی می‌توان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر پوسچر دانشجویان هنگام مطالعه نام برد، بنابراین بهبود روشنایی می‌تواند به بهبود پوسچر دانشجویان و به دنبال آن افزایش راحتی آنها کمک شایان توجّهی کند.

واژه‌های کلیدی: صدا، شدت روشنایی، RULA، ارزیابی پوسچر، کتابخانه

فصلنامه علمی پژوهشی

دانشکده بهداشت بزد

سال سیزدهم

شماره: چهارم

مهر و آبان ۱۳۹۳

شماره مسلسل: ۴۶

تاریخ وصول: ۱۳۹۱/۷/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۴/۵



مقدمه

توجه به منحنی‌های معیار (Noise Criteria (NC)) ۳۰ - ۲۵

دسى بل مى باشد (۱۰). با توجه به اينکه میزان روشنایی و صدا برای هر حرفه و فعالیتی حدود استانداردی دارد.

زمانی که يك استرس خارجی به فرد وارد شود، فرد پوسچر بدن خود را به منظور کاهش استرس تغییر می دهد و اين حالت ممکن است پوسچر را از حالت خشی به يك پوسچر نامطلوب تغییر دهد (۱۱). در مورد صدا و روشنایی باید چنین عنوان کرد که اگر میزان اين پارامترها از حدود استاندارد فراتر روند، فرد ناگزیر است برای انجام کار در وضعیت بدنی نامطلوب قرار گیرد و فشارهای بیومکانیکی فرایندهای را به ساختار اسکلتی-عضلانی بدن خود تحمل نموده و زمینه‌ی ابتلاء به اختلالات اسکلتی-عضلانی را فراهم می کند (۳).

اختلالات اسکلتی - عضلانی يکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ناتوانی‌های ناشی از کار و از کارافتادگی افراد را تشکیل می دهد (۱۲، ۱۳). اختلالات اسکلتی - عضلانی معمولاً در اثر فشارهای (استرس های) طولانی مدت یا تکراری در بافت‌های نرم بدن مثل اعصاب، عضلات، تاندون‌ها و مفاصل ایجاد می شود (۱۴، ۱۵). نداشتن شناخت کافی از وضعیت‌های کاری استاندارد و عدم به کارگیری صحیح عضلات در حالات مختلف نشسته، ایستاده، خمیده و حین حمل و بلند کردن اجسام هر یک در جای خود می تواند بر ساختار اسکلتی-عضلانی بدن اثر منفی به جا گذارد و موجب نقص یا نفایصی در ساختار جسمانی شود. لذا بی‌توجهی یا غفلت از این امر می تواند عوارض جبران ناپذیری در روند سلامتی و بهداشت افراد به بار آورد (۱۶).

در کتابخانه ها خطرات فیزیکی بسیاری از قبیل رطوبت، گرما و سرما، فضای کاری محدود، روشنایی نامناسب، آلدگی صوتی و گرد و غبار وجود دارد (۱). از بین این عوامل، روشنایی و صدا از اهمیت بسزایی برخوردارند. بدون شک مهمترین حس ما بینایی است و به همین دلیل روشنایی اهمیت حیاتی دارد (۳). يک شخص بالغ طی شباهه روز در حدود ۱۶ ساعت از چشم‌های خود استفاده می کند. به همین جهت میزان نور با توجه به ماهیت و نوع کار و درجه ظرافت و دقت مورد نیاز، می‌باشد تأمین گردد تا افراد بتوانند وظایف خود را انجام دهند (۳). استاندارد شدت روشنایی بر روی میزان مطالعه ۵۳۸ لوکس (۴) و در ایران حداقل ۳۰۰ لوکس و حداقل ۵۰۰ لوکس می باشد (۲).

نتایج برخی مطالعات نشان داده اند که خستگی بینایی و ناراحتی در اندام های فوقانی بدن با هم مرتبط می باشند. نیروی اضافی برای تطابق سیستم بینایی حین انجام کارهایی که به دقت نیاز دارند برای مدت زمان طولانی، تنش در ماهیجه های اندام های فوقانی را افزایش می دهد (۵).

همچنین صدا یا همان صوت ناخواسته، به عنوان يکی از مهم‌ترین عوامل فیزیکی، مشکلات بسیار زیادی را برای افراد ایجاد می نماید (۶-۸). يکی از علل وجود شکایت‌های بسیار زیاد درباره صدا این است که صدا پدیده‌ای فیزیکی، عینی و آشکار است و انسان به راحتی آن را حس می کند (۹).

حدود مجاز تراز فشار صوت کتابخانه‌ها با توجه به مقررات ملی مسکن کشور ۴۰ dB(A) و استاندارد صدا در سالن‌های مطالعه با



الف) اندازه گیری شدت روشنایی: به این منظور از دستگاه Lutron مدل LX-101 (ساخت تایوان) و به روش شبکه ای (بر حسب لوکس) استفاده شد. در هر یک از ایستگاه‌ها و در شب شدت روشنایی در سطح افق اندازه گیری گردید. نتایج این اندازه گیری، توزیع شدت روشنایی را در سطح مکان نشان می‌دهد (۱۵).

ب) اندازه گیری تراز فشار صوت: برای صدادستجی از دستگاه Simpson مدل ۸۸۶ (ساخت امریکا) استفاده و تراز فشار صوت اندازه گیری شد (۱۶). بدین معنی که تراز فشار صوت معادل مواجهه (Equivalent Sound Level) (L_{eq}) در ایستگاهی که هر فرد مشغول به مطالعه بود، محاسبه شد.

لازم به ذکر است اندازه گیری روشنایی و تراز فشار صوت در محل نشستن افراد پشت میز مطالعه (۱۶۷ ایستگاه کاری) انجام شد. دستگاه‌های مذکور قبل از استفاده در محیط پژوهش، در آزمایشگاه مهندسی بهداشت حرfe ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز کالیفرنیا شدند.

ج) ارزیابی پوسچر: در این مطالعه ارزیابی پوسچر به روش RULA انجام گرفت. به این منظور پس از انتخاب بدترین یا پر تکرارترین پوسچر دانشجو، وضعیت بازو، ساعد، مچ دست، گردن، تن و پاهای با استفاده از دیاگرام‌های مربوطه تعیین گردید و در نهایت با استفاده از جدول مربوطه امتیاز نهایی محاسبه شد. که این امتیاز برآورده از خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلاتی اندام های فوقانی را به دست می‌دهد (۱۷، ۱۸).

با توجه به این که وجود روشنایی مطلوب از یک سو و محیطی آرام و ساكت از سوی دیگر در فضای سالن‌های مطالعه می‌تواند بر روی پوسچر افراد و به دنبال آن راندمان مطالعه تأثیر بسزایی داشته باشد، مطالعه‌ی حاضر با هدف اندازه گیری این دو پارامتر فیزیکی در سالن‌های مطالعه خوابگاه‌های پسرانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقایسه‌ی آن‌ها با استاندارد و همچنین تعیین ارتباط این دو پارامتر فیزیکی (روشنایی و صدا) با پوسچر دانشجویان حین مطالعه انجام شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند مبنای برای قضاوت در مورد شرایط موجود در سالن‌های مطالعه خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در اختیار گذاشته و زمینه تصمیم گیری در مورد بهبود وضعیت موجود و استاندارد سازی فضای سالن‌های مطالعه را مهیا سازد.

روش بررسی

در این مطالعه تعداد ۳ سالن مطالعه شهید دستغیب (ره)، فردوسی و امام رضا (ع) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای نمونه گیری در این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد، از روش طبقه بندهی با تخصیص تصادفی متناسب، حجم نمونه ۱۶۷ نفر تعیین گردید. افراد مورد مطالعه، دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های مذکور بودند که از سالن مطالعه استفاده می‌نمودند. شایان ذکر است انتخاب سالن‌های مطالعه به صورت سرشماری و تعداد حجم نمونه (افراد مورد مطالعه) در هر سالن به صورت نمونه گیری آسان (یعنی افرادی که در زمان مراجعه محقق به سالن مطالعه حضور داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند) انجام گرفت. گردد آوری داده‌ها بصورت زیر انجام گردید:



شدت روشانایی اندازه‌گیری شده در خوابگاه‌های شهید دستغیب (ره)، فردوسی و امام رضا (ع) از استاندارد IESNA کمتر و از حداقل استاندارد ایران بیشتر است. تراز فشار صوت در این خوابگاه‌ها نیز بالاتر از حد استاندارد می‌باشد.

در ارزیابی به روش RULA مشخص شد که ۳۴٪ از افراد مورد مطالعه در سطح اولویت اقدامات اصلاحی ۲، ۴۱٪ از افراد در سطح ۳ و ۲۴٪ از دانشجویان در سطح ۴ قرار می‌گیرند. به منظور تعیین همبستگی بین شدت روشانایی با امتیاز نهایی پوسچر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. این آزمون نشان داد که بین شدت روشانایی با امتیاز نهایی RULA از نظر آماری ارتباط معنی‌داری وجود دارد ($R = -0.701$, $p < 0.001$).

همچنین به منظور تعیین همبستگی بین تراز فشار صوت با امتیاز نهایی پوسچر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. این آزمون نشان داد که بین تراز فشار صوت با امتیاز نهایی RULA از نظر آماری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد ($p = 0.109$).

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفت. در این مطالعه برای بررسی رابطه بین میزان شدت روشانایی و شدت صوت با امتیاز نهایی پوسچر شخص حین مطالعه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

یافته‌ها

در جامعه مورد مطالعه، میانگین و انحراف استاندارد شدت روشانایی ($433/88 \pm 114/83$ لوکس)، تراز فشار صوت ($49/598 \pm 4/646$ دسی بل) بدست آمد. همانگونه که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود شدت روشانایی اندازه‌گیری شده از استاندارد IESNA (International Engineering Standard North America) کمتر و از حداقل استاندارد ایران بیشتر است. تراز فشار صوت در جامعه مورد مطالعه نیز بالاتر از حد استاندارد می‌باشد.

جدول ۲ میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر شدت روشانایی و تراز فشار صوت را به تفکیک خوابگاه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد. همانگونه که در این جدول ملاحظه می‌شود

جدول ۱: میزان شدت روشانایی و تراز فشار صوت در جامعه مورد مطالعه

عامل اندازه‌گیری میانگین (انحراف استاندارد) شده	شدت روشانایی (Lux)	تراز فشار صوت (dB)	استاندارد ایران حداقل حداکثر	IESNA	استاندارد حداقل - حداکثر
(۱۱۴/۸۳) ۴۳۳/۸۸	۷۶۵-۱۹۰	۵۳۸	۳۰۰	۵۰۰	
(۴/۶۴۶) ۴۹/۵۹۸	۶۰-۴۰	-	۲۵	۳۰	



جدول ۲: میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر شدت روشنایی و تراز فشار صوت در خوابگاه‌های مورد مطالعه

خوابگاه	میانگین (انحراف استاندارد)	حداقل-حداکثر	شدت روشنایی (Lux)	تراز فشار صوت (dB)
	میانگین (انحراف استاندارد)	حداقل-حداکثر	میانگین (انحراف استاندارد)	حداقل-حداکثر
شهید دستغیب (ره) (n=۱۲۹)	(۹/۷۷) ۴۷۲	۷۶۵-۳۷۰	(۴/۶۲) ۵۰/۵۱	۶۰-۴۰
فردوسی (n=۲۲)	(۸/۱۱) ۳۰۲/۶	۴۱۸-۱۹۰	(۱/۸۱) ۴۸/۴۵	۵۳-۴۶
امام رضا (ع) (n=۱۶)	(۱/۷۶) ۳۰۲/۵	۳۲۰-۲۸۵	(۲/۷۱) ۴۳/۸۱	۴۷-۴۰

شیراز صورت پذیرفت و در آن میانگین تراز فشار صوت در

۱۰۰ درصد از کتابخانه‌ها بالاتر از استاندارد بود (۱۹)، نزدیک است.

از جمله منابع صدا در سالن‌های مطالعه می‌توان به صدای فضاهای مجاور، صدای تردد خودروها، رفت و آمد دانشجویان، سیستم‌های تهویه، صدای ناشی از جابجایی صندلی‌ها اشاره کرد. به طور کلی، بر پایه نتایج و ارزیابی‌های بعمل آمده، میزان تراز فشار صوت در کلیه سالن‌های مورد مطالعه در خوابگاه‌های مورد مطالعه از استاندارد بالاتر می‌باشد.

از نتایج ارزیابی پوسچر به روش RULA چنین برمی‌آید که ۳/۶۵٪ از افراد مورد مطالعه در سطح اولویت اقدامات اصلاحی بالا و بسیار بالا قرار می‌گیرند. این مطلب بدان معنی است که انجام اقدامات اصلاحی لازم و ضروری است و بی درنگ باقیستی صورت گیرد.

نتایج مطالعه حاضر مشخص ساخت که بین شدت روشنایی با پوسچر دانشجویان ارتباط معنی داری وجود دارد. این مطلب بدان معناست که با کاهش شدت روشنایی، امتیاز نهایی RULA افزایش یافته و بدن فرد حین مطالعه در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد و در نهایت ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی

بحث و نتیجه گیری
شدت روشنایی در سالن‌های مورد مطالعه به دلیل جهت‌گیری جغرافیایی، تعداد و مساحت پنجره‌ها، رنگ آمیزی کف، سقف و دیوارها، ارتفاع لامپ‌ها، نوع لامپ‌ها و نحوه نگهداری سیستم روشنایی، متفاوت می‌باشد.

با توجه به نتایج به دست آمده، میزان روشنایی در تمامی خوابگاه‌های مورد مطالعه از استاندارد IESNA کمتر و از حداقل استاندارد ایران بیشتر است. نتایج این مطالعه به نتایج حاصل از مطالعه‌ی قبری و همکاران که در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت پذیرفت و در آن میزان روشنایی در ۹۷ درصد میزهای مطالعه در مقایسه با استانداردهای خارجی و ۵۹ درصد موارد در مقایسه با استاندارد داخلی پایین تر محاسبه شد (۱۹)، نزدیک است.

به طور کلی بر پایه نتایج و ارزیابی‌های بعمل آمده، شرایط روشنایی در تمامی سالن‌های مورد مطالعه در خوابگاه‌های پسرانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیاز به اصلاح و بهبود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، تراز فشار صوت در تمامی سالن‌های مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از استاندارد بالاتر می‌باشد. نتایج این مطالعه به نتایج حاصل از مطالعه‌ی قبری و همکاران که در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی



نگهداشت سیستم روشنایی مصنوعی و تعویض به موقع لامپ‌های سوخته ضروری است.

استفاده از رنگ‌های روشن برای رنگ آمیزی سقف، کف و دیوارها.

چیدمان مناسب میزهای مطالعه با توجه به محل قرارگیری پنجره‌ها و چیدمان منابع روشنایی.

لازم به ذکر است برای تأمین روشنایی مناسب در سالن‌های مطالعه، فقط توجه به میزان روشنایی محیط برای کارهای بصری کافی نیست بلکه باید جهت نور، درخشندگی اجسام اطراف، ضریب انعکاس سطوح و ... نیز توجه شود (۲۳).

ب) صدا

استفاده از اکوستیک تایل برای پوشش سقف.

استفاده از شیشه‌های دوجداره در پنجره‌های سالن مطالعه. این عمل باعث کاهش تراز فشار صوت به میزان ۵۰ تا ۶۰ دسی بل می‌گردد.

استفاده از لاستیک‌های مخصوص در انتهای پایه‌های صندلی سالن‌های مطالعه به منظور کاهش اثر صدای جابجایی صندلی‌ها توسط دانشجویان.

استفاده از موکت به عنوان پوشش کف سالن‌های مطالعه.

تعمیر و نگهداشت به موقع و مناسب تجهیزات الکترونیکی (سیستم‌های تهویه و...).

تقدیر و تشکر

مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی دانشجویی با شماره طرح ۹۰-۵۷۶۳ مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد.

افزایش می‌یابد که موید نتایج حاصل از مطالعات دیگر می‌باشد (۲۰-۲۲).

همچنین در این مطالعه مشخص شد که بین تراز فشار صوت با امتیاز نهایی RULA از نظر آماری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه میزان شدت روشنایی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر پوسچر دانشجویان هنگام مطالعه شناخته شد، بنابراین بهبود روشنایی می‌تواند به بهبود پوسچر و به دنبال آن افزایش راحتی دانشجویان کمک شایان توجهی نماید.

این مطالعه در خوابگاه‌های پسرانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است، لذا نتایج این مطالعه قابل تعمیم به خوابگاه‌های دخترانه نمی‌باشد.

پیشنهادات

با توجه به نتایج به دست آمده به منظور بهبود شرایط سالن‌های مطالعه و افزایش سطح روشنایی و کاهش صدای مختلط کننده و همچنین بهبود پوسچر بدن دانشجویان، پیشنهادات اصلاحی به تفکیک دو عامل فیزیکی یاد شده (روشنایی و صدا) در زیر ارائه گردیده است.

الف) روشنایی

به منظور طراحی سیستم روشنایی، استفاده از روشنایی عمومی نسبت به روشنایی موضعی مناسب تر است (۲۲)، زیرا در روش موضعی احتمال ایجاد سایه و بروز خیرگی و تباین نامناسب وجود دارد.

بر اساس دستورالعمل‌های موجود، بهتر است تنوع لامپ‌های مورد استفاده در سالن‌های مطالعه به حداقل برسد (۲۳).



References

- 1- Farajpahlou AH, Danesh F. Job description requirements for systems librarians in Iranian university libraries. *The Electronic Library* 2009; 27 (1); 58-73.
- 2- Kalhor H. Luminance Engineering. 1st ed. Iran: Sahami-e-Enteshar Co. Publication; 2000: 11. [Persian] Available from:http://www.sjimu.medilam.ac.ir/files/site1/user_files_44b4b4/zmannasr-A-10-220-77-782da5a.pdf
- 3- Helmseresht P, Delpisheh A. Hygiene of Work. 3rd ed. Iran: Chehr publication; 2006: 46-9. [Persian]
- 4- Abbasian MA, Aminipanah B, Heidari MM, et al. Investigation and analysis of video display terminal workstations for identify and prevent of musculoskeletal disorders in a car design company. 1st International Conference on industrial safety, occupational and environmental health in organizations: 2008 may. 1-13: Esfahan, Iran. [Persian]
- 5- Bridger R S. Introduction to Ergonomics. 2nd ed. USA: Taylor & Francis publication; 2003: 287.
- 6- Nasiri P, Mehravaran H, Ghosi R. Measurement And Modeling of Equivalent Sound Level (Leq) and The Determination of Critical Points in Terms of Noise pollution (Case Study in An Automotive Company). *Journal of Environmental Science and Technology* 2007; 9 (4); 47-56. [Persian]
- 7- Keshtkar AA, Kabir MJ, Asghari S, et al. A Study on noise- induced hearing loss in Agriculture and industry factory – Iran. *Iranian Journal of Epidemiology* 2005; 1 (1); 59-64. [Persian]
- 8- Taheri M, Kalaneh Arabi H, Sharifitabar M. Prevalence of hearing loss in workers in carpentry of Sabzevar city. 1st International Conference on industrial safety, occupational and environmental health in organizations: 2008 may. 1-13: Esfahan, Iran. [Persian]
- 9- Tajic R, Ghadami A, Ghamari F. The effects of Noise Pollution and Hearing of metal Workers in Arak. *Tabib-e-Shargh* 2008; 1 (4); 291-8. [Persian]
- 10-Salter M, Acoustic for libraries2002:3-7. Available from: [<http://www.librisdesign.org/>].
- 11- Anshel J. Visual ergonomics in the workplace. 1st ed. USA: Taylor & Francis Publication; 1998: 16.
- 12- Nasel Saraji J, Mosavi S.A, Shahtaheri S.J, Pourmahabadian M. A surveying risk factors featuring upper extremity musculoskeletal disorders by OCRA method in a textile factory. *Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research* 2005; 3 (4); 51-60. [Persian]
- 13-Salehi Sahlabadi A, Nasl Saraji G, Zeraati H, et al. Assessment of spine curvatures (cervical, thoracic, lumbar) prevalence and their associations with musculoskeletal disorders in automobile industry workers. *Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research* 2008; 6 (3,4); 49-60. [Persian]



- 14- Golmohammadi R. Luminance Engineering. 2nd ed. Iran: Daneshjoo Publication; 2007: 133-34. [Persian]
- 15- Golmohammadi R. Noise and Vibration Engineering. 2nd ed. Iran: Daneshjoo Publication; 2003: 131-32. [Persian]
- 16- Choobineh, A.R. Posture assessment methods in occupational ergonomics. 3rd ed. Iran: Fan Avaran Publication; 2004: 81-6. [Persian]
- 17- McAtamny L, Corlett E N. RULA: a survey method for the investigation of world-related upper limb disorders. *Applied Ergonomics* 1993; 24 and (2); 91-9.
- 18- Ghanbari Z, Choobineh AR, Tabatabaei HR. The survey of noise and lighting intensity in libraries of Shiraz University of Medical Sciences and compare of its with standards in 2007. *Sabz Journal* 2009; 7; 30-40. [Persian]
- 19-Poorghasemi A. Prevention of complications and diseases caused by computer work or ergonomics for computer. 1st ed. Iran: Hayyan Publication; 1995: 62-3. [Persian]
- 20-Kogi K. Low-cost work improvements that can reduce the risk of musculoskeletal disorders. *International Journal of Industrial Ergonomics* 2003; 31: 179–84.
- 21-Chaiklieng S. Suggaravetsiri P. Boonprakob Y. Work ergonomic hazards for musculoskeletal pain among university office workers. *Walailak J Sci & Tech* 2010; 7 (2): 169-76.
- 22- Kakooei H. Zakerian A. Lighting in health and safety. 1st ed. Iran: Tehran University of Medical Sciences Publication; 2004: 21. [Persian]
- 23-Choobineh AR. Amirzadeh F. Arghami SH. Fundamental of occupational health. 3rd ed. Iran: Shiraz University of Medical Sciences Publication; 2004: 33-146. [Persian]



The Survey of Noise and Light Effects on Body Posture During the Study in Male Dormitory of Shiraz University of Medical Sciences

Zamanian Z(Ph.D)¹, Barzideh M(M.Sc)², Ghanbari S(M.Sc)³, Daneshmandi H(M.Sc)⁴

1. Associate Professor, Department of Occupational Health, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2. MSc, Department of Ergonomics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3. MSc, Department of Biostatistics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4. Corresponding Author: Ph.D Student, Research Center for Health Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Abstract

Introduction: Noise and light can affect on body posture during the study. With regard to the importance of the mentioned factors and their effect on body posture, measurement and assessment of these parameters seems essential in the study rooms. This study aimed to measure and assess these factors and their relationship with students' postural status.

Methods: In this cross-sectional (descriptive-analytical) study, 167 male and single students in dormitories of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) were selected. Measurement of noise and lighting was done according to the standards of the Iran National Committee on Occupational Health. The RULA method was used to assess the students' posture.

Results: In this study, light (433.88 ± 114.83 lux) and sound pressure levels (49.59 ± 4.64 dB) were obtained. The results of assessment of physical exposure to musculoskeletal risks by RULA technique showed that in 34.7% of the studied subjects, the level of exposure to musculoskeletal risks was in Action Level (AC) 2, 41.3% in AC 3 and 24% in AC 4.

Results showed no significant correlation between the sound the students' posture, but significant correlation was observed between light and the students' postural status.

Conclusion: Posture of students during the study has correlation with light. Therefore, improved lightening can improve student posture and consequently a remarkable help to increase the students comfort.

Keywords: Noise, Lighting, RULA, Posture assessment, Library