

تعیین فاکتورهای مؤثر در نیاز به دریافت خون بیماران تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونری در رابطه با جنس

منیر عباس زاده قنواتی^۱، فریبهرز مهرانی^۲، دکتر سید حسین احمدی^۳، الهه جزایری قره باع^۴

چکیده

زمینه و هدف: نیاز به دریافت خون در اعمال جراحی زنان با میزان کم هماتوکریت قبل از عمل قابل توجیه است، اما سایر فاکتورهای مؤثر بر دریافت خون نیز مطرح هستند. هدف از این مطالعه تعیین فاکتورهای مؤثر در نیاز به تزریق خون در اعمال جراحی پیوند شریان کرونر در رابطه با جنس می‌باشد.

روش بررسی: در یک مطالعه، آینده نگر و مقطعی ۵۰۰ بیمار (۳۰۶ مرد و ۱۹۴ زن) با وضعیت فیزیکی I و II برای عمل جراحی انتخابی پیوند شریان کرونر تحت بیهوشی عمومی در مدت یک سال در بیمارستان قلب تهران مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات هر بیمار براساس دریافت خون کامل، پلاسمای تازه بین زده (FFP) و پلاکت در ضمن عمل و بعد از آن و فاکتورهایی چون جنس، سن، وزن، قد، سطح بدن (BSA)، طول مدت عمل جراحی، هماتوکریت قبل و بعد از عمل، حجم خون قبل از عمل، در بیمارستان ثبت شد. نتایج با استفاده از تست‌های آماری t و χ^2 و رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: ۵۷/۲ درصد زنان (۱۱۱ نفر) و ۳۹/۴ درصد مردان (۱۲۱ نفر) خون دریافت کردند. میانگین مجموع خون دریافت شده در زنان ۱/۶ واحد در ضمن عمل جراحی و ۲/۶ واحد در طول مدت بستره در بیمارستان و در مردان ۱/۱ واحد در ضمن عمل و ۱/۸ واحد در طول مدت بستره بود. با توجه به متغیرهایی مانند، سن، سطح بدن، طول مدت عمل جراحی، میزان هماتوکریت قبل و بعد از عمل، حجم خون قبل از عمل، زمان پمپ و تعداد عروق پیوند شده که مورد بررسی قرار گرفتند، در مجموع در ضمن عمل جراحی و مدت بستره در بیمارستان زنان خون بیشتری دریافت کردند ($P<0.05$).

بحث و نتیجه گیری: میزان دریافت خون در بیماران زن تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونر تحت تاثیر عواملی چون، سن، سطح بدن، هماتوکریت بعد از عمل و در بیماران مرد تحت تاثیر متغیرهایی چون افزایش طول مدت جراحی کاهش حجم خون و هماتوکریت قبل از عمل می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: انتقال خون، پیوند شریان کرونر، حجم خون، هماتوکریت، جنس بیماران

* نویسنده مسئول :

منیر عباس زاده قنواتی^۱؛
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email : abbaszad@sina.tums.ac.ir

- دریافت مقاله : فروردین ۸۹ - پذیرش مقاله : مرداد ۸۹

مقدمه

میزان نیاز به دریافت خون در اعمال جراحی پیوند شریان کرونری^۱ (CABG) حداقل ۲۰ درصد از کل موارد انتقال خون را تشکیل می‌دهد^(۱). در مطالعه‌ای که در چند مرکز درمانی انجام شده بود ۶۵ درصد بیماران تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونر خون

^۱ مریمی هیئت علمی گروه بیهوشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۲ مریمی هیئت علمی گروه بیهوشی و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۳ استاد گروه چراغی قلب بیمارستان قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۴ مریمی گروه تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۱. Coronary Artery Bypass Graft

روش بررسی

این مطالعه، به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. در طی یکسال ۵۰۰ بیمار (۳۰۶ مرد و ۱۹۴ زن) با وضعیت فیزیکی I و II معادل انجمن بیهوشی آمریکا^۳ (ASA) که کاندیدای بیهوشی عمومی برای عمل جراحی انتخابی پیوند شریان در مرکز قلب تهران بودند، پس از توضیح کامل در مورد نحوه اجرای طرح و گرفتن رضایت نامه کتبی مورد بررسی قرار گرفتند. وجود هرگونه سابقه دریافت آسپرین به مدت ۱۰ روز قبل از عمل، تکرار عمل جراحی پیوند شریان کرونر و همزمانی چند عمل جراحی باعث خروج نمونه‌ها از مطالعه شد. پس از ورود بیماران به اتاق عمل، همه با یک روش استاندارد بیهوش شدند. برای پایش بیماران از دستگاه فشارخون غیر تهاجمی، پالس اکسی متري استفاده شد. جهت اینداشتن و لوله گذاری از میدازولام ۲-۴ میلی گرم، سوفتانیل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکروگرم و روکورونیوم ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم بصورت وریدی استفاده گردید. بیهوشی با استفاده از میدازولام، روکورونیوم، و در صورت نیاز ایزو فلوران ادامه یافت. همچنین انفوژیون رمی فتانیل به میزان ۱۵ تا ۳۰ میکروگرم در دقیقه ضمن عمل تجویز گردید. قبل از باس با کمک هپارین به مقدار ۳ میلی گرم در کیلو گرم زمان انعقاد خون^۴ (ACT) در حدود ۵۰۰ ثانیه حفظ شد و در صورت نیاز هر ۲۰ دقیقه در مدت باس تکرار می‌شد. در صورتی که هماتوکریت بیماران تحت پمپ قلی ۱۸ درصد یا کمتر می‌شد به بیماران خون تزریق می‌گردید و برای تمامی بیماران اکسیژن ۱۰۰٪ از طریق کانولای بینی تا هنگام انتقال به بخش مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات مربوط به هر بیمار شامل: سن، جنس، وزن،

دریافت کرده بودند(۲). در مطالعه دیگری از ۲۴ مرکز درمانی، شیوع دریافت خون بین ۲۷ تا ۹۲٪ درصد گزارش شده است(۳). بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد، که به دلایل اقتصادی، تهیه خون و ترس از انتقال^۱ HIV و سایر خطرات، سعی بر آن است که تجویز خون به بیماران تحت عمل جراحی کاهش یابد.

مطالعات گذشته نشان داده‌اند که انتقال گلوبولهای قرمز فشرده^۲ (PRBC) در بیماران تحت عمل جراحی CABG با فاکتورهایی چون میزان هماتوکریت قبل از عمل، سن، جنس، وزن، عمل جراحی CABG قبلی، سیگاری بودن، مشکلات انعقادی، دیابت وابسته به انسولین و سایر عوارض بالینی ارتباط دارد(۴-۸). مطالعات نشان داده است زنان در مقایسه با مردان تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونری خون بیشتری دریافت کرده‌اند(۱۱-۸-۲). دلیل این اختلاف در نیاز به دریافت خون کاملاً شناخته نشده است. از عوامل موثر در نیاز به دریافت خون بیشتر میزان هماتوکریت کم قبل از عمل در این بیماران گزارش شده است(۱۲ و ۴). زنان نسبت به مردان مشخصاً هماتوکریت کمتری دارند که سبب دریافت خون بیشتر در آنها می‌شود(۶). البته اختلاف در دریافت خون نیز با وجود یکسان بودن هماتوکریت قبل از عمل دیده شده است(۸ و ۱۳). با توجه به اهمیت نقش انتقال خون در بیماران، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی انجام گرفت تا فاکتورهای موثر بر دریافت خون در رابطه با جنس که سبب افزایش آن در ضمن عمل جراحی پیوند شریان کرونر و در مدت بستری می‌شوند تعیین گردند.

³. American Society of Anesthesiologists
⁴. Activated Clotting Time

¹. Human Immunodeficiency Virus
². Packed Red Blood Cell

خون قبل از عمل و مجموع خون دریافت شده اختلاف معنی داری دیده شد $P=0.0001$ (جدول ۱). چون انتشار واحدهای خون دریافت شده بوسیله زنان و مردان انتشار یکسانی نداشتند، دریافت خون به دو گروه دریافت خون و عدم دریافت خون تبدیل شد (نمودار ۱).

جدول ۲ ریسک فاکتورهای تاثیرگذار بر دریافت خون در رابطه با جنس را نشان می‌دهد. هریک از ریسک فاکتورها به زیر گروههایی تقسیم شد و با توجه به دریافت و عدم دریافت خون در رابطه با جنس مشخص گردید.

سن بیماران بین ۲۷-۸۶ سال بود که با توجه به گروه بندی که انجام شد، آنالیز X^2 نشان داد که در سن بیشتر از ۶۵ سال زنان در مقایسه با مردان خون بیشتری دریافت کردند ($P=0.0001$). همچنین آنالیز آماری نشان داد که زنان در مقایسه با مردان در وزن بالاتر از ۸۰ کیلوگرم ($P=0.0001$) و سایر فاکتورها مانند، هماتوکریت قبل و بعد از عمل، حجم خون قبل از عمل، طول مدت عمل، مدت زمان پمپ و سطح بدن بیماران خون بیشتری دریافت کردند ($P<0.05$).

با استفاده از روش Enter، مدل معنی داری به دست آمد، متغیرهای معنی دار برای مردان شامل هماتوکریت قبل از عمل، زمان جراحی و حجم خون قبل از عمل و برای زنان هماتوکریت بعد از عمل، سن و BSA بدست آمد.

قد، سطح بدن^۱ BSA، مدت عمل، هماتوکریت قبل و بعد از عمل، تعداد واحدهای خون، پلاسمای تازه یخ زده^۲ FFP و پلاکت و... دریافت شده در ضمん و بعد از عمل و در طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان جمع آوری گردید و در طول مطالعه به صورت محترمانه باقی ماند.

حجم لازم PRBC قبل از عمل طبق فرمول وزن به کیلو گرم × هماتوکریت قبل از عمل × ۶۵ mL بر کیلو گرم برای زنان و یا وزن به کیلو گرم × هماتوکریت قبل از عمل × ۷۰ mL / کیلو گرم برای مردان محاسبه می‌شد (۳).

اولین هماتوکریتی که قبل از جراحی در اتاق عمل از بیمار گرفته می‌شود هماتوکریت قبل از عمل تعریف می‌شود و آخرین هماتوکریتی که قبل از مرخص شدن از واحد مراقبت‌های ویژه از بیمار گرفته می‌شود هماتوکریت بعد از عمل نامیده می‌شود. نتایج با استفاده از تست‌های آماری t و X^2 و رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در این مطالعه بیماران با توجه به مشخصات دموگرافیک و فاکتورهای بالینی ضمن عمل مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی زنان و مردان تحت عمل جراحی گرافت شریان کرونر در جدول ۱ خلاصه شده است. میانگین سنی زنان مجتمع دریافت خون در زنان 20.3 ± 2.6 و در مردان 18.8 ± 1.1 واحد بود ($P=0.0001$). بین دو گروه زنان و مردان از نظر وزن، قد، BSA هماتوکریت، حجم


¹. Body Surface Area

². Fresh Frozen Plasma


جدول ۱: اطلاعات بالینی بیماران تمت عمل جراحی پیوند شریان کرونزی برهمسرب جنسیت

سن (سال)	زن	مرد	مقدار P
وزن (کیلو گرم)	۶۰/۲۱±۱۰	۵۸/۸۳±۱۰	N
قد (سانتی متر)	۶۷/۵۳±۱۲	۷۲/۴۰±۱۴	0.0001
سطح بدن (متر مربع)	۱۵۶/۴۲±۱۰	۱۶۳/۵۴±۹/۷	0.0001
مدت عمل (ساعت)	۱/۷±۰/۱۸	۱/۸۳±۰/۱۹	0.0001
هما توکریت قبل از عمل (%)	۲۷۹±۳۶	۲۷۸±۳۵	N
هما توکریت بعد از عمل (%)	۳۶/۸۳±۴	۳۸/۷۴±۴	0.0001
حجم خون قبل از عمل (واحد)	۲۷/۸۷±۳	۲۷/۹۴±۳	0.0001
زمان پمپ (واحد)	۱/۵±۰/۲	۱/۹±۰/۴	N
عروق تعویض شده (واحد)	۷۶/۵۳±۳۱	۷۲/۰۶±۲۴	N
مشکلات عروقی %	۳/۵۰±۰/۸۹	۳/۵۴±۰/۹	N
فشارخون بالا %	۴۸/۶	۵۱/۴	N
دیابت %	۴۶/۷	۵۳/۳	0.001
بیماری مزمن انسدادی تنفسی %	۴۳	۵۷	N
نارسایی قلبی %	۵۸/۳	۴۱/۷	N
سیگاری بودن %	۴۷/۶	۵۲/۴	N
دریافت خون ضمن عمل (واحد)	۴/۶	۲۹/۱	0.001
دریافت خون بعد از عمل (واحد)	۱/۶±۱/۲	۱/۱±۱	0.0001
مجموع خون دریافت شده (واحد)	۰/۹±۱/۲	۰/۸±۱/۵	N
دریافت کرایو	۲/۶±۲/۰۳	۱/۸±۱/۸	0.0001
دریافت پلاکت	۰/۳±۰/۹	۰/۳±۰/۸	N
دریافت پلاسمای یخ زده	۰/۵±۱/۱	۰/۴±۹	N

N= No Significant



الف) در ضمن عمل



ب) در مدت بستری در بیمارستان

نمودار ۱ : فراوانی دریافت خون در بیماران تمثیل عمل هر امراضی که در آن کروپن در رابطه با هنس

جدول ۲: مشخصات بیماران برهم سب و ضعیت دریافت خون

متغیر	دریافت خون			عدم دریافت خون	مقدار P
	زن (درصد)	مرد (درصد)	زن (درصد)		
سن (سال)	(۲۲/۹) ۱۶	(۲۲/۹) ۲۰	(۱۲/۹) ۹	(۳۵/۷) ۲۵	<0.0001
وزن	(۳۱/۵) ۲۸	(۴/۵) ۴	(۴/۵) ۴	(۴۲/۷) ۳۸	<0.0001
سطح بدن (متر مربع)	(۱۷/۳) ۳۰	(۳۰/۴) ۵۶	(۴/۳) ۸	(۴۸/۹) ۹۰	<0.0001
مدت عمل (ساعت)	(۳۰/۹) ۲۱	(۱۴/۷) ۱۰	(۱۴/۷) ۱۰	(۳۹/۷) ۲۷	<0.0001
هماتوکریت قبل از عمل (%)	(۱۵/۹) ۴۷	(۲۱/۴) ۶۳	(۱۴/۲) ۴۲	(۴۸/۵) ۱۴۳	<0.0001
هماتوکریت بعد از عمل (%)	(۲۸/۶) ۳۶	(۱۶/۷) ۲۱	(۹/۵) ۱۲	(۴۵/۲) ۵۷	<0.0001
حجم خون قبل از عمل (لیتر)	(۴/۵) ۷	(۲۰/۶) ۳۲	(۴/۵) ۷	(۷۰/۳) ۱۰۹	0.032
زمان پمپ (دقیقه)	(۲۷/۱) ۴۱	(۲۴/۸) ۳۹	(۱۶/۶) ۲۶	(۳۲/۵) ۵۱	0.020
عروق تعویض شده (تعداد)	(۲۲/۱) ۵۸	(۲۳/۷) ۶۲	(۱۳/۷) ۳۶	(۴۰/۵) ۱۰۶	<0.0001

جدول ۱۳: فاکتورهای تأثیرگذار بر میزان دریافت خون برمسب جنس بیماران تمث عمل جراحی پیوند شریان گروز

P	Beta	متغیرهای پیش بین در مردان
۰/۰۴۵	-۰/۱۲۵	هماتوکریت قبل از عمل
۰/۰۰۵	-۰/۱۷۷	زمان جراحی
۰/۰۰۱	-۰/۳۲۳	حجم خون قبل از عمل

با استفاده از روش Enter (مجذورات تنظیم شده = $F_{9,296} = 7/157$ ، $P = 0/0001$ ، $0/154$)

P	Beta	متغیرهای پیش بین در زنان
۰/۰۰۱	-۰/۲۴۶	هماتوکریت بعد از عمل
۰/۰۰۲	۰/۲۱۹	سن
۰/۰۰۱	۰/۵۲۰	سطح بدن

با استفاده از روش Enter (مجذورات تنظیم شده = $F_{9,184} = 4/559$ ، $P = 0/0001$ ، $0/142$)

یکی از فاکتورهای دریافت خون بیشتر، سابقه عمل جراحی قلب است که موجب افزایش خونریزی در ضمن عمل مجدد می‌شود که در چندین مطالعه گزارش شده است(۱۵-۱۶). علاوه بر آن کاهش در میزان عملکرد بطی خود EF است که به عنوان فاکتور خطر مطرح می‌باشد. ماگوورن^۱ و همکاران گزارش کردند که EF کمتر از (۳۰٪) عاملی برای انتقال خون بیشتر در ضمن عمل جراحی پیوند شریان گروز می‌باشد. همچنین سابقه خونریزی دستگاه گوارش و استفاده از هپارین قبل از عمل می‌تواند موجب افزایش خونریزی و دریافت خون بیشتر شود(۱۷ و ۹).

سارجنور^۲ و همکاران عمل مجدد، نوع پیوند شریان و انتقال گلbulهای قرمز را به عنوان فاکتورهای موثر در انتقال FFP و پلاکت بیان کرده‌اند. در مطالعه سارجنور جنس زن، افزایش سن، سابقه خونریزی معده، بیماریهای عروق محیطی، سطح پایین هموگلوبین،

بحث

انتقال خون و اجزای آن بخش مهمی از عمل جراحی پیوند شریان گروز می‌باشد. تمام بیماران تحت عمل جراحی پیوند شریان گروز از خون کامل یا ترکیبات آن استفاده می‌کنند. با وجود سعی در کاهش نیاز به انتقال خون در بیماران تحت عمل جراحی قلب بعضی از بیماران به دلیل شدت بیماری، عوارض جراحی در اعمال مجدد قلبی و افزایش خونریزی در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی نیازمند به دریافت خون بیشتری می‌باشند(۱۴). متوسط تعداد انتقال گلbulهای قرمز فشرده به میزان ۰ تا ۶/۳ واحد برای هر بیمار و تکرار انتقال گلbulهای قرمز فشرده بین ۱۶ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است(۱۵). شیوع دریافت خون در این مطالعه ۴/۶ درصد می‌باشد. اختلاف در انتقال اجزای خون مانند پلاکت یخ زده تازه، پلاکت و کرایو نیز گزارش شده است و ممکن است با نوع جراحی‌های بزرگ، تجارت جراح و یا به تفاوت مراکز درمانی ارتباط داشته باشد(۱۴).

¹. Ejection Friction

². Magovern

³. Surgenor

کوچک بدن، آنمی قبل از عمل و اثرات دیلوشن پمپ دریافت خون بیشتری داشته اند. پایین بودن سطح هماتوکریت قبل از عمل، یکی از فاکتورهای زمینه‌ای دریافت خون می‌باشد(۴). حداقل سطح هماتوکریت لازم برای انتقال اکسیژن در ضمن استفاده از پمپ قلبی مورد بحث است، سطح هماتوکریت قبل از عمل زنان در مقایسه با مردان تحت عمل جراحی پیوند شریان کروونر کمتر از ۳۵ درصد گزارش شده است(۶).

در این مطالعه میانگین سطح هماتوکریت قبل از عمل زنان ۳۶ درصد می‌باشد که بطور معنی داری از سطح هماتوکریت مردان مورد مطالعه کمتر است (جدول ۱) و دلیل مهمی برای اختلاف در دریافت خون در ارتباط با جنس محسوب می‌شود. با توجه به جدول ۲ با مقایسه میزان دریافت خون در زنان و مردان در میزان مشابه هماتوکریت قبل از عمل این تفاوت مشخص شده است(۷ و ۸). همودیلوشن ایجاد شده در ماشین با پاس قلبی نیز یکی دیگر از عوامل تفاوت بین زنان و مردان است، زیرا مقدار همو دیلوشن در زنان نسبت به مردان با توجه به وزن کمتر آنان بیشتر است(۹). اما در مطالعه حاضر این تئوری تحقق نیافت زیرا زنان با وزن‌های زیاد نیز نسبت به مردان خون زیادتری دریافت کرده بودند. عوامل موثر بر دریافت خون تاثیر همودیلوشن پمپ قلبی در حجم خون و روی گلbulو های قرمز خون، پلاکتها و فاکتورهای انعقادی می‌باشد بنابراین زمان استفاده از پمپ می‌تواند روی دریافت خون تاثیر داشته باشد.

علاوه بر تاثیر هماتوکریت قبل از عمل و وزن بدن در دریافت خون، وقتی دریافت خون در رابطه با جنس با سایر زیرگروه‌ها مثل سن و مدت عمل جراحی با شرایط یکسان مقایسه می‌شوند تفاوت در دریافت خون مشاهده می‌گردد(جدول ۲). نتایج نشان می‌دهد

نارسایی کلیه، کاهش شاخص توده بدن نیز همچنین به عنوان فاکتورهای موثر در افزایش دریافت خون در بیماران تحت عمل جراحی قلبی گزارش شده‌اند(۱۴). مطالعه حاضر نشان داد که دریافت خون در زنان تحت عمل جراحی گرافت شریان کروونر نسبت به مردان در دو مرحله ضمن عمل و در مدت بستری در بیمارستان بیشتر بوده است. میانگین دریافت خون در زنان ۲/۶ واحد و در مردان ۱/۳۴ واحد در طول مدت بستری در بیمارستان می‌باشد(جدول ۱). در مطالعه سارجنور اختلاف جنسیت در میزان دریافت خون، پلاکت و پلاسمای تازه یخ زده در بیماران تحت عمل جراحی CABG موثر بوده است(۱۴). این مطالعه در مورد پلاکت و پلاسما با مطالعه سارجنور موافقت دارد. استفاده از تنباق‌کو و مواد مشابه به عنوان فاکتور خطر در انتقال خون گزارش شده است(۱۸). دیابت نوع ۱، کاهش شمارش پلاکت، کاهش آلبومین (کمتر از ۴ گرم در دسی / لیتر) و نوع پیوند های شریان با افزایش خونریزی همراه می‌باشد(۱۴). در ضمن عمل جراحی قلب یا با پاس قلبی همو دیلوشن اتفاق می‌افتد. همودیلوشن ویسکوزیته خون و مقاومت عروقی را کاهش می‌دهد و سبب افزایش خون در عروق بزرگ می‌شود تا اکسیژن رسانی به تمام بافت‌های بدن را حفظ کند. جالب اینکه در ضمن استفاده از پمپ قلبی افزایش ۴۳ درصد در جریان خون مغزی و ۳۱ درصد کاهش در غلظت هموگلوبین ایجاد می‌شود(۱۹). یکی دیگر از متغیرهایی که در رابطه با انتقال خون است جنس می‌باشد. جنس زن به عنوان یک عامل خطر در بیماران تحت عمل جراحی پیوند شریان کروونر مشخص شده است چه بیماران تحت عمل جراحی با پمپ باشند و یا بدون پمپ عمل شوند(۱۵). آنمی قبل از عمل و کوچک بودن سایز بدن نیز دو متغیر در دریافت خون می‌باشند که در این مطالعه زنان مشخصاً با توجه به اندازه

که برای مردان شامل هماتوکریت قبل از عمل، زمان جراحی و حجم خون قبل از عمل و برای زنان هماتوکریت بعد از عمل، سن و سطح بدن می‌باشند(جدول۳). افزایش انتقال خون می‌تواند سبب ایجاد عوارض بعد از عمل جراحی قلب گردد و همچنین استفاده از گلوبولهای قرمز پیر اکسیژن کمتری را به بافتها انتقال می‌دهد.

یافته‌های این مطالعه در اداره بیهوشی هر چه بهتر بیماران تحت عمل جراحی گرافت شریان کرونر کمک خواهد کرد.

نتیجه گیری

دریافت خون در بیماران تحت عمل جراحی گرافت شریان کرونر در رابطه با جنس تحت تاثیر عواملی چون، سن، سطح بدن، هماتوکریت قبل از عمل، طول مدت جراحی، حجم خون قبل از عمل و عوامل دیگر می‌باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به شماره قرارداد ۱۷۳۰ مورخ ۸۳/۹/۱ می باشد که بدینوسیله از حوزه معاونت پژوهشی تشکر و قدردانی می گردد. همچنین از سرکار خانم اکرم موسوی زاده و همکاران وی در بخش مراقبتها ویژه و کارکنان اتاق عمل بیمارستان قلب تهران که در جمع آوری داده‌های پژوهشی ما را یاری نمودند تشکر می‌نماییم.

که این عوامل در دریافت خون بیشتر در زنان نسبت به مردان موثر هستند. ذکر این مطلب مهم است که احتمال افزایش دریافت خون در اعمال جراحی به دلیل استفاده از پمپ قلبی، مسن بودن بیماران و همچنین پایین بودن وزن و هماتوکریت قبل از عمل باشد. به حال معنی دار بودن عوامل تاثیر گذار در دریافت خون بیماران با توجه به زیر گروههای خاصی در جدول ۲ نشان داده شده است، این عوامل شامل سن در محدوده بیشتر از ۶۵ سال، وزن در محدوده بیشتر از ۸۰ کیلو گرم، هماتوکریت قبل از عمل بیشتر از ۳۷ درصد، هماتوکریت بعد از عمل بیشتر از ۳۰ درصد، مدت زمان جراحی بیشتر از ۵ ساعت، زمان پمپ بیشتر از ۸۰ دقیقه تعداد پیوندهای بیشتر از ۳ و سطح بدن بیشتر از ۱/۹ می‌باشند. نتایج نشان داده است که این فاکتورها ممکن است تاثیر بیشتری روی دریافت خون ضمن عمل در مقایسه با طول مدت بستره داشته باشد(۱۵). این نتایج ممکن است با توجه به تفاوت‌های کوچک بین زن و مرد در هر یک از صفات بالینی، ما را به درک تفاوت‌های مهم در نیاز به دریافت خون یاری دهنده. اگر چه نمی‌توان صراحتاً بیان کرد که چرا زنان نسبت به مردان به خون بیشتری نیاز دارند، اما در این مطالعه میزان حجم خون قبل از عمل در مردان و زنان اندازه گیری شد و با توجه به کاهش در میزان این فاکتور قبل از عمل در زنان نشان داد بین خون دریافت شده و جنس ارتباط معنی داری وجود دارد و می‌توان نتیجه گرفت که عواملی مانند افزایش سن، سطح بدن، وزن، زمان عمل، زمان پمپ، تعداد پیوند و کاهش حجم خون قبل از عمل، هماتوکریت قبل و بعد از عمل بطور معنی داری بر دریافت خون در بیماران تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونر در رابطه با جنس موثر می‌باشند(جدول۲). با استفاده از روش Enter در رگرسیون خطی مدل معنی داری به دست آمده است

منابع

1. Johnson RG, Thurer RL, Kruskall MS. Comparison of two transfusion strategies after elective operations for myocardial revascularization. *J Thoracic Cardiac Surge* 1992 Aug; 104(2): 307-14.
2. Ketan S, Murali P, Ananth K, Changa T, Chiedozi U, Mamatha P. Preoperative blood deficit influences blood transfusion requirements in females and males undergoing coronary artery bypasses surgery. *J Clin Anesth* 2002 Dec; 14(8): 511-517.
3. Stover EP, Siegel LC, Parks R. Variability in transfusion practice for coronary artery bypass surgery persists despitess national consensus guidelines: a 24 institution study. Institutions of the Millimeter Study of Preoperative Schema Research Group. *Anesthesiology* 1998; 88(2): 327-33.
4. Cosgrove DM, Loop FD, Lytle BW. Determinants of blood utilization during myocardial revascularization. *Ann Thorax Surg* 1985 Oct; 40(4): 380-4.
5. Ferraris VA, Gildengorin V. Predictors of excessive blood use after coronary artery bypass grafting. A multivariate analysis. *J Thorac Cardiovascular Surg* 1989 Oct; 98(4): 492-7.
6. Bharathi H, Scott Frank C, Seifert Peter S. A Glass and Roger Grimson: Blood use in patients undergoing coronary artery bypass surgery: Impact of cardiopulmonary bypass pump, hematocrit, gender, age, and body weight. *Anesth Analg* 2003 Oct; 97(4): 958-63.
7. Paone G, Sencer T, Silverman NA. Blood conservation in coronary artery surgery. *Surgery* 1994 Oct; 116(4): 672-8.
8. Surgenor DM, Churchill WH, Wallace EL. Determinants of red cell, platelet, plasma, and cryoprecipitate transfusions during coronary artery bypass graft surgery: the Collaborative Hospital Transfusion Study. *Transfusion* 1996 Jun; 36(6): 521-32.
9. Ferraris A, Ferraris P, Saha P, Hessel A, Haan K, Royston D. Preoperative blood Transfusion and blood conservation in cardiac surgery: The society of thoracic surgeons and the society of cardiovascular. Anesthesiologists clinical practice guideline. *Ann Thorac Surg* 2007 May; 83(5): 27-86.
10. Richardson, Cyrus RJ. Reduced efficacy of coronary artery bypass grafting in women. *Ann Thorac Surg* 1986 Dec; 42(6): 16-21.
11. Moskowitz D, Klein J, Shander A, Cousineau K, Goldweit R. Predictors of transfusion requirements for cardiac surgical procedures at a blood conservation center. *Ann Thorac Surg* 2004 Feb; 77(2): 626-634.
12. Anonymous. Preoperative red blood cell transfusion [Monograph on the internet]. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/, Accessed at 1988.
13. Peter S, Bharathi H, Frank C, Roger G. Blood use in patients undergoing coronary artery bypass surgery: impact of cardiopulmonary bypass pump, hematocrit, gender, age, and body weight. *Anesth Analg* 2003 Oct; 97(4): 958-963.
14. Covin R, Brien M, Grunwald G, Brimhall B, Sethi G. Factors affecting trabsfusion of fresh frozen plasma platelets and red blood cells durhng elective coronary artery bypass graft surgery. *Arch Pathol Lab Med* 2003; 127(4): 415-423.
15. Elmisterkawy ME, Errett L, Fawzy HF. Predictors of paced red cell transfusion after isolated primary coronary artery bypass grafting- the experience of a single cardiac center: A prospective observational study . *J Cardiothorac surg* 2009 May; 4(1): 1-11.

16. Frankel TL, Stamou SC, Lowery RC, Kapetanakis EI, Hill PC, Haile E. Risk factors for hemorrhage – related reexploration and blood transfusion after conventional versus coronary and blood transfusion after conventional versus coronary revascularization without cardiopulmonary bypass. Eur J Cardiothorac Surg 2005 Mar; 27(3): 494-500.
17. Magovern LA, Sakert T, Benckart DH. A Model for predicting transfusion after coronary artery by pass grafting. Ann Thorac Surg 1996 Jan; 61(1): 27-32.
18. Despotis GJ, Filos KS, Zoys TN, Hogue CW, Spitznagel E, Lappas DG. Factors associated with excessive postoperative blood loss and hemostatic transfusion requirements: a multivariate analysis in cardiac surgical patients. Anesth Analg 1996 Jan; 82(1): 13-21.
19. Heyman C, Sander M, Foer A, Heinmann A, Spiess B. The Impact of a hematocrit of 20% during normothermic cardiopulmonary bypass for elective low risk coronary artery bypass graft surgery on Oxygen delivery and clinical outcome-a randomized controlled study. Critical Care 2006; 10(2): 1-10.