

## مروری بر کاربرد ضد دردی گیاهان دارویی در ایران

\*سیما نصری

دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

### چکیده

عارض بی شمار داروهای سنتیک سبب توجه به گیاهان دارویی در دهه‌های اخیر به عنوان منبعی از داروهای جدید شده است. با توجه به اینکه در طب سنتی ایران به اثرات ضد دردی تعداد زیادی از گیاهان اشاره شده است، مطالعات زیادی در این مورد در ایران صورت گرفته، که نیاز به مرور آنها را سبب شده است. در این نوشتار روش‌های مختلف تست درد، اثرات ضد دردی و ترکیبات احتمالی موثر گیاهان دارویی و همچنین مکانیزم‌های احتمالی اثر ضد دردی این گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است.

تاریخ دریافت: خرداد ۹۱

تاریخ پذیرش: شهریور ۹۱

**واژگان کلیدی:** ضد دردی، گیاهان دارویی، درد، فلاونئولیدها

### مقدمه:

برد<sup>(۱)</sup>، حتی فعالیتهای ساده نظیر نشستن روی نشیمنگاه به مدت طولانی می‌تواند به علت فقدان جریان خون به پوست در قسمتی که به وسیله وزن بدن فشرده می‌شود، بافتها را تخرب و ایجاد درد کند<sup>(۲)</sup>.

درد به دلایل گوناگون مثلا تحت تاثیر حرارت آسیب رسان، ضربه، پارگی، کشیدگی، جریان الکتریکی، نکروز، التهاب و اسپاسم بوجود می‌آید<sup>(۳)</sup>.

درد به دو نوع عمده تقسیم می‌شود: درد سریع و درد آهسته. درد سریع حدود ۰/۱ ثانیه پس از برخورد محرك حس می‌شود. در حالی که درد آهسته بعد از یک ثانیه یا حتی بیشتر از برخورد محرك شروع شده و سپس شدت آن به آهستگی در طی چند ثانیه یا حتی دقیقه‌ها افزایش می‌یابد<sup>(۴)</sup>.

درد سریع با اسمای از قبیل درد تیز، درد گزشی یا سوزنی، درد الکتریکی و درد حاد نیز توصیف می‌شود. درد آهسته نیز اسمای متعددی از قبیل درد سوزشی، مبهم، ضربان دار و درد مزمن دارد. این نوع درد با انهدام بافت همراه است و می‌تواند منجر به زجر غیر قابل تحمل شود. این درد می‌تواند هم در

بر اساس تعریف انجمان بین المللی مطالعه درد، درد یک تجربه حسی و روحی ناخوشایند است که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط بوده و یا در دوره‌هایی از این گونه آسیبها به وجود می‌آید<sup>(۵)</sup>. در سراسر جهان میلیون‌ها نفر از انواع درد رنج می‌برند و آرزوی یافتن دارویی با اثر بیشتر و عوارض کمتر برای برطرف کردن درد خود هستند<sup>(۶)</sup>.

گیاهان دارویی به علت وجود مواد موثر طبیعی و همراه بودن این مواد موثره با مواد دیگر تعادل بیولوژیک ایجاد کرده و از ابناشته شدن مواد دارویی در بدن جلوگیری می‌کنند. عوارض جانبی کم و یا فقدان عوارض جانبی داروهای با منشا گیاهی در دهه‌های اخیر توجه جهانیان و محققان به این داروها را به خود جلب کرده است<sup>(۷)</sup>.

### ۱- تعریف درد:

درد عمده‌ای یک مکانیزم دفاعی محسوب می‌شود و هنگامی ایجاد می‌شود که بافتی دچار آسیب شود و موجب می‌شود که شخص از خود واکنش نشان داده و محرك مولد درد را از بین

گلوتامات و گابا را به عهده دارند. گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات و گیرنده های متابوتروپیک گابا در سطوح مختلف از درد نقش دارند که انتقال درد را کنترل می کنند<sup>(۱۲)</sup>. اخیرا، مشخص شده که گلوتامات برای انتقال ورودی حسی، به خصوص در طول مسیر درد دخالت دارد<sup>(۱۴)</sup>.

#### ۲-۲- ماده P:

ماده P پیتیدی است که توسط گیرنده های درد تولید می شود. ترشح ماده P از طریق انشعابات آکسون در پوست باعث واژودیلاسیون (اتساع عروق)، اتساع مویرگهای خونی و آزادشدن هیستامین از سلولهای ماست سل می گردد. حساسیت گیرنده های درد اطراف محل جراحت از طریق ماده P موجب پردردی ثانویه می شود<sup>(۱۵)</sup>.

ماده P در داخل تعدادی از نورون های حسی اولیه درد موجود است که به بخش سطحی شاخ پشتی نخاع ختم می شوند. تحریک شدید انشعابات فیبرهای آوران اولیه که فیبرهای C و A دلتا را فعال می کنند، باعث ترشح ماده P می شود<sup>(۱۶)</sup>.

#### ۳-۲- سروتونین:

بسیاری از نورونها در هسته رافه، سروتونین را بعنوان یک نوروتانسمیتر ترشح می کنند. سروتونین می تواند نورون های درد را مهار کند و احتمالاً نقش مهمی در دستگاه ضددردی درونزا ایفا می کند. سایپر نورون های ساقه مغز کاتکول آمین های اپی نفرین و نوراپی نفرین را در طناب نخاعی آزاد می کنند. این نورون ها نیز نورون های درد را مهار می کنند<sup>(۱۷)</sup>.

#### ۴- هیستامین:

نقشی کلیدی در التهاب آلرژیک دارد. پاسخ های التهابی ناشی از آزادسازی هیستامین طولانی است و با واسطه گیرنده هیستامینی H 1 انجام می شود. آنتاگونیست های گیرنده 1 H معمولاً به عنوان آنتی هیستامین ها شناخته می شوند و برای درمان آلرژی سالها است، استفاده شده اند. کشف چهارمین گیرنده هیستامین H4 و بیان آن در سلول های ایمنی و التهابی متعدد، ارزیابی دوباره از اعمال هیستامین را ممکن می کند<sup>(۱۸)</sup>.

#### ۵-۲- عامل رشد عصبی (NGF):

پوست و هم در تقریبا هر بافت یا اندام عمقی بوجود آید<sup>(۸)</sup>، درد سریع به طور عمده به واسطه محرکهای دردزای مکانیکی یا حرارتی ایجاد می شود. در صورتی که درد آهسته و مزمن بیشتر به وسیله محرکهای دردزای شیمیایی برانگیخته می شود<sup>(۹)</sup>. درد به عنوان یکی از پنج نشان حیاتی توصیف می شود که بی توجهی به آن منجر به پیامدهای منفی زیادی می شود. تحریک برخی مناطق ساقه مغز می تواند حس درد را کاهش دهد یا مهار کند. این مناطق عبارتند از منطقه دور بطنی دیانسفال، ماده خاکستری دور قنات مغز میانی و هسته های خط وسط در ساقه مغز<sup>(۱۰)</sup>.

#### ۲- میانجی های درد:

نسبت بالایی از گیرنده های درد سوماتیک و احساسی می تواند توسط محرکهای مختلف و میانجیهای التهابی مانند کاپسایسین، برادیکینین، پروستاگلندین ها، لوکوتین ها، سروتونین، هیستامین و رادیکال های آزاد تحریک یا حساس شوند. گیرنده های درد حاوی نوروپیتیدهایی مانند ماده کلستیونین هستند که از پایانه های فعل در آزاد می شوند و باعث التهاب نوروژنیک، از جمله اتساع پیش مویرگی و خروج پلاسمای مویرگی می شوند<sup>(۱۱)</sup>.

از میانجیهای درد می توان موارد زیر را ذکر کرد:

#### ۱-۲- گلوتامات

آمینواسید تحریکی گلوتامات می تواند از طریق کانال های یونی وابسته به لیگاند (گیرنده های یونوتروپیک گلوتامات) و یا رسپتورهای متابوتروپیک گلوتامات (mGluRs) جفت شده با G پروتئین عمل کند<sup>(۱۲)</sup>. اسید گلوتامیک و گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) به ترتیب دو انتقال دهنده ی عصبی عمدۀ تحریکی و مهاری سیستم عصبی مرکزی در پستانداران بالغ هستند. این انتقال دهنده های عصبی عمل خود را از طریق دو نوع گیرنده اعمال می کنند: گیرنده های یونوتروپیک و متابوتروپیک گیرنده های یونوتروپیک کانال های یونی دریچه دار وابسته به لیگاند می باشند که در انتقال سیناپسی سریع درگیر هستند. در حالی که گیرنده های متابوتروپیک متعلق به خانواده بزرگی از گیرنده های G پروتئین (GPCRs) بوده و نقش کنترل عصبی

محرك آزاردهنده، انتشار کاتابینوئید درون را افزایش می دهد، این عمل نقش آنها را در تعديل درد بیان می کند<sup>(۲۴)</sup>. اندوکاتابینوئیدها درد را کاهش می دهند. کاتابینوئیدهای طبیعی و مصنوعی توانایی کاهش حس درد، التهاب، درد التهابی، الودینیا، هیپرآلژزی و جلوگیری از آسیب ثانویه بافتی در زخم های ترومایی سر را دارند<sup>(۲۵)</sup>.

#### ۸-۲- اپیوئیدها:

فوايد عصاره خشخاش در قرن سوم قبل از ميلاد به ثبت رسيده است. مسكنهای اپیوئیدی اثر خود را از طريق اتصال به انواع مشخصی از گيرندهای اپیوئیدی در بدن اعمال می کنند. اين گيرندها در سراسر مغز و طناب نخاعی قرار گرفته‌اند<sup>(۲۶)</sup>. مرفين اولین اپیوئید طبیعی است که خصوصیات آن شناسایی شد. تحقیقات بیش تر در پستانداران به شناخت اپیوئیدهایی با منشأ داخلی و نیز گيرندهای این اپیوئیدها منجر شد. انکفالین ها و اندورفین ها به خصوص بتاندورفین از اپیوئیدهای درون را هستند. استفاده مکرر و زياد اپیوئیدها باعث ایجاد سه حالت تحمل، واپستگی روانی و جسمی می شود. تحمل، پس از مصرف مکرر داروی اپیوئیدی رخ می دهد و باعث می شود که موجود برای رسیدن به همان تأثير اولیه به میزان بیش تری از دارو نیاز داشته باشد. اپیوئیدهای مصرف شده یا همان اپیوئیدهای خارجی مثل مورفین بر گيرندهای اپیوئیدی با منشأ داخلی (۱۱, ۱۲) اثر می کنند و با یک بازخورد منفی، ساخت پیتیدهای با منشأ داخلی را کاهش می دهند<sup>(۲۷)</sup>. گرچه مورفین قرن ها به عنوان سرددسته تسکین دهنده های درد معرفی شده است، اما اثر آن کاملاً بی اثر نمی باشد. خصوصیات اعتیاد آور و عوارض جانبی در مورفین وجود دارد. عوارض جانبی شامل مشکلات تنفسی، چرت زدن، کاهش تحرک معده ای روده ای، تهوع و تغییرات در سیستم عصبی خودکار و اندوکرین می باشد<sup>(۲۸)</sup>.

#### ۹-۲- مسكنهای ترکیبی:

این فراوردها معمولاً حاوی دوز پایین از یک اپیوئید ضعیف همراه پارستامول یا آسپیرین هستند. مصرف طولانی این مسكنها موجب آسیبهای کلیوی و سیستم گوارش می شود<sup>(۲۹)</sup>.

این فاكتور احتمالاً بطور مستقیم یا غیر مستقیم در درد التهابی دخالت می کند. میانجی های التهابی مانند سیتوکینین ها، تولید فاكتور رشد عصبی را در بافت‌های متورم افزایش می دهند<sup>(۳۰)</sup>. فاكتور رشد عصبی سلولهای ماست سل را در آزاد کردن هیستامین و سروتونین تحریک می کند. همچنین این فاكتور می تواند هیپرآلژزی حرارتی را مستقیماً از طریق عمل بر ترمینالهای محیطی فیبرهای آوران اولیه تحریک کند<sup>(۳۱)</sup>.

فاكتور رشد عصبی، یک عضو از خانواده نوروتروپین بوده و برای بقای نورون های درد تعیین کننده است. اخیراً نقش مهمی از آن در عملکرد درد در بزرگسالان نشان داده شده است. فاكتور رشد عصبی در پوست باعث هیپرآلژزی حرارتی در مدت چند دقیقه می شود. سلولهای ماست سل اجزای مهم در عمل فاكتور رشد عصبی می باشند، مواد ترشح شده توسط ماست سل ها مانند سروتونین و هیستامین، دراثر فاكتور رشد عصبی آزاد می شوند<sup>(۳۲)</sup>.

#### ۶-۲- آدنوزین و آدنوزین فسفات:

در طی التهاب و جراحت بافتی احتمالاً آدنوزین و آدنوزین فسفات ها آزاد می شوند (AMP, ADP, ATP) و به داخل فضای خارج سلولی نشست و گيرنده های دردرا فعال می کنند<sup>(۳۳)</sup>.

گيرنده های ATP در اعصاب حسی اولیه گانگلیون ریشه پشتی و در اعصاب محیطی یافت شده اند. ATP

احتمالاً نورونهای درد دربوست سالم را از طریق گيرنده پورینرژیک هترومریک P2X3 - P2X2 و گيرنده پورینرژیک P2X3 فعال می کند<sup>(۳۴)</sup>.

#### ۷-۲- کاتابینوئید درونزا:

یک خانواده از لپیدهای فعال زیستی هستند که گيرنده های کاتابینوئید را برای تعديل انتقال عصبی فعال می کنند. آنها تنها در مقادیر کم در مغز و بافت‌های دیگر وجود دارند و در تنظیم کارکرهای مختلف مغز از جمله درد، اشتها و حافظه مشارکت دارند. آنها در سطح پایانه های پس سیناپسی که نیاز به نفوذ یون کلسیم دارد، ساخته می شوند و در سطح گيرنده های پیش سیناپسی کاتابینوئید منتشر می شوند<sup>(۳۵)</sup>.

فوق نخاعی است. خصوصیات اصلی این آزمایش توانایی فراهم آوردن رفتارهای دفاعی خودبه‌خودی است<sup>(۳۶)</sup>.

### ۲-۳- آزمون پیچش:

در این تست محلول اسید استیک به روش داخل صفاقی به موشهای تزریق می‌شود. سپس تعداد پیچش Writhing به مدت سی دقیقه پس از تزریق اسید استیک ثبت می‌شود<sup>(۳۷)</sup>. پیچش‌های ایجاد شده عبارت است از انقباضات شکمی همراه با باز کردن پاهای عقب و یا کشیدن تمام بدن در حیوان<sup>(۳۸-۳۹)</sup>.

انقباضات شکمی وابسته به حساسیت گیرنده‌های درد به ترکیباتی از جمله پروستاگلندین‌ها است. آسیب بافتی سبب آزاد سازی ترکیباتی مانند پروستاگلندین‌ها، برادی کینین، سروتونین، ماده P، هیستامین و PGF2α می‌گردد و بخشی از گیرنده‌های صفاقی را در گیر می‌نماید و سبب بروز درد التهابی توسط القا نفوذپذیری مویرگی می‌گردد. فعالیت ضددردی آگونیست اپیوئیدی و ضدالتهابی غیراستروئیدی را می‌توان به وسیله این تست شناسایی کرد. علاوه بر پروستاگلندین‌ها چندین میانجی دیگر التهابی شامل TNFα و ایترلوکین‌ها نیز با پاسخ نوسی سپتیو به اسید استیک ارتباط دارند. همچنین پاسخ این تست به فعالیت ماکروفازها و ماست سل‌های صفاقی بستگی دارد. ماکروفازها با ترشح برادی کینین آزادسازی اسید آراشیدونیک و تشکیل پروستاگلندین‌های E2 یا F2 را تحریک می‌کنند. ماست سل‌ها میانجیگرهای التهابی شامل ایترلوکین‌ها، فاکتور فعال کننده پلاکت، عامل محرك گرانولوستیت-ماکروفاز، پروتئین التهابی ماکروفاز و متabolیت‌های اسید آراشیدونیک، پروستاگلندین‌ها و لوکوتربین‌ها را سنتز می‌نمایند<sup>(۳۸)</sup>.

### ۳-۳- تست پرش دم:

در روش پرش دم Light tail flick موش داخل دستگاه مقید کننده به نحوی که دم حیوان خارج از محفظه باشد، قرار می‌گیرد. در این روش از نور لامپ برای ایجاد درد استفاده می‌شود. نور لامپ دستگاه بر روی دم حیوان مرکز می‌شود و در اثر درد ناشی از حرارت پس از مدت زمانی حیوان دم خود را حلقه زده و از محل نور دور می‌کند. ابتدا تحمل حیوان نسبت به درد سنجهده می‌شود و زمان تحمل به عنوان Control

### ۱۰-۲- داروهای غیر استروئیدی:

آسپیرین، استامینوفن از داروهای غیر استروئیدی (NSAIDS) هستند. این داروها به صورت گستردۀ جهت کنترل درد حاد مصرف می‌شوند. دیکلوفناک اثر ذاتی بالایی در بین این داروها دارد و زمان درازی است که در تسکین درد حاد مصرف می‌شود<sup>(۴۰)</sup>. این داروها باعث مهار آنزیم سیکلواکسیژناز می‌شوند و سه خاصیت مهم کاهش التهاب، ضد درد و تب بر دارند. بسته به دارو، این گروه دارای عوارض کلیوی، گوارشی و حتی قلبی عروقی هستند<sup>(۴۱)</sup>.

### ۱۱-۲- توپیرامات:

به عنوان داروی کمکی پذیرفته شده و به وسیله FDA در امریکا به عنوان داروی پیشگیری کننده از میگرن پذیرفته شده است. توپیرامات یک مونوساکارید سولفات دار است. مشخص شده توپیرامات با مهار کanal‌های کلسمی و سدیمی وابسته به ولتاژ باعث افزایش فعالیت گیرنده‌های گابا و مهار گیرنده‌های متابوتروپیک گلوتامات می‌شود<sup>(۴۲)</sup>.

### ۳- روشهای تست درد در حیوانات:

#### ۱-۱- تست صفحه داغ:

در این روش، قبل از روشن کردن دستگاه موشهای ۳-۴ مرتبه با فواصل زمانی ۵-۳ دقیقه جهت کاهش فشار عصبی روی صفحه قرار می‌گیرند. در تست صفحه داغ یا hot plate موشهای به صورت انفرادی بر صفحه داغی قرار می‌گیرند. فاصله زمانی بین قرار گرفتن موش بر دستگاه تا زمان لیسیدن به عنوان مدت زمان به آستانه رسیدن درد به وسیله حرارت در نظر گرفته می‌شود و تاخیر زمان لیسیدن یا لگد زدن پا توسط حیوان در زمانهای مختلف ثبت می‌گردد. برای محاسبه دقیقتر هر موش ۵-۴ مرتبه با فواصل زمانی پنج دقیقه بر روی دستگاه قرار گرفته و میانگین گرفته می‌شود. زمان Cut off برای اجتناب از صدمه بافتی برای حیوان در نظر گرفته می‌شود<sup>(۳۳-۳۲)</sup>. در این آزمون مکانیزم‌های کنترل درد مطرح هستند<sup>(۴۳)</sup>.

آزمون صفحه داغ یک آزمون انتخابی برای ترکیبات شبه اپیوئیدی است. این آزمون پاسخ ضددردی به محركهای سریع الاثر را بررسی می‌کند<sup>(۴۴)</sup>. آزمایش صفحه داغ یک مدل درد

داروهای مکمل دیگر به ویژه درمان‌های گیاهی برای کنترل درد در حال افزایش است<sup>(۱۰)</sup>.

تأثیر عصاره‌های گیاهی توسط آزمونهای مختلف درد از جمله تست پیچش، پرش دم، غوطه وری دم، صفحه داغ و آزمون فرمالین انجام شده است.

روشهای مختلف عصاره گیری جهت تهیه عصاره‌ها به کار رفته است که بیشترین روش به کار رفته پرکولاسیون، خیساندن و سوکسله است. همان‌طور که در جدول ۱ مشخص شده است عصاره‌ها از نوع آبی، آبی الکلی، الکلی، هگزانی و اتیل استاتی است.

بعضی از گیاهانی که در جدول ۱ ذکر شده است نظری ارون، آزار چوب، آویشن، بابونه، بادرنجبویه، بن سرخ، پسته، پلم، پنج انگشت، تاتوره، خرفه، دارچین، درمنه، رازیانه، زعفران، زنیان، سنجد، سورنجان کرمانی، علف چای، فلفل سیاه، کاکوتی، گرد، کرس، کنگر و ناخنک دارای اثرات ضد دردی در طب سنتی هستند. در بین گیاهانی که اثر ضددردی آنها به اثبات رسیده است، بیشترین گونه‌ها عضو خانواده نعناعیان است.

گیاهان موثر بر درد، علاوه بر خواص ضد دردی دارای خواص درمانی متفاوت هستند، به عنوان مثال می‌توان درمان نقرس، روماتیسم، سردردهای عصبی، خیز، شل کننده عضلات<sup>(۱۱)</sup>، ترمیم کننده زخم، آرام‌بخش، ضد اسپاسم<sup>(۴۳-۴۲)</sup>، ضد التهاب، آنتی اکسیدان<sup>(۴۳)</sup>، ضد تشنج، آرام‌بخش، خواب آور، ضد هورمونی، ضد ویروسی، ضد میکروبی، ضد تشنجی، پیشگیری کننده از آلزایمر و تقویت حافظه، آنتی اکسیدانتی<sup>(۴۴)</sup> و ضد التهابی<sup>(۴۶-۴۴)</sup>، ضد دیابت، ضد فشارخون<sup>(۴۸-۴۷)</sup>، اثرات تنفسی، گوارشی، کلیوی<sup>(۴۹)</sup>، افزایش فعالیت ترشحی و حرکات گوارشی<sup>(۳۲)</sup>، ضد اضطراب و سقط آور<sup>(۳۹)</sup> را نام برد. ترکیبات موثر آنها بر درد شامل فلاونوئیدها (کورستین)، روغن‌های فرار (مونوتربن‌ها و سرکوئی‌ترپن‌ها، توجون)، ترکیبات فنلی مانند تیمول و کارواکرول، کومارین، استروئیدهای گلیکوزیدی، ترکیبات آلکالوئیدی نظیر آتروپین، اسکوپولامین و هیوسین، اسیدهای آلی نظیر اسید کافئیک، اسید رزمارینیک، اسید نیکوتینیک، اسید فنولیک، گابا، گلیسین،

latency در نظر گرفته می‌شود. سپس در فواصل زمانی مختلف تا صد و بیست دقیقه پس از تجویز دارو مجدداً مدت زمان تحمل درد ثبت می‌گردد و با کمک فرمول زیر درصد حداقل

پاسخ ضد درد محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{test latency-control latency}}{\text{cut off time-control latency}} \times 100$$

زمان Cut off حداقل زمان قابل تحمل است که آسیبی به دم حیوان وارد نشود<sup>(۹)</sup>.

#### ۴-۳- غوطه وری دم:

از آزمون غوطه وری دم موش در آب داغ برای بررسی درد حاد استفاده می‌شود. ابتدا موش را در مقید کننده قرار داده و پس از گذشت بیست دقیقه دم موش را وارد آب داغ کرده و مدت زمان قراری گیری دم در آب تا زمانی که موش دم خود را از آب خارج نماید به عنوان آستانه درد حاد تلقی می‌شود. دم هر موش پنج بار در فواصل هفت دقیقه‌ای در آب داغ قرار می‌گیرد و میانگین آستانه این دفعات برای هر موش محاسبه می‌شود. پس از محاسبه میانگین آستانه درد در هر موش درصد ایندکس بی دردی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود<sup>(۳۹)</sup>:

$$\text{Analgesia index} = \frac{\text{drug latency-control latency}}{\text{cut off time-control latency}} \times 100$$

#### ۵-۳- آزمون فرمالین:

در این روش از یک محفظه شیشه‌ای به منظور قرار دادن حیوان در آن و مشاهده پاسخهای حیوان استفاده می‌شود. در زیر این محفظه شیشه‌ای آینه‌ای با زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح افق تعییه شده است که مشاهدات را آسانتر و دقیقتر می‌کند. جهت آزمایش بیست میکرولیتر فرمالین ۲/۵٪ به زیر پوست پنجه یکی از پاهای موش تزریق می‌شود. سپس مدت زمان لیسیدن یا گاز گرفتن پایی که فرمالین دریافت کرده است طی دو مرحله سریع و تاخیری ثبت می‌شود. معمولاً ۵-۰ دقیقه اول تست را مرحله حاد و ۶۰-۱۵ دقیقه را مرحله مزمن می‌نامند<sup>(۴۰)</sup>.

#### ۴- اثر عصاره گیاهان دارویی بر درد:

به دلیل عوارض جانبی بالقوه و فقدان کارایی درمان‌های استاندارد (استفاده از داروهای شیمیایی و سنتیک)، کاربرد

ها، ایریدوئیدها، ترکیبات الکلی نظری ساپونین، کافور، الفا تیوجن، سینثول، میرسین است.

تانن‌ها، روغنهای ضروری مثل بیتن، لیمونن و سینثول، الكل‌های مونوتربن، دی ترپن‌وئیدها، ربوفلاوین، تربن‌ها، رزین

جدول ۱- مثالهایی از گیاهان دارویی ایران به همراه نام تیره و انواع آزمونهای سنجش ضد درد آنها و مکانیزم‌های احتمالی ضددرد آنها

نام محلی گیاه	نام علمی گیاه	نام تیره	نوع تست درد	فراکسیون و اندام مورد استفاده	مکانیزم احتمالی	منبع
ارونه	<i>Salvia hydrangea</i>	Lamiaceae (Labiatea)	Light tail flick	اسانس و عصاره هیدروالکلی برگ و گل	مهار مسیر سنتز پروستاگلندین‌ها	(۵۰)
اسطخرودوس	<i>Lavandula officinalis</i>		tail flick و تست فرمالین	متانولی	تأثیر بر فرایندهای التهابی	(۵۱)
آویشن	<i>Thymus vulgaris</i>		tail flick و Hot plate	هیدروالکلی گیاه	-	(۴۱)
بادرنجبویه	<i>Melissa officinalis</i>		tail flick	آبی سرشاخه‌ها	مکانیزم ضددردی مرکزی	(۴۴)
پونه	<i>Menthe pulegium</i>		آزمون فرمالین	آبی الکلی برگ	مهار سنتز NO و واسطه‌های التهابی و گیرندهای NMDA و تحریک گیرنده‌های اپیوئیدی	(۴۲)
مریم نخودی خزری	<i>Teucrium hyrcanicum</i>		آزمون پیچش و فرمالین و پرش دم	آبی برگ	مهار سنتز پروستاگلندین‌ها و مهار سیستم عصبی مرکزی	(۵۲)
-	<i>Salvia hypoleuca</i>		آزمون فرمالین	الکلی برگ	سیستم اپیوئیدی و مهار میانجی‌های پیش التهابی	(۵۳)
کاکوتی	<i>Ziziphora tenuior</i>		آزمون پیچش	آبی الکلی برگ و سرشاخه‌ها	مهار آزادسازی اسید آراشیدونیک و سنتز پروستاگلندین‌ها و اثر بر سیستم اپیوئیدی	(۵۴)
کلپوره	<i>Teucrium polium</i>		پرش دم	آبی	اتصال به گیرنده‌های درد و تأثیر بر کانال‌های حساس به لیگاند و کاهش ورود سدیم	(۵۵)
مرزنجوش	<i>Origanum vulgare L.spp.viride</i>		پرش دم	آبی	ترکیبات آنتی اکسیدانتی و فرایندهای التهابی و گیرندهای اپیوئیدی	(۱۰) (۵۶)
مرزه	<i>Satureja hortensis linn</i>		تست فرمالین و پرش دم	عصاره آبی بذر	از طریق مکانیزم‌های مرکزی و فرایندهای التهابی	(۵۷)
مریم گلی	<i>Salvia sclarea</i>		آزمون پیچش و آزمون فرمالین و پرش دم	اتانولی بخش‌های هوایی و هیدروالکلی برگ	اثرات محیطی و فرایندهای التهابی و گیرندهای اپیوئیدی	(۲۸) (۵۸)
نعمان	<i>Mentha piperita Linn</i>		تست فرمالین و آزمون پیچش	اتانولی برگ	اثرات مرکزی و محیطی	(۳۶)
چای کوهی	<i>Stachys Lavandulifolia</i>		تست فرمالین و خوشه وری دم	هیدروالکلی سرشاخه‌ها	مهار سیکلو اکسیژناز	(۳۹)
ترخون	<i>Artemisia dracunculus</i>	Asteraceae	آزمون فرمالین	پودر برگ (تجویز خوراکی)	وجود فلاونوئیدها و موادی با خاصیت بنزودیازپین‌ها	(۵۹)

منبع	مکانیزم احتمالی	فراکسیون و اندام مورد استفاده	نام تیره	نام علمی گیاه	نام محلی گیاه
(۴۳)	مکانیزم‌های کولیزیزیک	قطره تجاری (Chamamill)	تست فرمالین	<i>Matricaria chamomilla</i>	بابونه
(۶۰)	سروتونرژیک، گاباژرژیک و آدرنرژیک و فرایند‌های التهابی	آبی الکلی سرشاخه‌های هوایی			کنگر
(۶۱)	فرایند‌های التهابی	الکلی اندام‌های هوایی			مخلاصه
(۴۷)	مکانیزم ضددردی محیطی و مسیرهای کولیزیزیک	هیدروالکلی میوه	تست فرمالین	<i>Solanum melongena</i>	بادمجان
(۴۹)	مکانیزم‌های کولیزیزیک و اپیوئیدی	الکلی دانه			بنگ دانه
(۳۳)	تعویت سیستم اپیوئیدی و کاهش واسطه‌های دردزای محیطی و مرکزی	الکلی بذر			تابوره
(۹)	از طریق مهار مسیرهای مرکزی و محیطی	عصاره هیدروالکلی ریشه	Boraginaceae	<i>Solenanthus circinnatus</i>	آزار چوب
(۳۸)	تأثیر فلاونوئیدها و استروئیدها	الکلی بخش‌های هوایی	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i>	شیرمال
(۶۲)	تأثیر اسیدهای چرب ضروری	آبی و روغنی میوه	تست فرمالین	<i>Carum copticum</i>	زنیان
(۶۳)	مهار سنتز NO و گیرنده‌های NMDA و تحریک سیستم اپیوئیدی و آدرنرژیک	آبی الکلی بخش‌های هوایی			بیلهر
(۶۴)	فعال کردن مسیرهای ضددردی	الکلی برگ			جعفری
(۶۵)	مهار سیکلواکسیژنان	هیدروالکلی میوه	تست فرمالین	<i>Apium graveolens</i>	کرفن
(۶۶)	خواص ضددردی مرکزی و اثر بر رسپتورهای اپیوئیدی	آبی الکلی برگ			بن سرخ
(۳۷)	مهار گیرنده‌های اپیوئیدی و مهار مدیاتورهای التهابی	هیدروالکلی صمغ			پسته
(۶۷)	مهار سنتز پروستاگلندین‌ها	هگزانی، اتیل استاتی و متانولی میوه، برگ و ریشه	Adoxaceae	<i>Sambucus ebulus</i>	پلم
(۶۸)	مهار سنتز پروستاگلندین‌ها و سایر میانجی گرهای التهابی	هیدروالکلی میوه	Verbenaceae	<i>Vitex agnus castus</i>	بنج انگشت
(۶۹)	-	آبی تخم	Apiaceae	<i>Coriandrum sativum</i>	گشنیز
(۷۰)	تأثیر سیستم سروتونرژیک	آبی برگ	Fabaceae	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	شنبلیله
(۷۱)	اثرات مرکزی و محیطی	الکلی و آبی بخش‌های هوایی (ساقه و برگ)	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	خرفه
(۷۲)	افزایش کربوهیدراتهای خون و افزایش سطح بتاندرووفینها و مکانیزم‌های محیطی	آبی میوه	Palmaceae	<i>Phoenix dactylifera</i>	خرما

منبع	مکانیزم احتمالی	فراکسیون و اندام مورد استفاده	نوع تست درد	نام تیره	نام علمی گیاه	نام محلی گیاه
(۴۵)	مهار سنتز NO و مهار تولید COX2 و پروستاگلندین ها و تحریک گیرنده های اپیوئیدی	آبی الکلی پوست ساقه	آزمون فرمالین	Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	دارچین
(۷۳)	مهار آزاد سازی کلسیم، انسداد گیرنده های TRPA1، مهار سنتز NO و E2 سیتوکاین ها و پروستاگلندین	آبی الکلی سرشاخه ها	آزمون فرمالین	Artemisia	<i>Artemisia siberi Besser</i>	درمنه دشتی
(۷۴)	تحریک گیرنده های کابا A	آبی الکلی ساقه و برگ	آزمون فرمالین و پرش دم	<i>Artemisia herba alba</i>	<i>Artemisia</i>	درمنه
(۷۵,۷۶)	گیرنده های اپیوئیدی	عصاره آبی گیاه	آزمون فرمالین	Cannabaceae	<i>Humulus lupulus L.</i>	رازک
(۷۷)	گیرنده های سروتونرژیک و هیستامینرژیک	آبی میوه	آزمون فرمالین	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	رازیانه
(۷۸)	مهار احتمالی گیرنده های NMDA و سنتز نیتریک اکسید	آبی گل	آزمون فرمالین	Iridaceae	<i>Crocus sativus</i>	زعفران
(۷۹)	مهار آزادسازی واسطه های محیطی، سیتوکاین، TNF و ایترلوکین $\beta$ ، فاکتور هسته ای کاپا $\beta$	الکلی ریزوم	آزمون فرمالین	Zingiberaceae	<i>Zingiber officinalis, Z.o</i>	زنجبیل
(۷)	-	آبی میوه	آزمون فرمالین		<i>Cuminum cyminum L.</i>	زیره سبز
(۸۰)	مهار میانجیهای پیش التهابی و گیرنده های NMDA	آبی میوه و آبی برگ	آزمون پیچش و آزمون فرمالین	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	سنجد (ذیتون روسی)
(۸۱)	اثرات ضد التهابی و مسیرهای اپیوئیدی	متانولی پیاز	آزمون فرمالین و آزمون فرمالین	Colchicaceae	<i>Colchicum szovitsii Fisch&amp; C.A.Mey</i>	سورنچان کرمانی (گل) حسرت برفی
(۸۲)	فعالیت هسته پارازیگاتنسلولاریس	عصاره آبی گیاه	آزمون فرمالین	Droseraceae	<i>Drosera spatulata</i>	شبنم خورشید
(۸۳)	مهار مهاجرت گلبلول های سفید و تولید واسطه های التهابی در نوتروفیل ها	هیدروالکلی ریشه	آزمون فرمالین و پرش دم	Fabaceae	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	شیرین بیان
(۴۸)	مهار آنزیم COX1 و 5-LO	آبی سرشاخه های گلدار	آزمون فرمالین و پرش دم	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	علف چای (گل) شهناز)
(۸۴)	ضد التهابی و مرکزی	متانولی میوه	فرمالین	Piperaceae	<i>Piper nigurm</i>	فلفل سیاه
(۸۵)	مهار آنزیم COX1، مهار آزاد سازی کلسیم، مکانیزم های کولینرژیک و هیستامین و آدرنرژیک	الکلی برگ	تست فرمالین	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	گردو
(۸۶)	سیستم اپیوئیدی	آبی، الکلی و کلروفرمی گل	صفحه داغ و پرش دم	Rosaceae	<i>Rosa demascena</i>	گل محمدی

منبع	مکانیزم احتمالی	فراکسیون و اندام مورد استفاده	نوع تست درد	نام تیره	نام علمی گیاه	نام محلی گیاه
(۳۵)	آلکالوئیدها	متانولی بخش‌های هوازی	تست فرمالین و صفحه داغ	Papaveraceae	<i>Glaucium grandiflorum</i>	گلوسیوم گرندیفلوروم
(۸۷)	فرایندهای التهابی	متانولی گل	تست فرمالین و صفحه داغ		<i>Matricaria chamomilla</i>	بابونه
(۸۸)	مکانیزم‌های مرکزی و محیطی	آبی-الکلی برگ	آزمون فرمالین و پرش دم	Comositeae	<i>Lactuca sativa longifolia</i>	کاهوی ایرانی
(۸۹)	مهار سنتز NO و COX2	هیدروالکلی دانه	تست فرمالین	Papilionaceae	<i>Securigera securidaca L.</i>	گنده تلخه
(۹۰)	فرایندهای التهابی و فاقد اثرات اپیوئیدی	متانولی میوه	آزمون فرمالین و پرش دم	Leguminosae	<i>Melilotus officinalis</i>	ناختنک
(۹۱)	سیستم اپیوئیدی	آبی الکلی ریشه	آزمون فرمالین	Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris L.</i>	زرشک

اپیوئیدی نیز مشکلاتی مانند مقاومت به دارو، وابستگی، سرخوشی و سواستفاده وجود دارد<sup>(۵۷)</sup>، گیاهان دارویی از ابتدائی ترین روشها برای مقابله با بیماریها و تسکین درد بوده اند<sup>(۳۴)</sup>. عقیده بر این است که اغلب ترکیبات طبیعی و به خصوص گیاهان طبی می‌توانند منبع یافتن ترکیبات جدید باشند. به دلیل اینکه برخی ترکیبات مشهور دارویی فعلی مثل آسپیرین، آتروپین، مورفین و کوکائین از گیاهانی که به عنوان ضد درد استفاده می‌شده اند به دست آمده است<sup>(۵۷)</sup>.

صرف مواد شیمیایی و گیاهی یکی از روشهایی است که در کنترل درد قدمتی کهن دارد<sup>(۶۰)</sup>. به علت وجود مواد موثر در داروهای گیاهی و همراه بودن آنها با مواد دیگر یک حالت تعادل بیولوژیکی بوجود می‌آید که مانع از انباشته شدن آنها در بدن می‌شود. وجود عوارض جانبی کم و یا نداشتن عوارض جانبی علت برتری قابل ملاحظه گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی ضد درد است<sup>(۲)</sup>.

همان طوری که از جدول ۱ پیداست بیشترین آزمون مورد استفاده در بررسیهای ضد دردی آزمون فرمالین است. آزمون فرمالین دارای دو مرحله حاد و مزمن است. مرحله حاد آن مربوط به دردهای غیرالتهابی (نوروزنیک) است که در این مرحله پیام درد از طریق مسیرهای عصبی خاص منتقل می‌شود. مرحله مزمن مربوط به دردهای التهابی بوده که در این مرحله انتقال پیام درد به علت واکنش التهابی ناشی از تحریق فرمالین است. معمولاً داروهایی که بتوانند بر روی سیستم عصبی اثر

## بحث و نتیجه گیری:

درد هنگام وقوع آسیب بافتی ایجاد و باعث می‌شود فرد واکنشی جهت حذف محرک درد آور انجام دهد. در پاتوفیزیولوژی درد ارتباط بسیار پیچیده‌ای بین ساختمانهای محیطی و مرکزی از سطح پوست تا کورتکس مغز وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت درد پاسخی شامل بخش‌های حسی، هیجانی و عاطفی است. بیماری، التهاب و آسیب به سیستم عصبی مرکزی و محیطی موجب تغییرات بازز در مسیرهای درد مانند افزایش تحریک پذیری، تغییر بیان ژن و مولکول‌های جدید نظروترانسمیترها، آنزیم‌ها و گیرندهای می‌شود. ابتلا به بعضی از دردها در درازمدت اثرات نامطلوب روحی و روانی بر فرد تحمل می‌کند. به همین دلیل بشر همیشه به دنبال یافتن راه حلی برای از بین بردن یا کاهش درد بوده است<sup>(۶۱)</sup>.

درد یکی از پدیده‌هایی است که هر انسانی در طول عمر خود با آن مواجه شده و یک عامل هشدار دهنده محسوب می‌گردد، اما به هر حال یک احساس ناخوشایند است و بشر به دنبال راهی برای مقابله با آن بوده است. آنالیز تحقیقهای دهه‌های اخیر نشانگر توجه خاص در مورد داروهای ضد درد است. از آنجایی که داروهای ضد درد موجود در بازار دارویی، طیف وسیعی از عوارض نامطلوب را از خود نشان می‌دهند<sup>(۳۴)</sup>، به عنوان مثال شبه آسپیرین‌ها آسیهایی را به دستگاه گوارش، کلیه‌ها و سیستم عصبی مرکزی وارد می‌سازند و علاوه بر این در بعضی از بیماران موثر نیستند. در مورد داروهای ضددردی

فلاونوئیدها یکی از مهار کننده‌های آنزیم سنتز کننده نیتریک اکساید به شمار می‌روند و مانع تولید NO می‌شوند که به دنبال تزریق فرمالین افزایش می‌یابد، بنابراین کاهش آن منجر به فعالیت ضد دردی می‌شود. سایر مطالعات نشان می‌دهند که فلاونوئیدها با مهار فعالیت گیرنده‌های N-متیل-D-آسپارتات سبب کاهش کلسیم داخل سلولی می‌شوند و به دنبال آن فعالیت آنزیم سنتز کننده نیتریک اکساید و فسفولیپاز A2 وابسته به کلسیم کاهش می‌یابد و در نتیجه با کاهش NO و پروستاگلاندین‌ها اثرات ضد دردی خود را نشان می‌دهند. مهار فعالیت آنزیم فسفولیپاز A2 باعث مهار تبدیل اسید فسفوتیدیک به اسید آراشیدونیک می‌شود و در نتیجه سنتز پروستاگلاندین‌ها مهار می‌گردد<sup>(۳۱)</sup>. با توجه به شواهد موجود، فلاونوئیدها با مهار فاکتور نکروز کننده تومور (TNF)<sup>(۴۵)</sup> و مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز تولید پروستاگلاندین (E) را از اسید آراشیدونیک در پاسخ به محرك‌های التهابی مهار می‌کنند<sup>(۴۹)</sup>.

فلاونوئیدها از جمله آبی ژنین تجمع لبیدهای شناور را که برای سیگنال کردن درد ضروری هستند را کم می‌کند. بنابراین، فلاونوئیدها با مهار تجمع گیرنده‌ها و آبشار سیگنالی درد التهابی را کم می‌کنند<sup>(۶۵)</sup>.

فلاونوئیدهای موجود در ترخون با خاصیت حفاظت کننده دربرابر استرس اکسیداتیو ناشی از حالت هیپرگلیسمی و موادی با خاصیت مشابه بنزودیازپین‌ها سبب کاهش درد شده است<sup>(۵۹)</sup>. تاثیر مستقیم فلاونوئیدها بر سنتز پروستاگلاندین‌ها اثبات شده است. از آنجا که NO میانجی پردردی است، بنابراین کاهش آن منجر به فعالیت ضددردی می‌شود. فلاونوئیدها از طریق سیستم اپیوئیدی و سیستم آدرنرژیکی در تعديل درد دخالت دارند. از بین روغنها ضروری ترکیب آلفا-اوسمول مهار کننده کانال‌های کلسیمی نوع P/Q حساس به امگا توکسین می‌باشد و از این طریق موجب مهار آزاد سازی نوروتانسミترها از پایانه‌های فیبرهای در شاخ خلفی نخاع می‌شود و در نهایت باعث کاهش درد می‌گردد<sup>(۶۳)</sup>.

گلیسیرین‌زین یکی از ترکیبات شیرین بیان است که اثر ضد التهابی خود را با مهار مهاجرت گلبول‌های سفید به سمت

داشته باشند بر مرحله حاد تاثیر گذار بوده و داروهای ضد التهاب اغلب در مرحله مزمن آزمون فرمالین منجر به تعديل درد می‌شوند<sup>(۲)</sup>. عوامل ضد دردی مختلف ممکن است در مرحله نخست و ثانویه به صورت کاملاً متفاوتی عمل نمایند. بنابراین، این آزمون می‌تواند برای مشخص شدن مکانیسم احتمالی ضددردی عامل مورد مطالعه به کار رود. داروهایی نظیر اپیوئیدها که به صورت مرکزی عمل می‌کنند، هر دو مرحله را مهار می‌نمایند<sup>(۳۵)</sup>. اثر تولید شده در مرحله اول وابسته به اثرات مستقیم و حد واسطه بر گیرنده‌های حسی، برادی کینین یا مسیر گلوتاماترژیک است<sup>(۲۸)</sup>، اما ضددردهایی که به صورت محیطی عمل می‌کنند مانند آسپیرین، ایندومتا辛 و دگزاماتازون تنها مرحله تاخیری را مهار می‌کنند. به نظر می‌رسد که مرحله تاخیری یک پاسخ التهابی همراه با درد ناشی از التهاب است که می‌تواند توسط داروهای ضددرد التهاب مهار شود<sup>(۳۵)</sup>.

یکی از ترکیبات فراوان در گیاهان با خاصیت ضددردی فلاونوئیدها هستند. فلاونوئیدها ترکیبات پلی فنل طبیعی موجود در گیاهان می‌باشند که دارای خواص ضد دردی و ضد التهابی اند<sup>(۴۹)</sup>. فلاونوئیدها می‌توانند از سد خونی-مغزی عبور کنند و به واسطه مکانیزم‌های مختلفی از جمله اثر بر گیرنده‌های GABA<sub>A</sub>، اپیوئیدی، آلفا دو آدرنرژیک و مهار آنزیم‌های درگیر در التهاب در مغز درد را به صورت مرکزی کنترل کنند. در نواحی مختلف سیستم عصبی از جمله در ناحیه نوکی شکمی جانبی بصل النخاع (Rostral ventrolateral medulla) که هسته پارازیگانتوسلولاریس نیز بخشی از آن است، وجود گیرنده‌های GABA<sub>A</sub>، اپیوئیدی، آلفا دو آدرنرژیک گزارش شده است. تحریک این گیرنده‌ها موجب بسی دردی می‌شود<sup>(۴۲)</sup>.

فلاونوئیدها با مهار سیکلو اکسیژناز در بافت ملتهب، مانع از تشکیل پروستاگلاندین‌ها می‌شوند. پروستاگلاندین‌ها سبب تحریک رسپتورهای درد می‌شوند. گیاهان حاوی فلاونوئید بسیاری از آثار خود را با مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز اعمال می‌کنند<sup>(۳۸)</sup>.

فنل هایی نظیر اوژنول سبب مهار ورود کلسیم به داخل سلول گشته و از این طریق رهاسازی نوروترانسمیترهای دخیل در درد را از پایانه فیبرهای آوران درد در شاخ خلفی نخاع مهار می کند<sup>(۴۵)</sup>.

مونوتراپن های فنولی نظیر تیمول و کارواکرول<sup>(۵۶)</sup> دارای اثرات مهار کننده بر پروستاگلندین ها هستند<sup>(۱۰)</sup>.

ماده جینجرول به عنوان ترکیب موثره ریزوم زنجیبل توانایی قوی در مهار تولید پروستاگلندین ها، لوکوتربین ها، کینین را به عنوان مهمترین واسطه های التهابی دارد. به علاوه، سبب مهار آزاد سازی انواع سیتوکین ها، TNF و ایترولوکین یک بتا و کاهش عامل کاپا بی توسط این عصاره می شود. عصاره زنجیبل سبب کاهش تولید NO و PGE2 می شود. این ترکیبات واسطه های مهم افزایش نفوذپذیری عروقی هستند. کاهش نفوذپذیری عروقی و تولید واسطه های درد و التهاب به عنوان مهمترین عوامل تخفیف دهنده التهاب و به دنبال آن درد توسط زنجیبل است<sup>(۷۹)</sup>.

از ترکیبات الكلی، کافور باعث کاهش درد التهابی می شود. کافور موجب غیر حساس شدن کانال های TRPV1 شده که اثرات ضددردی دارد. کافور سترز NO و سیتوکاین ها و پروستاگلندین E2 را مهار می کند. همچنین سبب مهار آزاد سازی کلسیم می شود<sup>(۳۳)</sup>.

ترکیبات فنلی نظیر تیمول اثرات پاراسمپاتیک را تقليید می کند. سیستم کولینرژیک یکی از سیستم های تعديل کننده درد است<sup>(۶۲)</sup>.

عصاره آبی علف چای از طریق مکانیزم های سروتونرژیک، آلفا ۲ آدرنرژیک و اپیوئیدرژیک از طریق مهار آنزیم COX1 و LO-5 نیز عمل می کند. مشاهده شده است که بعد از رهایش لوکوتربین ها از بافت های آسیب دیده فیبرهای حسی حساس می شوند. این حساس شدن از طریق لوکوتربین های D4 و B4 که از متابولیت های مسیر لیپو اکسیژنаз می باشد اتفاق می افتند. مهار کننده های 5-LO مانع تولید لوکوتربین های D4 و B4 می شوند. از طرف دیگر رهایش پروستاگلندین ها و لوکوتربین D4 و مهار کننده های COX1 دردهای تونیک ایجاد شده مانند درد فاز دوم آزمون فرمالین و درد ناشی از اسید استیک را

ناحیه ملتهب و مهار تولید واسطه های التهابی در نوتروفیل ها اعمال می کند. استفاده خوراکی از شیرین بیان موجب مهار آنزیم ۱۱- بتا دهیدروژناز و به دنبال آن افزایش سطح کورتیزول خون می شود. این امکان وجود دارد که این ماده از طریق کاهش التهاب موجب کاهش درد در مرحله دوم تست فرمالین شود<sup>(۸۳)</sup>.

از ترکیبات ضد دردی در گیاهان متون، تانن و متول است. مطالعات نشان می دهد متول دارای گیرنده اختصاصی در غشاء سلول است که منجر به کاهش جریان رو به داخل سلولی در حالت استراحت شده و آستانه تحریک سلول ها را افزایش می دهد. این ترکیب با اثر بر کانال های کلسیمی موجود در غشاء سلول های عصبی به ویژه نورون های مسیر درد، سبب کاهش جریان کلسیمی رو به داخل شده و تحریک پذیری و میزان انتقال سیناپسی را کاهش می دهد و منجر به کاهش احساس درد می شود. با توجه به تاثیر متوالی بر رسپتور های اپیوئیدی کاپا احتمالاً متوالی موجود در عصاره گیاهان روی این رسپتورها تاثیر می گذارد و بدین طریق جریان و انتقال سیگナル درد را مهار می کند و منجر به کاهش احساس درد می شود<sup>(۴۲)</sup>.

عصاره بعضی از گیاهان مانند جعفری یا خرفه احتمالاً با فعال کردن سیستم های دخالت کننده در مسیر ضددردی مانند اپیوئیدرژیک، گابائرژیک، کولینرژیک و گلوتاماترژیک اثرات خود را اعمال می کند<sup>(۶۱، ۶۴)</sup>.

در مورد گیاهانی که حاوی قند بالا نظیر خرما هستند، ممکن است قسمتی از اثرات ضد دردی آنها از طریق افزایش سطح هیدرات های کربن خون باشد. از طرفی بیست دقیقه بعد از تجویز مواد شیرین مزه سطح بتالندروفین های هیپوتالاموس افزایش می یابد<sup>(۷۲)</sup>.

برای ترکیبات ترپنی خاصیت مهار کننده کسید اسید آراشیدونیک و آنزیم نیتریک اکسید سنتاز ذکر شده است. همچنین لینالول یکی از ترکیبات مونوتراپنی دارچین است که بر رسپتور های درد اثر کرده و سبب خاصیت ضددردی می شود. لینالول با باز کردن کانال های پتاسیمی باعث ایجاد توان مهاری در نورون های سیستم عصبی مرکزی می شود.

به نظر می‌رسد که ترپنئیدها، فلاونوئیدها و آلکالوئیدها از طریق مهار سنتز پروستاگلندین‌ها و مهار سیستم عصبی مرکزی سبب اثر ضد دردی می‌شوند<sup>(۵۲)</sup>.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که در بین گونه‌های گیاهی که خاصیت ضد دردی دارند خانواده نعناعیان بیشترین گونه‌ها را به خود اختصاص داده و در بین ترکیبات مختلف با اثر ضد دردی فلاونوئیدها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین ترپن‌ها، روغنها و ضروری و فرار نیز اثر ضددردی دارند. کشور ایران غنی از منابع گیاهان دارویی است و توجه به این گیاهان و حفظ آنها به عنوان سرمایه‌ای ملی می‌تواند در توسعه کشور نقش بسزایی داشته باشد.

کاهش می‌دهند. نقش مهاری LO-5 بر رهایش پروستاگلندین‌ها و تولید لوکوتین‌های مختلف D4 و B4 در طی مرحله دوم (نهایی فرمالین) تا حدود زیادی روشن شده است<sup>(۴۸)</sup>.

مهمنترین ترکیبات میوه فلفل آلکالوئیدهای پی پرین و پی پریدین می‌باشد. ترکیب پی پریدین به طور مستقیم روی ریپتورهای اپیوئیدی اثر می‌گذارد<sup>(۸۴)</sup>.

اثر ضددردی گیاه کاکوتی از خانواده نعناعیان به پولگون نسبت داده شده است که به نظر می‌رسد از طریق مهار اسیدآراشیدونیک اسید و سنتز پروستاگلندین‌ها و اثر بر اپیوئیدها باشد<sup>(۵۴)</sup>.

لاکتوکاریوم موجود در کاهو سبب مهار فعالیت آنزیم انکفالیناز شده و با حفظ انکفالین اثر ضددردی را به جای می‌گذارد<sup>(۸۸)</sup>.

**REFERENCE:**

1. M. Vaez Mahdavi, R.: The history of methodological studies and research of pain, Tehran: Shahed university Press, 44-41, 1996.
2. AA. Taherian, H. Etemadi, H Sadeghi: Assessment of Aqueous Extract of Seed of Cuminum cyminum L. on Neurogenic and Inflammatory Pain in Mice. Journal of Medicinal Plants: 2007,6(24) :44-50.
3. A. Ziai, B. Mesgarpour: Medicinal herbs Publish of Tabib, 415, 2006
4. A. Guyton, J. Hall: Textbook of Medical Physiology: translating by F. Shadan ,Iran: publishing Chehr, 903-1028, 2004.
5. Appenzeller D.F, Cantweel J.D. Health aspects of endurance training. New York:S.Karger; 1998. p564-568.
6. Saarto T. Antidepressants for neuropathic pain: a Cochrane review. J NeuralNeurosurg Psychiatry 2010; 81: 1372-3.
7. Sukkar M.Y, Munshid H.A, Ardawi M.S. Concise human physiology. Australia : Blackwell Science publication; 1993. 446-464.
8. Karimpour H: Antinociceptive effects of Teucrium polium L, Ph.D. thesis of Pharmacy degree, Tehran University of Medical Sciences, 2002.
9. Ranjbar, A.: Analgesic effect of Solenanthus circinnatus root extract in male rats. Journal of Isfahan Medical School: 2009, 27 (101): 660- 668
10. Sepehri G.R., and Sheibani V., Pahlavan Y, Afarinesh Khaki M.R., Effect of intracerebroventricular injection of aqueous extract of Origanum vulgare L. ssp. virde on pain threshold in male rats. Journal of Ardabil University of Medical Sciences: 2011, 11 (1): 52-58.
11. Messlinger K. What is a nociceptor? Anaesthetist 1997 Feb ;46(2):142-53.
12. Bhave G Karin F, Carlton . Peripheral group 1 metabotropic glutamate receptors modulate nociception in mice .Nature neuroscience 2001; 4:417-423
13. Goudet C, Magnaghi V, Landry M, Nagy F, Gereau RW, Pin JP. Metabotropic receptors for glutamate and GABA in pain. Brain Res Rev 2009 Apr;60(1):43-56.
14. Carozzi V, Marmiroli P, Cavaletti G. Focus on the role of glutamate in the pathology of the peripheral nervous system. CNS Neurol Disord Drug Targets 2008; 7: 348-360.
15. Bear M. F, arry Connors B. W, Paradiso M.A. Neuroscience Exploring the brain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.p. 411.
16. Jessell TM. Substance P in nociceptive sensory neurons. Ciba Found Symp 1982;(91):225-48.
17. Berne R. M and Matthew L, Koeppen B.M, Stanton B.A. Physiology,5d edition. UK: Mosby company; 2004.p.95-98.
18. Thurmond RL, Gelfand EW, Dunford PJ. The role of histamine H1 and H4 receptors in allergic inflammation: the search for new antihistamines . Nat Rev Drug Discov 2008 Jan.;7(1):41-53.

19. Mc mahon SB. NGF as a mediator of inflammatoryPain. Philoso trans R Soc Lond [Biol.] 1996; 351:431-440 .
20. Chuang H & et al . Bradykinin and nerve growth factor release the capsaicin receptor from ptdlns94,5)P2-mediated inhibition. Nature 2001; 411(6840):957-962.
21. Shu XQ, Mendell LM. Neurotrophins and hyperalgesia. Proc Natl Acad Sci 1999 Jul ; 96(14):7693-6.
22. Chen CC,Akopian AN,Sivilotti L, Colquhoun D, Burnstock G, Wood JN . A P2X purinoceptor expressed by a subset of sensory neurons. Nature1995; 377(6548) :428-431.
23. Giuffrida A, Beltramo. M, Piomelli D. Mechanisms of endocannabinoid inactivation: biochemistry and pharmacology. J Pharmacol Exp Ther2001; 298:7–14.
24. Walker JM, Krey JF, Chu CJ, Huang SM. Endocannabinoids and related fatty acid derivatives in pain modulation. Chem Phys Lipids2002;121:159–172.
25. Sanger G.J. Endocannabinoids and the gastrointestinal tract;What are the key question? . J Pharmacol 2007; 152(5) :663-670.
26. D. Carroll, D Bowsher: Pain management and nursing care. Translation:A Shrofi, Sajedi F., N. Boustany. Pub. Of Chehr, Tehran, 311-315, 1995.
27. N. Gheibi, M. Javdan: Noxious behaviours from injection of formalin and morphine tolerance of addicted male rats. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences: 2004, 31: 22-28.
28. A. Eidi, M. Eidi, A. Mazooji, S. Mortezaie: Antinociceptive effects of ethanolic extract of Salvia sclarea L. aerial parts in mice. Journal of Sciences (Islamic Azad University): 2011, 20 (78/1): 61-70.
29. Nadeau S, Ferguson T, Valentein E, Vierck C, Petruska J, Streit W, Ritz L. Medical neuroscience.USA: Elsevier Health Sciences Publisher; 2004.p.313-350.
30. Wikipedia, the free encyclopedia. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. <http://en.wikipedia.org>
31. Lopez L.S, Pereira S.S, Silva L, Figueiredo k.A, Moura B.A, Almeida F, Sousa F. Antinociceptive effect of Topiramate in models of acute pain and diabetic neuropathy in rodents. Life Sciences 2009:105-110.
32. D. Farzin, L. Asghari, M. Norousi: Effect of different histamine receptor agonists and antagonists on the pain thresholdcaused by hot plate and abdominal Writhing in mice. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences: 2000, 10 (28): 40-54.
33. M. Khalili Najafabadi, S.M. Atyabi : Evaluation of analgesic effect of of Datura stramonium seed extract in hot plate and formalin tested on male rats. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants: 2004, 20 (3): 309-. 322.
34. M.R. Heidari, M. Vahedian , S. Momenzadeh, M.M. Hayatbakhsh-A: Evaluation of the analgesic effect of Colchicum szovitsii Fisch & C.A. Mey extract in mice: possible mechanism involved. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences: Summer and Autumn 2005 , Volume 2, Number 3 and 4: 187-194.
35. M. Semnani, M. Saeedi, M. Hamidian, H. Vafamehr, AR. Dehpour: anti-inflammatory, analgesic activity and acute toxicity of Glaucium grandiflorum extract. J Ethnopharmacol 2002, 80(2-3): 181-6.
36. Eidi , A.H. Rustaiyan, M. Eidi, M. Bahramian: Antinociception effects of ethanolic extract of Mentha piperita leaves in adult male mice. Iranian Journal of Biology: 2010, 23 (4): 613-621.

37. S. Parv ardeh, M. Niapoor, M. AslNassiri, , H. Hosseinzadeh: Antinociceptive, anti-inflammatory and toxicity effects of Pistacia vera extract in mice and rat. *Iran. J. Med. Plants*:2002,1: 59-68.
38. A. BABAEI, A.A. PILEHVARIAN , M. SHIRANI, F. KHEYRI SOLEYMAN,TAJI,ASGARI A., M RAFIEIAN: EFFECT OF EUPHORBIA HELIOSCOPIA ON ACETIC ACID-INDUCED ABDOMINAL CONSTRICtIONS IN BALB/C MICE. *SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL: WINTER 2010*, 11(4 (SUPPL 1 COMPLIMENTARY MEDICINE)): 9-14.
39. S. Nasri , A. Ramezanghorbani, M. Kamalinejad: Analgesic and anti-inflammatory effects odf hydroalcoholic extract Stachys lavandulifolia Vahl aerial parts in male mice. *Armaghan Danesh: JUNE-JULY 2011*, 16(2 (62)):161-171.
40. S. Nasri, N. Yousofvand, S. Khani : Effectiveness of exogen testosterone and Finasteride on morphine analgesia in male mice using the formalin test. *Journal of Ilam University of Medical Sciences: Summer 2011*, 19 (2): 48-38.
41. AA. Taherian, A. Rashidy Pour, M. Arefi, AA. Vafaei, M. Jarrahi, H. Miladi Gorji, M. Emami Abarghoii, H. Sadeghi,: Effects of Hydroalcholic extract of Thymus Vulgaris on pain ( Tail Flick and Hot Plate) in mice : *Koomesh: 2004, Spring and Summer, 5(3,4)*, 179-185.
42. Mokhtari M, Shariati M, L Khodaparast: The antinociceptive effect of hydro-alcoholic extract of leave Mentha pulegium in formalin test in male rat. *Journal of Shahrekord University of Medical Sciences / 10 ( 4 ) (suppl1 3- Serial : 40: 2009 , 12-7.*
43. A.Vahidi , M.H. Dashti, S.H. Jamaladdini: Antinociceptive effect of Chamomill on Formalin induced pain in Rat : *Scientific Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services : Summer 2001 9(2) , 60-66.*
44. Miladi Gorji H, Rashidi Pour A, Vafaei AA, Taherian AA: Opioid receptors role on anti-nociceptive effects of the aqueous extracts of Melissa Officinalis in mice: *Journal of Hormozgan University of Medical Sciences: 2006;10(1) :28-23.*
45. Dashti-Rahmatabadi M, Vahidi Merjardi A, Pilavar A, Farzan F. Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat. *JSSU. 2009; 17 (2) :190-199*
46. Ranjbar, A.: The Effect of Solenanthus circinnatus root extract on actue carrageenan – Induced inflammation. *Journal of Isfahan Medical School: 2007, 26 (91) :349-353*
47. M H Dashti Rahmatabadi, M Anvari et al: The effect of Solanum melongena L. hydro-alcoholic extract on chronic pain in male mice as compared with morphine : *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants:2009, 25( 1): 129-138.*
48. M Khaksarian , M Javan, A Sonboli , F Motamedi: Inhibition of acute and chronic pain in male rats by aqueous extract of Hypericum perforatum L: *Yafteh. 2004; 5 (3) :11-1*
49. Z. Kiasalari, M. Khalili, M. Ashrafi: Anti-nociceptive effect of alcoholic extract of henbane seed on the different phases of estrous cycle of female Rats: *J Gorgan Uni Med Sci: Winter 2010; 11 (4):1-7*
50. V.A HAJ HASHEMI, A GHANADI, D MOSAVI: ANALGESIC AND ANTIINFLAMMATORY EFFECTS OF TOTAL EXTRACT, FLAVONOID FRACTION AND VOLATILE OIL OF SALVIA HYDRANGEA. *Journal of Research in Medical Sciences: 2000; 5 (4): 10 - 14.*

51. Heidari MR, Zahedi MJ and Rezvani H: Analgesic effect of Lavandula officinalis and histopathological studies in mice: Scientific-Research Journal of Shahed University (DANESHVAR): 2000; 30(7): 23-30.
52. A. Farshchi , G. Ghiasi , A. Abdollahi: Antinociceptive and antiinflammatory effects of Teucrium hyrcanicum aqueous extract in male mice and rats: Physiology and Pharmacology: Spring 2010; 14(1): 78 – 84.
53. A. Eidi \*, k. Parivar, A. Mazouji , Z. Akhtari Antinociceptive effects of essential oil of Salvia hypoleuca L. in mice. Medical Science Journal of Islamic Azad University: 2006, 16 (3) :165-169
54. M. Zendehdel , J. Ghahhari, GhH. Vaezi, N. Shariatifar: The study of hydroalcoholic extract of Ziziphora tenuior on visceral pain with writhing test in mice. Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal. 2009, 15(3): 24-30.
55. MR. Shahraki, H. MirShekari, MJ. Palan: The comparison of nociceptive effect of Teucrium polium and morphine in female rats : Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal: 2005, 12 (1): 10-14.
56. Y. Pahlavan, GR Sepehri, MR. Afarinesh Khaki, V. Sheibani, K. Esmail Pour Bezenjani, Pahlavan B: Intervention of Morphine and Naloxone on Analgesic Effects of Origanum vulgare Extract in Male Rat: Journal of Ardabil University of Medical Sciences: 2010, 11 (2): 142-134.
57. J. VERDI, M. KAMALINEZHAD, M. SABET KASAEI, SH. SHARIF: ANALGESIC EFFECT OF AQUEOUS SATURAJA HORTENSIS L. SEED EXTRACT IN MALE RAT. Journal of PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY; Fall 2004-Winter 2005, 8(2):163-168.
58. A. Arzi, A. Sarkaki , N. Aghel, Z. Nazari, M. Zarei Naserabadi: The Effect of Salvia officinalis Hydroalcoholic Extract on Analgesic Effect of Morphine in Rat. Sci Med J 2011;10(5):505-13
59. M. Roghani , T. Baluchnejadmojarad, B. Sabouri , N. Nahavandi: The analgesic effect of oral administration of tarragon in diabetic rats. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences:2006; 9 (4) :19-24
60. Sh. Oryan, S. Nasri, GhR. Amin, SMM. Kazemi-Mohammady: Anti nociceptive and anti-inflammatory effects of aerial parts of Gundelia tournefortii L. on NMRI male mice. Journal of Shahrekord University Of Medical Sciences: Winter 2011, 12(4.) (Suppl 1),: 8-16
61. Parvin N, Ansari Samani R, Shahinfard N, Reissi S, Alibabaie Z, A. Asgari A. Effect of alcoholic extract of Tanacetum parthenium on acute pain in rat. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences: 2012, 16 (1) :15-21
62. S.H. HEJAZIAN, A. FATAHI BAFGHI, M MAHDAVI SEYED: THE ANALGESIC EFFECTS OF AQUEOUS PART OF CARUM COPTICUM (L.) C. B. CLARKE EXTRACT ON CHRONIC PAIN AND COMPARISON WITH OIL PART OF EXTRACT IN MICE. RANIAN JOURNAL OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS; SPRING 2009; 25(1 (43));104-112.
63. M. Mokhtari, M. Shariati, H. Niknam: The Effect of Antinociceptive and Anti inflammatory of Hydro –Alcohol Extract of Dorema aucheri on FormalinTest and Carrageenan Model in Rats. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences: 2008, 7 (3) :165-172
64. A. Eidi, M. Eidi, L. Badiei: Antinociceptive effects of ethanolic extract of parsley (*Petroselinum crispum* L.) leaves in mice. 2009, 19 (3) :181-186
65. S. Nasri,M. Ramazani, N. Yasa. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydro-alcoholic extract of Apium graveolens. J Shahrekord Univ Med Sci: 2009, 10 (4) :25-31

66. M. Khaksarian, M. Meshkatosadat, R. Farzi, F. Safarpour. A Study of Chemistry and Antinociceptive Properties of Medicinal Plant Allium Jesdianum Leaves and the Probable Role of Opioidergic System. *Yafteh*: 2008, 9 (4) :21-26
67. MA. Ebrahim Zadeh, M. Mahmoodi, S. Saeid Nia, F. Pour Morad, E. Salimi: Anti-inflammatory and anti-nociceptive properties of fractionated extracts in different parts of *Sambucus Ebulus*. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*: 2006, 16(54) :42-35.
68. Ramezani M, Amin GH, Jalili A: Antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of *Vitex agnus castus* fruit in mice. *Journal of Shahrekord University Of Medical Sciences*: Winter 2010, 11(4) (Suppl 1): 51-46.
69. A. Taherian, A. Rashidy-Pour, A. Vafaei, M. Jarrahi, H. Miladi-Gorgi, M. Emami-Abarghooii et al . Effect of Aqueous Extract of the *Coriandrum Sativum* Seed on the Reduction of Acute and Chronic Pain in Mice. *Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences*. 2004; 3 (4) :243-249
70. AR. Parvizpour, AH. Ahmadiani, M. Kamali Nejad. Possible role of Serotonergic and Opioid systems in analgesia induced by administration of *Trigonella Foenum-Graecum* (TFG) leaves extract. *Physiology & Pharmacology Journal* 2000, 4(1) :69-63.
71. M.R. Hajzadeh , H. Rakhshandeh, M. Esmaeilizadeh , A. Ghorbani. Analgesic and anti-inflammatory effects of *Portulaca oleracea* extracts in mice & rat. *Koomesh*: 2004, 5 (3) :113-120
72. M. Asadi Shekaari, V. Sheibani, H.A. Ebrahimi, M. Rismanchian, T.P. Kalantari Pour, M.R. Afarinesh: EFFECT OF LONG TERM CONSUMPTION OF AQUEOUS DATE FRUIT EXTRACT ON ANALGESIA RESPONSE IN MALE RAT. *Journal of Babol University of Medical Sciences*: February-March 2008,9 ( 6): 7-12.
73. M.H. Dashti , A. Morshedi , M. Dehghan - H , M.A. Bagherinasab , A.S. Salami: The Effect of *Artemisia sieberi* Besser on Infkammatory and Neurogenic Pain in Mice. *Journal of Medicinal Plants*: 2012, (40) 4: 57-49
74. H. Sadeghifard, P. Zareian. The study of analgesic effect of hydroalcoholic extract of *Artemisia herba alba* in acute and chronic models of pain in male rats. *SJKU* . : 2009; 13 (4) :30-36
75. S. Hejazian, S. Mahdavi. Comparison Between the Analgesic Effect of *Humulus Lupulus* (Hops) Extract and Morphine in Mice. *Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences*: 2006; 5 (4) :273-278
76. S.H. Hejazian: Evaluate the analgesic opiate receptors of hops (*Humulus lupulus L.*) extract in mice. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants*: 2007, 23( 2): 173-166
77. Taherian A, Dehghanina M, Vafaei A, Sadeghi H, Miladi Gorgi H. Effects of aqueous extract of fruit of *Foeniculum vulgar* on neurogenic and inflamatory pain in mice. *SJKU*. 2007; 12 (2) :29-36
78. H Zardooz , J Shams , ,H.R Izadi, H Ghoshooni S Arbabian, M Kamalinejad, H Sahraei, A Noroozzadeh. Effect of water extract of saffron (*Crocus sativus*) on chronic phase of formaline test in female mice. *Kowsar Journal*: 2009, 14(1):11-18.
79. M Khalili, Z Kiasalari, E Farhadi, M Agah. Effects of alcoholic extract of *Zingiber officinalis* rhizome on acute and chronic inflammation and pain in rats. *Koomesh*: 2010; 12 (2) :159-166
80. G. Vaez, Z. Tavasoli, S. Ranjbar-Bahadori. Study on the different dosages of *Elaeagnus angustifolia* aqueous extract with and without morphine on the antinociceptive rate in mice. *Pejouhesh*: 2011; 35 (1) :27-33.

81. M. Sofiabadi, M. Esmaeili, H. Haghdoost, N. Ghaibi. The effect of *Elaeagnus angustifolia* L. leaves extract on pain of male rats. Yafteh: 2008; 10 (1) :23-29
82. S. Golabi , M. hassanpour-ezati, K. Rohampour: Effect of aqueous extracts of sun-dew (*Drosera spatulata*) on the firing rate of PGi nucleus neurons after formalin-induced pain in rats. Journal of Physiology and Pharmacology: 1389, 14 (3): 287-282.
83. Zareian P, Esmaeili Mahani S, M. Taherianfard: The effect of Licorice root extract on acute and chronic pain. J Med Fac,10, 2003; 851-857.
84. M. Heidari, F. Sharifi-Far,A Hajiaghaei : analgesic effect of *Piper nigrum* fruit extract on formalin test in mice. Pejouhesh: 2000, (4) 24: 285-277.
85. M. Mokhtari, M. Shariati, N. Sadeghi. Effect of alcohol extract from leave *Juglans regia* on antinociceptive induced by morphine in formalin test. Medical Science Journal of Islamic Azad University : 2008, 18 (2) :85-90
86. H. Rakhshandeh, M. Hosseini, M. Esmaeli-Zadeh: Analgesic and anti-inflammatory effects of rose (*Rosa demascena*) extract in mice and rats. Iranian Journal of Basic Medical Sciences: 2005, (3) 7: 156-151.
87. M.R Heidari , A Asadipour , M Ghayoor : Evaluation of analgesic and ulcerogenic effect of Methanolic extract of *Matricaria Chamomilla* L. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2002; 5 (4) :15-23
88. B. Heshmatian, S. Nasri, J. Asghari Mehrabad, F. Mahmoudi Far. Antinociceptive Effects of Hydroalcoholic Extract of *Lactuca Sativa Longifolia* Leaves in Male Mice. The Horizon of Medical Sciences. 2010; 16 (2) :5-11.
89. F. Hoodgar, S. Nasri, Gh. Amin: Investigation of Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Hydro-alcoholic Extract of *Securigera Securidaca* L.. Ofogh-e-Danesh; Journal of Gonabad University of Medical Sciences:2011, 17(2): 12-20.
90. MR. Heidari, F. Najafi, A. Asadi pour, M. Ansari, MJ. Zahedi, M. Vahedian: Analgesic and ulcerogenic effect of methanolic extract of *Melilotus officinalis*, Journal of Kerman University of Medical Sciences: 2001, 8 (4): 210-219
91. Mohebali Sh, Nasri S, Kamalinejad M, Noori A.S. Antinociceptive & anti-inflammatory effects of *Berberis vulgaris* L. root,s hydroalcoholic extract and determination of it,s possible antinociceptive mechanism in male mice. JPS 2011; 2(4):12-18.