

بررسی تأثیر برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر کیفیت خواب و تغییرات رفتاری کودکان پس از جراحی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

سعیده الماسی^۱، طبیبه حسن طهرانی^۱، قدرت الله روشنایی^۲، فتح الله بهنود^۳، آرش خلیلی^۴، دکتر فاطمه چراغی^{۴*}

^۱ گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۲ مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۳ گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۴ دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

* نویسنده مسئول: فاطمه چراغی، دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن در منزل،

دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ایمیل: f_cheraghi@umsha.ac.ir

DOI: 10.21859/nmj-25019

چکیده

مقدمه: عدم کنترل مؤثر درد پس از جراحی می‌تواند باعث اختلال خواب، کاهش دریافت مایعات و بروز تغییرات رفتاری مثل بی‌قراری، کج‌خلقی و کاهش فعالیت و بازی شود. این مطالعه با هدف تأثیر برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر کیفیت خواب و تغییرات رفتاری کودکان پس از جراحی انجام شد.

روش کار: در این کارآزمایی بالینی ۶۸ کودک ۶ تا ۱۲ سال بستری جهت عمل جراحی تانسیلکتومی در بیمارستان بعثت و شهید مطهری همدان سال ۱۳۹۲، به همراه والد مراقب انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. برای گروه آزمون مداخله شامل آموزش برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن پس از ترخیص انجام شد. ابزار گردآوری داده هاچکلیست ثبت وقایع در منزل بود که توسط والدین تکمیل شد. داده‌ها توسط SPSS نسخه ۱۶، با آزمون‌های تی مستقل، کای دو و آتاکیز واریانس با اندازه‌های تکراری تحلیل شدند.

یافته‌ها: بین تفاوت میانگین نمرات کیفیت خواب شبانه کودکان گروه آزمون و کنترل در روز اول پس از ترخیص تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد ($P = 0.008$). بین تغییرات رفتاری فقط در متغیر کاهش اشتها در روز اول تا سوم پس از ترخیص تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد ($P = 0.000$). نتیجه گیری: آموزش پیروی از برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن در سه روز اول پس از جراحی‌های سرپایی مانند تانسیلکتومی می‌تواند از بروز تغییرات رفتاری نامناسب در کودکان جلوگیری و نیز باعث افزایش کیفیت خواب و اشتها آنها شود.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

وازگان کلیدی:

تغییرات رفتاری

خواب

کودک

جراحی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی همدان محفوظ است.

مقدمه

شایع در دوران کودکی است که می‌تواند با ایجاد ترس و گلو درد باعث امتناع کودک از خوردن و آشامیدن و در نتیجه افزایش احتمال استفراغ و دهیدراتاسیون، تب و حتی عفونت شود^[۱]. از طرف دیگر، تغییرات رفتاری مثل تغییر در خلق و خوبه صورت بی‌قراری و تحریک‌پذیری، کج‌خلقی، گربه، کاهش انرژی، کاهش فعالیت و بازی، کاهش توجه نسبت به محیط اطراف، تغییر در وضعیت خواب مثل دیدن کابوس و بیدار شدن‌های مکرر و همچنین تغییر در وضعیت تغذیه مانند کاهش اشتها، به عنوان عوارض ناشی از درد پس از عمل جراحی تانسیلکتومی ذکر شده‌اند. این عوامل سبب به وجود آمدن یک تجربه ناخوشایند برای کودک و خانواده خواهد شد^[۲-۴]. در مطالعه‌ای بیش از ۷۷ درصد از والدین گزارش کردند که فرزندانشان پس از تانسیلکتومی در متوسط تا شدیدی را در خانه تجربه کرده‌اند. همچنین آنان کنترل با وجود پیشرفت در طب، درد حاد به دنبال اعمال جراحی، وضعیتی رایج و غیرقابل اجتناب است^[۱]. مطالعات نشان داده که ۸۰ درصد از کودکان حتی بعد از جراحی‌های کوچک نیز، نیاز به ضد درد دارند و بعد از جراحی‌های وسیع تر ممکن است درد شدیدی را تا یک هفته تجربه کنند^[۳, ۲]. عدم کنترل مؤثر این درد نه تنها باعث می‌شود کودکان از درد غیر ضروری رنج ببرند، بلکه می‌تواند منجر به عوارض ناخوشایند زیادی شده و اثراتی مخرب بر روی وضعیت فیزیولوژیکی و روانی کودک داشته باشد. بنابراین با طولانی کردن زمان بستری و بهبودی بیمار سبب افزایش عوارض ریوی، قلبی و عروقی، گوارشی و ادراری بعد از عمل می‌گردد^[۴]. همچنین پیامدهایی مانند اختلال در خواب و اشتها که دو عامل مهم در پیشرفت فرآیند بهبودی هستند، را در پی دارد^[۵]. عمل جراحی تانسیلکتومی از جمله اعمال جراحی سرپایی

مهر تا آذر سال ۱۳۹۲ به دو مرکز درمانی بعثت و شهید مطهری شهر همدان مراجعه نمودند، انتخاب و به صورت بلوک تصادفی به دو گروه کنترل (۳۴ کودک و عضو مراقب) و آزمون (۳۴ کودک و عضو مراقب) تقسیم شدند. پژوهشگر پس از مراجعه به مرکز درمانی، کودکان بستری در روزهای زوج را به عنوان گروه آزمون و کودکان بستری در روزهای فرد را به عنوان گروه کنترل انتخاب کرد. دلیل این امر، جلوگیری از مواجهه واحدهای پژوهش در گروه کنترل و آزمون و امکان تبادل اطلاعات تا حدامکان بود.

معیارهای ورود به مطالعه شامل: کودکان بین ۶-۱۲ سال، انجام تانسیلکتومی به روش Dissection and Snare، مصرف شربت استامینوف به عنوان تنها داروی مسکن پس از ترخیص، عدم ابتلا کودک به بیماری قبلی یا درد مزمن، عدم وجود سابقه جراحی تانسیلکتومی در فرزند دیگری در خانواده و توانایی والد شرکت کننده در پژوهش به خواندن و نوشتمن بودند. براساس معیارهای خروج از مطالعه (کودکانی که که پس از جراحی به دلیل بروز عوارض شدید نیاز به بستری مجدد پیدا کنند و واحدهای مورد پژوهشی که به هر دلیل از ادامه مطالعه منصرف و یا به طور کامل برگه ثبت وقایع روزانه در منزل را کامل نکرده باشند). از گروه آزمون دو و از گروه کنترل سه کودک حذف و حجم نمونه به ۶۳ کودک و عضو مراقب تقلیل یافت (تصویر ۱).

درد را دشوار بیان داشتند. این مشکل به علت ترس والدین از عوارض جانبی یا مسمومیت دارویی با داروهای ضد درد و در نتیجه مصرف ناکافی دارو برای کنترل درد کودک ذکر شده است [۱۲]. آموزش به والدین در مورد مصرف داروهای ضد درد تجویزی در فواصل زمانی معین مناسب و مطابق برنامه تنظیم ساعتی (ACT: Around The Clock) در سه روز اول پس از جراحی، موجب کاهش درد پس از عمل، کاهش نیاز به مسکن‌های قوی، کاهش عوارض پس از جراحی و جلوگیری از بروز درد مداوم می‌شود [۱۴، ۱۵]. لذا با توجه به عواقب ناگوار عدم تسکین درد بر روی کودکان و وجود رابطه مستقیم بین بی‌قراری کودک پس از عمل با بروز عوارض پس از تانسیلکتومی [۱۳]، محقق برآن شد تا مطالعه حاضر را با هدف تأثیر برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر کیفیت خواب و تغییرات رفتاری کودکان پس از جراحی انجام دهد.

روش کار

مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر از نوع دو گروهی بود که با استناد به نتایج مطالعه Huth و Broome (۲۰۰۷) [۱۶]، خطای نوع اول ۵ درصد و توان آزمون ۸۰ درصد، حجم نمونه ۶۸ کودک به همراه والد مراقب برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس از بین والدین و کودکان دارای معیارهای ورود به مطالعه که جهت عمل جراحی تانسیلکتومی در فاصله



تصویر ۱: فلوچارت ورود افراد به مطالعه بر اساس کنسورت ۲۰۱۰

خلیلی و همکاران

داده شد. والدین و کودکان گروه کنترل همان مراقبت‌های متداول بخش را دریافت کردند و تنها در مورد نحوه تکمیل چک لیست‌ها آموزش دیدند. هیچ‌گونه آموزش مدونی جهت ارائه به کودک و والدین انجام نشده بود. با این حال واحدهای مورد پژوهش در گروه کنترل نیز ممکن بود از طرق مختلف آموزش‌هایی را دریافت می‌کردند که خارج از کنترل پژوهشگر بود و از محدودیت‌های مطالعه به شمار می‌آمد. یک هفته پس از عمل جراحی هنگام ویزیت مجدد پزشک در درمانگاه، ابزارهای پژوهش از هر دو گروه جمع‌آوری شدند. اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کلمگروف – اسمیرونف، تی مستقل، کای دو و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری دسته بندي و تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری آزمون‌ها $0.05 > P$ در نظر گرفته شد. نتایج آزمون آماری کولمگروف – اسمیرونوف (Kolmogorov-Smirnov test) نمایانگر توزیع نرمال نمرات واحدهای مورد پژوهش در متغیرهای پژوهش بود ($P < 0.05$).

یافته‌ها

تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو و تی بیانگر آن بود که بین مشخصات دموگرافیک کودکان گروه آزمون و کنترل از لحاظ سن، جنس، رتبه تولد، تعداد افراد خانواده، شخص مراقب و مشخصات دموگرافیک مادر و پدر اختلاف معنی دار آماری نشان وجود نداشت. لذا دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک همسان بودند. در مورد کیفیت خواب، یافته‌ها نشان دادند که اکثریت کودکان گروه آزمون (19%) و کنترل (47%) در روز سوم پس از ترخیص خیلی خوب خوابیدند (نمره $9-10$). هیچ‌یک از کودکان گروه آزمون در سه روز و کودکان گروه کنترل در روز دوم و سوم پس از ترخیص بی‌خوابی (نمره $1-4$) نداشتند (جدول ۱).

بنابر آزمون آماری تی مستقل، بین تفاوت میانگین نمرات کیفیت خواب شبانه کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل تنها در روز اول پس از ترخیص تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد ($P < 0.01$) (جدول ۲).

همچنین 100% کودکان گروه آزمون در روز دوم پس از ترخیص اصلاً کابوس شبانه نداشتند. هیچ‌یک از کودکان گروه آزمون و کنترل، در روز سوم پس از ترخیص دچار کابوس شبانه زیاد و شدید نبودند. همچنین در روز سوم پس از ترخیص، هیچ‌یک از کودکان گروه آزمون دچار مشکل متوسط در به خواب رفتن نبودند. آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری،

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست ثبت وقایع در منزل بود. چک لیست ثبت وقایع روزانه در منزل نیز توسط محقق و با استفاده از مطالعات مشابه [۱۵, ۱۴, ۱۲] برای سه روز اول پس از ترخیص تدوین گردید. در این چک لیست، والدین وضعیت خواب شبانه، تغییرات رفتاری (کم توجهی، ترس از تنها‌یی، کج خلقی، بی‌قراری، ساکت‌تر شدن، کم شدن فعالیت و کاهش اشتتها) و ساعت مصرف داروی ضد درد تجویزی پزشک را در سه روز اول پس از ترخیص ثبت نمودند. در مطالعه حاضر اعتبار محتوای ابزارها با اخذ نظر در تن از اساتید محترم عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان به دست آمد. همچنین، آلفای کرونباخ 0.87 نیز نشانگر پایایی مناسب چک لیست ثبت وقایع روزانه در منزل بود. جهت گردآوری داده‌ها، پژوهشگر پس از کسب اجرازه از مراجع ذیربسط، با مراجعه به بخش و براساس پرونده کودک بستری، واحدهای پژوهش دارای معیارهای ورود به مطالعه را انتخاب و به صورت تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم نمود. پس از معرفی و بیان هدف مطالعه و جلب رضایت و همکاری کودک و والدین و همچنین دریافت رضایت نامه کتبی از والد کودک، مشخصات دموگرافیک والد و کودک ثبت شد. سپس محتوای آموزش خود مراقبتی تدوین شده برای گروه آزمون در دو سطح کودک و بزرگسال، به کودک و مراقب وی طی یک جلسه آموزش انفرادی و چهره به چهره در بالین کودک، ارائه و به سؤالات آنان پاسخ داده شد. مدت زمان تقریبی هر جلسه آموزشی $30-45$ دقیقه بود. محتوای آموزش خود مراقبتی شامل اطلاعات کلی درباره عمل جراحی تانسیلکتومی و لزوم آن، درد و سایر عوارض احتمالی ناشی از درد، مراقبت‌های عمومی و خاص به دنبال بروز عوارض پس از عمل جراحی تانسیلکتومی، مراقبت‌های بعد از جراحی به خصوص روش‌های کنترل درد و اهمیت آن، مصرف شربت استامینوفن تجویزی طبق برنامه تنظیم ساعتی (هر 6 ساعت یک بار طبق دستور پزشک) و لزوم پیگیری و مراجعت بعدی بود. همچنین چک لیست‌ها پس از توضیح دستورالعمل نحوه تکمیل، در سه رنگ برای سه روز متوالی پس از ترخیص و محتوای آموزشی به صورت کتابچه آموزشی برای استفاده بیشتر در اختیار والدین قرار گرفت. این محتوا با استفاده از کتب و مقالات معتبر تدوین و محتوای آن به تأیید 2 تن از اساتید هیئت علمی دانشکده پرستاری و همچنین مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی همدان رسید. در سه روز بعد از ترخیص هر روز طی تماس‌های تلفنی ضمن پیگیری روند کار به سؤالات والدین گروه آزمون پاسخ

| جدول ۱: توزیع فراوانی مطلق و نسبی کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل در سه روز اول پس از ترخیص بر حسب کیفیت خواب شبانه. | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| گروه کنترل | | | | | گروه آزمون | | | | | کیفیت خواب (نمره) |
| روز سوم | روز دوم | روز اول | روز سوم | روز دوم | روز اول | روز دوم | روز اول | روز دوم | تعداد (درصد) | |
| تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | | |
| (۰) ۰ | (۰) ۰ | (۶/۵) ۲ | (۰) ۰ | (۰) ۰ | (۰) ۰ | (۰) ۰ | (۰) ۰ | (۰) ۰ | اصلانخوابید (۱-۰) | |
| (۳/۲) ۱ | (۳/۲) ۱ | (۱۲/۹) ۴ | (۶/۲) ۲ | (۶/۲) ۲ | (۶/۲) ۲ | (۶/۲) ۲ | (۶/۲) ۲ | (۶/۲) ۲ | بدخوابید (۲-۳) | |
| (۳/۲) ۱ | (۹/۷) ۳ | (۱۹/۴) ۶ | (۱۲/۵) ۴ | (۱۲/۵) ۴ | (۱۸/۸) ۶ | (۱۸/۸) ۶ | (۱۸/۸) ۶ | (۱۸/۸) ۶ | متوسطخوابید (۴-۶) | |
| (۱۶/۱) ۵ | (۳۲/۳) ۱۰ | (۴۵/۲) ۱۴ | (۹/۴) ۳ | (۱۸/۸) ۶ | (۲۸/۱) ۹ | (۲۸/۱) ۹ | (۲۸/۱) ۹ | (۲۸/۱) ۹ | خوبخوابید (۸-۷) | |
| (۷۷/۴) ۲۴ | (۵۴/۸) ۱۷ | (۱۶/۱) ۵ | (۷۱/۹) ۲۳ | (۶۲/۵) ۲۰ | (۴۶/۹) ۱۵ | (۴۶/۹) ۱۵ | (۴۶/۹) ۱۵ | (۴۶/۹) ۱۵ | خیلی خوبخوابید (۹-۱۰) | |
| (۱۰۰) ۳۱ | (۱۰۰) ۳۱ | (۱۰۰) ۳۱ | (۱۰۰) ۳۲ | (۱۰۰) ۳۲ | (۱۰۰) ۳۲ | (۱۰۰) ۳۲ | (۱۰۰) ۳۲ | (۱۰۰) ۳۲ | جمع | |

| P value | تفاوت میانگین | خطای معیار | آماره آزمون تی مستقل | df = ۶۱ | فاصله اطمینان ۰/۹۵ | کیفیت خواب |
|---------|---------------|------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | دامنه پایین دامنه بالا |
| ۰/۰۰۸ | -۲/۷۴ | -۰/۲۳ | -۱/۵۰ | ۰/۳۱ | -۰/۸۶ | روز اول |
| ۰/۵۱ | -۰/۰۶۶ | ۰/۳۷ | -۰/۰۷۳ | ۰/۲۷ | -۰/۱۸ | روز دوم |
| ۰/۲۶ | ۱/۱۳ | ۰/۸۳ | -۰/۰۲۳ | ۰/۲۶ | ۰/۳۰ | روز سوم |

| جدول ۳: توزیع فراوانی نسبی کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل در سه روز اول پس از ترخیص بر حسب تغییرات رفتاری | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|-------|------|-------|-------------|---------|
| تغییرات رفتاری | | | | | | | | | | |
| گروه کنترل گروه آزمون | | | | | | | | | | |
| تعداد (درصد) | متوسط | زیاد و شدید | کم | متوسط | زیاد و شدید | اصلاً | کم | متوسط | زیاد و شدید | |
| درصد | درصد | درصد | درصد | درصد | درصد | درصد | درصد | درصد | درصد | |
| ۰/۳۰ | ۴/۸۷ | ۳۵/۵ | ۲۵/۸ | ۱۲/۹ | ۲۵/۸ | ۳۱/۲ | ۱۸/۸ | ۲۵ | ۲۵ | روز اول |
| ۰/۲۷ | ۳/۸۵ | ۲۲/۶ | ۲۵/۸ | ۲۹ | ۲۲/۶ | ۶/۲ | ۲۵ | ۳۴/۴ | ۳۴/۴ | روز دوم |
| ۰/۸۰ | ۰/۹۸ | ۱۲/۹ | ۱۲/۹ | ۴۱/۹ | ۳۲/۳ | ۹/۴ | ۲۱/۹ | ۳۷/۵ | ۳۱/۲ | روز سوم |
| بی قراری | | | | | | | | | | |
| ۰/۲۴ | ۵/۵۰ | ۲۲/۶ | ۲۵/۸ | ۲۲/۶ | ۲۹ | ۱۵/۶ | ۱۸/۸ | ۳۱/۲ | ۳۴/۴ | روز اول |
| ۰/۲۰ | ۵/۹۳ | ۱۲/۹ | ۲۹ | ۱۶/۱ | ۴۱/۹ | ۱۸/۸ | ۹/۴ | ۳۱/۲ | ۴۶/۹ | روز دوم |
| ۰/۲۴ | ۴/۱۸ | ۳/۲ | ۹/۷ | ۳۸/۷ | ۴۸/۴ | ۹/۴ | ۶/۲ | ۱۸/۸ | ۶۵/۶ | روز سوم |
| کم شدن فعالیت | | | | | | | | | | |
| ۰/۰۸ | ۸/۲۷ | ۴۵/۲ | ۲۲/۶ | ۱۹/۴ | ۱۲/۹ | ۲۸/۱ | ۶/۲ | ۴۶/۹ | ۱۸/۸ | روز اول |
| ۰/۲۰ | ۵/۹۶ | ۱۹/۴ | ۴۱/۹ | ۲۲/۶ | ۱۶/۱ | ۱۲/۴ | ۲۱/۹ | ۳۴/۴ | ۳۱/۲ | روز دوم |
| ۰/۳۴ | ۴/۵۱ | ۶/۵ | ۲۲/۶ | ۲۵/۸ | ۴۵/۲ | ۱۲/۴ | ۳۱/۲ | ۲۵ | ۳۱/۲ | روز سوم |
| کم توجهی | | | | | | | | | | |
| ۰/۳۴ | ۴/۴۹ | ۶/۴ | ۱۶/۱ | ۱۶/۱ | ۶۱/۳ | ۰ | ۱۵/۶ | ۳۴/۴ | ۵۰ | روز اول |
| ۰/۸۵ | ۰/۳۱ | ۰ | ۳/۲ | ۲۹ | ۶۷/۷ | ۰ | ۶/۲ | ۲۸/۱ | ۶۵/۶ | روز دوم |
| ۰/۷۲ | ۱/۳۸ | ۰ | ۳/۲ | ۱۶/۱ | ۸۰/۶ | ۳/۱ | ۶/۲ | ۱۵/۶ | ۷۵ | روز سوم |
| ترس از تنها بی | | | | | | | | | | |
| ۰/۹۶ | ۰/۵۷ | ۱۹/۴ | ۱۶/۱ | ۱۹/۴ | ۴۵/۲ | ۸/۱۸ | ۱۲/۵ | ۱۸/۸ | ۵۰ | روز اول |
| ۰/۲۵ | ۵/۲۹ | ۰ | ۱۹/۴ | ۲۲/۶ | ۵۸/۱ | ۹/۴ | ۶/۲ | ۱۸/۸ | ۶۵/۶ | روز دوم |
| ۰/۵۲ | ۲/۲۴ | ۰ | ۹/۷ | ۲۵/۸ | ۶۴/۵ | ۳/۱ | ۶/۲ | ۱۵/۶ | ۷۵ | روز سوم |
| کاهش اشتتها | | | | | | | | | | |
| ۰/۰۲ | ۱۱/۲۳ | ۶۱/۳ | ۲۵/۸ | ۶/۵ | ۶/۵ | ۳۷/۶ | ۱۲/۵ | ۳۱/۲ | ۱۸/۸ | روز اول |
| ۰/۰۴ | ۹/۷۷ | ۳۵/۵ | ۲۲/۶ | ۲۹ | ۱۲/۹ | ۲۱/۸ | ۱۲/۵ | ۱۸/۸ | ۴۶/۹ | روز دوم |
| ۰/۰۰ | ۱۸/۹۷ | ۲۲/۶ | ۳۲/۳ | ۳۵/۵ | ۹/۷ | ۱۲/۵ | ۹/۴ | ۱۸/۸ | ۵۹/۴ | روز سوم |

خلیلی و همکاران

مشاهده نشد. بنابراین استفاده از مسکن طبق برنامه تنظیم ساعتی در مطالعه حاضر تاثیری بر این موارد نداشت که با ویگننس (۲۰۰۸) [۱۷] و کرندا (۲۰۰۸) [۱۸] هم خوانی دارد. درد، اضطراب، استرس، اختلال در خواب، کاهش اشتها و بسیاری از عوامل دیگر می‌تواند منجر به بروز تغییرات رفتاری گذرا در کودک پس از عمل جراحی گردد [۱۹]. از بین تغییرات رفتاری کودک مورد بررسی، آزمون آماری کای دو بین گروه آزمون و کنترل تنها از نظر اشتها در سه روز اول پس از ترخیص تفاوت معنی دار آماری نشان داد. لذا آموزش پیروی از برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن در سه روز اول پس از ترخیص، مانع از کاهش اشتها کودکان گروه آزمون و افزایش تعداد دفعات دریافت مایعات شد. اما بر کم توجهی، ترس از تنهایی، کج خلقی، بی‌قراری، ساکت‌تر شدن، کم شدن فعالیت، مشکل در به خواب رفتن و کابوس شبانه تاثیری نداشت که با مطالعه ویگننس (۲۰۰۸) [۱۵] و کرندا (۲۰۰۸) [۱۶] هم خوانی داشت. مطالعه ساتر و همکاران (۲۰۰۵) نشان داد که پس از اجرای برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن، کودکان گروه آزمون در روز سوم پس از عمل جراحی تانسیلکتومی فعالیت، انرژی و تمایل به بازی کمتری در مقایسه با کودکان گروه کنترل داشتند [۱۳]. نتایج مطالعه هاث و همکاران (۲۰۰۳) نیز نشان داد که سطح فعالیت کودکان گروه آزمون در سه روز اول پس از جراحی قلب نسبت به کودکان گروه کنترل کمتر بود [۱۹]. این ناهم خوانی می‌تواند به دلیل حجم نمونه بالاتر و یا تفاوت در نوع و مقدار مسکن تجویزی باشد.

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه نشان دادند که در صورت مصرف صحیح و به موقع مسکن در سه روز اول پس از ترخیص در کودکانی که تحت عمل جراحی تانسیلکتومی قرار گرفته‌اند، می‌توان موجب مدیریت درد کودک و کاهش برخی عوارض شایع پس از عمل جراحی تانسیلکتومی شد. استفاده از برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن در این پژوهش منجر به افزایش اشتها و افزایش تعداد دفعات دریافت مایعات و افزایش کیفیت خواب کودکان پس از جراحی تانسیلکتومی گردید که دو عامل مهم در روند بهبودی کودک پس از تانسیلکتومی به شمار می‌رود. پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی تأثیر برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر شدت درد و عوارض پس از سایر جراحی‌ها در کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

تضاد منافع

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

بین میانگین نمرات کیفیت خواب شبانه کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل در سه روز اول پس از ترخیص، تفاوت معنی دار آماری نشان نداد ($P < 0.01$) [۷/۵۷]. در مورد تغییرات رفتاری مورد بررسی، نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بیشترین تغییر رفتاری کودکان گروه آزمون کج خلقی (۳۱/۲%) و کاهش اشتها (۳۷/۶%) در روز اول و در گروه کنترل کاهش اشتها (۶۱/۳%)، و کم شدن فعالیت (۴۵/۲%) در روز اول پس از ترخیص بود. هیچ‌یک از کودکان در گروه آزمون و کنترل، در روز سوم پس از ترخیص دچار کم توجهی زیاد و شدید نبودند. هم‌چنین هیچ‌یک از کودکان گروه کنترل دچار ترس از تنهایی زیاد و شدید نبودند. با استفاده از آزمون آماری کای دو بین گروه آزمون و کنترل در بین تغییرات رفتاری فقط در متغیر کاهش اشتها در روز اول و دوم ($P < 0.05$) و نیز روز سوم ($P < 0.01$) پس از ترخیص تفاوت معنی دار آماری نشان داد اما در مورد سایر تغییرات رفتاری شامل کم توجهی، ترس از تنهایی، کج خلقی، بی‌قراری، ساکت‌تر شدن و کم شدن فعالیت بین گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (جدول ۳).

همچنین نتایج نشان داد که اکثریت کودکان گروه آزمون (۴۶/۹%) و کنترل (۳۵/۵%) در روز سوم پس از ترخیص به مقدار کافی مایعات مصرف نمودند. هیچ‌یک از کودکان گروه آزمون در روزهای دوم و سوم پس از ترخیص، عدم مصرف مایعات نداشتند. آزمون آماری کای دو نشان داد که بین گروه آزمون و کنترل از نظر مصرف مایعات در روز اول ($P = 0.02$) و دوم ($P = 0.1$) پس از ترخیص تفاوت معنی دار آماری وجود داشت.

بحث

درد و بی‌قراری و تنش ناشی از عمل جراحی تانسیلکتومی می‌تواند منجر به مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن‌های مکرر طی خواب، کابوس شبانه و در نهایت کاهش کیفیت خواب کودکان شود [۱۱]. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف مسکن طبق برنامه تنظیم ساعتی موجب افزایش کیفیت خواب کودکان گروه آزمون به خصوص در روز اول پس از ترخیص شد که با مطالعه ساتر و همکاران (۲۰۱۲) [۱۶] هم راستا بود. اما بر خلاف نتایج پژوهش حاضر، نتایج مطالعه ویگننس و همکاران (۲۰۰۸) [۱۷] و کرندا (۲۰۰۸) [۱۸] نشان داد که مداخلات آموزشی بر کیفیت خواب کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی بی‌تأثیر بود. این امر می‌تواند به علت عدم تاکید بر استفاده از برنامه تنظیم ساعتی در آموزش‌های این مطالعه باشد. بین گروه کنترل و آزمون از نظر مشکل در به خواب رفتن و کابوس شبانه تفاوت آماری معنی داری

همدان تصویب شد. این پایان نامه در جلسه کمیته اخلاق دانشگاه مورخ ۹۱/۱۱/۲۶ به شماره ثبت ۹۰۱۹/۴۰۳۵/۹/۱۶/۳۵ ا/P/D و نیز در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران به شماره IRCT2013022512609N1 به ثبت رسید. بدین وسیله از استادی، پرسنل محترم دانشگاه و بیمارستان و همه عزیزانی که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند، تشکر فراوان به عمل می‌آید. مطالعه حاضر با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان اجرا شده است.

REFERENCES

1. Tocher J, Rodgers S, Smith MA, Watt D, Dickson L. Pain management and satisfaction in postsurgical patients. *J Clin Nurs.* 2012;21(23-24):3361-71. [DOI: 10.1111/j.1365-2702.2012.04253.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04253.x) PMID: 22938034
2. Kokki H. Current management of pediatric postoperative pain. *Expert Rev Neurother.* 2004;4(2):295-306. [DOI: 10.1586/14737175.4.2.295](https://doi.org/10.1586/14737175.4.2.295) PMID: 15853571
3. Wu CL, Raja SN. Treatment of acute postoperative pain. *Lancet.* 2011;377(9784):2215-25. [DOI: 10.1016/S0140-6736\(11\)60245-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60245-6) PMID: 21704871
4. Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-surgical Nursing. Netherlands: Wolters Kluwer Health; 2010.
5. Nabati M, Abazari P, Talakob S. [Nursing experiences in pediatric pain management]. *Iranian J Nurs Res.* 2008;3(10):86.
6. Goldstein NA, Fatima M, Campbell TF, Rosenfeld RM. Child behavior and quality of life before and after tonsillectomy and adenoidectomy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2002;128(7):770-5. [DOI: 10.117732](https://doi.org/10.117732)
7. Helgadottir HL, Wilson ME. Temperament and pain in 3 to 7-year-old children undergoing tonsillectomy. *J Pediatr Nurs.* 2004;19(3):204-13. [DOI: 10.1585249](https://doi.org/10.1585249)
8. Kain ZN, Mayes LC, Wang SM, Hofstadter MB. Postoperative behavioral outcomes in children: effects of sedative premedication. *Anesthesiology.* 1999;90(3):758-65. [DOI: 10078677](https://doi.org/10078677)
9. Kleiber C, Suwanraj M, Dolan LA, Berg M, Kleese A. Pain-sensitive temperament and postoperative pain. *J Spec Pediatr Nurs.* 2007;12(3):149-58. [DOI: 10.1111/j.1744-6155.2007.00108.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2007.00108.x) PMID: 17594295
10. Kotiniemi LH, Ryhanen PT, Moilanen IK. Behavioural changes following routine ENT operations in two-to-ten-year-old children. *Pae-diatr Anaesth.* 1996;6(1):45-9. [DOI: 8839088](https://doi.org/8839088)
11. Sutters KA, Miaskowski C. Inadequate pain management and associated morbidity in children at home after tonsillectomy. *J Pediatr Nurs.* 1997;12(3):178-85. [DOI: 10.1016/S0882-5963\(97\)80075-9](https://doi.org/10.1016/S0882-5963(97)80075-9) PMID: 9198341

تضاد منافع:

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

سپاسگزاری

این مطالعه بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد بود که در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۴ به شماره طرح ۹۲۰۲۲۴۵۹۱ در شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

12. Vincent C, Chiappetta M, Beach A, Kiolbasa C, Latta K, Maloney R, et al. Parents' management of children's pain at home after surgery. *J Spec Pediatr Nurs.* 2012;17(2):108-20. [DOI: 10.1111/j.1744-6155.2012.00326.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2012.00326.x) PMID: 22463471
13. Marzban S, Haddadi S, Movahedi H, Parvizi A, Haghghi M. [Effect of low dose ketamine on reducing postoperative sore throat tonsillectomy in children]. *J Mazandaran Univ Med Sci.* 2008;15(56):53-9.
14. Huth MM, Broome ME. A snapshot of children's postoperative tonsillectomy outcomes at home. *J Spec Pediatr Nurs.* 2007;12(3):186-95. [DOI: 10.1111/j.1744-6155.2007.00111.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2007.00111.x) PMID: 17594298
15. Sutters KA, Savedra MC, Miaskowski C. The pediatric PRO-SELF(c): pain control program: an effective educational program for parents caring for children at home following tonsillectomy. *J Spec Pediatr Nurs.* 2011;16(4):280-94. [DOI: 10.1111/j.1744-6155.2011.00299.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2011.00299.x) PMID: 21951354
16. Sutters KA, Holdridge-Zeuner D, Waite S, Paul SM, Savedra MC, Lanier B, et al. A descriptive feasibility study to evaluate scheduled oral analgesic dosing at home for the management of postoperative pain in preschool children following tonsillectomy. *Pain Med.* 2012;13(3):472-83. [DOI: 10.1111/j.1526-4637.2011.01324.x](https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2011.01324.x) PMID: 22313591
17. Wiggins SA. Pain following pediatric tonsillectomy and adenoidectomy: What do we know about home pain management? *Pain.* 2008;10(1):1-6.
18. Crandall M, Lammers C, Senders C, Braun JV, Savedra M. Children's pre-operative tonsillectomy pain education: clinical outcomes. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2008;72(10):1523-33. [DOI: 10.1016/j.ijporl.2008.07.004](https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2008.07.004) PMID: 18757103
19. Huth MM, Broome ME, Mussatto KA, Morgan SW. A study of the effectiveness of a pain management education booklet for parents of children having cardiac surgery. *Pain Manag Nurs.* 2003;4(1):31-9. [DOI: 10.1053/jpmn.2003.7](https://doi.org/10.1053/jpmn.2003.7) PMID: 12707866

The Effect of Around-The-Clock (ATC) Analgesic Administration on the Quality of Sleep and Behavioral Changes in Children after Surgery: A Randomized Clinical Trial

Saeideh Almasi¹, Tayebeh Hasan Tehrani¹, Ghodratollah Roshanaei², Fatollah Behnoud³, Arash Khalili¹, Fatemeh Cheraghi^{4*}

¹ Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

² Modeling of Noncommunicable Diseases Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

³ Department of Otorhinolaryngology, School of Medicene, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

⁴ Associate Professor, Chronic Diseases (Home Care) Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

* Corresponding author: Fatemeh Cheraghi, Associate Professor, Chronic Diseases (Home Care) Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail: f_cheraghi@umsha.ac.ir

DOI: 10.21859/nmj-25019

Received: 09.08.2016

Accepted: 23.08.2016

Keywords:

Behavioral Changes
Sleep
Child
Surgery

How to Cite this Article:

Almasi S, Hasan Tehrani T, Roshanaei GH, Behnoud F, Khalili A, Cheraghi F. The Effect of Around-The-Clock (ATC) Analgesic Administration on the Quality of Sleep and Behavioral Changes in Children after Surgery: A Randomized Clinical Trial. *Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac.* 2016;25(1):69-75.DOI: 10.21859/nmj-25019

© 2017 Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty

Abstract

Introduction: Lack of effective control in postoperative pain can cause sleep disturbance, decreased fluid intake and incidence of behavioral changes, such as restlessness, irritability and reduced activity and play. Therefore, this study was performed with the aim of determining the effectiveness of Around-The-Clock (ATC) analgesic administration on the quality of sleep and behavioral changes in children after surgery.

Methods: In this clinical trial, 68 children, 6 to 12 years old, admitted for tonsillectomy with one parent, were selected and randomly divided to control and case groups. For the case group, an intervention was performed by the Around-The-Clock (ATC) analgesic administration training after discharge. The data collection tool was a home dairy that was completed by parents. Data were analyzed with SPSS 16 by repeated measures, post-hoc, independent t and chi-square tests.

Results: According to the independent t test, there were significant differences between children of case and control groups in average sleep quality scores on the first day after discharge ($P = 0.008$). According to chi-square test, except for appetite ($P = 0.00$), no significant differences were shown between children of the two groups in the other behavioral changes.

Conclusions: Training of Around-The-Clock (ATC) analgesic administration in the first three days after ambulatory surgery, such as tonsillectomy, could prevent inappropriate behavioral changes in children and increase the quality of their sleep and appetite.