

تأثیر تمرینات تن آرامی بر سرزندگی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مرکز مراقبتهاي پره ناتال

فرزانه سلطانی^۱، سامرہ قلیچ خانی^۲، پریسا پارسا^{۳*}، قدرت ا... روشنايی^۴

^۱ استادیار، مرکز تحقیقات مراقبتهاي مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشكى همدان، همدان، ايران

^۲ دانشجوی کارشناس ارشد، مشاوره در مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكى همدان، همدان، ايران

^۳ دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشكى همدان، همدان، ايران

^۴ دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى همدان، همدان، اiran

* نویسنده مسئول: پریسا پارسا، دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه

علوم پزشكى همدان، همدان، اiran. ايميل: pparsa2003@yahoo.com

DOI: 10.21859/nmj-25036

چکیده

مقدمه: سرزندگی به عنوان يكى از مؤلفههای بهزيستی ذهنی در بارداری کاهش پيدا می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تمرینات بدنی بر سرزندگی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مرکز مراقبتهاي پره ناتال فامینین همدان بوده است. روش کار: در مطالعه نيمه تجربی حاضر ۱۰۰ زن نخست باردار مراجعه کننده به يك مرکز مراقبتهاي پره ناتال در دو گروه ۵۰ نفره آزمون و كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله، تمامی زنان دو گروه پرسشنامه های سرزندگی و مشخصات دموگرافيك را تكميل کردند. برای زنان گروه آزمون ۸ جلسه کلاس با تاكيid بر تمرینات بدنی و تن آرامی، هر دو هفته يكبار به مدت يك ساعت و نيم برگزار گردید و از آنها خواسته شد تا تمرینات را در منزل انجام دهند. گروه كنترل نيز مراقبتهاي روتين درمانگاه پره ناتال را دريافت مي کردند. پس از پایان جلسات، پرسشنامه ها مجددآ "توسط هر دو گروه آزمون و كنترل تكميل گردید و دادهها قبل و بعد از مداخله و نيز بين دو گروه مورد مقاييسه قرار گرفت.

ياfته ها: ميانگين نمرات سرزندگی زنان نخست باردار در گروه آزمون، بعد از انجام تمرینات بدنی بطور معناداري افزایش یافت [از $۷/۳۱ \pm ۳/۵۸$ به $۷/۳۱ \pm ۳/۸۲ \pm ۴/۵۵$] در حال يك سرزندگی زنان گروه كنترل کاهش پيدا کرده [از $۷/۲۱ \pm ۷/۳۲$ به $۷/۲۰ \pm ۷/۹۶$] و تفاوت معناداري با قبل از مداخله شان داد ($P < 0.05$).^[P]

نتيجه گيري: مطالعه حاضر اهميت انجام تمرینات بدنی به عنوان يك مداخله بهداشتی آسان و در دسترس را كه می تواند به افزایش سرزندگی زنان نخست باردار منجر شوند، مورد تأييد قرار داد.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

واژگان کلیدی:

بارداری

سرزندگی

تن آرامی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه

علوم پزشكى همدان محفوظ است.

مقدمه

توجهی نظير افسردگی، آشفتگی روحی، خشونت خانوادگی، انزوا و مشکلات دیگر مربوط به سلامت روان مواجه گردند [۱]. در واقع، هورمون های بارداری می توانند زمینه تغييرات سایکولوژیک و فشارهای روحی را فراهم سازند و بدین ترتیب تغييرات خلقي و غلبه اضطراب و نگرانی در اين دوران دور از انتظار نیست. بطوريكه مطالعات نشان داده اند نيمی از موارد افسردگی بعد از زایمان در دوران بارداری يا قبل از زایمان شروع می شوند [۲]. از سوی ديگر، استرس های روحی قبل از زایمان باعث تولد نوزاد کم وزن و يا زایمان زودرس می شود و مشکلات روحی در اين دوران با بروز رفتارهایي مانند تغيير در تغذیه، خواب، ورزش، مصرف مواد و همچنین بي توجهی به مراقبتهاي دوران بارداری مرتبط دیده است [۳]. حتی بعضی محققین نشان داده اند که عالیم افسردگی احتمالاً در بارداری شایع تر از دوره

پژوهشگران بسياري دوران بارداری را به عنوان يك دوره تغيير شديد عاطفي در نظر گرفته اند [۱، ۲] زن باردار از زمان لقاد و تشکيل نطفه تا لحظه زایمان از لحاظ ذهنی و بدنی دستخوش يك سري تغييرات اساسی می شود و نه تنها باید خود را با جنین در حال رشد وفق دهد، بلکه باید با حاملگی و تغييراتی که هنگام بارداری برای او رخ می دهد و نيز حس مادر شدن سازگار کند. گر چه اين عواطف به طور مستقيم و آگاهانه توسط جنین حس نمي شوند، اما هورمونهايی که در اثر احساس لذت، سرخوشی، شادي و يا غم و اندوه در بدن مادر توليد می شوند، همگی از طريق جفت به بدن جنین انتقال می یابند [۳]. زنان باردار مستعد آسيب پذيری از انواع عوامل تنش زا می باشند. حتی در يك بارداری طبيعی تغييرات فيزيولوژیک می تواند به اندازه کافي چالش برانگيز باشد، تا حدی که زنان باردار با مشکلات قابل

اضطراب و افسردگی را بهبود می‌بخشد. تمرینات بدنی بر سطح سلامت عمومی زنان باردار در ابعاد عالیم جسمانی، اضطراب، عواطف منفی، اختلال خواب، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی مؤثر می‌باشد [۱۵]. مزایای ورزش شامل بهبود عملکرد قلبی عروقی، کاهش ناراحتی‌های عضلانی اسکلتی، کاهش احتمال بروز کرامپ‌های عضلانی، آدم و فشار خون بالا و دیابت حاملگی و همچنین ثبات خلق و خو در مادر است [۱۶]. حتی مطالعه Melzer (۲۰۱۰) در مورد تأثیر فعالیت‌های فیزیکی طی دوران بارداری نشان داد که فعالیت‌های فیزیکی با بهبود پارامترهای جسمی و روانی و کاهش احتمال بروز عوارض و مرگ و میر مادران همراه می‌باشد [۱۷]. در سالهای اخیر بیمارستان‌های دوستدار مادر در ایران با تشکیل کلاس‌های آمادگی برای زایمان در دوران بارداری، امکان ارائه آموزش‌های لازم برای مادران و همراهان آنان را فراهم آورده‌اند. با توجه به تأثیرات قابل توجه ورزش و تمرینات بدنی بر افزایش سطح سلامت و بهزیستی روانشناختی مادران باردار، افزایش کمیت و کیفیت تمرینات فوق در کلاس‌های آمادگی برای زایمان می‌تواند از طریق افزایش سرزندگی زنان باردار نتایج مثبتی را در روند زایمان و پس از زایمان در برداشتne باشد. از آنجا که در زمینه تأثیر تمرینات بدنی بر بهزیستی روانشناختی مادران و بویژه سرزندگی آنان تحقیقات اندکی در ایران صورت گرفته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات بدنی بر سرزندگی زنان نخست باردار انجام گرفته است.

روش کار

محیط پژوهش در مطالعه نیمه تجربی حاضر یک مرکز ارجاعی مراقبتهاهی پره ناتال و مشارکت کنندگان در مطالعه ۱۰۰ نفر از زنان نخست باردار ۲۸-۲۰ هفته مراجعته کننده به مرکز مراقبتهاهی پره ناتال بودند که به روش قرعه کشی و بر اساس شماره پرونده افراد انتخاب و در دو گروه ۵۰ نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل بارداری نرمال و بدون عارضه ماماگی و پزشکی، عدم ابتلاء به اضطراب و افسردگی و عدم مصرف داروهای روان گردنان قبل از بارداری و در حین بارداری فعلی بوده است. پس از کسب رضایت نامه کتبی، پرسشنامه‌های ویژگیهای دموگرافیک و بارداری و نیز ابزارسنجش سرزندگی دسی و رایان در اختیار هر دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفت. پرسشنامه سرزندگی دسی و رایان در سال ۱۹۸۵ ساخته شده و توسط عریضی در ایران ترجمه و توسط فرحناز ابوالقاسمی در سال ۱۳۸۲ پایایی و اعتبار سنجی شده است [۳]. پایایی پرسشنامه در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ محاسبه گردید. این پرسشنامه دارای ۷ سؤال می‌باشد که از یک، به معنی اصلًا "درست نیست

بعد از زایمان است [۴، ۷]، لذا مداخله جدی و زودهنگام در رویارویی با این استرس‌های روحی در دوره قبل از زایمان ضروری بنظر می‌رسد [۵]. سرزندگی که به عنوان تجربه هوشیارانه فرد از داشتن انرژی و حس زندگی تعریف می‌گردد [۸]، یک احساس مثبت شادابی و انرژی و بازتاب دهنده تندرستی ارگانیسمی است و باید همراه با عوامل روانشناختی و جسمانی که بر انرژی قابل دسترسی برای خود فرد تأثیر می‌گذارند، تغییر کند. ارتباطاتی بین سرزندگی و چند شاخص سلامت روانی، عوامل جسمانی از قبیل علائم فیزیکی و عملکردی بدن، و گرایش‌های عاطفی و صفات شخصیتی اساسی وجود دارد. نشان داده شده که سرزندگی در افراد مبتلا به درد مزمن و به ویژه کسانی که تصور می‌کنند که در دشان ترسناک است یا آن‌ها را از کار می‌اندازد کمتر است [۹، ۱۰]. ارزش‌های فرا مادی و بخصوص داشتن سرزندگی که فراتر از رفع نیازهای فیزیولوژیک و ارزش‌های مادی است، از مقولاتی است که در سالیان اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. صاحب نظران معتقدند که انسان دارای بهداشت روانی نه فقط باید از اختلالات روانی رها شود، بلکه باید نشانه‌های بهزیستی روان شناختی را دارا باشد که دارای سازه‌های سرزندگی و عاطفه مثبت است. در واقع سرزندگی بازتاب سلامت روان شناختی و جسمانی است و متقابلاً تحت تأثیر عوامل جسمی و روان شناختی قرار می‌گیرد (۹). امروزه توجه پژوهشگران زیادی به سوی روش‌های غیردارویی و قابل اجرای مؤثر برسلامت جسمی و روانی زنان باردار جلب شده است. یکی از مهمترین و موثرترین این روش‌های غیردارویی تمرینات بدنی و ورزش است [۱۱]. بطور معمول حاملگی ممکن است زنان باردار را در خطر کاهش فعالیت فیزیکی قرار دهد. در این دوره معمولاً زنان از ورزش و فعالیت فیزیکی منع می‌شوند [۱۲]، و این در حالیست که تجربه سرزندگی در ارگانیسم سالم بیشتر روی می‌دهد. بخصوص هنگامی که تمرینات بدنی بصورت ثابت و منظم انجام شوند، احساس سرزندگی بیشتر خواهد بود. محققین نشان داده‌اند ورزش قبل از بارداری، حین بارداری و بعد از آن با وضعیت سلامتی بهتری در ارتباط است [۱۳] و در همین راستا، کالج زنان و ماماگی امریکا روزانه ۳۰ دقیقه ورزش ملایم را در غیاب مشکلات طبی یا ماماگی توصیه می‌کند [۱۴]. تمرینات بدنی نشاط، شادابی و سرزندگی زیادی را ایجاد می‌کند و همچنین کم هزینه و اینم بوده و در محل زندگی بدون ابزار و وسیله خاصی قابل انجام است. به نظرمی رسید شرکت در یک برنامه منظم و مدون ورزشی بتواند سهم عمده‌ای در بهبود سلامت روانی و زیر مجموعه‌های آن مانند نشاط و سرزندگی زنان باردار داشته باشد. در مطالعه صادقی و همکاران نیز از اثرات ضد افسردگی ورزش حمایت شد و همچنین نشان داده شد که ورزش اعتماد به نفس فرد را افزایش داده و علایم

توزیع متغیرهای اصلی مطالعه ارزیابی گردید و از آنالیز کوواریانس برای تعديل اثر متغیرهای دموگرافیک ناهمگن در دو گروه آزمون و کنترل استفاده شد. همچنین از آزمونهای شاخص مرکزی و پراکندگی برای توصیف متغیرها و آزمونهای تی زوجی و تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سرزندگی افراد قبل و بعد از مداخله در هر یک از دو گروه آزمون و کنترل نیز قبل و بعد از مداخله بین دو گروه استفاده گردید. ($P < 0.05$) معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میانگین سنی زنان باردار در گروه آزمون و کنترل به ترتیب $24/86$ و $24/28$ بود که در دو گروه تفاوت معناداری نداشته است. سایر خصوصیات دموگرافیک دو گروه در [جدول ۱](#) آمده است.

برای مقایسه میانگین نمرات سرزندگی زنان قبل و بعد از مداخله در هر یک از گروههای آزمون و کنترل، از آزمون تی زوجی استفاده شد. [جدول ۲](#) نشان می‌دهد میانگین نمرات سرزندگی قبل از مداخله در گروه آزمون $33/58$ بوده است که این میزان بعد از مداخله به $38/32$ رسیده است و اختلاف معنی‌داری با قبل از مداخله پیدا کرده است ($P < 0.001$).

تا ۷ به معنی کاملاً "درست است، نمره دهی می‌شود. همه آیتمهای پرسشنامه در یک جهت نمره گذاری شده و میانگین نمره هر فرد در کل مقیاس سنجیده شد. زنان باردار گروه آزمون پس از دریافت توضیحات کافی، برنامه و تاریخ تشکیل کلاسها را به همراه کارت حضور در کلاس دریافت کردند. ۸ جلسه کلاس هر دو هفته یکبار با تعداد حداقل ۱۰ نفر زن باردار به مدت یک ساعت و نیم برگزار گردید که شامل ۳۰ دقیقه آموزش، ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ اختصاص داده دقیقه آخر به پخش فیلم و پرسش و پاسخ اختصاص داده شد. مادران در زمان انجام تمرینات بدنی لباس‌های راحت پوشیدند و در مکان مناسب، همراه با آموزش دهنده تمرینات بدنی را انجام می‌دادند. از مادران خواسته شد که تمرینات ورزشی و آرام سازی را در خانه به همین ترتیب روزانه انجام دهند و فایل موسیقی تن آرامی نیز به آنها داده شد. گروه کنترل نیز مراقبتهای روتین درمانگاه پره ناتال را دریافت می‌کردند. پس از پایان کلاسها پرسشنامه‌ها مجدداً "توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 انجام گرفت. با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف

جدول ۱: مقایسه خصوصیات دموگرافیک زنان باردار در دو گروه آزمون و کنترل

متغیر	آزمون				P-value
	کنترل		آزمون		
	فرآوانی	درصد	فرآوانی	درصد	
شغل زن					
خانه دار	۴۳	۸۶	۴۱	۸۲	.۰۵۸
شاغل	۷	۱۴	۹	۱۸	
شغل همسر					
بیکار	۰	۰	۱	۲	۱
شاغل	۵۰	۱۰۰	۴۹	۹۸	
تحصیلات زن					
سواد خواندن و نوشت	۱	۲	۱	۲	.۰۹۶
ابتدایی	۹	۱۸	۷	۱۴	
دیپلم	۲۳	۴۶	۲۴	۴۸	
دانشگاهی	۱۷	۳۴	۱۸	۳۶	
تحصیلات همسر					
سواد خواندن و نوشت	۲	۴	۴	۸	.۰۸۱
ابتدایی	۱۰	۲۰	۸	۱۶	
دیپلم	۲۶	۵۲	۲۷	۵۴	
دانشگاهی	۱۲	۲۴	۱۱	۲۲	
محل سکونت					
شخصی	۴۰	۸۰	۳۰	۶۰	.۰۰۲
استیجاری	۱۰	۲۰	۲۰	۴۰	

جدول ۲: مقایسه میانگین نمرات سرزندگی زنان قبل و بعد از مداخله در هر گروه و بین دو گروه آزمون و کنترل

P-value	آماره آزمون (تی زوجی)	بعد از مداخله			قبل از مداخله			گروه آزمون	آماره آزمون (تی مستقل)
		میانگین انحراف معیار	میانگین انحراف معیار	میانگین	میانگین	انحراف معیار	میانگین		
<0.001	-4/75	4/55	38/32	7/21	33/58			آزمون	
<0.001	6/71	7/08	27/96	7/15	36/32			کنترل	
		8/71		-1/89					
		<0.001		0/061					p-value

پیشگیری از افسردگی در دوران بارداری مؤثر بوده است [۲۱]. در مطالعه بهادران و همکاران زنانی که تمرينات بدنی و تن آرامی در بارداری انجام دادند، سرزندگی بالاتری را در دوران بارداری و پس از زایمان تجربه کردند [۳]. همچنین کارگرفت و همکاران (۲۰۰۴) نیز تأثیر ورزش و تمرينات بدنی را بر سلامت ذهنی زنان باردار نشان داده است [۲۲]. مطالعه حاضر نیز نشان داد که زنان در گروه مداخله با انجام تمرينات بدنی منظم دارای سطح سرزندگی بالاتری در مقایسه با زنانی هستند که این تمرينات بدنه دسته جمعی را نداشته‌اند. البته باقیتی به این نکته توجه داشت که علاوه بر تأثیر مثبت تمرينات بدنی بر شاخصهای جسمی و روانی، بنظر می‌رسد شرکت افراد در ورزش همگانی و همراهی با دیگران، از طریق تقویت روابط بین فردی و برقراری تعاملات اجتماعی می‌تواند بر ارتقای سلامت ذهنی و سرزندگی و شادابی زنان باردار مؤثر باشد. به عبارت دیگر انجام تمرينات بدنی شاخصهای اصلی کیفیت زندگی (جسمی، روانی و اجتماعی) را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کماینکه محققین دریافت‌های شرکت در تمرينات بدنی که نوعی وضعیت فعلی و پرارتزی است علاوه بر اینکه می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود میزان سرزندگی و نشاط افراد بگذارد، متقابلاً نشان داده شده که افراد با سرزندگی بالا بیشتر به بسیج امکانات خود یا شرکت فعلی در فعالیتهای دسته جمعی مانند ورزشهای گروهی مرتبط با سلامت روی می‌آورند [۱۸]. فعالیتهای ورزشی علاوه بر فواید جسمی و روحی می‌تواند بر سایر شاخصهای بارداری نیز مؤثر باشد. برای مثال، Barakat و همکاران (۲۰۱۱) با هدف بررسی اثر فعالیتهای ورزشی متوسط بر احساس سلامتی و خوب بودن زنان باردار، پس از یک دوره فعالیتهای ورزشی احساس سلامتی زنان را بررسی کردند. علاوه بر اینکه درصد بیشتری از زنان گروه آزمون حالت سلامتی خود را خیلی خوب توصیف کردند، در این گروه میزان افزایش وزن دوران بارداری هم کمتر گزارش شد [۲۳]. همچنین مطالعات نشان داده اندفعالیت بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختلالات روانی شایع در جامعه از قبیل اضطراب و افسردگی و بهبود مؤلفه‌های بهزیستی مانند نشاط و سرزندگی است [۲۴]. هیجانات مثبت نقش بسیار مهمی در بهبود سلامت روان زنان باردار ایفا می‌کنند و شناخت مداخلات مؤثر در این زمینه

بر خلاف گروه آزمون، میانگین نمرات سرزندگی قبل از مداخله در گروه کنترل ۳۶/۳۲ بوده که بعد از مداخله کاهش یافته و به ۲۷/۹۶ رسیده است، بطوریکه بین میانگین نمرات سرزندگی در گروه کنترل، قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری وجود دارد ($P < 0.001$). همچنین برای مقایسه میانگین نمرات سرزندگی زنان قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد قبل از مداخله میانگین نمرات سرزندگی در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشته است ($P = 0.061$ ، اما بعد از مداخله میانگین نمرات سرزندگی در گروه کنترل (۲۷/۹۶) و آزمون (۳۸/۳۲) تفاوت معناداری پیدا کرده است ($P < 0.001$).

بحث

زنان باردار نسبت به دیگران از سطوح پایین‌تر شادابی، عملکرد فیزیکی و عملکرد اجتماعی برخوردارند [۱۸]. این موضوع با پیشرفت بارداری بویژه در زنان بدون تجربه قبلی بارداری و بدلاًیل مختلفی مانند ترس از آنورمالی نوزاد، مشکلات تهدید کننده لیبر و زایمان، ترس از آسیب‌ها و حتی مرگ بدليل زایمان بیشتر اهمیت می‌یابد [۱۸]. این‌ها در حالیست که هیجانات مثبت نقش بسیار مهمی در بهبود افراد از فشارهای روانی بازی می‌کند و به عقیده محققین هیجانات مثبت منابع روانشناختی بسیار مهمی هستند که به فرد کمک می‌کنند در مقابل فشار روانی از روشهای مقابله‌ای موثری استفاده کند [۱۹]. میزان سرزندگی زنان باردار به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سلامت زنان با پیشرفت بارداری سیر نزولی پیدا می‌کند [۹]. کماینکه در مطالعه حاضر نیز با وجودی که قبل از مداخله سرزندگی زنان گروه کنترل بیشتر از زنان گروه آزمون بود، اما سرزندگی آنان با پیشرفت بارداری کاهش معناداری پیدا کرد. سیر رو به کاهش سرزندگی در بارداری، ضرورت مداخله به منظور پیشگیری از کاهش سرزندگی و نشاط زنان باردار بویژه با نزدیک شدن به اواخر بارداری را نشان می‌دهد، کماینکه در مطالعات دیگران نقش حفاظت کننده سرزندگی و عواطف مثبت در اواخر بارداری در برابر افسردگی پس از زایمان و حتی کاهش ریسک زایمان پره‌ترم دیده شده است [۲۰]. Lara و همکاران (۲۰۱۰) نیز دریافتند تمرينات فیزیکی دربهبود نشاط و سرزندگی ذهنی و

مثبت و سرزندگی زنان نخست باردار منجر شوند را مورد تأیید قرار داد. لذا یافته‌های پژوهش حاضر ضرورت ارائه خدمات آموزشی و مداخلات فیزیکی را به منظور بهبود سرزندگی زنان باردار تأیید کرد.

تضاد منافع

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

سپاسگزاری

این مقاله منتج از پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی می‌باشد که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی همدان به شماره IR.UMSHA.REC.1394.256 به ثبت رسیده است. بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان و همچنین از تمامی مادران عزیز باردار و پرسنل محترم مرکز مراقبتهای پره ناتال شهرستان تویسرکان همدان تشکر و قدردانی می‌شود.

References

- Abbaszadeh F, Kafaei Atrian M, Masoudi Alavi N, Bagheri A, Sadat Z, Karimian Z. Relationship between quality of life and depression in pregnant women. *Nurs Midwifery Stud*. 2013;2(2):193-7. [PMID: 25414858](#)
- Glazier RH, Elgar FJ, Goel V, Holzapfel S. Stress, social support, and emotional distress in a community sample of pregnant women. *J Psychosom Obstet Gynaecol*. 2004;25(3-4):247-55. [PMID: 15715023](#)
- Bahadoran P, Asefi F, Oreyzi H, Valiani M. The effect of participating in the labor preparation classes on maternal vitality and positive affect during the pregnancy and after the labor. *Iran J Nurs Midwifery Res*. 2010;15(Suppl 1):331-6. [PMID: 22069407](#)
- Fraser D. Myles' Textbook for Midwives. 15th ed: Churchill Livingstone; 2009.
- Woods SM, Melville JL, Guo Y, Fan MY, Gavin A. Psychosocial stress during pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2010;202(1):61 e1-7. [DOI: 10.1016/j.ajog.2009.07.041](#) [PMID: 19766975](#)
- Evans J, Heron J, Francomb H, Oke S, Golding J. Cohort study of depressed mood during pregnancy and after childbirth. *BMJ*. 2001;323(7307):257-60. [PMID: 11485953](#)
- Dayan J, Creveuil C, Herlicovitz M, Herbel C, Baranger E, Savoye C, et al. Role of anxiety and depression in the onset of spontaneous preterm labor. *Am J Epidemiol*. 2002;155(4):293-301. [PMID: 11836191](#)
- Muraven M, Gagne M, Rosman H. Helpful Self-Control: Autonomy Support, Vitality, and Depletion. *J Exp Soc Psychol*. 2008;44(3):573-85. [DOI: 10.1016/j.jesp.2007.10.008](#) [PMID: 18496610](#)
- Yevchak AM, Loeb SJ, Fick DM. Promoting cognitive health and vitality: a review of clinical implications. *Geriatr Nurs*. 2008;29(5):302-10. [DOI: 10.1016/j.gerinurse.2007.10.017](#) [PMID: 18929179](#)
- Diener E. Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. *Am Psychol*. 2000;55(1):34-43. [PMID: 11392863](#)
- Hotelling BA. Promoting wellness in lamaze classes. *J Perinat Educ*. 2005;14(3):45-50. [DOI: 10.1624/105812405X57589](#) [PMID: 17273442](#)
- Larsson L, Lindqvist PG. Low-impact exercise during pregnancy--a study of safety. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2005;84(1):34-8. [DOI: 10.1111/j.0001-6349.2005.00696.x](#) [PMID: 15603564](#)
- Haas JS, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Stewart AL, Dean ML, Brawarsky P, et al. Changes in the health status of women during and after pregnancy. *J Gen Intern Med*. 2005;20(1):45-51. [DOI: 10.1111/j.1525-1497.2004.40097.x](#) [PMID: 15693927](#)
- Committee on Obstetric P. ACOG committee opinion. Exercise during pregnancy and the postpartum period. Number 267, January 2002. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Int J Gynaecol Obstet*. 2002;77(1):79-81. [PMID: 12053898](#)
- Sadeghi A, Sirati Nir M, Hajiamini Ebadi A, Naderi Z, Mehdizade S. The effect of exercise on level of general health of pregnant women referred to a prenatal-care-clinic of Baghiatallah hospital. *Adv Nurs Midwifery*. 2017;22(77):10-6.
- Yousefzadeh S, Esmaeili Darmiyan M, Asadi Younesi M, Shakeri MT. Effects of Training about the Benefits of Natural Childbirth during Pregnancy on the Attitude and Intentions to Select the Mode of Delivery in Nulliparous Women. *J Midwifery Reprod Health*. 2016;4(3):704-11.
- Melzer K, Schutz Y, Boulvain M, Kayser B. Physical activity and pregnancy: cardiovascular adaptations, recommendations and pregnancy outcomes. *Sports Med*. 2010;40(6):493-507. [DOI: 10.2165/11532290-00000000-00000](#) [PMID: 20524714](#)
- Ryan RM, Frederick C. On energy, personality, and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. *J Pers*. 1997;65(3):529-65. [PMID: 9327588](#)
- Zautra A, Smith B, Affleck G, Tennen H. Examinations of chronic pain and affect relationships: applications of a dynamic model of affect. *J Consult Clin Psychol*. 2001;69(5):786-95. [PMID: 11680555](#)
- Voellmin A, Entringer S, Moog N, Wadhwa PD, Buss C. Maternal positive affect over the course of pregnancy is associated with the length of gestation and reduced risk of preterm delivery. *J Psychosom Res*. 2013;75(4):336-40. [DOI: 10.1016/j.jpsychores.2013.06.031](#) [PMID: 24119939](#)
- Lara MA, Navarro C, Navarrete L. Outcome results of a psycho-educational intervention in pregnancy to prevent PPD: a randomized control trial. *J Affect Disord*. 2010;122(1-2):109-17. [DOI: 10.1016/j.jad.2009.06.024](#) [PMID: 19596446](#)
- Kargarfar M, Arizi Samani H, Bahadoran P. The relationship between positive affect after exercise training with intrinsic, external and relative autonomy motivation of

می‌تواند ارتقای سلامت روحی و روانی زنان را در این دوران حساس فراهم سازد. ارتقای سلامت روحی مادر نقش غیرقابل انکاری در سلامت جامعه دارد، همانگونه که مطالعات در سایر کشورها نشان داده مداخلات مناسب می‌تواند تاثیرات ماندگاری بر روحیه و نگرش مثبت مادر، نوزاد متولد شده و حتی سایر اعضای خانواده داشته باشد [۱۹]. بایستی اذعان داشت در حالیکه هنوز هم محققین فواید و مضرات ورزش در بارداری را موربد بحث قرار می‌دهند [۲۶, ۲۵]. مطالعه حاضر تأثیر تمرينات بدنی را بر افزایش سرزندگی زنان باردار نشان داد. محدودیت مشخص مطالعه حاضر تفاوت‌های فردی و اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر دریافت آموزشها و نیز عدم اطلاع دقیق و مستند از شرایط روحی و روانی زنان باردار قبل از انجام مداخلات بوده است.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر اهمیت انجام مداخلات بهداشتی آسان و در دسترس را که بدون عوارض بوده و می‌توانند به افزایش خلق

- pregnant women in the second period of pregnancy. Olympic Mag. 2004;3(12):83-98.
23. Barakat R, Pelaez M, Montejo R, Luaces M, Zakythinaki M. Exercise during pregnancy improves maternal health perception: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(5):402 e1-7. [DOI: 10.1016/j.ajog.2011.01.043](https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.01.043) PMID: 21354547
24. Farahani A. Comparison of quality of life for participants and non-participants in the sport for ladies. J Organ Behav Sports Manage Stud. 2014;1(1):11-20.
25. Di Mascio D, Magro-Malosso ER, Saccone G, Marhefka GD, Berghella V. Exercise during pregnancy in normal-weight women and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(5):561-71. [DOI: 10.1016/j.ajog.2016.06.014](https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.06.014) PMID: 27319364
26. Kramer MS. Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2002(2):CD000180. [DOI: 10.1002/14651858.CD000180](https://doi.org/10.1002/14651858.CD000180) PMID: 12076383

Effect of Relaxation Exercises on Vitality of Primigravida Women Referred to Prenatal Clinics

Farzaneh Soltani¹, Samereh Ghelichkhani², Parisa Parsa^{3,*}, Ghodratollah Roshanaei⁴

¹ Assistant Professor, Department of Midwifery, Research Center for Child and Maternity Care, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

² MSc Student, Department of consultation in Midwifery, Student Research Center, Department of Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

³ Associate Professor, Research Center for Chronic Diseases Care (at Home), Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

⁴ Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Heath, Hamadan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

*** Corresponding author:** Parisa Parsa, Associate Professor, Research Center for Chronic Diseases Care (at Home), Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail pparsa2003@yahoo.com

[DOI: 10.21859/nmj-25036](https://doi.org/10.21859/nmj-25036)

Received: 12 Feb 2017

Accepted: 28 Feb 2017

Keywords:

Pregnancy

Vitality

Relaxation

© 2017 Hamadan University of Medical Sciences

Abstract

Introduction: Vitality, as one of the components of well-being, decreases during pregnancy. The aim of this study was to examine the effect of relaxation exercises on vitality of primigravida women in Hamadan, Iran.

Methods: The present quasi-experimental study was conducted on 100 primigravida women referred to a prenatal care center in Hamadan, Iran. Before the intervention, all the pregnant women completed the questionnaires of vitality and demographic characteristics. The pregnant women of the intervention group participated in 8 sessions every two weeks with an emphasis on physical and relaxation exercises, while the control group received the routine care of the prenatal clinic. By the end of the sessions, the questionnaires were recompleted by both intervention and control groups and compared inter and intra two groups.

Results: The mean score of vitality of the women in the intervention group was 33.58 ± 7.31 before the intervention, and 38.32 ± 4.55 after the intervention, which showed a significant difference ($P < 0.05$), while the mean score of the vitality of the women in the control group was reduced from 36.32 ± 7.71 to 27.96 ± 7.30 , which showed a significant difference from the pre-intervention state ($P < 0.05$).

Conclusions: The present study shows the importance of the relaxation exercises as a simple and available health intervention, which could lead to the increased vitality in pregnant women.

How to Cite this Article:

Soltani F, Ghelichkhani S, Parsa P, Roshanaei G. Effect of Relaxation Exercises on Vitality of Primigravida Women Referred to Prenatal Clinics. *Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac*. 2017; 25(3):41-47. DOI: [10.21859/nmj-25036](https://doi.org/10.21859/nmj-25036)